

Vibrio parahaemolyticus

区分	手法名 (文献)	プライマー		反応温度条件	増幅産物 bp	備考	推奨度
		名称	配列(5'-3')				
PCR	Vp-tlh1/Vp-tlh2 (Haldar et al., 2010)	Vp-tlh1	GATTTGGCGAACGAGAAC	94°C5分→(94°C30秒、54°C30秒、72°C30秒)×30サイクル→72°C5分	695	<i>V.harveyi</i> , <i>V. campbellii</i> , <i>V. parahaemolyticus</i> のそれぞれの特異プライマー(Haldar et al., 2010)を用いたMultiplex PCRが可能。	—
		Vp-tlh2	CGTCTCGAACCAAGGCG				
	VP 1155272 F/VP 1155272 R (Kim et al. 2015)	VP 1155272 F	AGCTTATTGGCGGTTTCTGTCTGG	94°C5分→(94°C30秒、60°C30秒、72°C30秒)×25サイクル→72°C10分	297	<i>V.parahaemolyticus</i> , <i>V. cholerae</i> , <i>V. vulnificus</i> , <i>V. alginolyticus</i> , <i>Vibrio mimicus</i> , <i>Vibrio sp.</i> のそれぞれの特異プライマー(Kim et al., 2015)を用いたMultiplex PCRが可能。	—
		VP 1155272 R	CKCAAGACCAAGAAAAGCCGTC				
	toxR-F/toxR-R (Tsai et al. 2012)	toxR-F	GTCTTCTGACGCAATCGTTG	96°C5分→(96°C40秒、57°C40秒、72°C60秒)×35サイクル→72°C10分	368	<i>V.parahaemolyticus</i> , <i>V. vulnificus</i> , <i>Chryseobacterium meningosepticum</i> , <i>Edwardsiella tarda</i> , <i>Aeromonas hydrophila</i> のそれぞれの特異プライマー(Tsai et al., 2012)を用いたMultiplex PCRが可能。	—
toxR-R		ATACGAGTGGTTGCTGTCATG					
Vp.fluE-79F/Vp.fluE-934R (Tarr et al., 2007)	Vp.fluE-79F	GCAGCTGATCAAAACGTTGAGT	93°C15分→(92°C40秒、57°C1分、72°C1.5分)×35サイクル→72°C7分	897	<i>V. cholerae</i> , <i>V. parahaemolyticus</i> , <i>V. vulnificus</i> , <i>V. mimicus</i> , <i>Vibrio sp.</i> のそれぞれの特異プライマー(Tarr et al., 2007)を用いたMultiplex PCRが可能。	—	
	Vp.fluE-934R	ATTATCGATCGTGCCACTCAC					
リアルタイムPCR	<i>V. parahaemolyticus</i> (Uchiyama et al. 2012)	Vt-Forward	CCTTGATTCCACGCGTTATT	50°C2分→95°C10分→(95°C15秒、58°C60秒)×40サイクル	情報無	TaqMan Gene Expression Master Mix (Applied Biosystems)を使用。 <i>V. fischeri</i> , <i>V. parahaemolyticus</i> , <i>V. harveyi</i> のそれぞれの特異プライマー(Uchiyama et al., 2012)を用いたMultiplex PCRが可能。	—
		Vt-Reverse	ATCTGACGGAAGTCTGAGATTCCG				
		Vt-Probe	NED- ATTTGCGTACTGCTGTTTA -BHQ-MGB				
	<i>V. parahaemolyticus</i> (Liu et al. 2016)	toxrtF	CAATGACGCCTCTACTAATGA	95°C30秒→(95°C5秒、60°C31秒)×40サイクル	情報無	SYBR®Premix Ex Taq™ II (TaKaRa)を使用。	—
toxrtR		CACCAATCTGACGGAAGTGA					

文献

Haldar, S., Neogi, S.B. Kogure, K., Chatterjee, S., Chowdhury, N., Hinenoya, A., Asakura, M. and Yamasaki, S. (2010) Development of a haemolysin gene-based multiplex PCR for simultaneous detection of *Vibrio campbellii*, *Vibrio harveyi* and *Vibrio parahaemolyticus*. The Society for Applied Microbiology, Letters in Applied Microbiology, 50, 146-152.

Kim, H.J., Ryu, J.O., Lee, S.Y., Kim, E.S. and Kim, H.Y. (2015) Multiplex PCR for detection of the *Vibrio* genus and five pathogenic *Vibrio* species with primer sets designed using comparative genomics. BMC Microbiology, 15:239.

Liu, R., Qiu, L., Zhao, X., Zhang, H., Wang, L., Hou, Z., Gao, D., and Song, L. (2016). Variation analysis of pathogenic *Vibrio* spp. and *Pseudomonas* spp. in *Changhai mollusk* farming waters using real-time PCR assay during 2011-2014. Marine Biology Research, 12, 146-157.

Tarr, C.L., Patel, J.S., Pühr, N.D., Sowers, E.G., Bopp, C.A. and Strockbine, N.A. (2007) Identification of *Vibrio* isolates by a multiplex PCR assay and *rpoB* sequence determination. Journal of clinical microbiology, 45, 134-140.

Tsai, M.A, Ho, P.Y, Wang, P.C., E, Y.J., Liaw, L.L. and Chen, S.C. (2012) Development of a multiplex polymerase chain reaction to detect five common Gram-negative bacteria of aquatic animals. Journal of Fish Diseases, 35, 489-495.

Uchiyama, T., Kakizaki, E., Kozawa, S., Nishida, S., Imamura, N. and Yukawa, N. (2012) A new molecular approach to help conclude drowning as a cause of death: Simultaneous detection of eight bacterioplankton species using real-time PCR assays with TaqMan probes. Forensic Science International, 222, 11-26.7