昭和43年度

事 業 成 績 書

水 産 庁 北海道さけ・ますふ化場


十 勝 事 業 場



飼 育 池

1,296.00*m*t

天 塩 事 業 場



天 塩 支 場 庁 舎 99.17㎡



網走事業場 飼育池 663.90㎡





徳 志 別 事 業 場 ふ 化 室 62.8㎡

刊行のことば

わが国におけるさけ・ます増殖事業は、国際的な意義を背景に人工ふ化放流事業 が進められております。

昭和37年から「さけ・ます増殖事業強化拡充計画」を進めてまいりましたが、 いまだに目標を達成するに至つておらず、また沿岸回帰量も拡充計画で期待した量 よりも著しく低く、来遊量は地域的な偏重の傾向が強くなつております。

このため昭和43年度から「さけ・ます増殖事業推進整備計画」(3ヶ年計画) を立案しました。この計画は前記計画の補完が意図されており、主意は将来のさけ ます漁業資源の再生産管理の基盤を確立し、「さけ・ます資源拡大再生産計画」 (仮称)樹立の意図を含んだものであります。

すなわち、現在北海道に偏している国費の投資を本州を含めた新らたな観点にたって活用することを検討すべきであり、受益者は自から資源の増殖事業に参画し、国は合理的な資源管理および高度な技術開発をめざし、地方公共団体は増殖のための保護対策、有効な漁業調整、および自然環境の保全など、各種の調整を担当し、官民一体となつてさけ・ます再生産を図ることが、近代社会に即応した将来の理想的な体制と確信します。

本年度の全道沿岸来遊量は213万尾であり、全道的に不漁で、これは主群となる4年魚(1964年級群)の回帰が非常に少なかつたことと、稚魚放流数が多かつた年の回帰群である3年魚が期待したほど多くなかつた結果であります。

この原因については種々考えられますが、河川沿岸を含めて、稚魚期の環境条件の影響が大きく左右したものと思われ、今後は早急に調査研究を進め、対策を検討しなければならないと考えます。

以上のように、さけ・ます資源の安定と拡大を図るためにはまだまだ多くの問題 点があり、広く関係各位と協力し、こんごも一層の努力を重ねてまいりたいと思い ます。

昭和45年3月

水産庁北海道さけ・ますふ化場 場 長 逸 見 文 彦

水産庁北海道さけ、ますふ化場事業成績書

目 次

§	1.	さけ・ます捕獲事業実施体制	- 1
ş	2.	さけ・ますふ化放流実施体制	. 3
§	3.	さけ・ます増殖事業経費	- 5
8	4.	北海道さけ・ますふ化場の現員	6
§	5.	北洋さけ・ます漁業	7
§	6.	さけ・ます増殖事業成績総括	9
§	7.	さけ増殖事業	13
		1. さけの来遊(漁獲)状況と捕獲採卵の概況	13
		2. 沿岸漁業とそ上率	15
		3. さけ種卵の移殖	3 4
		4. さけふ化放流成績概要	3 5
ŝ	8.	ます増殖事業 グール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
		1. 捕獲採卵概要	46
		2. ます卵の移殖	64
		3. ますふ化放流成績 概況	65
§	9.	ひめます増殖事業	76
§	10	さけ・ます親魚蓄養成績	79
§	11	べにさけ生産事業	92
§	12.	ますのすけ増殖事業	101
§	13.	交配種增殖事業	105
§	14.	河口通過稚魚 観測事業	106
§	15.	降河稚魚保護事業	111
§	16.	稚魚 飼育事業	126
§	17.	調査研究	137
8	18.	資料の刊行	212

§ 1 さけ・ます補獲事業実施体制

昭和43年度のさけ・ます捕獲採卵事業は、道内、70河川、78捕獲場(さけ44箇所、さけ十 ます29箇所、ます4箇所、ひめます1箇所)で実施した。このうち国が実施した捕獲場は5箇所 (徳志別、西越、薫別、遊楽部および支笏湖)、民間団体に実施させた捕獲場73箇所(さけ43箇 所、さけ+ます26箇所、ます4箇所)で、その詳細については第1表のとおりであり、これを支場別 に整理したものが第3表である。

飽ひめます

○さくらます, からふとます 第1表 昭和43年度さけ・ます捕獲採卵事業実施体制 獲 担 当 実施区分 海 獲 担 当 実施区分 さけします さけます

	,,,	211	1			_		-	-	li .		215	1		ŀ		_	-	-	_
区	7		採身	羽 場	事業場	国	民	国	民	区			採	卵 場	事美	以場	国	民	国	民
	岩尾	1 別	岩片	礼 別	岩尾別		0		0		尻	別	名	駒	尻	別		0		0
	斜	里	斜	里	斜里		0		0	В	朱	太	朱	太	"	,		0		0
	藻	零	藻	琴	藻 零	E	0			本	利	别	冷	水	利	别		0		
オ	濤涉	串湖	濤	沸	網走		0			海	厚沢	部	厚	沢部	厚沥	部		0		
	能耳	文 湖	能	取	"		0			計		7		1 0		8	1	8	2	3
ホ	網	走	網	走	"		0				サシ	ルイ	サ	シルイ	羅	白				
1	,	,	西着	網走	"		0				羅	臼	羅	臼	"	,		0		
'	常	呂	常	呂	北見		0				春刈花	与丹	春〉	圳古丹	"	,				
ッ	サロマ	アベツ	ᄞ	マペツ	"		0			根	植	别	植	別	薫	别		0		
	湧	別	湧	別	湧 別		0			111	元崎氣	展異	元	奇無異	,	,		0		
2	渚	滑	渚	滑	渚 滑		0		0		崎 無	異	崎	無異	,,	,		0		
海	興	部	興	部	"		0		0		薫	别	薫	别	,,	,	0			
114	幌	内	幌	内	幌内		0			室	古多	糠	古	多糠	"			0		
区	雄	武	雄	武	"						忠	類	忠	類	伊森	仁		0		
	徳は	5 別	徳	志 別	徳志別	10		0			伊茶	仁	伊	茶仁	,,	,		0		
	幌	別	幌	別	北見幌然	31)	0		0	海	標	津	標	津	根	室		0		0
	頓	別	頓	别	頓別		0				当	幌	当	幌	計材	別		0		0
	猿	払	猿	别	"		. *		0	Ê	春	别	春	别	,	,		0		0
計		17		18	1	1	15	1	1 3	×	床	丹	床	丹	,,	,	1	0		0
	天	塩	天	塩	天 塩	[0				西	別	西	別	虹	别		0		0
.B		,	中	Л	中川		0		0		矢 臼	別	矢	白別	浜	中	\	0		
本	石	狩	石	狩	千 蒝		0				風	連	風	連	,	,		0		0
海	,	,	西	越	"	0		0			別当	賀	別	当 賀	厚	床		0		0
	/	,	音	江	音 江	:	0				穂	香	穂	香	,	,		0		
X	支参	5 湖	支	笏 湖	支笏湖			@		計		19		19		8	1	16	-	12
-							1	1	-	1			1							

-1-

海				捕		獲	担	当	実	施	区分	}	海				捕		獲	担	当	美	施	区分	}
	水		系						さ	け	李	す		水	3	系						さ	け	古	寸
区				採	卵	場	事美		国	民	国	民	区				採	卵	場	事業		国	民	国	民
	別須		2牛	厚		岸	太	田		\circ				静	F	内	静		内	静	内		0		
1	釧		路	釧		路	釧	路		0		٠		新	Ī	世	新		冠		7		0		
襟	冏		寒	阿		寒	阿	寒:		0			以	沙	Ž	流	富		Ш		,		0		
裳	茶		路	茶		路	鶴	居		0			N.	鵡	j	11	鵡		Ш	干	歳		0		
以	+		勝	千	代	田	+	勝		0				勇	d	丛	勇		払	,	,		0		
		//		打		内	,	,		0			西	白	Ē	老	白		老	白	老		0		
東		"		幕		別	幕	别		0				敷	Ŀ	Ė	敷		生	敷	生		0		
海		"		利		別		,		0				貫	気易	引	貫	気	別	,	,		0		
区		"		東	3 3	号	札	内		0			海	長	万亩	部	長	万	部	八	雲		0		
	歴		舟	歴		舟	大	樹		0				遊	楽台	部	遊	楽	部	,	,	0			-
-(8)	広		尾	広		尾	,	"		0			157	汐	Ý	白	沙		泊	/	,		0		
1	猿		留	猿		留	,	,		0	1		区	有	j	11	有		Ш	知	内		0		
計		~	8	- 4		12		8	_	12	-	*1		茂	辺地)	11	茂	刀地	Ш	/	,		0		
	仁	雁	別	仁	雁	別	静	内		0		0		亀	J	11	亀		///	,,			0		
襟	幌		别	幌		別	,	,		0		4		知	P	勺	知		内	11			0		
裳	元	浦][]	元	浦)11	,	,		O.			計		1	9			1 9		6	1	18	1	1
	Ξ		石	Ξ		石	/.	,		0			合計		7	0		1	78		41	4	69	4.	30

第2表 前年度対比変更箇所及び事項

事		項	捕採	酌	獲場	支	場	魚種	摘	要
新		規	能	Ţ,	取	北	見	さけ	そ上調査	
	11		サロ	コマ	ベツ		//	"	"	
休		止	音		别	十	勝	"		
	"		東	15	号		"	11		
新		規	猿		留		"	"	そ上調査	
休		止	様		似	干	歳	"		
新		規	沙		泊	渡	島	"	そ上調査	

第3表 支場別さけ・ます捕獲事業実施体制

		1	-	捕獲		実 施	区分			,
支	場	水	系		3	け	重	す	備	考
1				採卵場	国	民間	国	民間	*	3
北	見		13	14	-	13	-	10		
根	室		19	19	1	16	_	12	-	
+	勝		8	12	-	12	_	1		
天	塩		5	6	1	4	1	4		
千	蒇		14	16	1	14	2	1	ますの項ひめますを含む	
渡	島		11	11	1	10	1	2		
10			7 0.	78	4	59	4	3 0		
					Lancard Control of the Control of th	1			1	

§ 2 さけ・ますふ化放流実施体制

昭和43年度のさけ・ます人工ふ化放流事業は54箇所(国38箇所、民間16箇所)で実施し、48水系に稚魚を放流した。その他に捕獲を実施しているが、ふ化場のない水系、および捕獲、ふ化とも行つてない26水系にも稚魚を放流した。

昭和43年度さけ・ますふ化放流実施体制及び環元、移殖放流河川は第1表~第4表のとおり。 第1表 昭和43年度さけ・ますふ化放流実施体制

1	7	144				tr.	:04F		th its	放流実施		魚	種
海	放	流	放流実		支 場	魚	種		放 流		支 場		
区	水系	名	事業場	名		さけ	ます		水系名	事業場名		さけ	ます
	岩尾	別	岩尾	别	北見	0	0	根	標津	根室	根室		0
才	斜	里	斜	里	"	0	0		"	中標津	"	0 ,	
ホ	藻	零	藻	琴	"	0	0	室	当幌	計根別	"	0	
	網	走	網	走	"	0	0	海	西 别	虹別	"	0	0
1	常	呂	北	見	"	0		区	風 連	浜 中	"	0	0
ッ	湧	別	湧	别	"	0	0		別当賀	厚 床	"	0	0
1	渚	滑	渚	滑	"	0	0		7	8	1	7	6
	幌	内	幌	内	"	0	0		別寒辺牛	太田	十 勝	0	
海	徳志	別	徳志	別	天 塩	0	0	襟	釧路	釧路	"	0	
K	幌	别	歌	登	"	0	0	裳以	"	鶴居	"	0	
}	屯	别	屯	别	11	0	0	東	十 勝	十 勝	"11	0	0
		11	1	1	2	11	11	海	11	幕 別	"	0	
	天	塩	天	塩	天 塩	0	0	区	"	札内	11	0	
В	11		中	Ш	"	0	0		歴 舟	大 樹	"	0	
	石	狩	干	歳	千 歳	0	0		4	7	1	7	1
本	1	,	音	江	"			拉林	静内	静内	干 歳	0	1
海	支 笏	5 湖	支 笏	湖	11		@	常常	白 老	白 老	"	0	
付出	尻	别	尻	别	渡島	}	0	襟裳以	敷 生	敷 生	"	0	
区	利	別	利	別	"	0		西	遊楽部	八雲	渡島		0
	厚沥	巴部	厚沢	部	"	0		海区	知 内	知内	"	0	
		6		8	3	6	5	X	5	5	2	5	1
	羅	臼	羅	臼	根室	0	0	◆公三 L					
	伊森	~ 仁	伊茶	仁	"	0	0	総計	3 3	3 9	6	3 6	24

第2表 民間仮収容施設

	.V-			7	放		流	放	流 実	施	支	場	_	魚	種		備	考	
	淮	‡	12	_	水	系	名	筃	所	名	X	. <i>40</i> .	,	さけ	ます			~	
	才才	ーッ	ク海	華区	雄		武	雄		武	北		見		0	雄武法	魚恊		
1					時		前	辩		前	天		塩	0		宗谷	"		
	日	本	海	X	増		幌	増		幌		"		0		宗谷	"		
					暑	寒	别	増		毛		"		0		増毛	"	- 3	
	根	室	海	区	床		丹	床		丹	根		室		0	野村	"		

¥	放		流	放	流 隽	逐施	支		場	魚	種	所	属
海区	水	系	名	箇	所	名			7003	さけ	ます		1-1
10 -t- V= 57	矢	臼	别	矢	臼	别	根		室	0	0	別海漁恊	
根室海区	穂		香	穂	-	香		"		0		根室 "	
襟裳以東海区	音		别	4	IJ	111	+		勝	0		白糠 "	
er or	広		尾	広		尾		"		0		広尾 "	
襟裳以西海区	様		似	様		似	千		歳		0	様似町	
	元	浦	JH	元	浦	111		"		0		浦河町	
	鵡		111	鵡		111		"		0		鵡川漁組	
	貫	気	別	豊		浦		"		0		豊浦 "	
	有		Ш	有][[渡		島	0		上磯 "	
	茂	辺	地	茂	辺	地		"		0		茂辺地 "	
	亀		JII	亀		JII		"		0		木古内町	
計		1	1 6			1 6			6	13	4		

第3表 還元移殖放流河川

註	٠	○印は還元	圏 は移殖	
市士		() FIJV よびとし	(か) (11/197)回	

海		放流	実施	所	管	魚	種	海	+4-	流水系	放	旅隽	施	所	管	魚	種
区	放流水系	事 業	場	支	場	さけ	ます	区	瓜	加	事	業	場	支	場	さけ	ます
オ	能 取 湖	網	走	北	見	移			床	丹	計	根	别	根	室	0	
ホ	ライトコロ	常	呂	,	,	移		以	茶	路	鶴		居	+	勝	189	
1	佐呂 間別	湧	别	,	,	0		東	猿	留	+		勝		,	移	
ッ	芭 露	"		,	,	189	1		幌	満	千		歲	千	歳	移	
2	興 部	渚	滑	,	,	移		襟	様	似	静		内		"	移	
日	余 市	干	歳	干	歲	移		裳	幌	別		"			"	移	
本	朱 太	八	雲	渡	島	189		以	Ξ	石		//			"	0	
	植 別	羅	日	根	室	移		西	新	冠		"		1	"	0	
根	崎 無 異	"		1	,	0		海	沙	流		"			"	0	
	薫 別	伊茶	仁		"	0		区	勇	払	干		歳		"	0	
	古多糠	"			"	189			白	老	千	歳・剪	放生		"	0	
室	忠 類	"		1	"	0			長	万 部	遊	楽	部	渡	島	移	
	春 別	計材	别	,	,	8			沙	泊	茂	辺	地		"	0	

第4表 支場別さけ、ますふ化放流実施体制

+	75	放	流	泰	化	施設	<u> </u>	実	施	X	分	備	考
支	場	水系	《 数	国 営	民	間	計	さ	け	호	す	7/HS	
北	見		9	8		1	9		8		- 9		
根	室		10	8		3	11		9	1	8		
+	勝		6	7		2	9		9		1		
天	塩	1	7	5		3	8.		8		5		
干	歳		9	6		4	10		8		3	ひめま	すを含む
渡	島		7	4		3	7		6		2		
	計		48	3 8		16	54	4	18		28		

§ 3 さけ・ます増殖事業経費

昭和43年度、さけ・ます増殖事業のために要した経費予算及決算額は下記のとおりである。

第1表 昭和43年度さけ・ます増殖事業のための予算額及決算額

K	分		予	算	額		決	算	額		決算額(含む開発局外	分)
(組織)					P	9				円		円
水	産	庁										
(項)												
北海道さけ	・ますふん	七場	3 2	2,21	L 4,0 0	a	3 (3, 2	23,	261	311,404,191	Ĺ
(目)						-						
入 当	経	費	17	5, 5	56,00	0	1	67,6	5 4	,945	1 6 7, 6 5 4, 9 4 5	5
職員	旅	費		6, 2	43,00	0.		6, 1	. 7 3,	565	6,242,565	5
庁		費		6, 6	93,00	a		6, 6	4.0,	842	6,6 9 2,7 7 2	2
光 熱	水	料		2,2	7 5, 0. 0.	0.		2,2	7 4	,091	2,2 7 4, 0. 9 1	1
採卵ふり	比 放 流	費	7	3, 0	6 4,0 0	0.		7 0, 2	7 6,	256	7 0,2 7 6, 2 5 6	3
事業用機材	成器具 購	入曹	1	4,7	03,00	a		1 4,7	0 3	000	1 4,7 0 3,0 0	0.
土 地 建	物借	料		6	6 0,0 0	0.		Ę	9 7	032	597,085	2
各 所	修 繕	費		9, 1	65,00	a		9, 1	6 4	,980	9,164,980	Ω
施 設	整備	費	8	3,6	7 0, 0 0	0.		2 5, 5	5 5 4	,000	3 3,6 1 4,0 0	0.
国有資産所在	市町村交付	付金		1	8 5, 0 0	0		1	84	,5 5 0	184,55	Ω

§ 4 北海道さけ、ますふ化場の現員

昭和43年3月31日現在の本場及び支場別人員配置状況は第9表のとおりである。

第1表 北海道さけ・ますふ化場の職員本、支場別人員配置表

場	名	技	官	事	務	官	傭	人	
本	場	9	9		1	. 3		2	4 4
北	見	1	. 7			4		-	2 1
根	室	2	4			4		-	2 8
+	勝	2	2		·	4		-	2 6
天	塩	1	. α		*	2	e	-	1 2
干干	歳	1	1		`.	3		-	1 4
渡	島	-	8		, ,	3		-	1 1
計		1 2	1		3	3		2	1 5 6

註: 本場技官のうち9名は研究員

-6-

6 —				

§ 5 北洋さけ・ます漁業

1) 漁業規模

母船式さけ・ます流し網漁業(隻数)

企業別		昭和 年	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	38	3 9	40	41	4 2	4 3
母		船	1 6	1 6	1 6	1 2	1 2	1.1	11	11	11	1 1	11	11
独	航	船	461	460	410	410	3 6 9	3 6 9	3 6 9	3 6 9	3 6 9	3 6 9	3 6 9	3 6 9

48度以南流し網、はえなわ漁業(許可隻数)

許可別 昭和 年	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	40	4 1	42	4 3
大臣~中型 さけます流し網	2 3 1	241	2 4 8	2 6 4	277	2 4 2	283	293	3 1 7	3 2 0	3 2 3	太 327日 44
大臣~中型さけますはえなわ	3 7 3	373	3 7 3	373	3 7 3	3 6 9	369	369	3 6 9	369	3 6 9	3 6 9
知事~太平洋 7トン以上流し網	2 5 6	211	182	151	1 3 7	9 1	5 0	4 0	1 5	1 2	9	5

その他さけ・ます漁業(道知事許可隻数)

許可別	昭和 年	3 2	33	3 4	3 5	3 6	37	38	3 9	40	41	4 2	43
太平洋小型流	たし網 7トン未満				151	1, 3 6 7	1, 2 8 3	1, 2 8 2	1, 2 7 8	1, 2 8 0	1, 2 8 0	1, 2 8 2	1, 2 7 5
日本海小	ト型流し網			2 3 5	462	5 1 2	206	294	281	278	281	282	205
津軽海	峡 流 し 網				,		97	9 5	9 2	9 2	100	100	100
日本海小	型はえなわ			183	7 9	1,707	1, 1 3 3	1,016	916	3 3 9	3 9 7	477	483
太平洋小	型はえなわ	_ 1				6 8	1 4 2	162	3 1 8	305	308	3 0 5	263
オホーツクギ	毎 小型はえなわ					8 3	×	2 5 6	,			11	****
宗谷海峡	小型はえなわ	-							3 5 8		203	188	
支庁長~さけ	・ますはえなわ	7						6 4 0					

資料 : 「漁業養殖業漁獲統計表」および「北海道漁業現勢」

漁獲割り当て量と実績

実	12,810	16,919	2,111	4,885	917	37,642	6,003	2,720		8,723	46365	16,174	14,693	1	3 0,8 6 7	1,471	6, 3 0 8	1	2,779	1	3,493	ı	3, 493	984	2,524	1	3, 50 8	45,647	92012	8,935	8,164	1	17099	109,111
量ン宗の帰						37,763				8,737	46,500				27,420				12,180				2,950				3,950	46,500	93,000					
魚種	なないとく	しゃみなな	ななる数	fm #6	なちのちゃ	計量	\$ 10	ton 146	み の 街	100		40	for 186	その 街	tho	5	40	かの街	ılıa ı	な	10 0	み の 街	nha	to to	₩ ₩	み の 街	-thu			な	†n	み の 毎	dun	
漁業種類	母船、						48度以南流し網				十二	48度以南流し網				はえなわ				日本海流し 鑑				7トン未満流し網		,		神	台					4
操業区域	A 区 域											B区域																	規制区域	規制区域外(分計)		,	,	30

第14回日ソさけ・ます委員会準備資料による。

§ 6 さけ・ます増殖事業成績総括


昭和43年度さけ・ます捕獲採卵事業は1月15日西別採卵場の事業終了をもつて、全道の業業を完了した。その結果は以下のとおりである。

第1表 海区别、魚種別成績集計

	魚		種			र्वे ।	1	V.	t		さ	(5	重 3				72 0	っふと	ます	
海区			目	水系数	実施個所数	捕獲数	採卵数干粒	収容卵数	放流尾数	水系数	獲数尾	採卵数	収容卵数	放流尾数千尾	水系数	実施個所数	捕獲数	採卵数干粒	収容卵数	放流尾数千尾
	計		画	12	13	6 5, 4 0 0	8 5, 3 7 8	138,477	110,781	7	3,700	6,364	6,364	5,090	14	14	1 2,4 0 0	6,806	8,806	7,044
オホーツク海区	実		績	13	13	3 2,5 6 2	4 1,8 3 9	43,810	37590	7	1,490	7,115	7, 115	6,402	14	14	38,829	19,888	16,630	1 4,1 8 5
	達	成	率			% 49.8	4 9. 0	3 1.6	3 3.9		1715	111.8	111.8	1 2 5.8			3131	292.2	1888	201.4
	計		画	5	8	2 1,1 0 0	2 5, 7 3 2	6 2, 1 0 7	48,416	4	L, Q Q Q	1,4 4 6	1,4 46	1,1 5 7	1	1	3 0 0	148	148	118
日本海区	実		績	5	8	17081	14,980	16,707	12,067	4	8 3 6	1,509	1,497	1,1 19	1	1	311	133	133	123
	達	成	率			% 81.0	5 8.2	2 6.9	2 4.9		836	1044	1035	9 6.7			1037	8 9.9	8 9 9	104.2
	計		画	17	17	178,900	216,400	170,310	136,247	7	3,800	4,793	4,793	3,835	8	8	47,500	2 3,7 7 9	19,779	15,823
根室海区	実		績	17	17	86,417	94,351	9 2,3 2 5	78,878	8	3,260	2,9 5 6	2,9 5 6	2,4 0 6	12	12	26,466	5,5 0 3	6,613	5,274
	達	成	率			% 48.3	4 3.6	5 4.2	5 7.9		8 5.8	6 1.7	6 1.7	6 2.7			5 5.7	2 3.1	3 3.4	3 3.3
	計		画	7	12	300,800	299,854	230,686	184,549						2	2	3 0 0	150	150	120
襟裳以東海区	実		績	8	12	8 5, 0 5 4	7 2, 5 4 7	7 2,6 6 7	6 4, 0. 5 6						1	1	3.0	13	13	11
	達	成	率	*		% 283	2 4.2	3 1.5	3 4.7								1 0.0	8.7	8.7	9.2
	計		画	18	18	2 2,8 0 0	27,676	5 3, 4 6 0	4 4, 0, 4, 3	1	100	96	96	7 7	1	1	5 0 0	2 27	2,227	1,7 8 2
襟裳以西海区	実		績	19	19	1 4,5 6 0	11,369	1 5,6 0.5	1 4, 8 4 7	1	10	12	12	0.	1	1	238	4 0	2,1 8 8	1,876
	達	成	率			% 63.9	41.1	2 9. 2	3 3,7		1 0.0	1 2.5	1 2.5	0.			476	176	982	1 0 5.8
	計		画	59	68	589,000	655,040	6 5 5, 0 4 0	5 2 4, 0 3 1	19	1,600	1 2,6 9 9	12.699	10,159	26	26	6 1,0 0 0	31,110	31,110	2 4,8 8 7
승 計	実		績	62	6 9	235,674	2 3 5, 0 8 6	2 4 1, 1 1 4	207438	20	5, 5 9 6	1 1,5 9 2	11,580	9,9 2 7	29	2 9	6 5, 8 7 4	25,577	25,577	21,469
	達	成	率			% 40.0	3 5.9	3 6.8	3 9. 6		1 3 4.4	9 1.3	9 1.2	977			1080	8 2.2	8 2. 2	8 6.3

[※] 海産親魚からの卵数 6,6 6 0 千粒は含まず。

	魚	種			<i>V</i>	めま	す				交	配	種		É	<u></u>	1	
海区		目	水系数	実施個所数	捕獲数尾	採卵数干粒	収容卵数	放流尾数		実施個所数	捕獲数	採卵数	収容卵数	放流尾数	捕獲数尾	採 卵 数	収容卵数 千粒	放流尾数
	計	画									-	-	_	_	8 4,5 0 0	98,548	153,647	1 2 2,9 1 5
オホーツク海区	実	績									8 8	6 0	60	8	8 2,9 6 9	68,902	67,615	58,185
	達	成 率						š							9 8.2	6 9.9	4 4.0	473
	計	画	1	1	19,460	3, 5 0 0	1,3 0 0	1, 0 4 0							4 1,860	3 0. 8 2 6	75,001	50,731
日本海区	実	績	1	1	13,852	2,6 8 8	7 5 2	380							3 2,0 8 0	19.310	19,089	13,689
	達	成 率			71.2	7 6.8	578	36.5							7 6.6	6 2.6	2 5.5	270
	計	画													2 3 0, 2 0 0	2 4 4,9 7 2	194,882	155,905
根室海区	実	績										v.			116,143	102.810	101,894	86,558
	達	成率											-		5 0. 5	4 2.0	5 2.3	5 5.5
	計	画													301,100	300,004	230,836	184,669
襟裳 以東海区	実	績											*		8 5, 0 8 4	7 2,5 6 0	7 2, 6 8 0	6 4,0 6 7
	達	成率		_					_	<u> </u>	-				2 8.3	2 4.2	3 1.5	3 4.7
	計	画													2 3, 4 0 0	27,999	55,783	45,90.2
襟裳 以西海区	実	績					-								1 4,8 0 8	1 1,4 2 1	17805	1 6, 7 2 3
	達	成 率					d -		_	_					6 3.3	4 0.8	3 1.9	3 6.4
	計	画	1	1	1 9, 46 0	3,500	1,3 0 0	1,040			-		-	-	681,060	7 0 2, 3 4 9	700,149	560,117
슴 計	実	績	1	1	13,852	2,688	7 5 2	380			8.8	6 0.	6.0	8		275,003	279,083	2 3 9, 2 2 2
	達	成率			7 1.2	7 6.8	5 7.8	3 6.5							4 8.6	3 9. 2	3 9.9	4 2.7



第2表 海産親魚からの採卵数(さけ)

_				_			-			_		
海区	5	_	事項			別	採	戼	数 干粒	補	備	考
				岩	尾	別		1,	6 5 0.			
1				斜		里		1	683			
オ	ホ	ーッ	2	網		走			451			
		-		常		呂			202			
				佐	呂間	別			429			
					計			3,	415			
				羅		臼			137			
根			室	薫		別			17			
				伊	茶	仁		2,	236			
					計			2,	390			
				歴		舟			5			
襟	裳	以	東	広		尾			117		*	
					計			3	122			
				仁	雁	別			3 9 2			
襟	裳	以	西	元	浦	Ш			163			
				有		Ш		1	178			
					計				733			
		合			計			6, 6	3 6 0			

§ 7 さけ増殖事業

1 さけの来遊(漁獲)状況と捕獲採卵概況

昭和43年(1月~12月)の全道の沿岸来遊量は213万尾で、全道的に(襟裳以西海区を除いて)昭和34.35年に次ぐ不漁であつた。これは主群である4年魚(1964年級群)の回帰量が少なかつたこと、3年級群の再生産量が多かつたにも拘らず、その回帰量が期待したほど多くなかつたためである。

河川そ上数(捕獲数)は、沿岸来遊量が少なかつた上に、最近の沿岸漁業努力の強化が反映して河川そ上率も低く110%を示し、捕獲数は286万尾と近年になく少なかつた。

本年度の計画目標数は親魚 5 8 9,0 0 0尾、採卵数 6 5 5,0 4 0 千粒の計画をもつて、5 9 水系 6 9 個所の捕獲採卵場で実施した。

					В	召和	4 3 年度	Ē	昭和42年度	前年度との対比
D	S 5.	}	計	画	数	実	績	達成率	実 績	増 減 △
捕	獲	数	尾	5 8 9,	0 0 0		235,674	% 40.0	5 9 1, 8 7 7	△ 356,203
우	使 用	数	尾	2 4 5,	780		8 8,7 9 4	3 6.1	2 0 2,2 3 4	△ 113,440
採	明	数	干粒	6 5 5,	0.40		2 3 5, 0 8 6	3 5.9	538,951	△ 303,865
1:4	流 尾	坐女	千尾	5 2 4.	031		207438	3 9.6	434,729	△ 227291

第1表 事業計画と実績並びに前年度との比較

各海区の状況は次のとおりである。

(1) 日本海区

この海区では石狩川の資源が極端に減少したため例年回帰量が少なく、資源も回帰されていない。沿岸漁獲は約5万尾にとどまり、主群は4年魚(786%)で、その大半は天塩川の資源であった。また、河川捕獲ではそ上率が高く、344%(17万尾)であった。

各地区毎の概要についてみると、天塩では小型魚が多く雌が約70%で比較的成熟魚が多かつたが不漁(昨年の80%)。豊富では昨年の漁獲の60%で、9月は好漁であつたが、10月に入つて減少した。魚体は中程度のものが多く雄が若干多かつた。遠別では海況も静穏で漁獲は昨年より若干よいが、例年なみで、魚体は大きくて雌が多く、軽漁期も早かつた。増毛では春期好天に恵まれたが、後期は荒天が多かつた。浜益では昨年より若干良かつたが、石狩、厚田では昨年より不漁で小型魚が多かつた。

日本海北部の河川では6月初旬異常渇水があり、9月初旬降雨に恵まれた。10月初旬の軽漁期に

も降雨増水があり捕獲装置の冠水、欠壊があり若干が上流に逸迷しをが、捕獲では目標の110.8 %(1.8万尾)を示した。

石狩川では昨年より幾分良好であつた。これは河川内密漁取締の強化と、昨年のような泥炭の 流下が、なかつたことが要因と思いしる。また特に西越捕獲場では捕魚車を再使用した。(昭和 41、42年度は捕魚車を中止して捕獲槽を設置。本年度は両施設を併設して比較した結果、補 獲比は9:1で捕魚車の高率度が立証された。)

日本海南地区では昨年の捕獲が985%の計画達成(36千尾)であつたのに、本年は22% (1.千星)で昨年の%にも満たなかつた。

(2) オホーック海区

この海区は前年度の60%(80万尾)で最近の最低漁獲量であつた。魚群の年令構成は4年魚 (392%)、3年魚(370%)が主群で、2年魚(161%)の出現率が比較的高かつた。 また、河川の年令別回帰状態をみると網走川では(高率順に3年魚-4-2-5)高年令群の回 帰が少なく、湧別川ではその傾向が更に著しく(3-2-4-5)、特に2年魚は例年より著し 〈多かつた。沿岸漁獲量は、斜里、網走地区で61.7万尾、湧別、常呂地区で9万尾、紋別、枝 幸地区で3.5万尾、浜屯別、猿払地区で2.7万尾と両地区ほど少なくなつている。

河川捕獲数は来遊量の4.1%(3.3万尾)と低かつた。これは、例年そ上量の多い網走川、湧 別川の高令魚が少なかつたことに起因する。また、幌別川の捕獲が多かつたのは、4年魚の資源 量が多かつたためである。

雄武以東ではほぼ昨年の光程度の漁獲であつたが、斜里地区はて0%を示した。斜里、ウトロ 沿岸では漁期が早く、9月中旬から本格化したが、斜里、網走地区では10月に入つて30分が プナ毛となり、下旬には漁獲が低下し、ブナ毛が70%となつた。

枝幸では海沢平穏で魚体は不揃いで雌 5 5 %で漁獲は許年の 6 2 %。 屯別では海水温がや 3 高く 魚体不揃いで、漁獲は昨年の75%。猿払では11月下旬に時化があり、終了期は漁獲不振であ つたが、漁獲量は、昨年より若干良かつた。宗谷では魚体は大きいが、昨年の1/8 程度で終つた。

(3) 根室海区

この海区は、前年度沿岸来遊量は160万尾と未曾有の豊漁に恵まれたが、本年は約65万尾 と平年漁であつた。年令構成は4年魚が最も多く(54.8%)、3年魚(32.7%)、5年魚 (118%)の順で、5年魚の比が例年に比較して多かつたが、これは前年豊漁4年級群の生残 りが回帰したものと見られる。

この海区を便宜的に6地区に区分出来るが来遊期についてみると例年と同様に軽漁期のピークは 羅臼9月下旬、標津10月上・中旬、野付10月中旬、別海10月中旬~11月上旬と知床半島 から順次南下の傾向が見られる。また風連湖地区は9月中、下旬、根室地区では10月上旬とな つており、前記4地区とは異なつた系統と見られる。

河川親魚そ上率は133%で昨年の109%に比べ若干アップし64.8万尾であつた。

(4) 襟裳以東海区

この海区は昭和39年(1964)以来沿岸来遊量は100万尾以上の豊漁が続いたが、本年 度はこれを大巾に下廻り 41万尾とやや不漁であつた。

年令構成では3年魚(46.3%)、4年魚(33.2%)、5年魚(18.9%)の順で、この海区 としては4年魚の占める割合いが、非常に小さく、逆に3年魚の比率が高かつた。これは、昭和 39年度が3年魚の出現が多かつたため豊漁であつたが、前年は、この1964年発生群が、3 年魚として回帰量が少なかつたので、従つて本年の4年魚不振のため不漁に見舞われた。

海区内重要河川の十勝川についてみると、そ上期は例年よりも早く、そのピークは例年と同じく 9月下旬であるが、山が10月上旬まで継続しなかつた。年令構成は3年魚、5年魚の出現が多 く、4年魚は少ない。釧路川では10月上旬にあるピークは本年も同様であるが、例年10月下 旬にも見られるピークが中旬に早まつており、この傾向は近年に見られない現象で、年令構成は 3年魚(718%)、4年魚(227%)、5年魚(4.9%)と、3年魚が非常に高率で、変則 的な年令組成を示した。また歴舟川は若令魚の出現が多かつた。

河川捕獲については、最近にない減少値を示し、特に十勝川では5.5万尾と極端に少なく、釧 路川も2.6万尾と不振であつたが、歴舟川はこの川として比較的多かつた。

(5) 襟裳以西海区

この海区では前年度の70%(22万尾)とやや不漁であつた。年令組成は3年魚(382%) 4年魚(330%)、2年魚。(140%)、5年魚(50%)の順で、3年魚が主群であり、2 年魚の出現も多かつた。

沿岸漁獲では日高地区で最も多く漁獲されたが、その中でも幌泉地区がその大半を占めた。例 年ドかり9月1日から着業しているが、初漁は悪く、幌泉地区では11月下旬から12月上旬に かけて若干よくなつた。日高沿岸では10月上旬から20℃の海水帯が拡がり長く停滞した。

道南地域では約4万尾の漁獲であつたが、とのうち70%は噴火湾で漁獲されている。 河川の年令別回帰状態をみをと、静内川と茂辺地川では8年魚が主群であり、2年魚の出現が多 く、特に静内川で著しい。また、勇払川は3年魚と4年魚の出現がほぼ同程度であつたが、遊楽

河川捕獲についてはそ上率が6.6%と従来より若干向上したが、沿岸来遊量が少ないため1.5万 尾にとどまり、特に茂辺地川のそ上が少なかつた。

2 沿岸漁業とそ上数

部川では高令魚が多かつた。

北海道沿岸におけるさけ漁業はさけ定置網、雑小型定置網、雑刺網などがあり、漁獲量の大部分は さけ定置網によつている、従つて河川そ上親魚量はこれらの漁獲努力によつて大きな影響がある。

本年度 北海道沿岸に来遊した秋さけは約214万尾で、昭和34、35年度についで不振であつた。 (過去5ヶ年平均413万尾)。一方河川へのそ上総数は約236万尾で沿岸来遊量の110%に当 り例年より若干下廻つた。(5ヶ年平均183%)。しかし海区別にはまだまだ大きな差があり海区 別漁業資源の均てん化と共に大きな課題となつている。

各海区における秋さけを対象とした秋さけ定置網の許可統数は昨年と同様であるが(明年度から第 4次切替によつて変更)、雑小型定置網305ヶ統のうち、さけ混獲の多いものについて整理統合を 行ない、295ヶ統を対象として、このうち127ヶ統については、暫定的に本年度限りさけ定短期 免許として許可された。これらの海区別内訳は第2表のとおり。 (昭和 4 3 年度)

2表	毎区別さ	け定置	網統数	昭和 4 3 4	王度限り	1						i		年度限り
海	区	支庁	設 置統 数	整理対象小定置	さけ定設置数	Ä	毎	X		支庁	設統	置数	整理対象 小 定 置	さけ定設置数
オホーン	ツク海区	網走	111	18	9	根	室	海	区	根室		7 2	137	5 9
		宗谷	27	4.8	9	with a	Ma Iv I	who she	· E.S.	釧路		0.0		
		留萌	22	5	3	祭	是以	東海		十勝		98		
日本	海 区	石狩								日高		104		
		後志	2 7			禁	裳以	西海	X	胆振		9	4 4	21
		檜山	_							渡島			4 3	16
									計			470	295	127

第3表 北海道におけるさけの沿岸漁獲数並びに河川捕獲数と河川そ上率

	年		1 9 6 0	1961	1 9 6 2	1963
海区	事項	度	(35年度)	(36年度)	(37年度)	(38年度)
才太	沿	岸	1, 0 1 0	1, 5 4 3	1, 2 5 0	1821
オホーツク	河	JII	1 3 8	6 2	5 7	6 6
海	合	計	1, 1 4 8	1, 6 0 5	1, 3 0 7	1, 8 8 7
X	河川そ	上率	1 2.0	3. 9	4. 4	3. 5
	沿	岸	3 6	2 6	6 9	6 2
日本	河	JII	8	1 4	2 2	2 2
海区	合	計	4 4	4.0	9 1	8 4
	河川そ	上率	1 8 2	3 5. 0	2 4. 2	2 6. 2
	沿	岸	1 1 4	4 1 5	2 9 3	5 2 9
根室	河	Ш	6 6	152	1 2 5	1 2 1
海区	合	計	180	5 6 7	4 1 8	6 5 0
	河川そ	上率	3 6. 7	2 6.8	2 9. 9	1 8 6
	沿	岸	1 6 0	3 6 5	4 2 7	6 3 9
襟東 裳海	河	JII	8 0	178	1 4 5	1 3 6
以区	合	計	2 4 0	5 4 3	572	7 7 5
	河川そ	上率	3 3. 3	3 2.8	2 5, 3	175
Autor - pro-	沿	岸	1 0 4	1 6 5	3 4 9	3 5 7
襟西 裳海	河	JII	1 3	2 1	2 2	1 6
以区	合	計	1 1 7	1 8 6	3 7 1	3 7 3
	河川そ	上上率	1 1. 1	1 1. 3	5. 9	4. 3
全	沿.	岸	1, 4 2 4	3, 5 1 4	2, 3 8 8	3, 4, 0, 8
道	河	Ш	3 0 5	4 2 7	3 7 1	3 6 1
合計	合	計	1, 7 2 9	2, 9 4 1	2, 7 5 9	3, 7 6 9
u,	河川る	と上率	1 7. 6	1 4. 5	1 3. 4	9. 6

1964	1965	1966	1967	1963~1967	1968
(89年度)	(40年度)	(41年度)	(42年度)	5 ケ年平 均	(43年度)
1, 5 4 6	1, 0 7 6	1, 5 2 4	1, 3 1 7	1, 4 5 7	7 6 9
5 0	2 5	7 1	4 8	5 2	3 3
1, 5 9 6	1, 1 0 1	1, 5 9 5	1, 3 6 5	1, 5 0 9	8 0 2
3.1	2. 3	4.5	3. 5	3. 4	4. 1
3. 9	2 2	3 3	4 7	4 1	3 3
1 2	1 3	1 6	1 2	1 5	1 7
5 1	3 5	4 9	5 9	5 6	5 0
2 3. 5	3 7. 1	3 2. 7	2 0. 3	2 6.8	3 4. 4
5 0 4	1, 2 0 7	7 1 3	1, 4 4 0	8 7 9	5 6 1
1 8 2	162	1 3 8	1 6 3	1 5 3	8 6.
6 8 6	1, 3 6 9	8 5 1	1, 6 0 3	1, 0, 3, 2	6 4 7
2 6. 5	1 1.8	1 6. 2	1 0. 2	1 5. 0	1 3 3
8 3 8	1, 3 6 5	7 6 6	8 0. 3	8 8 2	3 2 9
3 3 6	5 9 6	154	3 5 3	3 1 5	8 5
1, 1 7 4	1,961	920	1, 1 5 6	1, 1 9 7	4 1 4.
2 8.6	3 0. 4	1 6. 7	3 0. 6	2 6. 3	2 0. 5
2 9 3	2 7 3	3 7 2	3 0 2	3 1 9	2 1 0
1 4	1 0	1 8	1 6	1 5	1 5
3 0 7	2 8 3	3 9 0	3 1 8	3 3 4	2 2 5
4. 6	3. 5	4. 6	5. 0	4. 5	6. 5
3, 2 2 0	3, 9 4 3	3, 4 0 8	3, 9 0 9	3, 5 7 8	1, 9 0 2
5 9 4	8 0 6	3 9 7	5 9 2	5 5 0	2 3 6
3, 8 1 4	4, 7 4 9	3, 8 0 5	4, 5 0 1	4, 1 2 8	2, 1 3 8
1 5. 6	170	1 0. 4	1 3. 2	1 3 3	1 1. 0

(注)1 千尾未満の数字は四捨五入によりまとめた。

2. 上表の河川そ上率とは河川捕獲数÷(沿岸漁獲数十河川捕獲数)である。

第4表 昭和43年度そ上さけ年令組成


(昭和43年秋---1968)北海道域


插卡粉	4	2 5 0	1 3 8	80 80	1.24	8	206	73	4.9	4	129	149	2 7 8	2 5 9	.3 8 5	644	F. 53	1 6 5	69 61 60	1 1 2	5 4 4	ابر در در در	6 0 5	77 00 20	874
88	9																								
华	r3	1 0.0	5. 7	8 2	4.0	4	ගේ		2.0	9.0	0. 7	1. 3	1 1	ಕ	0.8	1.8	.c.	2 2	80 A1	1 3 4	2 2	1 0.8	7 2.2	4 6.6	6 0 9
	4	4 6.0	3 1.9	3 & 6	8 6	8 0.5	6 2 8	10001	8 8.7	8 4.3	8 7 6	7 5.2	8 0.9	0 2 3	2 2 3	2 4.2	7 9.7	6 9, 1	7 4.8	2 8 1	3 6.8	3 1.9	2 7 8	4 7 3	3 6. 4
年	co	4 3.6	4 2.8	4 % 2	8	1 5.9	80		1 4.3	1 3 7	1 1.6	2 1.5	169	4 5.2	4 3 1	4 3 9	1 0.8	9 2 1	1 4.2	4 5. 7	3 5. 7	4 1.4		6.1	2.2
	63	0.4	1 9.6	1 0.4		1.2	0.5					2.0	1.1	9 4.7	රේ රේ ලෝ	3 0.1		6. 1	T 05	1 2.8	2 0 0	159			
型	118	Ol-	(0	ina ina	ot	€0	iha	O+	(0	the	O+	(0	iha	OF	€0	ilin	O+	€0	nha.	0-	(0	illia	O+	(0	illin
44	原本 突 果 月 日		9.26~11.11			9.25~11.22			9.14~ 9.26			9.14~ 9.80	_		10.14~11.80			9.14~11.19			8.14~12.11			1 0. 7~12. 5	
	始		Ξ						別川			111 118 3			11 11			H			=			H H	
	TI III		石 猝			州			海			北. 晃 幌			海 別			部			網港			黨 別	
連	XI 4P		Ш	*	埋	X						k .	\	- ;	3)	n :	連 1	X		1			単	例	進区

大	+	149	161	310	152	80	237	96	210	306	7.4	5.6	130		276	276	244	460	704	2.4	5.7	8.1	8.7	159	246	327	213	540
瀬	Ś				_	_	-			_						-			-			-					_	_
(%)	9	0.7		0.3		×											0.6	0.1	0.3								1.0	0.3
⟨F	್ತುಚ	564	2 8.0	4 1.6	4 9.4	2 2.3	39.6	6.3	ಣ ಣೆ	4.2	0 2 4	7 1.4	7 4.6		4.9	4.9	29.5	20 00	2 5.4	8.8		2.4	1 6.1	1.8	6.8	1.9.3	& હાં	1 2.8
	4	36.9	472	4 2.3	4 4.7	5.1.8	473	8 2 3	5.4.3	55.2	21.6	2 3 2	2 2.3		2 2.7	2 2.7	43.6	3 5.3	381	1 2.5	30	6.2	42.5	1 2.0	22.8	6 9.7	4 5.5	60.2
中	ဇ၁	6.0	20.5	135	5.3	9.4	6.8	35.4	41.9	3 9.9	1.4	5.4	3.1		7 1.8	7 1.8	26.0	3 9.0	3 4.6	79.2	965	91.4	39.1	434	4 1.9	11.0	4 4.1	2 4.1
	5		4.3	2.3	0.6	16.5	6.3	1.0	0.5	0.7				*	0.6	0.6	0.3	2.3	1.6				2.3	4 2.8	285		6.6	2.6
和	別	0+	€0	咖	아	€0	itha	아	€0	nha	0+	€0	गोत	아	€0	illia	0+	60	iihta	아	€0	nina.	0+	€	iha	아	€	illia
插木碎雕田田	****		$9.13 \sim 12.10$			9. 4~12.19			9.22~11.7			9.27~10.30			9.24~12. 3			9. 4~12.10			1014~11 2			9 4~12. 5			828~11.7	
H	1		Ξ			Ξ	-		Ξ			Ξ			Ξ		-	Н			Ξ			Ξ			Ξ	
Ξ			茶			赸			別			泄			盆			盤			尾		.*	K			北	
原			垂			韓			团			画			畿			+			日			韓			黑	
海区	선					梅		栅		⊭		X			Н	2	H :	以 由	米海				H	→		加集	M	

C1	ß	1 2	7	1 9	03	00	9		3		海	×	別	さ	け	事	業	成	績	凶
----	---	-----	---	-----	----	----	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

-	-		_		_	_																				
+	命令数				3.0	6	3.9	3.0	2 0	5.0	本	888	5	93	2.9	57.	8.2	31	28	5.9	121	77	198	3.7	3.2	6 9
	9																	-	•	-						
令 (%)	ಭ		-		26.7		20.5	ಣ ಣೆ		2.0		6.7	1.9	4.2	2 4.1	9.4	1 4.6	32		1.7	14.0	1 1.7	131	10.8	1 2.5	11.6
	4			1	6 3,3	හ ග් හ	564	86.7	4 0.0	680		6 5. 8	5.2.7	5.8.1	586	4 3.4	488	6 4.5	7 1.4	8 2 9	36.4	14.3	278	929	4 0.6	75.73
年	60				1 0.0	6 6.7	23.1	10.0	5.0.0	26.0		26.3	21.8	237	138	189	1 2 1	8 2.8	6 2 1	25.4	49.6	55 S	5.2.0	2 1.6	37.5	290
	22								10.0	4.0			23.6	1 4.0	3.5	283	19.5	_	10.7	5.1		182	7.1		9.4	A 50
却	別	O+	€0	nha.	O+	€0	illia	0+	€	nha		0+	€0	nha	아	(0	गीन	아	€	illia	아	60	ilha	O+	€	nh
4	縣本採業 月日	6	9.24~12.16			$11.15 \sim 11.26$							$10.17 \sim 11.27$			11.12~12. 7			10. 7~1124	*		$11.16 \sim 12.29$		**	$10.14 \sim 11.23$	
-	仲		Ξ			Ξ			Ξ				Ξ	<u> </u>		Ξ			=			Ξ			Ξ	
3	=		業						内				觀	魚野		数			入瀬			植			田	
]	更		拟			ə			以		1			₩. 		類			歐			K			净	
集	区名		Н	J.	H	刘	团	堆	M				Ш	H	典	M			K	H	壮	典				





第5表 昭和43年度海区別さけ事業成績集計表

項		捕	獲採	卵 成	績	
海目	捕	獲	数	우	♀ 親 魚	♀ 親 魚
Z	우	8	計	性 比	使 用 数	使 用 率
オホーツク海区	16,190	16,372	3 2,5 6 2	4 9.7	15,317	9 4.6
日 本 海 区	8, 2 3 9	8, 8, 4, 2	17,081	4 8.2	5,714	6 9.4
根室海区	3 9, 4 7 7	46,940	86,417	4 5.7	38,5.09	975
襟裳以東海区	3 3,7 3 6	5.1,318	8 5, 0 5. 4	3 0. 9	2 4,8 4 9	7 3.7
襟裳以西海区	6,053	8, 5. 0. 7	1 4,5 6 0	4 1.6	4,405.	7 2.8
合 計	103,695	131,979	2 3 5,6 7 4.	4 4.0	88794	8 5.6

第6表 昭和48年度支場別さけ事業成績集計表

		項				捕	ì	獲	採	卵	成	績					
海		\	目	捕	獲		数				φ.	우	親	魚	우	親	魚
	区			우	8			計		性	比	使	用	数	使	用	率
北	見	支	場	13,644	1 3, 3	3 4		2 6,	978		5.0.6		1 3, 1	72	,	9	6, 5
根	室	支	場	3 9, 4 7 7	4 6, 9	4.0		8.6,	417		4 5.7		3 8, 5	09		9	7. 5
+	勝	支	場	33,736	5.1,3	18		8 5,	0 5 4.		3 9.7		2 4,8	4.9		7	3.7
天	塩	支	場	8,7 2 7	9, 0	01		1 7,	728		4 9. 2		6, 3	0.5		7	2.2
千	歳	支	場	4,836	7, 6	31		1 2,	467		3 8.8		2,7	4.8		5	6.8
渡	島	支	場	3,2 7 5	3, 7	5.5		7,	030		4 6.6		3, 2	11		9	8.0
É	À	Ē	H	103,695	1 3 1, 9	7 9		2 3 5,	674		4 4.0		88,7	94.		8	5.6

					ふ化	放 流	成 績	
平	均	採卵数	実施期間	収容卵数	ふ出尾数	率出る	放流尾数	+4-7-5-1199
採卵	数	干粒	关加約[6]	千粒	干粒	96	千尾	放流期間
2	,730	41,839	9.1~12 27	43,810	38780	8,8,5	37,590	2.1 5-6.9
2	620	1 4,9 8 0	8. 2 4~12. 10	16,707	1 5, 2 2 3	9 1.1	1 2,0 6 7	3.3-6.2
2	.450	9 4,3 5.1	9.1~ 1.15	9 2,3 2 5	8 2,4 9 8	89.4	78,878	3.1-6.1
2	,920	72,547	9.1~12.25	7 2,6 6 7	6 5,6 0 5	9 0.3	6 4,0 5.6	3.16-6.4
2	,580	11,369	8.24~12.31	15,605	1 3, 8 7 5	8.8.9	1 4,8 4 7	2.25-5.2
. 2	.660	235,086	8.24~ 1.15	241,114	215,976	8.9.6	207438	2.1 5 6. 2

					ふ 化	放 流 成	積	
平	均	採卵数	実施期間	収容卵数	ふ出尾数	ふ出率	放流尾数	放流期間
採	卵 数	千粒	<i>元加</i> 277日]	干粒	干粒	Я	千尾	/汉/记书[1]
	2,700	35,542	9.1~12.27	37,409	3 2,9 1 3	8.8.0	3 2, 0 4 9	3,55,31
	2,450	9 4,3 5.1	9.1~ 1.15	9 2,3 2 5	8 2,4 9 3	8.9.4.	78,878	3,1-6,15.
	2,920	7 2, 5 4 7	9.1~12.25	7 2,6 6 7	6 5, 6 0 5	9 0, 3	6 4,0 5 6	3.16-6.4.
	2,690	1 6, 9 4, 3	9. 1~12.10	16,943	15,484	9 1.4	1 3, 5. 4 3	2.1 5-6.25
	3,040	8,364	8.24~12.31	9,837	8,841	8.9.9	8,5.87	3.1 2-4.2 9
	2,290	7, 3, 3, 9	9.10~12.30	11,933	1 0, 6 4 0	8.9.2	10,375	2.25-5.23
	2,6 5 0	235,086	8.2 4~ 1.15	241,114	215,976	8,9,6	207,488	2.1 5-6.2 0

第7表 昭和43年度海区水系別鮭親魚捕獲採卵成績表

海			_	-		Les	所	管	捕	獲	数	使	用 親
区	水		系	採	卵	場	事業	纟揚	♀尾	∂尾	計尾	♀尾	♂尾
	岩	尾	别	岩	尾	别	岩尾	引	217	248	4 6 5.	216	96
	斜		里	斜		里	斜	里	2,1 8 9	2,0 6 7	4,25.6	2,1 3 5.	1, 5.6 3
	藻		零	藻		琴	藻	琴	118	81	199	113	4 2
オ	網		走	網		走	網	走	6, 5. 2 4	5, 3 3 5.	1 1,8 5.9	6,411	2,4 8 7
ホ	常		呂	常		呂	北	見	890	9 0 5.	1,7 9 5.	812	317
	佐呂	引間	别	佐吾	3 間	别	,	,	4 5.	28	7 3	43	21
1	湧		别	湧		别	湧	別	2,835.	3,75.3	6, 5. 8. 8.	2,639	917
ッ	渚		滑	渚		滑	渚	滑	389	5.6 &	95.7	372	15.7
,	興		部	興		部	,	,	7 3	2 5.	98.	7 3	2 5.
1	幌		内	幌		内	幌	内	364	3 2 4	688	3 5.8	151
海	徳	志	別	徳	志	別		も別	760	469	1,2 2 9	616	194
区	幌		別		見幌		歌	登	1,6 3 1	2,392	4,0 2 3	1,395.	390
	屯		別	屯	, ,	別	屯	別	155	177	3 3 2	134	64
	-		23.3	,,,		,,,							
			-	本	年	度			16,190	16,372	3 2,5.6 2	1 5,3 1 7	6, 4 2 4
	海	X	計	前	年	度			28,462	1, 9, 4 2 5.	47,887	27,712	1 1, 0 5.9
-	天		塩	天	<u> </u>	塩	天	塩	1,85.3	2,25.0	4,103	3 5.2	13
	^	"	- 3111	中		JII	中	Ш	4,3 2 8	3,7 1 3	8,041	3,808	812
п				小		計			6,181	5,963	1 2,1 4 4	4,160	8 2 5
日	石		狩	石		狩	干	歳	3 3 5.	6 6 2	997	3 2	
	· find	"	71	西		越越		"	1,0 4 4	1,203	2,2 4 7	904	464
本		,,		音		江	音	江	272	412	684	2 16	5.2
4		,,		小		計			1,65.1	2,2 7 7	3,928	1,1 5.2	5.1 6
	朱		太	朱		太	尻	別	16	3 0	46	15	5.
海	不利		別	利		別	利	別	25.6	187	4 4 3	2 5 6	174
1-3		沪		厚	沢			沢部	135.	3 8 5.	5.20	131	71
	丹	0	נינו	1	V	117	1	V C LIP				-	
区				本	年	度	-		8,239	8842	17081	5,7 1 4	1,5.91
	海	区	計	前			-		5,7 9 6	6,503	1 2,2 9 9	5,184	2, 197
	872		白	-	-1-	白	羅	白	1,960	1,5.47	3,5.07	1,776	1,5.21
	羅			和主			本田		1,000				

魚	数	採卵数	增減卵数	仮収容卵数	♀親魚 使用率	平均採卵数	実施期間
	計尾	千粒	△ 千粒	午粒	%	粒	月日~月日
	312	5.22	海 1,65.0	2,172	9 9. 5.	2,4 2 0	1 0. 2 1~ 1 2. 2 0
	3,698	5, 8, 0, 0	伸 683	6,483	9 7. 5.	2,7 2 0	9.12~12.21
4	155	288		288	9 5.8	2,5.5.0	9.1 1~1 2.21
	8,898	18,042	悔 45.1	18,493	98.3	2,810	9.1 ~1 2.26
	1,129	2,1 2 9	海 202	2,3 3 1	9 1.2	2,6 2 0	912~12.14
	6 4	109	悔 429	5.3 &	9 5.6	2, 5. 3 0	10.2 ~ 12.15.
	3, 5.5.6	6, 2 8 1		6,281	9 3.1	2,3 8 0	9.1 ~12.26
	5.29	1,0 8 3		1,083	9 5. 6	2,910	9.11~12.27
	98	1 87		187	100	2,5.60	1 1. 2 7~ 1 2. 2 0
	5.09	1,101		1, 101	9 8.4.	3, 0 & 0	9.1 ~ 12.10
	810	1,7 1 3	0	1,7 1 3	81.1	2,7 8 0	9.1 ~ 1 1.1 0
	1,7 8 5.	4,184		4,184	8 5.5.	3,000	9.5. ~1 1.10
	198	400		400	8 6, 5:	2,990	9.10~11.30
	21,741	41,839	海 3,415	4 5, 2 5.4	9 4.6	2,7 3 0	9.1 ~ 1 2.2 7
	38,771	7 3, 7 0 9	侮 3,117	7 6, 8 2 6	97.4	2,6 6 0	9.1 ~ 1.10
	365	861		861	19.0	2,4 5.0	9.11~11.9
	4,6 2 0	9,785.	4	9,785.	8.8.0	2,5.70	9.1 ~1 2.1 0
	4,985.	10,646		10,646	673	2,5.6 0	9.1 ~ 12.10
	3 2	8.3		8.3	9.6	2,5.90	9.1 ~ 1 0.1 8
	1,368	2,5.7 8	△(供試)22	2,5.5.6	8 6.5.	2,85.0	9.5. ~12.10
	268	5.11		511	7 9. 4	2,3 7 0	8.24~10.20
-	1,668	3,172	△(供試)22	3, 15.0	6 9.8.	2,7 5.0	8.24~12.10
	2 0	3 2		3 2	9 3.8	2, 13 0	10.1 ~1 1.30
	430	7 7 5.		7 7 5.	100	3,030	9.20~1 1.23
	202	3 5.5.		3 5. 5.	9 7. 0	2,7 1 0	9.21~11.20
			(1127				
	7, 3 0 5.	1 4,9 8 0	△(供試)22	1 4,9 5.8	6 9.4	2,6 2 0	8.2 4~ 1 2.1 0
	7,381	15,201	△(供試)78	15,123	8 9.4.	2,9 3 0	8.21~12.19
	3,297	4,7 8 6	陶 137	4,923	9 0.1	2,6 9 0	1 0.5. ~ 1 2.26

海				1073		1.00	所	管	捕	獲	数	使	用 親
X	水		系	採	卵	場	事美	英場	タ 尾	8 4	計尾	♀ 尾	∂ 展
	植		别	植		別	薫	别	9 4	8.1	175	91	41
	元』	奇 無	異	元峒	5 無	異	. 1	7	2 3	12	3 5.	2 3	10
	崎	無	異	崎	無	異		"	377	189	566	3 4 1	121
根	薫		别	薫		别		"	1,102	460	1,562	1,1 0 2	381
	古	多	糠	古	多	糠		,	10	7	17	9	6
	忠		類	忠		類	伊ィ	茶仁	3 2 9	156	485	3 2 5.	117
	伊	茶	仁	伊	茶	仁		"	3,011	1,399	4,403	2,966	1,145.
室	標		津	標		津	根	室	2,179	1,698	3,877	2, 1 4 5	970
	当		幌	当		幌	計力	長 別	3, 2 0 9	2,5.9 6	5,805	3,199	1,766
	春		別	春		别		"	. 3 3 3	268	5.98	3 3 3	229
	床		丹	床		丹		"	619	4 4 5	1,064	619	299
毎	迺		别	西		別	虹	別	24,696	3 6, 6 5 7	61,353	2 4,1 7 1	7,887
	矢	日	别	矢	臼	別	浜	中	2 6	2 :	5.1	2 0	14
	風		連	風		連		"	5.14	4 5.	964	4 3 3	194
	别	当	賀	別	当	賀	厚	床	986	93	1,922	9 4 7	780
X	穗		香	穂		香		<i>II</i>	9	2 .	3 3	9	5.
				本	年	度			3 9, 4.7 7	46,94	86,417	38, 5.0 9	15,486
	海	\boxtimes	1	前	年	度			8 6, 8 4 7	7 6, 2 6	162,615	82,935	3 3,1 6 2
	別	寒辺	2 牛	厚		岸	太	田	893	5.5	3 1,449	829	384
	釧		路	釗		路	釧	路	11,518	1 4,7 6	2 6, 2 7 5	9,959	3, 9 9 0
Julia	阿		寒	阿		寒	阿	寒	3 3 5	4.8	2 817	291	70
襟	茶		路	茶		路	鶴	居	8.2	19	7 279	6 7	3 0
裳	+		勝	干	代	田	+	勝	4,8 0 7	5, 6 3	2 10,439	4,166	1,0 3 7
以		"		打		内		"	1 2,7 8 5.	2 4,6 7	3 7, 4 5.8	6,809	2 4 5.
IJ,		"		利		別	幕	別	4		9 13		
東		"		幕		別		//	1,2 2 1	1,5.6	7 2,7 8 8	1,1 7 2	689
海		11		東	3 3	号	札	內	1,665	2,2 3	6 3,901	1,317	0
		"		小		計			20,482	3 4,1 1	7 54,599	1 3, 4 6 4	1,971
X	歴		舟	歴		舟	大	樹	363	9 5.	0 1,3 1 3	188	101
	広		尾	広		尾		"	4 4	2 4	8 292	28	17
	猿		留	猿		留		"	2 4		6 30	2 3	6

魚 数		採卵数		滅 卵 数	仮収容卵数	早親魚	平均採卵数	実施期間
) Hr	+ 居	干粒		△ 干粒	干粒	使用率%	粒	月日~月日
(1)	132	217	陶	17	234	9 6.8	2,3 8 0	9.11~12,20
	3 3	5.3			5.3	100	2,300	9. 2 1~ 1 2,2
	462	806			806	9 0.5.	2,360	9.15~12,2
	1,483	2, 5. 4. 5.			2,545	100	2,310	9.2 4~1 2,2
	15	18			18	9 0.0	2,0 0 0	9.2 5~12,2
	442	830			830	988	2,5.50	9.11~12.2
	4,111	7, 5. 3 7	(毎)	2,236	9,773	98.5	2,5 4 0	9.11~1 2.2
	3,115	5, 5. 5. 0			5, 5 5 0	9 8.4.	2,5 9 0	9. 1~1 2.2
	4,965	7, 5. 9. 9			7, 5, 9, 9	9 9. 7	2,3 8 0	9. 1~1 2.2
	5.62	7 8 7			787	100	2,360	9.10~12.1
	918	1,522		*	1,522	100	2,460	9.11~12.1
3	2,058	57,963			57,963	97.9	2,4 0 0	9. 1~ 1.1
	3 4	5.5.			5.5	7 6.9	2,7 5.0	9.10~11.
	627	1,230			1,230	8 4.2	2,8 4 0	9. 1~11.
	1,7 2 7	2,8 2 6			2,826	9 6. 0	2,980	9. 1~11.2
	14	2 7			27	100	3,000	9, 2 0~1 1.3
5	3,995.	9 4,8 5.1	陶	2,390	96,741	97.5.	2,4 5 0	9. 1~ .1.1
11	6,097	2 0 6, 9 2 0	陶	2,477	209,397	9 6. 0	2,490	9. 1~ 1.2
	1,213	2,3 7 9			2,3 7 9	9 2.8	2,8 7 0	9.11~11.1
1	3,949	27, 5.85.			27,5.85.	8 6, 5.	2,770	9.11~1 2.1
	361	862			862	8 6. 9	2,960	9.1 1~1 1.1
	97	192		*	192	8 1.7	2,870	9.21~1.1
	5,203	11,814			11,814	8 6.7	2,8 4 0	9. 1~1 2.1
	7054	21,901			21,901	5. 3. 3	3,220	9.10~1 1.2
								9.11~10.2
	1,861	3, 25. 0			3, 2 5 0	9 6.0	2,7 7 0	9.14~11.2
	1,317	3, 8 6 6			3,866	7 9.1	2,9 4 0	9.10~10.2
1	5, 4. 3 5.	4 0, 8 3 1			40,831	6 5.7	3,030	9. 1~1 2.1
	289	557	悔	5.	5.6 2	51.8	2,960	9.2 2~1 2.2
	4.5.	6 8	陶	117	185	6 3,6	2,430	10. 3~11.3
	29	7 3			7 8	9 5.8	3,170	9.24~12.2

海							所	管	捕	獲	数	使	用	親
X	水		系	採	卵	場	事美	美場	우	8	計	우	8	
				本	年	度			3 3,7 3 6	51,318	8 5, 0 5 4	2 4,8 4 9	6, 5. 6. 9	1
	海	X	計	前	年	度			1 4 0, 7 5 6	212,748	3 5 3, 4 9 9	7 9, 5.0 3	21,923	1
	仁	雁	別	仁	雁	别	静	内	7	6	13	7	4	
襟	幌		別	幌		别		//	4 0	8.9	129	3 4	2 7	1
	元	浦	Ш	元	浦	河		"	3 7	106	143	18	18	ì
裳	三		石	Ξ		石		"	3 4	49	8.3	30	1 7	Ĭ
表	静		内	静		内		"	1,626	3,049	4,6 7 5.	815.	426	3
	新		冠	新		冠		"	110	8.6	196	8.9	5.8	3
以	沙		流	富		JII		"	291	368	6 5 9	9 4	6 5	5.
	武島		JII	鵡		Щ	千	歳	293	437	7 3 0	7 2	2 9	2
西	勇		払	勇		払		″	5.29	616	1,1 4 5.	277	11(0
	白		老	白		老	白	老	9.5.	241	3 3 6	61	3 4	4
海	敷		生	敷		生	敷	生	9 3	257	3 5 0	91	5.8	3
11-3-	貫	気	別	貫	気	別		"	3 0	5.0	8.0	8		5.
	長	万	部	長	万	部	八	雲	19	31	5.0	15	8	8
区	遊	楽	部	遊	楽	部		"	492	349	841	488	15.	9
	沙		泊	沙		泊		"	7 7	8.6	163	61	4	8
	有		Щ	有		JII	知	内	2 5.	29	54	8		4
-	茂	辺	地	茂	辺	地		"	2,1 5.9	2,5 8 6	4,7 4 5	2,143	1,10	2
	亀		JII	亀		JII		"	4 4	3 3	7 7	4 2	2	1
	知		内	知		内		"	5.2	39	91	5.2	1	7
			=1	本	年	度			6,0 5.3	8,507	14,560	4,4 0 5	2,1 9	8
	海	X	計	前	年	度			8,0 21	7, 5, 5, 6	1 5, 5 7 7	6,900	3,01	0
			=1	本	年	度			1 0 3,6 9 5.	131,979	2 3 5, 6 7 4	88,794.	3 2, 2 6	8
合			計	前	年	度			269,382	3 2 2,4 9 5.	591,877	202,234	7 1, 3 5.	1

魚	数	採 卵 数	增	減 卵 数	仮収容卵数	♀親魚 使用率	平均採卵数	実施 期間
-	計	千粒		△ 干粒	干粒	发 7 年 %	粒	月日~月日
	31,418	7 2, 5 4 7	陶	122	7 2,6 6 9	7 3.7	2,920	9. 1~12.25
	101,426	2 2 5, 2 6 1	陶	621	225,882	5 6.5	2,830	9. 1~12.20
	11	21	陶	392	413	100	3,000	9.20~12.25
	61	8.0			8.0	8 5.0	2,350	9.30~12.10
	3 6	3 5.	侮	163	198	4 8.6	1,940	9.30~12.10
	47	93			93	8 8.2	3,100	10. 5~12.10
	1,2 4 1	2,7 4 1			2,7 4 1	5.0.1	3,360	8.25~1 2.20
	1 47	291			291	8 0.9	3, 2 7 0	9.15~12.10
	159	294			294	32.3	3,130	9. 9~11.18
	94	239			239	2 4.6	3, 3 2 0	8.24~11.15
	3 8 7	945			945	5 2.3	3,410	9. 8~11.20
	9 5.	162			162	6 4.2	2,660	9.11~12.31
	144	276			276	97.8	3,030	9.25~12.31
	13	15.			15	2,6.7	1,880	9.11~11.25
	2 3	28			28	7 8.9	1,870	9.10~11. 8
	6 4 7	1,476			1,476	9 9. 2	3,020	9.11~12.30
-	109	165			165	7 9. 2	2,700	9.20~12.20
}	1 2	2 3	海	178	201	3 2.0	2,880	9.21~12.20
	3, 2 4 5.	4,264			4,264	9 9, 3	1,990	1 0. 1~1 2.3 0
	6 3	71			71	9 5.5	1,6 9 0	1 0.19~1 2.20
	6 9	150			150	100	2,8 8 0	10.13~12.20
	6,603	1 1,3 6 9	陶	7 3 3	1 2,10 2	7 2.8	2,580	8.24~12.31
	9,910	17,860	{海	929	18,786	8 6.0	2,5 9 0	9. 1~1 2.28
	1 2 1, 0 6 2	235,086		6,660 (供試) 22	2 4 1, 7 2 4	8 5, 6	2,6 5.0	8.24~ 1.15
	273,585	538,951	{嗨	7,144 (供試) 81	5.46,014	7 5.1	2,670	8.21~ 1.25

第8表 支場·事業場別鮭親魚捕獲採卵成績表

支場	事	業	場	ł	甫	獲	数	使	用親魚	数
义物	尹	未	770	우 1	2	8 尾	計尾	9 尾	↑ 常 尾	計組
	岩	尾	别	21	7	248	465	21.6	96	312
北	斜		里	2,1.8	9	2,067	4,256	2, 1.3 5	1,563	3,698
	藻	j	零	1.1	8	81.	1.99	1.1.3	4.2	155
見	網		走	6,52	4	5, 3 3 5	11,859	6,411	2,487	8,898
-	北		見	93	5	933	1,868	855	3 3 8	1,193
支	湧		别	2,8 3	5	3,753	6,588	2,6 3 9	9 1.7	3,556
	渚	1	滑	46	2	593	1,055	4 4 5	1.8 2	6 2 7
場	幌		内	3 6	4	324	688	358	151.	5 0 9
			_							
計		年		1.3,64	4 1.	3, 3 3 4	26,978	13,1.72	5, 7 7 6	1.8,948
	前	年	度	27,37	6 1.	7, 1.7 7	4 4,5 5 3	26,648	1.0, 7 3 9	37, 387
	羅	ł	3	1,96	0	1,547	3,507	1,776	1,521.	3,297
根	薫	5	31	1,60	6	749	2,355	1,566	5 5 9	2,1.25
	伊	茶	仁	3, 3 4	0	1,548	4,8 8 8	3,291.	1,262	4,5 5 3
室	根		室	2.1.7	9	1,698	3,877	2,1 4 5	970	3,1.1.5
	計	根	別	4,1.6	1-	3,306	7, 4 6 7	4,151	2,294	6,445
支	虹.		別	24,69	3	6,657	6 1, 3 5 3	2 4, 1. 7 1.	7,887	3 2,0 5 8
-	浜	1	中	5 4 (475	1,01.5	453	208	6 6 1.
場	厚		床	9 9 8	5	960	1,955	956	785	1,741.
				<u> </u>	-					e
計		年	-	3 9, 4 7	4 (3,940	8 6, 4 1.7	38,509	1.5, 4.8.6	5 3, 9 9 5
		年	芝	8 6, 3 4	7 7 9	3,268	1.6 2, 6 1.5	8 2,9 3 5	3 3, 1.6 2	1.1.6,097
+	太		田	895	1	556	1,4 4 9	829	3 8 4	1,21.3
11	釗		路	1.1,5 1.8	3 1.4	1,762	26, 275	9,9 5 9	3,990	13,949
勝	阿	5	寒	3 3 5	5	482	81.7	291.	7 0	361
	鶴	F	居	8 2		1.97	279	67	3 0	97
支	+	E	勝	1.7, 5 9 2	3 (,305	47,897	1.0,975	1,282	1.2,2 5 7
~	幕	5	31	1,225	1	,5 76	2,801	1,1.7 2	689	1,861.
場	札	P	为	1,665	2	2,236	3,901.	1,31.7	0	1,3 1.7
7003	大	ŧ	對	431	. 1	,204	1,6 3 5	239	1.2 4	3 6 3
計 -	本	年度	-	33,736	5 1	, 3 1.8	8 5, 0 5 4	2 4, 8 4 9	6,569	31,41.8
	前鱼	年度	3	1.4 0, 7 5 6	21.2	,743	353,499	7 9, 5 0 3	21,923	1.0 1,4 2 6

-30-

採	卵 数	増	减	卵 数	仮収容卵数	♀ 親 魚	平均採卵	実 施 期 間
	干粉	ž		干粒	干粒	使用率%	数粒	月日~月日
•	5 2	2 海		1,650	2,1.7 2	9 9. 5	2,420	1.0.21~1.2.20
	5,80	0 海		683	6,483	97.5	2,7 2 0	9.1.2~1.2.21.
	2 8	8			288	9 5.8	2,5 5 0	9.1.1~1.2.21.
	1.8,04	2 陶		451	18,493	9 8.3	2,81.0	9. 1~1.2.26
	2,2 3	8 伸		631	2,8 6 9	9 1.4	2,61.8	9.1.2~1.2.1.5
	6,28	1			6, 2 8 1.	9 3.1.	2,380	9 1,~1.2.26
	1,2 7	0			1,270	9 6.3	2,850	9.1.1~1.2.27
	1,1.0	1			1,1.01.	984	3,080	9. 1~1.2.1.0
	3 5, 5 4 9	2 (海)		3, 4 1.5	38,957	9 6. 5	2.7 0 0	9. 1~12.27
	7 0, 4 7 8	海		3,1.17	7 3, 5 9 5	973	2,6 4 0	9. 1~ 1.1.0
	4,7 8 6	海		1.37	4,9 2 3	9 0.1.	2.6 9 0	1.0. 5~1.2.26
	3,6 3 9	伸		1.7	3,656	975	2,3 2 0	9.1.1~1.2.20
	8,367	陶		2,2 3 6	1.0,603	985,	2,5 4 0	9.1.1~1.2.20
	5, 5 5 ()			5,550	8 0.3	2,5 9 0	9. 1~1 2.2 0
	9,908	3			9,908	9 8.4	2,3 9 0	9. 1~1.2.20
	57,965	3			57963	9 7. 9	2.4 0 0	9. 1~ 1.1.5
	1,2 8 5	5			1,2 8 5	8 3.9	2,8 4 0	9. 1~1.1. 6
	2,85	3			2,8 5 3	9 6.1.	2,980	9. 1~11.30
		_						
	9 4, 3 5 1	海		2,390	9 6, 7 4 1.	975	2,450	9. 1~ 1.1.5
	206,920	1.3)		2,477	209,397	9 6.0	2,4 9 0	9 1~ 1.25
	2,3 7 9				2,3 7 9	9 2.8	2.8 7 0	9.1.1~1.1.1.
	27,585				27,585	8 6.5	2,7 7 0	9.1.1~1.2.1.6
	862	3			862	8 6.9	2,960	9.1.1~1.1.4
	1.9 2	3			1.92	8 1.7	2.8 7 0	9.21~1.1.4
	3 3, 7 1. 5				3 3, 7 1.5	6 2.4	3,070	9. 1~1.2.1.0
	3, 2 5 (3, 2 5 0	9 5.7	2.770	9.1.1~1.1.29
	3,866				3,866	7 9.1.	2,940	9.1.0~1.0.21.
	698	海		1.2 2	820	5 5.5	2,920	9.22~1.2.25
	7 2, 5 4 7	陶		1.2 2	7 2,6 6 9	7 3 7	2,920	9. 1~1.2.25
	2 2 5, 2 6 1	伸		6 2 1.	2 2 5, 8 8 2	5 6.5	2,8 3 0	9. 1~1.2.20

-31-

平18	wher	-744-	1e	捕	獲	数	使	用親魚	数
支場	事	業	場	9 尾	♂尾	計尾	♀尾	♂ 尾	計尾
天	徳	志	别	760	469	1,229	6 1.6	194	810
	歌		登	1,631	2,3 9 2	4,023	1,3 9 5	390	1,785
塩	屯		別	1.5 5	1.77	3 3 2	1.34	6 4	198
支	天		塩	1,8 5 3	2,250	4,1.03	352	1.3	365
場	中		Ш	4,3 2 8	3,713	8,0 41.	3,808	81.2	4,6 2 0
									}
計	本	年	度	8,727	9, 0 0 1.	1.7,728	6,305	1,473	7,778
αi	前	年	度	3,253	5, 3 0 5	8,558	2,9 9 9	847	3,846
千	千		歳	2.2 0 1.	2,91.8	5, 1. 1.9	1,285	596	1,881.
1	音		江	272	412	684	2 1.6	5 2	268
歳	静		内	2,1.45	3,753	5,8 9 8	1.087	6 1.5	1,702
支	白		老	95	241.	3 36	61.	34	9 5
場	敷		生	1.2 3	307	430	99	58	157
計	本	年	度	4,8 3 6	7,631.	12,467	2.7 4 8	1,355	4,103
	前	年	度	5,5 7 6	6,0 1.9	11,595	4,1.83	1,438	5,6 2 1.
Territor I	八		雲	588	466	1,0 5 4	5 6 4	21.5	779
渡	知		内	2,2 8 0	2,6 8 7	4,9 6 7	2,2 4 5	1,144	3,389
島	尻		別	1.6	30	46	15	5	20
支	利		别	256	1.87	4 4 3	256	174	430
場	厚	沢	别	1.35	385	520	1 3 1.	71.	202
람	本	年	度	3,275	3,755	7,030	3,211	1,609	4,8 2 0
91	前	年	度	6,074	4,983	11.057	5,9 6 6	3,242	9,208
合計	本	年	度	1.03,695	131,979	2 3 5, 6 7 4	88,794	3 2,2 6 8	121,062
ПāІ	前	年	度	269,382	3 2 2, 4 9 5	5 9 1, 8 7 7	2 0 2, 2 3 4	7 1, 35 1.	273,585

採	卵 数	増 減	卵 数	仮収容卵数	♀ 親 魚	平均採卵数	実 施 期 間
	干粒		千粒	千粒	使用率%	粒	月日~月日
	1,71.3			1,7 1.3	8 1.1.	2.7 8 0	9.1. ~ 1 1,1.0
	4,1.84			4,1.84	8 5, 5	3,000	9.5 ~1.1.1.0
	400			400	8 6.5	2,9 9 0	9.1.0~1.1.30
	8 6 1.			8 6 1.	1.9.0	2,450	9.1.1~1.1. 9
	9, 7 8 5			9,785	8 8.8	2.5 7 0	9. 1~1 2.1.0
	16,943			1.6, 9 4 3	7 2.2	2.6 9 0	9. 1~1.2.1.0
i.	8,317			8,3 1.7	9 2.2	2,7 7 0	9. 1~1.2. 6
	3,8 4 5	△(供試)	2 2	3,823	5 8.4	2,9 90	8.2 4~ 1 2.1.0
	5 1 1.			5 1 1.	7 9.4	2,360	8.2 4~ 1.0.2 0
	3, 5 5 5	悔	5 5 5	4.1 1 0	5 0.7	3, 2 7 0	9. 9~1 2.2 0
	1.62			1.62	6 4.2	2.6 6 0	9.1.1~1 2.31
1	291.			291.	8 0. 5	2,940	9.1.1~1 2.31
							* %
	8,364	△(供試) 海	$\begin{smallmatrix}2&2\\5&5&5\end{smallmatrix}$	8,897	5 6.8	3,040	8.2 4~1 2.3 1.
	1.2,598	悔 △(供試)	8 6 6 7 8	1 3, 3 8 6	7 5.0	3,020	821~1.2.25
	1,669			1,669	9 5. 9	2,960	9.1.0~1.2.30
	4,5 0 8	伸	1.78	4,686	9 8 5	2.0 1.0	9.21~12.30
	3 2			3 2	9 3.8	2.1 3 0	1.0.1.1~1.1.30
	7 7 5	4		775	1.00	3,030	9.20~11.23
	3 5 5			3 5 5	97.0	2,71.0	9.21~11.20
	7, 3 3 9	陶	1.78	7, 5 1.7	9 8.0	2,290	9.1.0~ 1 2.3 0
	1 5, 3 7 7	海(供試)	6 3 3	1.5, 4.3.7	9 8.2	2,580	9. 1~1.2.28
	2 3 5, 0 8 6	海 △(供試)	6,660	2 4 1,7 2 4	8 5,6	2.6 5 0	8.2 4~ 1.1 5
	5 3 8, 9 5 1.	四(供試)	7, 1, 4, 4 8 1.	5 4 6, 0 1.4	7 5.1.	2,670	8.21~ 1.25

3 さけ種卵の移殖

本年度はさけ親魚捕獲採卵成 が最近にない不振のため、さけ種卵の移殖は、主としてさけ・ます増殖事業推進整備計画に基づいて資源不振地域への移殖にとどめた。

さけ発眼卵の移殖

1. 道内移殖

供系	合 地	移殖	受系	合 地		多殖卵	の内訳	Lote III
支場名	事 業 名	年月日	支場名	事 業 名	移籍卵数	移殖前死卵数	移 殖 死卵数 死卵	海率 摘 要
北見	網走	44. 1.22	干 歳	千 歲	1,5 48	25整	1,3 26	%
	計				1,548	222	1, 3 2 6	
根室	虹别	4 3.1 2.2 4	渡島	八雲	3,536	3 3 4	3, 2 0 2	
	"	4 3.1 2.2 5	"	知 內	880	7 3	807	
	計				4,4 1.6	407	4,0 0 9	
合	計				5,964	6 2 9	5, 3 3 5	

2. 道外移殖

供;	給 地	移	殖	受 給 地	1	多殖卵	の内部	5	摘 要
支場名	事業名	年月	日	受 給 地	移籍卵数	移殖前死卵数	移 殖実卵数	死卵率	11向 安
千 歳	千 歳	44. 1.	23	茨城県鬼怒川 ふ化場	干粒 117	干粒 1.7	干粒 1.00	%	網走事業
	"	4 4. 1.	2 5	富山県神通川 ふ化場	467	6 7	400		場から移殖したものの一部
合	計				584	84	500		- CO CO

4 さけふ化放流成績概要

本年度は採卵数 2 3 5,0 8 6 干粒のうち試験卵 4 8 干粒を供出し、寄贈海産卵 6,6 6 0 干粒を受入れ、仮収容卵数 3 4 L 6 9 8 干粒の中から管外に 5 8 4 干粒を移出し、収容卵数 2 4 1,1 1 4 干粒を 5 4 事業場(このうち民間施設 1 6 ケ所)で管理し、ふ出稚魚 2 1.5,9 7 6 干尾のうち約 半数に給餌を行ない、2月 1 5 日から 6月 2 5 日までの間に 2 0 7 4 8 8 干尾の稚魚を生産し放流した。ふ化率、餌育歩留り成績は前年度成績より上廻り収容から放流までの歩留りは 8 6.0 % であつた。

							放	流尾
海区	水系	事業場	収容卵数 干料	死 卵 数	ふ出尾数 干尾	ふ化率 第	無給餌干尾	給 年尾
	岩尾別	岩尾別	2,1.7 2	1.25	2.0 4 7	9 4.2		2.0 2 5
	斜 里	斜 里	6,483	5 2 4	5,9 5 9	9 1.9		4,8 9 0
	藻	藻 琴	288	27	261.	90.6	261	
- 1	網 走	網走	1.1,826	1,607	1.0, 2 1.9	8 6.4		8,890
オ	能取湖							1,970
-	常呂	北見	2,8 6 9.	405	2,464	8 5.9		1,505
ホ	ライトコロ							7 0 5
	佐呂間別							495
1	芭 露							497
	湧 別	湧 別	1.2,501.	1,71.4	1.0,787	8 6. 3		7, 1, 8 9
ツ	渚 滑	渚滑	1,270	94	1,1.76	9 2.6	638	995
	興 部						500	
1	幌 内				-			1,489
	徳 志 別	徳志別	2,267	1.98	2,069	9 1.3		2,0 5 6
海	幌 別	歌登	3,027	220	2,807	9 2.7		2,500
	屯 別	屯 別	1,003	98	905	9 0.2		900
区	時 前	(時前)	1.0 4	1.8	86	8 2.7		8 5
	¥ 57 31	本年度	43,810	5,030	38,780	8 8.5	1,399	3 6, 1.9 1.
	海区計	前年度	1.2 0, 1.3 5	1.5,7 4 2	1.0 4,3 9 3	8 6.9	52,095	4 5, 9 4 5
	增,幌	(增幌)	5 1.3	68	445	8 6.7		4 3 0
	天 塩	天 塩	1,6 4 1	1.11.	1,530	9 3.2		1,500
	"	中川	7, 3 8 6	636	6,750	9 1.4		5,202
日	"	小 計	9,027	747	8,280	9 1.7		6,7 0 2
	暑寒別	(増毛)	1,002	1.1.0	892	8 9. 0		870
本	石 狩	于 歲	4,5 2 4	4 2 2	4,1.0 2	9 0.7		1,5 4 4
	"	音 江	5 1.1.	56	455	8 9. 0	452	
海	"	小 計	5,035	478	4,5 5 7	9 0, 5	452	1,5 4 4
_	余 市							1,000
区	朱太						5 0	
	利別	利 別	7 75	5 3	722	932	23	691
	厚沢部	厚沢部	3 5 5	28	327	9 2.1.		305

		free lives after one Mile.
計	放流期間 月日一月日	備 考 仮収容卵数から収容卵数までの卵の動き事業場単位 稚魚移殖放流括弧書き
<u> </u>	3.20-5.25	JEWAN TOWN 10 WE G
4.890	4. 15.31.	
261	4. 15.1.0	
8,890	5.20	 千歳へ 1,5 4 8 千粒、湧別へ 5,1 1.9 千粒 (斜里から 1,0 0 0千尾移殖放流)
1,970	4.26	(網走から1,970千尾移殖放流)
1,505	3.1.5 - 5.1.0	海産卵631千粒を含む
7 0 5	4.1.7 - 4.20	(常呂から705千尾移殖放流)
495	5.1.5	(湧別から495千尾 ″)
497	5.1.5	(" 497千尾 ")
7, 1.89	4. 15.24	網走から5.119千粒、幌内から1,101千粒
1,633	3. 5-4.30	(湧別から995千尾移殖放流)
5 0 0	4. 8-4.1.2	(渚滑から500千尾 〃)
1,489	4.24-4.26	(湧別から 1,489 千尾 〃)
2,056	3. 14.1.5	歌登から554千粒
2,5 0 0	2.1 5 - 4. 5	徳志別へ554千粒、屯別へ603千粒
900	4.214.30	歌登から603千粒
85	6. 5-6. 9	中川から1.0 4千粒
37,590	2.1.5 - 6. 9	
98,040	1.26-5.31	
430	6. 5-6. 9	中川から518千粒
1,500	5.1.0 -5.2 8	中川から1,641千粒、中川へ861千粒
5,202	5.17 -5.31	天塩から861千粒、天塩へ1,641千粒、増毛へ1,002粒、増幌へ 513千粒、時前へ104千粒
6,702	5,1.0 -5,31	1 477 10 10 1 1 477
870	6.1.1-6.25	中川から 1,0 0 2 千粒
1,5 4 4	3.30-4.23	網走から1,548千粒、道外へ584千粒、鵡川へ239千粒
452	4.25	
1,996	3.30-4.25	
1,000	3.30-4. 4	(千歳から 1,0 0 0 千尾移殖放流)
5 0	3.20	(八雲から50千尾 ")
7 1.4	4.1.3 -4.1.5	
3 0 5	3. 3-3.31.	

海			1	N111		A consideration of a start		rin sut	> (1) L= 36/-	* 11 - 14		放	流	注	1
区	ヹ	茅	弱	業	場	収容卵数 干粒	死	卵 数 千粒	ふ出尾数 干尾	ふ化率	無	給 年 年	給	= {	Mary Told
	3/- 1	区計	本	年	度	16,707		1,484	1 5, 2 2 3	9 1.1		5 2 5		11,5 4	2
	母!	△ iii		年	度	4 2,6 4 6		4,6 3 2	38,014	8 9.1		16,791		1 2,5 4	9.
	羅	E	羅		臼	7,509		1,098	6,411	8 5.4		470		4,3 5	9
	植	另												96	2
根	崎:	無 異												49	6
	薫	別.												1,00	0
	古	多糠												5 0	0
室	忠	類												5 0	0
	伊	茶仁	伊	茶	仁	13,780	}	1,635	1 2,1 4 5	881				9, 3 3	0
	標	津	中	標	津	6,922		1.1 0 9	5,813	8 4.0		5.22		5,64	8
海	当	幌	計	根	别	9,908		788	9,120	9 2.0				6, 1 5	4
	春	別						-						1,00	0
	床	丹	(床が	子)					-				1,50	0
X	西	别	1 41		别	5 0, 0 6 8		5,086	4 4,9 8 2	8 9.8				41,73	9
	矢	臼 別	(4	日	别)	5 5		11	44	8 0.0		40			1
	風	連	浜		中	1.2 3 0		74	1,1 5 6	9 4.0		1,100		8 2	0
	别	当 賀	厚		床	2,6 2 6		22	2.6 0 4	9 9. 2		2,5 38			1
	穗	香	(想?	토)	2 2 7		9	218	9 6.0				20	0
	海	区計	本	年	度	92,325		9,832	8 2, 4 9 3	8 9.4		4,670		7 4,2 0	8
	1113	K7 111		年	度	174,232		25,311	148,921	8 5.5		8 5, 3 1 9	.4	47,01	2
	別無	影 辺牛	太		田	4,5 2 8		532	3,996	8 8.3		259		3,31	8
	釧	路	一釗	ŀ	路	15,985		1,561	1 4,4 2 4	9 0.2				1 4,3 3	4
襟		"	鶴		居	9,459		8 1 0	8,649	9 1.4		145		7,42	0
		"	小		計	25,444		2,371	23,073	9 0.7		1 4 5		2 1,7 5	4
裳	茶	路								15				1,00	0
以	音	別	1	ムリ	11)	1,046		46	1,000	9 5, 6		1,000			
_	+	勝	+		勝	6,256		8 5 8	5,398	8 6.3				4,86	3
東		"	幕		别	12,226		1,319	10,907	89.2				10,63	0
海		"	札		内	19,805		1,624	18,181	9 1.8				1778	0
区		"	小	c.	計	38,287		3,801	3 4,4 8 6	9 0.1				3 3, 2 2	3
23	歷	舟	大		樹	1,6 0 6		200	1,406	8 7, 5				1,3 6	3
	広	尾	(広角	星)	1,7 5 6		112	1,644	9 3.6		1,5 9 4			

数		放流期間	備 考 仮収容卵数から収容卵数までの卵の動き事業場単位
	計千尾	月日一月日	稚魚移殖放流括弧書き
-		3. 3-6.25	
-	29340	1.26-6.13	
-	4.8 2 9	4. 7-5.31	蔵別から1,085 干粒、虹別から1,501干粒、海産卵154 干粒を含む
	962	5. 9 -5.10	(羅臼から962千尾移殖放流)
	496		-(" 496千尾 ")
	1.000	5.20	(伊茶仁から1,000千尾を移殖放流)
	500	5.20	(" 500千尾 ")
	500	5.20	(" 500千尾 ")
	9, 3 3 0	4.20-5.31	薫別から 2,571千粒、中標準から 6 0 6千粒、海産卵 2,2 3 6 千粒を含む)
		4.15-6.15	伊茶仁へ606千粒、虹別から1,978千粒 (虹別から498千尾、伊茶仁
	6, 1 5 4	3. 1-5.16	から145千尾移殖放流)
	1,000	4.2 2- 4.2 3	(計根別から1,000千尾移殖放流)
	1,5 0 0	4.24-4.25	(" 1,500千尾 ")
	41,739	3.20-5.15	八雲知内へ 4,416 千粒、羅白へ 1,501 千粒、中標津へ 1,978 千粒
	40	3.20-4.15	浜中(矢臼別採卵場分)から55千粒
4	1,920	3.26-4.30	無 国別 べる 5 千粒 (虹別から820千尾を移殖放流)
	2,5 38	4. 1-5.25	穂香へ227千粒
	200	5. 1-5. 5	厚床(穂香採卵場分 2 7 千粒、別当賀分 2 0 0 千粒) から 2 2 7 千粒
	78,878	8. 1-6.15	
1	32,331	2.20-6.20	
	3, 5 7 7	4. 9-5.24	釧路から 2,1 4 9 千粒
	1 4,8 34	3.28-5.17	鶴居へ9,451千粒、太田へ2,149千粒
	7,565	5. 1-5.31	釧路から 9,451 千粒、阿寒から 862 千粒 (ムリ川) へ 1,0 46 千粒
	21,899	3.28-5.31	
	1,0 0 0	4.25-4.26	(鶴居から 1.0 0 0 千尾移殖放流)
	1,000	5. 1-5.31	鶴居から 1,0 4 6 千粒
	4,8 6 3	4.20-6. 4	
	1 0,6 3 0	3.1 6- 5.1 5	大樹へ1,000千粒、広尾へ1,542千粒
	17730	4. 1-5.10	[]
	33,223	316-6. 4	
	1,863	3.26-4.17	十勝から1,000千粒、海産卵5千粒を含む
	1,594	3.20-5.20	十勝から1,543千粒、大樹(広尾、猿留へ29千粒)から214千粒、 海産卵117千粒を含む

	T			,				
海	水系	事業場	加尔加州	玩 的 米	5 UL 123 WAY	> (Lette	放	流尾
X	水米	争耒物	収容卵数干粒	死 卵 数	ふ出尾数 干尾	ふ化率 第	無 給 餌 千尾	給 千尾
	猿 留							400
	海区計	本年度	7 2,6 6 7	7,062	6 5, 6 0 5	9 0.3	2,9 98	6 1, 0 5 8
		前年度	169,726	2 2,2 6 1	147,465	8 6.9	47,941	93,603
	幌 満							100
	様 似	(様似)						329
	幌 別						76	100
	元浦川	(元浦川)	278	16	262	9 4.2	183	100
	三石							7 7
襟	静内	静内	3,832	440	3,392	8 8.5		2,355
1	新 冠				141			2 4 1
裳	沙流	*			•			254
æ	鵡川	(鵡川)	239	89	200	8 3.7	170	100
以	勇 払							8 3 5
1	白 老	白 老						250
西	敷 生	敷 生	438	21	417	9 5.2		260
123	貫気別	(豊浦)	15	2	13	8 6.7	11	100
海	長万部						50	
借	遊楽部	八雲	5,072	788	4,284	8 4.5	5 5	4,0 4 3
×	汐 泊						150	
	有 川	(有川)	201	31	170	8 4.6	160	
	茂辺地	(茂辺地)	4,429	232	4,197	9 4.8	3,912	
	亀 川	(亀川)	71	9	6 2	873	61	
	知 内	知 内	1,030	152	878	8 5.2	875	
	海 ▽ 型	本年度	15,605	1,7 3 0	13,875	8 8.9	5,703	9,1 4 4
	海区計	前年度	38,907	5,252	33,655	8 6, 5	21,422	1 2,0 5 2
総	≅ .L	本年度	2 4 1, 1 1 4	25,138	215,976	8 9,6	15,295	192,143
不忘	計	前年度	5 4 5, 6 4 6	78,198	47 2,4 48	8 6.6	2 2 3, 5 6 8	2 1 1,1 6 1

※ さけ卵子の採卵から収容までの動き

 採
 卵
 数
 285,086
 干粒
 仮収容卵数
 241,698
 干粒

 海産卵数
 6,600
 "
 △道外移殖卵数
 584
 "

 △供試卵数
 48
 "
 収容卵数
 241,114
 "

計	放 流 期 間 月日一月日	備 考 仮収容卵数から収容卵数までの卵の動き奉業場単位 稚魚移殖放流括弧書き
400	5.23-5.24	(十勝から400千尾、移殖放流)
6 4, 0 5 6	316-6. 4	
1 4 1, 5 4 4	2.27-5.31	
100	4. 4	(千歳から100千尾移殖放流)
3 2 9	4.22-4.23	(静内から329千尾移殖放流)
176	4.15-4.22	(千歳から100千尾移殖放流)
283	4.1 5-4.2 2	, **
77	4.1 2	(静内から7.7千尾移殖放流)
2,355	4. 9-4.28	海産卵392千粒を含む
241	4.1 6	(静内から 2 4 1 千尾を移殖欲流)
254	4.1 5	(" 254千尾 ")
270	4.1 2	(千歳から100千尾 ")
8 3 5	4. 9-4.25	(" 835千尾 ")
250	3.12-3.13	(千歳から100千尾、敷生から150千尾移殖放流)
260	312-313	白老から162千粒、豊浦へ15千粒
111	4.23	敷生(貫気別分)から15千粒(千歳から100千尾移殖放流)
5 0	3.20	(遊楽部から 5 0 千尾移殖放流)
4,0 9 8	3.20-5.23	虹別から3536千粒、朱太から32千粒、茂辺地へ165千粒
150	324-325	(茂辺地から150千尾を移殖放流)
160	3.25-4.30	知内(有川産)から201千粒、海産卵178千粒を含む。
3,912	2.25-4.30	八雲(汐泊産)から165千粒、知内(茂辺地産)4,264千粒
61	3.25-4.30	知内(亀川産)から71千粒
875	3.20-3.31	虹別から880千粒、有川、茂辺地、亀川へ
1 4,8 4 7	2.25-5.23	
33,474	2.19-5.11	
207,438	2.15-6.25	
4 3 4,7 2 9	1.26-6.20	

第10表 昭和43年度支・事業場別さけふ化放流成績表

Ī			収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ化率	放
支	場	事 業 場	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	千粒	干尾	%	無給餌 干尾
北	見	岩 尾 別	2,172	125	2,0 4 7	9 4.2	
		斜 里	6, 4 8 3	5 2 4	5,959	919	
		藻 琴	288	27	261	9 0. 6	261
		網 走	11,826	1,6 0 7	1 0, 2 1 9	8 6.4	
		北 見	2,869	405	2,464	8 5.9	
		湧 別	12,501	1,714	1 0,787	8 6. 3	
		渚 滑	1,270	94	1, 1 7 6	9 2.6	1,138
		本 年 度	3 7, 4 0 9	4,496	3 2, 9 1 3	8 8.0	1,399
		前 年 度	107,745	1 4,2 9 0	9 3, 4 5 5	8 6.7	4 9, 2 3 8
根	室	羅臼	7, 5 0 9	1,0 9 8	6, 4 1 1	8 5. 4	470
		伊 茶 仁	1 3,780	1,6 3 5	1 2.1 4 5	8 8.1	
		中 標 津	6,922	1,109	5,813	8 4.0	5 2 2
		計 根 別	9,908	788	9,1 2 0	9 2.0	
		虹 别	5 0, 0 6 8	5,086	4 4,982	8 9.8	
		(矢臼別)	. 55	11	44	8 0.0	40
		浜 中	1,230	7 4	1,156	9 4.0	1,100
		厚 床	2.626	2 2	2,6 0 4	9 9. 2	2,5 3 8
		(穗 香)	2 2 7	9	218	9 6.0	e
		本 年 度	9 2, 3 2 5	9,832	8 2,4 9 3	8 9. 4	4,6 7 0
		前 年 度	1 7 4,2 3 2	2 5, 3 1 1	148,921	8 5, 5	8 5, 3 1 9
+	勝	太 田	4,5 28	5 3 2	3,996	8 8 3	259
		釧路	1 5, 9 8 5	1,561	1 4,4 2 4	9 0.2	
		鶴 居	9, 4 5 9	810	8,6 49	9 1.4	145
		(四川)	1,046	4.6	1,0 0 0	9 5, 6	1,000
		幕 別	1 2, 2 2 6	1, 3 1 9	1 0,9 0 7	8 9. 2	
		札 内	1 9,8 0 5	1,624	18,181	9 1.8	
		十 勝	6, 2 5 6	858	5, 3 9 8	8 6.3	
		大 樹	1,606	2 0 0	1.4 0 6	87.5	
		(広尾)	1,756	112	1,6 4 4	9 3.6	1,5 9 4
		本 年 度	7 2,6 6 7	7,062	6 5,6 0 5	9 0. 3	2,9 9 8
		前 年 度	1 6 9, 7 2 6	2,226	147,465	8 6.9	47,941

註: () の事業場は民間簡易ふ化設備

尾 数 壮海日数	
給 餌 計	備考
2.0 2 5 2.0 2 5 9 3.2 3.2 0 - 5.3 1	
5,890 5,890 909 4. 1 - 5.31	
261 906 4.1-5.10	
9,860 9,860 83.4 5,20	
2.210 2.210 770 3.15 - 5.10	
10,665 10,665 85.3 4.1-5.24	
1.138 89.6 3.5-4.30	
3 0,6 5 0 3 2,0 4 9 8 5.7 3. 5 - 5.3 1	
38,305 87,543 81.3 3.12 - 5.30	
5,8 1 7 6, 2 8 7 8 3.7 4. 7 - 5.3 1	
1 1,4 7 5 1 1,4 7 5 8 3.3 4,2 0 - 5.31	
5,005 5,527 79.8 4.15 - 6.15	
8,654 8,654 873 3.1-5.16	
43,057 43,057 86.0 3.20-5.15	
40 72.7 3.20 - 4.15	
1,100 89.4 3.26 - 4.30	
2,5 3 8 9 6.6 4. 1 - 5.2 5	
200 200 881 5.1-5.5	
7 4,2 0 8 7 8,8 7 8 8 5.4 3. 1 - 6.1 5	
47,012 132,331 76.0 2.20 - 6.20	,
3,318 3,577 79,0 4.9-5.24	,
1 4,3 3 4 1 4,3 3 4 8 9.7 3.28 - 5.17	
8,420 8,565 905 4.25 - 5.31	
1.000 95.6 5. 1 - 5.31	
1 0,6 3 0 1 0,6 3 0 8 6.9 3.1 6 - 5.1 5	
17,730 17,730 89.5 4. 1-5.10	
5,263 5,263 84.1 4.20 - 6. 4	
1,363 1.363 84.9 3.26 - 4.17	
1,5 9 4 9 0.8 3.20 - 5.20	
61,058 64,056 88.2 3.16-6. 4	
9 3 6 0 3 1 4 1 5 4 4 8 3 4 2 2 7 - 5 3 1	

1						放
支 場	事 業 場	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ化率	無 給 餌
		千粒	千粒	千尾	%	千尾
天 塩	徳 志 別	2,267	198	2,0 6 9	9 1.3	
	歌 登	3,027	220	2,8 0 7	9 2.7	
	屯 別	1.0 0 3	98	905	9 0.2	
	(時 前)	104	18	8 6	8 2.7	
	(増 幌)	513	6 8	4 4 5	8 6.7	
	中 川	7, 3 8 6	6 3 6	6,750	9 1.4	
	天 塩	1.6 41	111	1,5 3 0	9 3.2	
	(増毛)	1.002	110	892	8 9.0	
	本 年 度	16,943	1,459	15,484	9 1.4	
	前 年 度	31,443	3,793	27650	8 7 9	8,511
千 歳	千 歳	4,5 2 4	4 2 2	4,1 0 2	9 0. 7	
	音 江	5 1 1	5 6	4 5 5	8 9.0	452
	(元浦川)	268	16	262	9 4.2	259
	静内	3,8 3 2	4 4 0	3,3 9 2	8 8.5	
	(鵡川)	239	3 9	200	8 3.7	170
	敷 生	4 3 8	21	417	9 5.2	
	(貫気別)	15	2	13	8 6.7	11
	本 年 度	9,837	996	8,841	8 9,9	8 9 2
	前年度	38,181	4.1 3 5	3 4, 0 4 6	8 9.2	2 0, 5 7 3
渡 島	利 別	775	5 3	7 2 2	9 3.2	2 3
	厚沢部	355	28	3 2 7	9 2.1	
	八 雲	5,072	788	4.284	8 4.5	155
	(有川)	201	31	170	8 4.6	160
	(亀川)	71	9	6 2	873	61
	(茂辺地)	4,429	2 3 2	4,1 9 7	9 4.8	4,062
	知 内	1.0 3 0	. 152	8 7 8	8 5.2	875
	本 年 度	11,933	1,293	1 0, 6 4 0	8 9.2	5,3 3 6
	前 年 度	24,319	3,408	20,911	8 6. 0	1 1,9 8 6
A 21	本 年 度	241,114	25,138	215,976	8 9.6	1 5, 2 9 5
合 計	前 年 度	5 4 5,6 4 6	73,198	47 2,4 48	8 6.6	223,568

流 尾 数		放流尾数			
給 年 千尾	計	収容卵数%	放 流 期 間月日一月日	備	考
2,0 5 6	2,056	9 0.7	3. 1 - 4.1 5		
2,5 0 0	2,5 0 0	8 2.6	2.15 - 4. 5		
900	900	8 9.7	4.21 - 4.30		
8 5	8 5	8 1.7	6. 5 - 6. 9		
4 3 0	4 3 0	83.8	6. 5 - 6. 9		
5, 2 0 2	5,202	7 0.4	5.17 - 5.31		
1.5 0 0	1,500	9 1. 4	5.10 - 5.23		•
870	870	8 6.8	6.11 - 6.25		
1 3,5 4 3	1 3, 5 4 3	7 9.9	2.15 - 6.25		
1 5,1 7 8	23,689	7 5.3	1.26 - 6.13	*	
3,979	3,979	88.0	4. 4-4.25		
	452	8 8 5	4.25		
	259	9 3.2	4.15 — 4.29		
3,256	3, 2 5 6	8 5.0	4. 9 — 4.28		
	170	71.1	4.1 2		
410	410	9 3.6	312-313		
	11	7 3.3	4.23	ar.	
7, 6 4 5	8,537	8 6.8	3.12-4.29		
1 0, 0 7 7	3 0,6 5 0	8 0. 3	2.19 - 5.21		
691	7 1 4	9 2.1	4.13 - 4.15		
3 0 5	3 0 5	8 5.9	3 3 - 331		
4,0 4 8	4,198	8 2.8	4.11-5.23		
	160	7 9. 6	3.25 - 4.30		
	61	8 5. 9	3.25 - 4.30		
	4,062	9 1.7	2.25 - 4.30		
	875	8 5.0	320-331		
5,0 3 9	1 0, 3 7 5	8 6.9	2.25 - 5.23		
6,986	18,972	7 8.0	1.26 - 5.11		
1 9 2,1 4 3	207438	8 6.0	2.15 - 6.25		
211,161	4 3 4, 7 2 9	7 9.7	1.26-6.20		

§ 8 ます増殖事業

1 補獲採卵成績概要

のさくらます

本年度は19水系の19捕獲採卵場で5月11日から10月20日まで実施し、15592尾を捕獲した(最近5ヶ年平均7290尾)。例年をはるかに上週り各海区とも昨年以上の成績を示したが、特にオホーツク海区では特に好漁であつた。

採卵数については雌親魚使用率 6 3 6 %と悪く、1 1,5 9 2 千粒であつた。これはオホーツク 海区の興部採卵場、根室海区の風連採卵場で蓄養中の大量へい死による。

0からふとます

本年度は29水系の29捕獲採卵場で5月15日から10月20日まで実施し、65,874尾を捕獲した。(最近5ヶ年平均44,139尾)。総体では計画数を上廻り例年量を越える成績であつた。最近西歴偶数年はオホーツク海豊漁、根室海区不漁、奇数年は逆の傾向が現われていた。岩尾別川では豊漁の偶数年に約10千尾、奇数年は数100尾で、本年はその不漁年にも拘らず、豊漁年の200分の成績であつた。一方根室海区では豊漁年にも拘らず豊漁年の67分程度に止まつた。

採卵数については雌親魚使用率が、84.9%で、25.577千粒と計画をはるかに下廻つた。 これは、雌:雄比が1:2と極端に悪く、また魚体も小型魚が多かつた。


事業計画と実績並びに前年度との比較

第1表 さくらます

	^		昭和 4 3 年度	昭和42年度	前年度との対比	
X	分	計画数	実 績	達成率	実 績	増 滅 △
捕	獲 数	11,600 尾	15,596 尾	1 3 4.4 %	7,993 尾	7,599
우	使 用 数	6,119 尾	6,558 尾	1072 %	4,257 尾	2,301
採	卵 数	12.699千粒	11.592干粒	9 1.3 %	7,222干粒	4.3 7 0
放	流 尾 数	10,159千尾	9.927干尾	977 %	6.312千尾	3,615

第2表 からふとます

67	0	f.	昭和43年度		昭和42年度	前年度との対比		
区	分	計画数	実 績	達成率	実 績	増 滅 △		
捕	獲 数	6 1.0 0 0	6 5,8 7 4	108.0 %	47,431 尾	18,443		
우	使 用 数	23.179	18,482	7 9.7 %	22,161 尾	△ 3,679		
採	卵 数	31.110	2 5, 5 7 7	8 2.2 %	32338千粒	△ 6,761		
放	流尾数	24,887	2 1, 4 6 9	8 6.3 %	28,083千尾	△ 6,616		



第3表 昭和43年度海区別さくらます事業成績集計表

	,	項						.‡	甫	羞	į.	Ð	采	列
海		\		目	捕	獲	数	7	9	親	魚	P	親	魚
			\		9 尾	8 尾	計尾	性比	使	用	数尾	使	用	率 %
*	水 一	ック	海	区	7, 4 5 4	4,0 36	11,490	6 4.9		4, 2	12		5	6.5
目	本	海	Ē	区	638	198	8 3 6	7 6.9		6	21		9	7.3
根	室	海	Ī	×	2,204	1,0 5 6	3,260	676		1,7	19		7	8.0
襟	裳以	東	海	区		4								
襟	裳以	西	海	区	8	2	10	8 0.0			6		7	5.0
	合		î î	†	1 0,3 0 4	5, 2 9 2	15,596	6 6.1		6, 5	58		6	3,6

第4表 昭和43年度支場別さくらます事業成績集計表	第 4表	昭和 4:	3 年度支場別さく	らま	す事業成績集計ま
---------------------------	------	-------	-----------	----	----------

	項						打	申	獲	採	B
支			目	捕	獲	数	우	우	親魚	9 業	
	場			♀	↑ 尾	計尾	性比	使	用数尾	使 月	9 率 %
北	見	支	場	6,570	3, 4 9 7	1 0,0 6 7	6 5.3		3, 4 4 3		5 2.4
根	室	支	場	2,204	1,056	3, 2 6 0	6 7.6		1,719		7 8.0
+	勝	支	場								
天	塩	支	場	1.020	576	1,596	6 3 9		895		8 7 7
干	歲	支	場	8 0	7 2	152	5 2.6		76		9 5.0
渡	島	支	場	430	91	521	8 2.5		425		9 8.8
合	ì	The state of	H	1 0, 3 0 4	5, 292	1 5, 5 9 6	6 6.1		6,558		6 3.6

2	14	放	流	成	績				
平採	均卵数	採卵数	実 施	期間	収容卵数	ふ出尾数	ふ化率	放流尾数	放流期間
	粒	干粒			干粒	千尾	%	千尾	
1	1,690	7115	5.1 1~1	0.16	7,115	6, 4 9 6	9 1.3	6, 4 0 2	1.1 0 - 4.3 0
2	2,430	1,509	7. 1~	10.20	1.497	1,321	8 8.2	1.119	4. 1-5.16
1	.720	2,9 5 6	5.1 5~1	10.10	2.9 5 6	2,6 2 9	8 8.9	2,406	2. 1-4.80
Ş	2.0 0 0	12	7 1~	9.30	12	11	9 1.7	0	
1	.770	11,592	5.1 1~1	0.20	11,580	10,457	90.3	9,927	1. 9-5.1

-	化	放	流	成	績				
平採!	均 数 粒	採卵数干粒	実施	期間	収容卵数 千粒	ふ出尾数 干尾	ふ化率	放流尾数	放流期間
1	1,770	6,078	5.1 1~1	1 0.1 6	6,078	5,5 6 3	9 1,5	5, 4 9 6	1.10-4.30
1	1,720	2,9 5 6	5.15~1	10.10	2,9 5 6	2,629	8 8.9	2,406	2. 1-4.30
		,			1				
1	.390	1, 2 4 7	5.25~	9, 3 0	1.2 4 7	1,1 3 2	9 0.8	1,104	1. 9-4.10
2	2,390	182	7 1~	10.10	172	155	901	141	4.30
2	2,6 6 0	1.129	8.21~	1 0.2 0	1,127	978	8 6,8	780	5.15-5.16
1	1.770	11,592	5.1 1~1	10.20	11.580	10,457	9 0.3	9, 9 2 7	1. 9-5.16

第5表 昭和43年度 海区別からぶとます事業成績集計表

項				打	獲	採	卵点
梅目	捕	獲	数	우 性 比	♀ 親 使 用	魚魚飯	親魚用率
R	♀尾	↑ 尾	計尾	%	医 用	足尾	#3 44 %
オホーツク海区	1 5, 4 5 0	2 3, 3 7 9	38,829	3 9.8	1 3, 4	71	872
日 本 海 区	180	131	311	579	1	17	6 5.0
根室海区	6.012	2 0, 4 5 4	26,466	2 2.7	4,8	37	8 0.5
襟裳以東海区	19	11	3 0	6 3.3		9	4 7 4
襟裳以西海区	115	1 2 3	238	48.3		48	4 1.7
合 計	21.776	4 4,0 9 8	6 5, 8 7 4	3 3.1	18,4	8 2	8 4.9

第6表 昭和43年度 支場別からふとます事業成績集計表

1	耳	Ĩ							ł	甫	獲	1	采	卵	£
支	場	_	目	捕	獲	炎	女	우		우	親	魚	8	親	魚
	匆名			9 尾	♂ 員	2	計尾	性上	Ł %	使	用	数尾	使	用	率 %
北	見	支	場	11,112	17,82	3	28,935	3	8.4		1 0, 2	75		9	2.5
根	室	支	場	6,012	2 0, 4 5	4	26,466	2	2.7		4, 8	3 7		8	0. 5
+	勝	支	場	19	1	1	. 30	6	3.3			9		4	7. 4
天	塩	支	場	4,5 18	5,68	7	1 0, 2 0 5	4	4.3		3, 3	13		7	3.3
干	歳	支	場				34.								
渡	島	支	場	115	12	3	238	4	8.3			48		4	1.7
4	<u> </u>	100	+	21,776	44,09	3	65,874	2	3.1		18,4	82		8	4.9

	放	Ŭ	12	放	í	寅 								
平採	卵	均数	採	卵	数	実	施	期間	収容卵	数	ふ出尾数	ふ化率	放流尾数	放流期間
		粒			千粒				手	粒	千尾	96	千尾	
	1,4	8 0		1 9,	888	6. 1	1~	1 0.2	16,6	3 0	1 4.4 2 4	8 6.7	1 4,1 8 5	2. 1-5.
*.	1, 1	4 0			133	7.	1~	9. 2	1	3 3	123	9 2.5	123	4. 1-4.
	1,1	4 0		5,	503	5.1	5~	1 0.20	6,6	13	5,623	8 5.0	5, 2 7 4	2. 1-5.
	1.4	40			13	7. 2	1~	9. 2	3	13	11	8 4.6	11	4.20
	8	3 0			4 0	7.	1~	1 0.	2.1 8	8 8	1,888	8 6.3	1.8 7 6	2.1 8-5.
	1, 3	8 0		2 5,	577	5.1	5~	10.2	2 5, 5 7	77	22,069	8 6.3	21,469	2. 1-5.

Ľ	放		流		成	į	漬									
亚		均							×							
採	卵	数	1	采	卵	数	実	施其	明眉		収容卵数	ふ出尾数	ふ化率	放流尾数	放	粒期間
		粒			=	F粒					干粒	千尾	%	千尾		
	1,	490		1	1 5, 3	5 4	6.1	1~	1 0.	2 0	1 2,0 9 6	11,017	9 1.1	10,809	2.	1-5,2
	1.	140			5, 5	0 3	5.1	5 ~	10.9	2 0	6,613	5,623	8 5.0	5,274	2.	1-5.3
	1,	4 4 0				13	7. 2	1~	9.	28	13	11	8 4.6	11		4.20
	1,	410			4,6	67	7.	1~	10.	10	4,6 6 7	3,530	7 5.6	3,499	2.	1-4.1
		8 3 0				4 0	7.	1~	1 0.	9	2.188	1,888	8 6.3	21,469	2.	1-5.3
	1,	380		5	2 5, 5	7 7	5. 1	5~	10.	20	2 5, 5 7 7	2 2,0 6 9	8 6.3	2 1, 4 6 9	2.	1-5.3

第7表 昭和48年度海区水系別さくらます親魚捕獲採卵成績表

海			所 管	捕	獲	数	使	用親魚
X	水 系	採卵場	事業場	9 尾	8 尾	計尾	タ 尾	8 尾
	岩尾別	岩尾別	岩尾別	7 6	2 5	101	. 76	2.5
オ	斜 里	斜 里	斜 里	3,282	2.1 4 5	5, 4 2 7	2,4 9 3	790
ホ	渚 滑	渚滑	渚滑	1.187	708	1.8 9 5	826	274
	興 部	興 部	"	2.021	617	2.6 3 8	. 44	20
1	幌 内	幌 内	幌 内	4	2	в	4	2
ツ	徳志別	徳志別	徳志別	92	9	101	64	16
2	北見幌別	北見幌別	歌登	7 9 2	5 3 0	1.3 2 2	705	210
		本年度		7, 4 5 4	4,036	11,490	4,212	1.3 3 7
	海区計	前年度		3,636	2.0 5 3	5,689	2.7 0 4	735
	天 塩	中川	中川	136	37	178	126	26
B	石 狩	西 越	干 歳	7 2	7 0	142	7.0	46
	尻 別	名 駒	尻 別	414	8.8	502	409	8 8
	朱 太	朱 太	"	16	3	19	16	3
本	사 IZ 라	本年度		638	198	8 3 6	621	163
244	海区計	前年度		287	120	407	288	107
	標津	標津	根室	988	3 3 8	1,8 26	8 2 2	308
	当幌	当幌	計根別	161	92	258	157	90
根	春 別	春 別	"	18	12	3.0	18	12
	床 丹	床 丹	"	20	8	28	20	. 8
	西 別	西 別	虹别	86	4.6	132	88	4.6
	矢臼別	矢日别	浜 中	91	7 0	161	5.5	3.4
	風蓮	風蓮	"	388	173	5 5 6	108	5 8
室	别当賀	別当賀	厚床	457	817	774	456	229
	海区計	本年度	1	3.204	1.0 5 6	8,260	1,719	7 7 3
	(日 日	前年度		1,329	567	1,896	1,270	494
以	位雁别	仁雁别		8	2	10	6	
	海区計	本年度		8	2	10	6	
西	(HF 1/2 6)	前年度		1	0	1		
	合 計	本年度		1 0,3 0 4	5, 2 9 2	1 5, 5 9 6	6,558	2,2 7 3
	C 61	前年度		5, 2 5 3	2.7 4 0	7,993	4,257	1,336

数						
計	採卵数	增減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚 使 用 率	平均採卵数	実 施 期 間
尾	千粒	△ 千粒	干粒	96	粒	月日~月日
101	159		159	100	2.0 9 0	6. 1~ 9.30
3,283	4,768		4,768	7 6,0	1.910	5.11~ 9.19
1.1 0 0	1,101		1,1 0 1	6 9.6	1,230	5.1 1~1 0.1 6
6 4	41		41	2. 2	980	5.11~ 9.14
6	9		9	100	2,250	8 1~ 930
80	122		122	6 9.6	1,910	6. 5~ 9.20
915	915		915	89.0	1,300	5.25~ 9.30
5, 5 4 9	7,115	-	7,115	5 6.5	1.690	5.11~10.16
3,439	4,312		4,312	7 4.4	1,5 9 0	5.12~10.14
152	210		210	9 2.6	1,670	7. 1~ 9.25
116	170	△(供試) 10	160	972	2.4 3 0	9. 5~10.10
497	1,0 8 9	-	1.0 8 9	98.8	2,660	821~1010
19	4 0		4 0	100	2,5 0 0	9. 1~10.20
784	1,5 0 9	△(供試) 10	1,499	978	2,480	7 1~10.20
3 9 0	572	△(供試) 23	549	986	2,0 2 0	725~1010
1.1 8 0	1.4 2 9		1,429	8 3.1	1,7 4 0	5.21~10.10
247	453		453	975	2,890	5.15~10.10
30	5 2		5 2	100	2,890	5.1 5~1 0.1 0
28	4 2		4 2	100	2.100	5.15~1 0.10
1 2 9	191		191	9 6.5	2,300	6. 1~1 0.1 0
8 9	5 2		5 2	6 0.4	950	6. 1~10. 7
161	131		131	282	1,210	5.21~10. 4
678	606		606	99.8	1.830	7 1~10.10
2,492	2,9 5 6		2,9 5 6	7 8.0	1.7 2 0	5.15~10.10
1,764	2.3 3 8		2,338	9 5.6	1.840	6. 1~10.10
6	12		12	7 5, 0	2,000	7 1~ 9.30
6	12		1 2	7 5, 0	2.000	7 1~ 9.30
						9.19
8,831	1 1,5 9 2	△(供試) 10	11,582	6 3.6	1.770	5.11~10.20
5,598	7, 2 2 2	△(供試) 23	7,199	8 1.0	1,700	5.12~10.24

第8表 支場・事業場さくらます捕獲採卵成績表

T		1 2 2			J-ba	CD 400 60	466
-t- +e	車 娄 担	捕	獲数			用親魚	数
支 場	事業場	♀ 尾	尾	計尾	♀ 尾	↑ 尾	計尾
北	岩尾別	7 6	25	1 01	7 6	25	101
見	斜 里	3,282	2,145	5,427	2,493	790	3,288
支	渚 滑	3,208	1,3 2 5	4,5 3 3	8 7 0	294	1.1 6 4
場	幌 内	4	2	6	4	2	. 6
	本年度	6, 5 7 0	3,497	10,067	3, 4 4 3	1.111	4.5 5 4
計	前年度	3, 4 4 4	1,881	5, 3 2 5	2,5 2 3	684	3, 2 0 7
根	根 室	988	3 38	1,326	8 2 2	3 0 8	1.1 3 0
	計根別	199	112	311	195	110	305
室	虹. 别	86	4 6	132	8 3	46	129
支	浜 中	474	243	717	163	8 7	2 5 0
場	厚 床	457	317	774	456	222	678
A.	本年度	2.2 0 4	1,056	3,260	1.719	7 7 3	2,492
at	前年度	1,329	567	1.896	1,270	494	1,764
天	徳 志 別	92	9	101	6 4	16	8 0
塩支	歌登	792	5 3 0	1,322	7 0 5	210	915
場	中 川	136	37	178	126	26	152
= I.	本年度	1,020	5 7 6	1,5 9 6	8 9 5	252	1,142
1	前年度	390	257	6 4 7	379	125	504
干才	干 歲	7 2	7 0	1 4 2	7 0	4 6	116
支 場	静内	8	2	10	6	0	6
44.1.	本年度	8 0	72	152	7 6	4 6	122
計	前年度	1 4	3	17	9	1	10
渡島 支場	尻 別	430	91	521	425	91	516
	本年度	430	91	5 2 1	425	9 1	5 1 6
計	前年度	7 6	3 2	108	7 6	3 2	108
合 計	本年度	10,304	5, 2 9 2	15,596	6, 5 5 8	2.2 7 3	8,831
(i)	前年度	5, 2 5 8	2,7 4 0	7,993	4,2 5 7	1,336	5, 5 9 8

			_	des	~		
採 卵 数	增減卵数	仮収容卵数	全使		魚 率%	平均採卵数	実 施 期 間
干粒	千粒	千粒			%	粒	月日~月日
159		159		10	0	2.090	6. 1~ 9.30
4,7 6 8		4,7 6 8		7	6.0	1,910	5.11~ 9.19
1,142		1.1 4 2		2	7.1	1,310	5.1 1~1 0.1 6
9		9		10	0	2,2 5 0	8. 1~ 9.30
6,078		6,078		5	2, 4	1,770	5.1 1~1 0.1 6
4,020		4,020		7	3.3	1,590	5.1 2~1 0.1 2
1, 4 2 9	8	1.429		8	3.1	1,740	5.21~1 0.1 0
5 4 7		547		9	8.0	2,810	5.1 5~1 0.1 0
191		191		9	6, 5	2,800	6. 1~10.10
183		183		3	4.4	1.1 2 0	5.21~10. 7
606		606		9	9, 8	1, 3 3 0	7. 1~10.10
2,9 5 6		2,9 5 6		7	8.0	1.720	5.1 5~1 0.1 0
2,338		2,3 3 8		9	5.6	1 8,4 0	6. 1~1 0.1 0
122		122		6	9, 6	1,910	6. 5~ 9.20
915		915		8	9.0	1,3 0 0	5.25~ 9.30
210		210		9	2.6	1,6 7 0	7. 1~ 9.25
1.2 4 7		1.2 4 7		8	7. 7	1,3 9 0	5.25~ 9.30
655		6 5 5		9	7. 2	1,7 3 0	6. 1~10.14
170	△(供試)10	160		9	7. 2	2,4 3 0	9. 5~10.10
12		12		7	5.0	2,0 0 0	7. 1~ 9.30
182	△(供試)10	172		9	5.0	2,3 9 0	7. 1~1 0.1 0
23	△(供試)23	0		6	9. 2	2,5 6 0	9.2 3~1 0.2 4
1.129		1,129		9	8,8	2,6 6 0	8.21~10.20
1.1 2 9	Υ,	1,1 29		9	8.8	2,6 6 0	8.21~1 0.20
186		186		10	0	2,4 6 0	9. 1~10.10
11.592	△(供試)10	1 1,5 8 2		6	3.6	1,7 7 0	5.1 1~1 0.2 0
7, 22 2	△(供試)23	7,199		8	1.0	1,7 0 0	5.1 2~1 0.2 4

-56-

第9表 昭和43年度海区水系別からふとます親魚捕獲採卵成績表

海				捕	獲	数	使	用親魚
区	水 系	採卵場	所 管 事業場	9 尾	↑ 尾	計尾	マ 尾	↑ 尾
-	岩尾別	岩尾別	岩尾別	7,7 7 3	1 3,9 9 0	21,763	7,6 5 5	1,2 6 4
	斜 里	斜 里	斜里	1,5 6 5	1,412	2,977	1,4 2 7	479
	藻 琴	藻 琴	藻 零	0	2	2		
オ	網走	網 走	網走	10	8	18	.8	4
ホ	常呂	常呂	北見	279	3 30	609	242	7 7
~	湧 別	湧 別	湧 別	323	4 4 5	768	314	105
1	渚 滑	渚 滑	渚 滑	756	1,1 2 9	1,885	430	119
ッ	與 部	興 部	"	96	68	164	6.9	18
	幌 内	幌 内	幌 内	189	3 0 1	490	130	6 7
2	雄 武	雄 武	"	121	138	259	}	2
海	徳 志 別	徳志別	徳志別	2,1 3 2	2,3 6 1	4,4 9 3	1,980	3 9 7
区	北見幌別	北見幌別	歌登	1,0 21	1,965	2,9 8 6	953	252
	屯 別	屯 別	屯 別	854	755	1,609	230	7 4
	猿 払	猿 払	"	331	4 7 5	806	3 3	20
	海区計	本年度		1 5,4 5 0	2 3,3 7 9	3 8,8 2 9	1 3,4 7 1	2,8 7 6
	神区引	前年度		20,511	1 7,7 3 9	3 8,2 5 0	1 9,3 7 0	4,876
日	天 塩	中川	中川	180	131	311	117	3 6
本海	海区計	本年度		180	1 3 1	311	117	3 6
四区	107 123 131	前年度		_		-	-	-
	サシルイ	サシルイ	羅臼	5 3	3 4	8 7	29	11
	春刈古丹	春刈古丹	"	18	15	3 3	10	11
根	植 別	植 別	薫別	0	0	0		
110	忠 類	忠 類	伊茶仁	50	231	281	3 3	15
室	標津	標津	"	1,2 4 3	4,8 9 2	6,135	833	319
25.	当 幌	当幌	計根別	592	6 84	1,276	592	600
海	春 別	春 別	"	3 0	40	70	3.0	4 0
119	床 丹	床 丹	"	27	22	49	27	2 2
区	西别	西 別	虹别	3,4 1 3	1 3,3 5 2	16,765	2,8 2 4	1,0 23
	矢白别	矢 臼 別	浜 中	3 0	6 9	99	21	9
	風 蓮	風 蓮	"	474	1,0 2 6	1,500	362	91

数									
_	計	採卵数	增減卵	数	仮収容卵数	♀使	親魚用率	平均採卵数	実施期間
	尾	干粒	Δ	千粒	干粒		96	粒	月日~月日
	8,9 1 9	1 1,1 0 5			11,105		9 8.5	1,4 50	6.1 1~ 1 0.1 0
	1,906	2,4 9 0			2,4 9 0		9 1.2	1,7 4 0	7. 1~10.12
									9.11~ 9.30
	12	12			1 2		8 0.0	1,500	8.1 1~ 1 0.1 0
	319	368			368		8 6.7	1,520	8. 1~10.20
	419	519			519		9 7. 2	1,6 5 0	8. 1~10.20
	549	5 3 5			535		56.9	1,2 4 0	7.29~10. 5
	87	93			9 3		7 1.9	1,350	8. 1~10.10
	197	232			232		4 1.9	1,7 8 0	8. 1~10.10
									7.10~ 9.10
	2,3 7 7	2,8 1 5			2,8 1 5		9 2.9	1,4 2 0	7. 1~10.10
	1,2 0 5	1,366			1,3 6 6		9 3.3	1,4 3 0	7.1 1~ 9.3 0
	3 0 4	315			315		2 6.9	. 1,370	7.25~ 9.29
	5 3	38			3 8		1 0.0	1,1 5 0	7.15~ 9.21
1	6,347	19,888			1 9,8 8 8		8 7.2	1,4 8 0	6.1 1~ 1 0.20
2	2 4,2 4 6	2 8,9 8 9			28,989		9 4.4	1,5 0 0	7. 1~10.31
	153	133			133		6 5.0	1,1 4 0	7. 1~ 9.2 5
	153	133			133		6 5.0	1,140	7. 1~ 9.2 5
	-	_			-		_	-	
	4 0	26			26		5 4.7	900	7.21~ 9.30
	21	10			10		5 5.6	1,0 0 0	7.19~ 9.20
									7.1 1~ 9.1 0
	48	40			40		6 6.0	1,210	7. 1~ 9.2 0
	1,1 5 2	1,0 8 2	J.		1,0 8 2		6 7.0	1,300	7. 1~10.20
	1,1 9 2	579			579		100	980	5.15~10.10
	70	27			2.7		100	900	5.15~10.10
	49	26			2 6		1 0 0	960	5.1 5~ 1 0.1 0
	3,8 4 7	2,9 5 8			2,9 5 8		8 2.7	1,050	6.21~10.20
	3 0	32			3 2		7 0.0	1,520	7.1 1~ 1 0. 2
	453	610			610		7 6.4	1,690	7.21~10.17

海						所	管	捕	獲	数	使	用 親	魚
	水		系	採卵	場	事業		우	8	計	우	8	
区						サホ	2-000	尾	尾	尾	尾		崖
根	別	当	賀	別当	賀	厚	床	8 2	8 9	171	7 6		4.5
根室海区		57	=L	本年	度			6,0 1 2	2 0,4 5 4	26,466	4,837	2,1	86
区	海	区	äT	前 年	度			2,983	5,153	8,136	2,4 8 8	1,1	23
L/ 886	釧		路	釧	路	剑	路	19	1 1	3 0	9		4
禁以 東海 裳区	14-	-7	#1	本年	度			19	11	3 0	9		4
裳区	海	X	äT	前年	度			293	375	668	186		73
襟以	遊	楽	部	遊楽	部	八	雲	1 1 5	123	238	48		2 2
襟以 海 寒 寒	14-	_	=1	本年	度			115	123	238	48		22
裳区	海	X	計	前年	度			191	186	3 7 7	117		46
				本年	度			2 1,7 7 6	4 4,0 9 8	6 5,8 7 4	1 8,4 8 2	5,	124
4	ì		計	前年	度			23,978	2 3,4 5 3	4 7,4 3 1	2 2,1 6 1	6,3	1 1 8

数計尾	採 卵 数	増減卵数 千粒	仮収容卵数 千粒	Q 親 魚 使 用 率 %	平均採卵数粒	実施期日 月日~月日
121	113		113	9 2.7	1,490	7. 1~1 0.1 0
7,023	5,503		5,5 0 3	8 0.5	1,1 4 0	5.15~10.20
3,6 1 1	3,010		3,010	8 3.4	1,210	6. 1~10.10
13	13		13	47.4	1,440	7.21~ 9.28
1 3	13		13	4 7.4	1,440	7.21~ 9.28
259	189		189	6 3.5	1,0 2 0	9. 1~10.10
7 0	4 0		40	4 1.7	830	7. 1~10. 9
7 (40		4 0	4 1.7	830	7. 1~10. 9
163	150		150	6 1.6	1,2 8 0	7. 6~10.20
2 3,600 6	2 5,5 7 7		25,577	8 4.9	1,3 8 0	5.15~10.20
2 8,2 7 9	3 2,3 3 8		3 2,3 3 8	9 2.4	1,4 6 0	6. 1~1 0.3 1

第10表 支場・事業場別からふとます親魚捕獲採卵成績表

		-	捕	獲	数 -	使	用 親 魚	数
支 場	事	業場	♀尾	る尾	計尾	♀尾	8 尾	計尾
	岩	尾別	7,7 7 3	13,990	21,763	7,6 5 5	1,2 6 4	8,9 1 9
北	斜	里	1,5 6 5	1.4 1 2	2,9 7 7	1,4 27	479	1,906
_	藻	零	0	2	2			
見	網	走	10	8	18	8	4	12
支	北	見	279	3 3 0	609	242	7 7	319
^	湧	别	323	4 4 5	768	314	105	419
場	渚	滑	852	1,1 9 7	2,0 4 9	499	137	636
	幌	内	310	439	749	130	67	197
	本	年 度	1 1,1 12	17,823	2 8,9 3 5	1 0,2 7 5	2,1 3 3	1 2,4 0 8
計	前	年度	19,392	16,354	35,746	18,463	4,6 4 9	2 3,1 1 2
	羅	臼	71	49	120	3 9	2 2	6 1
根	薫	别	0	0	0			
室	伊	茶仁	1,2 9 3	5,1 2 3	6,416	866	3 3 4	1,2 0 0
35	計	根 別	649	7 4 6	1,3 9 5	649	662	1,3 1 1
支	虹	别	3,4 1 3	1 3,3 5 2	16,765	2,8 2 4	1,0 23	3,8 4 7
	浜	中	504	1,0 9 5	1,599	383	100	483
場	厚	床	82	8 9	171	7 6	4 5	121
	本	年 度	6,012	20,454	26,466	4,8 3 7	2,1 8 6	7,023
計	前	年 度	2,983	5,1 5 3	8,1 3 6	2,4 48	1,1 2 3	3,6 1 1
十勝支場	釧	路	19	11	3 0	9	4	13
=1	本	年 度	19	11	3 0	9	4	1 3
計	前	年 度	293	3 7 5	6 6 8	186	7 3	259
	徳	志別	2,1 3 2	2,3 6 1	4,4 9 3	1,980	3 9 7	2,3 7 7
工场支援	歌	登	1,0 2 1	1,9 6 5	2,986	9 5 3	252	1,205
天塩支場	屯	别	1,1 8 5	1,230	2,415	263	94	357
	中	JII	180	1 3 1	3 1 1	117	3 6	153
=1.	本	年 度	4,5 1 8	5,6 8 7	1 0,2 0 5	3,3 1 3	779	4,0 9 2
11	前	年度	1,1 1 9	1, 3 8 5	2,5 0 4	9 0 7	2 2 7	1,1 3 4
渡島支場	八	雲	115	123	238	4 8	2 2	7 0
=+	本	年 度	115	1 2 3	238	48	22	7 0
計	前	年 度	190	183	373	117	4 6	163
A #1	本	年 度	21,776	4 4,0 9 8	65,874	1 8,4 8 2	5,124	2 3,6 0 6
合 計	前	年度	23,978	2 3,4 5 3	47,431	2 2,1 6 1	6,1 18	28,279

				0	46	4.		
採卵	数	增減卵数	仮収容卵数	や使	親用	魚率	平均採卵数	実 施 期 間
	干粒	△ 千粒	千粒			%	粒	月日~月日
1 1	,105		1 1,1 0 5			9 8.5	1,4 5 0	6.11~10.10
2	490		2,4 9 0			9 1.2	1,7 4 0	7. 1~ 1 0.1 2
								9.11~ 9.30
	12		1 2			8 0.0	1,500	8.11~ 10.10
	368		3 6 8			8 6.7	1,5 2 0	8. 1~ 1 0.2 0
	519		519			9 7.2	1,650	8. 1~ 10.20
	628		628			5 8.6	1,260	7.29~ 1 0.10
	232		2 3 2			4 1.9	1,780	7.10~ 10.10
15	,354		15,354			9 2.5	1,4 9 0	6.11~ 10.20
2 7	774		1,7 7 4			9 5.2	1,5 0 0	7. 1~ 1 0.3 1
	3 6		3 6			5 4.9	9 2 0	7.19~ 9.30
								7.11~ 9.10
1	,1 2 2		1,1 2 2			6 7.0	1,3 0 0	7. 1~ 10.20
	632		632		1	0 0	970	5.15~ 10.10
2	,9 5 8		2,9 5 8			8 2.7	. 1,050	6.21~ 10.20
	642		642			7 6.0	1,680	7.11~ 10.17
	113		113			9 2.7	1,4 9 0	7. 1~ 1 0.1 0
5	,503		5,5 0 3			8 0.5	1,1 4 0	5.15~ 10.20
3	0.010		3,010			8 3.4	1,2 1 0	6. 1~ 10.15
	13		1 3			4 7.4	1,4 4 0	7.21~ 9.28
	13		13			4 7.4	1,4 40	7.21~ 9.28
	189		189			6 3.5	1,0 2 0	9. 1~ 1 0.1 0
2	,815		2,8 1 5			9 2.9	1,4 2 0	7. 1~ 10.10
1	,3 6 6		1,3 6 6			9 3.3	1,4 3 0	7.1 I~ 9.3 0
	3 5 3		3 5 3			2 2.2	1,3 4 0	7.15~ 9.29
	133		133			6 5.0	1,1 4 0	7. 1~ 9.25
4	1,6 6 7		4,6 6 7			7 3.3	1,4 1 0	7. 1~ 1 0.1 0
1	,2 1 5		1,2 1 5			8 1.1	1,3 4 0	7. 1~ 1 0.3 1
	4 0		4 0			4 1.7	830	7. 1~ 10. 9
	4 0		4 0			4 1.7	830	7. 1~ 10. 9
	150		150			6 1.6	1,280	7. 6~ 1 0.2 0
2 5	5,5 7 7		2 5,5 7 7			8 4.9	1,3 8 0	5.15~ 10.20
3 2	2,3 3 8		3 2,3 3 8			9 2.4	1,4 6 0	6. 1~10.31

2 ます卵の移殖

本年度のます卵移殖はからふとますについてのみ行なつた。これは計画に基づく資源不振地域への の移殖と、オホーック海区、根室产区の豊凶是正のための移殖である。

第11表 からふとます発眼卵の移殖

供給	合 地		受制	合 地	移	殖卵	の内訳		
支場名	事 業 名	移殖月日	支場名	事 業 名	移 籍 数 干粒	移殖前 死卵粒 干粒	移 殖 数 千粒	死卵率	摘要
北見	網走	4 3.1 1.2	渡島	八雲	2,1 4 8	2 2 8	1,9 2 0		岩尾別川産
"	"	4 3.1 1.4	根室	虹别	1,1 1 0	5 6	1,0 5 4		"
合	# <u></u>				3,2 5 8	284	2,9 7 4		

3 ますふ化放流成績概要

o さくらます

本年度は採卵数 1 1,5 9 2 千粒から供試卵 1 2 千粒を差引いた 1 1,5 8 0 千粒について、とれを 1 4 事業場(このうち民間ふ化設備 2 ケ所) に収容して管理を行ない、 9,9 2 7 千尾の稚魚を生産し放流した。この歩留りは 8 5.7 %と最近 5 ケ年平均(8 7.1 %)より若干低かつた。この うち、 9 2 1 千尾(9.3 %) は給餌稚魚である。

oからふとます

本年度は採卵数 2 5.5 7 7 千粒について、 1 6 事業場(とのうち民間ふ化設備 3 ヶ所) に収容して管理を行ない 2 1.4 6 9 千尾の稚魚を生産放流した。 との歩留りは 8 3.9 %で最近 5 ヶ年平均(8 7.3 %) より若干低かつた。 とのうち 9.6 8 0 千尾(4 5.1 %) は給餌稚魚である。

註: ()の事業場は民間簡易ふ化設備

放 流 解 千尾 死 卵 数 ふ出尾数 ふ化率 事業場 収容卵数 無給餌 給 系 千尾 干粒 干粒 干尾 X 150 9 6.9 岩尾别岩尾别 159 5 154 4,432 4,478 9 3.9 里 4,768 290 里 オ ホ 8 88.9 8 湧 别 湧 1 906 80.8 219 923 滑渚 滑 1,142 渚 ッ 8 8.3 279 徳志別 徳志別 324 38 286 海 66 647 9 0.7 627 713 北見幌別歌 6,402 9 1.3 本年度 619 6,496 7,115 海区計 3,995 3,908 9 2.6 前年度 4,3 12 317 198 塩 中 JII 11 199 9 4.8 天 210 141 144 9 0.0 干 160 16 石 狩 歳 本 780 978 8 6.8 149 尻 別尻 別 1,127 海 921 198 本年度 1,497 176 1,3 21 88.2 X 海区計 425 前年度 513 35 478 9 3.2 8 7.4 1,217 180 1,249 伊茶仁 1,429 伊茶仁 根 9 3.8 510 丹 (床丹) 5 4 7 34 513 床 164 8 5.9 159 別虹別 191 西 室

65

21

169

1,123

523

1

118

585

2,629

2,169

11

11

31

10,457

6,673

6 4.5

9 6.5

8 8.9

9 2.8

9 1.7

9 1.7

9 3.9

9 0.3

9 2.7

110

410

2,406

1,952

27

9,006

6,312

(8) (8)

(8)921

第12表 昭和43年度海区水系別さくらますふ化放流成績表

※ さくらます卵子の採卵から収容までの動き

矢臼別

海区計

様似

仁雁別

海区計

計

別当賀厚

海

X

襟海 裳 以

西区

(矢臼別

本年度

前年度

(様似)

本年度

前年度

本年度

前年度

採 卵 数 11,592 千粒

183

606

2,956

2,338

12

12

33

1 1,5 8 0

7,196

仮収容卵数 11,592 "

△供試卵数 1,2 "

収容卵数 11,580 "

-66-

数		仮収容卵数から収容卵数までの卵の動き事業場単位
計千尾	放流期間	備 考 稚魚移殖放流括弧書き
150	4. 1~4.30	
4,4 3 2	2. 1~2.28	
8	1.1 0	幌内から9千粒
906	1.29~2. 3	
279	1. 9	歌登から202 千粒
6 2 7	2. 1~2.28	徳志別へ202千粒
6,4 0 2	1.1 0~4.3 0	
3,9 0 8	1. 1~4.3 0	
198	4. 1~4.10	
141	4.3 0	試検供用(淡水区水研へ)10千粒
780	5.15~5.16	試験供用(北大へ)2千粒
1,119	4. 1~5.1 6	
4 2 5	3. 1~5.1 5	
1,217	2.1 0~4.1 0	根室から 1,4 2 9 千粒
510	3. 1~4.30	計根別(当幌、春別、床丹採卵場分)から547千粒
159	2. 1~2.20	
110	2.25~2.28	浜中(矢臼別、風蓮採卵場分)から183千粒
410	3. 1~3.31	
2,4 0 6	2. 1~4.3 0	
1,9 5 2	1.15~4.30	
(8)	1 0. 1 6 1 0, 1 6	静内(仁雁別採卵場分)から12千粒 (様似から静内事業場へ稚魚11千尾を移し、ととで10月15日まで飼育 して、体長 121cm・体重 829の魚体にして放流)
27	5.1 6	
9,927	1. ¹ 9 ^{0.1} 5.1 6	
6,3 1 2	1. 1-5.16	

第13表 昭和43年度支・事業場別さくらますふ化放流成績表

支場 事業場 収容卵数 干粒 死卵数 干粒 添出卵数 干粒 本化率 所 無給町 元程 北見 岩尾別 無 里														 女	流	
出見 岩尾 別	支	場	事	業	場		死			Š	化		無	給		
新 里 4,768 290 4,478 93.9 4,432 勝 別 9 1 8 88.9 8 8 8 8 9 9 9 1 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9	dt.	見	岩	尾	別			5	154			9 6.9			150	
接 滑 1.1 42 219 923 80.8 90.6 本 年 度 6,078 515 5.5 63 91.5 5.49.6 前 年 度 4,020 291 3,729 92.8 3.65.5 根 室 伊 茶 仁 1,429 180 1.249 87.4 1.217 (床 丹) 547 34 513 93.8 510 虹 別 191 27 164 85.9 159 (矢臼別) 183 65 118 64.5 110 厚 床 60.6 21 58.5 96.5 410 本 年 度 2,95.6 327 2,629 88.9 2.40.6 前 年 度 2,338 169 2,169 92.8 1,952 天 塩 徳 志 別 324 38 286 88.3 279 歌 登 713 66 647 90.7 627 中 川 210 11 199 94.8 198 本 年 度 1,247 115 1,132 90.8 1,104 前 年 度 655 30 625 95.4 611 千 歲 千 歲 160 16 144 90.0 (檢 似) 12 1 11 91.7 本 年 度 172 17 155 90.1 前 年 度 0 0 0 0 渡 島 尻 別 1,127 149 978 86.8 市 年 度 183 33 150 81.9 94 本 年 度 11,580 1,123 10,457 90.3 9,006	,,,				里	4,7 6 8		290	4,4 7 8			9 3.9		4	,4 3 2	
本 年度 6,078 515 5,563 91.5 5,496 前年度 4,020 291 3,729 92.8 3,655 1496 (床 丹) 547 34 513 93.8 510 虹 別 191 27 164 85.9 159 (矢臼別) 183 65 118 64.5 110 厚 床 606 21 585 96.5 410 本 年度 2,956 327 2,629 88.9 2,406 前年度 2,338 169 2,169 92.8 1,952 天 塩 徳 志 別 324 38 286 88.3 279 中 川 210 11 199 94.8 198 本 年度 1,247 115 1,132 90.8 1,104 前年度 655 30 625 95.4 611 千 歳 千 歳 160 16 144 90.0 (様 似) 12 1 11 91.7 本 年度 172 177 155 90.1 前年度 0 0 0 0 で			湧		別	9		1	8			8 8.9			8	
制 年 度 4,020 291 3,729 92.8 3,655 根 室 伊 茶 仁 1,429 180 1,249 87.4 1,217 (床 丹) 547 34 513 93.8 510 虹 別 191 27 164 85.9 159 (矢臼別) 183 65 118 64.5 110 厚 床 606 21 585 96.5 410 本 年 度 2,956 327 2,629 88.9 2,406 前 年 度 2,338 169 2,169 92.8 1,952 天 塩 徳 志 別 324 38 286 88.3 279			渚		滑	1,1 4 2		219	923			8 0.8			906	
根 室 伊 茶 仁 1,4 29 180 1,249 87.4 1,2 17 (床 丹) 547 34 513 93.8 510 虹 別 191 27 164 85.9 159 (矢臼別) 183 65 118 64.5 110 厚 床 606 21 585 96.5 410 本 年度 2,9 56 327 2,6 29 88.9 2,4 06 前 年度 2,3 38 169 2,169 92.8 1,9 52 天 塩 徳 志 別 324 38 286 88.3 279 歌 登 713 66 647 90.7 627 中 川 210 11 199 94.8 198 本 年度 1,2 47 115 1,132 90.8 1,10 4 前 年度 655 30 625 95.4 611 千 歲 千 歲 160 16 144 90.0 (様 似) 12 1 11 91.7 本 年度 172 17 155 90.1 前 年度 0 0 0 0 変 島 尻 別 1,1 27 149 978 86.8 亦 年度 1,1 27 149 978 86.8 前 年度 183 33 150 81.9 94 ★ 年度 11,5 80 1,1 23 10,4 57 90.3 9,006			本	年	度	6,0 7 8		5 1 5	5,5 6 3			9 1.5		5	,496	
(床 丹) 547 34 513 93.8 510 虹 別 191 27 164 85.9 159 (矢臼別) 183 65 118 64.5 110 厚 床 606 21 585 96.5 410 本年度 2,956 327 2,629 88.9 2,406 前年度 2,338 169 2,169 92.8 1,952 天塩徳志別 324 38 286 88.3 279 中 川 210 11 199 94.8 198 本年度 655 30 625 95.4 611 千歳 千歳 160 16 144 90.0 (様似) 12 1 11 91.7 本年度 172 17 155 90.1 前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			前	年	度	4,020		291	3,7 2 9			9 2.8		3	,6 5 5	
虹 別 191 27 164 85.9 159 (矢臼別) 183 65 118 64.5 110 厚 床 606 21 585 96.5 410 本年度 2,956 327 2,629 88.9 2,406 前年度 2,338 169 2,169 92.8 1,952 天塩 徳 志 別 324 38 286 88.3 279 歌 登 713 66 647 90.7 627 中 川 210 11 199 94.8 198 本年度 1,247 115 1,132 90.8 1,104 前年度 655 30 625 95.4 611 千 歳 千 歳 160 16 144 90.0 (様 似) 12 1 11 91.7 本年度 172 175 90.1 前年度 0 0 0 変 島 尻 別 1,127 149 978 86.8 前年度 1,127 149 978 86.8 前年度 183 33 150 81.9 94	根	室	伊	茶	仁	1,4 29		180	1,2 4 9			8 7.4		1	,2 1 7	
(矢臼別) 183 65 118 64.5 110 厚 床 606 21 585 96.5 410 本年度 2,956 327 2,629 88.9 2,406 前年度 2,338 169 2,169 92.8 1,952 天塩 徳 志別 324 38 286 88.3 279 歌 登 713 666 647 90.7 627 中川 210 11 199 94.8 198 本年度 1,247 115 1,132 90.8 1,104 前年度 655 30 625 95.4 611 千歳 千歳 160 16 144 90.0 (様似) 12 1 11 91.7 本年度 172 17 155 90.1 前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			(床	モ チ	})	5 4 7		3 4	513			9 3.8			5 1 0	
厚 床 606 21 585 96.5 410 本 年 度 2,956 327 2,629 88.9 2,406 前 年 度 2,338 169 2,169 92.8 1,952 天 塩 徳 志 別 324 38 286 88.3 279 歌 登 713 66 647 90.7 627 中 川 210 11 199 94.8 198 本 年 度 1,247 115 1,132 90.8 1,104 前 年 度 655 30 625 95.4 611 千 歲 千 歲 160 16 144 90.0 (樣 似) 12 1 11 91.7 本 年 度 172 17 155 90.1 前 年 度 0 0 0 波 島 尻 別 1,127 149 978 86.8 前 年 度 1,127 149 978 86.8 前 年 度 183 33 150 81.9 94			虹		別	191		27	164			8 5.9			159	
本年度 2,956 327 2,629 88.9 2,406 前年度 2,338 169 2.169 92.8 1,952 天塩 徳志別 324 38 286 88.3 279 歌 登 713 66 647 90.7 627 中川 210 11 199 94.8 198 本年度 1,247 115 1,132 90.8 1,104 前年度 655 30 625 95.4 611 千歲 千歲 160 16 144 90.0 (樣似) 12 1 11 91.7 本年度 172 17 155 90.1 前年度 0 0 0			(9	ミ臼 另	IJ)	183		6 5	118			6 4.5			1 10	
前年度 2,3 38 169 2,169 92.8 1,9 52 天塩 徳志別 324 38 286 88.3 279 歌 登 713 666 647 90.7 627 中川 210 11 199 94.8 198 本年度 1,2 47 115 1,132 90.8 1,10 4 前年度 655 30 625 95.4 611 千歳 千歳 160 16 144 90.0 (様似) 12 1 11 91.7 本年度 172 17 155 90.1 前年度 0 0 0 渡島 尻 別 1,1 27 149 978 86.8 市年度 183 33 150 81.9 94			厚		床	606		21	5 8 5			9 6.5			410	
天塩 徳志別 324 38 286 88.3 279 歌 登 713 66 647 90.7 627 中川 210 11 199 94.8 198 本年度 1,247 115 1,132 90.8 1,104 前年度 655 30 625 95.4 611 千歳 千歳 160 16 144 90.0 (様似) 12 1 11 91.7 本年度 172 17 155 90.1 前年度 0 0 0 渡島 尻別 1,127 149 978 86.8 本年度 1,127 149 978 86.8 前年度 183 33 150 81.9 94 本年度 11,580 1,123 10,457 90.3 90.06			本	年	度	2,9 5 6		3 2 7	2,6 2 9			8 8.9		2	2,4 0 6	
歌 登 713 66 647 90.7 627 中 川 210 11 199 94.8 198 本 年 度 1,247 115 1,132 90.8 1,104 前 年 度 655 30 625 95.4 611 干 歲 干 歲 160 16 144 90.0 (様 似) 12 1 11 91.7 本 年 度 172 17 155 90.1 前 年 度 0 0 0 渡 島 尻 別 1,127 149 978 86.8 本 年 度 183 33 150 81.9 94	-		前	年	度	2,3 3 8		169	2,169			9 2.8		1	,952	
中 川 210 11 199 94.8 198 本年度 1,247 115 1,132 90.8 1,104 前年度 655 30 625 95.4 611 干蔵 干 歳 160 16 144 90.0 (様似) 12 1 11 91.7 本年度 172 17 155 90.1 前年度 0 0 0 渡島 尻 別 1,127 149 978 86.8 本年度 1,127 149 978 86.8 前年度 183 33 150 81.9 94	天	塩	徳	志	別	3 2 4		3 8	286			88.3			279	
本年度 1,247 115 1,132 90.8 1,104 前年度 655 30 625 95.4 611 干歳干歳 160 16 144 90.0 (様似) 12 1 11 91.7 本年度 172 17 155 90.1 前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			歌		登	713		6 6	647			9 0.7			627	
前年度 655 30 625 95.4 611 干歳干歳 160 16 144 90.0 (様似) 12 1 11 91.7 本年度 172 17 155 90.1 前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			中		Ш	210		11	199			9 4.8			198	
千歲 千歲 160 16 144 90.0 (樣似) 12 1 11 91.7 本年度 172 17 155 90.1 前年度 0 0 0 渡島 尻別 1,127 149 978 86.8 本年度 1,127 149 978 86.8 前年度 183 33 150 81.9 94 会計 本年度 11,580 1,123 10,457 90.3 9,006			本	年	度	1,2 4 7		115	1,1 3 2	+		9 0.8		1	1,104	1
(様似) 12 1 11 91.7 本年度 172 17 155 90.1 前年度 0 0 0 渡島 尻 別 1,127 149 978 86.8 本年度 1,127 149 978 86.8 前年度 183 33 150 81.9 94 会計 本年度 11,580 1,123 10,457 90.3 9,006			前	年	度	655	à	3 0	6 2 5			9 5.4			611	
本年度 172 17 155 90.1 前年度 0 0 0 渡島 尻 別 1,127 149 978 86.8 本年度 1,127 149 978 86.8 前年度 183 33 150 81.9 94 会計 本年度 11,580 1,123 10,457 90.3 9,006	干	荿	干		歳	160		1 6	144			9 0.0				
前年度 0 0 0 渡島尻別 1,127 149 978 86.8 本年度 1,127 149 978 86.8 前年度 183 33 150 81.9 94 本年度 11,580 1,123 10,457 90.3 9,006			(t	兼	以)	12		1	11			9 1.7				Ì
渡島 尻 別 1,127 149 978 86.8 本年度 1,127 149 978 86.8 前年度 183 33 150 81.9 94 本年度 11,580 1,123 10,457 90.3 9,006			本	年	度	172		1 7	155			9 0.1				
本年度 1,127 149 978 86.8 前年度 183 33 150 81.9 94 本年度 11,580 1,123 10,457 90.3 9,006			前	年	度	0		0	0							
前年度 183 33 150 81.9 94 本年度 11,580 1,123 10,457 90.3 9,006	渡	島	尻		別	1,1 2 7		149	978			8 6.8				
本年度 11,580 1,123 10,457 90.3 9,006	-		本	年	度	1,1 2 7		149	978			8 6.8				
스 카			前	年	度	183		3 3	150			8 1.9			9 4	
前年度	_	골나	本	年	度	1 1,5 8 0		1,123	1 0,4 5 7			9 0.3		9	9,0 0,6	
		äΤ	前	年	度	7,196		5 2 3	6,673		ų.	9 2.7		(5,3 1 2	

註: ()の事業場は民間簡易ふ化設備

H	<u> </u>	数			1	N W W W W W W W W W W W W W W W W W W W
	給 解 干尾	計	放流尾数	放流期間	備	考
		150	9 4.3	4. 1-4.30		2
		4,432	9 3.0	2. 1-2.28		
		8	8 8.9	1.10		
		906	7 9.3	1.2 9-2. 3		
		5,4 9 6	9 0.4	1.1 0-4.3 0	*	
		3,6 5 5	9 0.9	1. 1-4.30		
		1,217	8 5.2	2.1 0 - 4.1 0		
		5 1 0	9 3.2	2.25-4.30		
		159	8 3.2	2. 1-2.20		
		110	6 0.1	2.25-2.28		
		410	6 7.7	3. 1-3.31		
		2,4 0 6	8 1.4	2. 1-4.30		4
		1,952	8 3.5	1.1 5-4.3 0		
		279	8 6.1	1. 9		
		6 2 7	8 7. 9	2. 1-2.28		
		198	9 4.3	4. 1-4.10		
		1,104	8 8.5	1. 9-4.10		
		611	9 3.3	1. 7-3.10		
	1 4 1 (8)	1 4 1	8 8.1 6 6.7	4.3 0 1 0. 1 6		
	(8) 1 4 1	(8)	6 6.7	1 0. 1 6		
	141	141	8 2.0	4.3 0		
1	780	780	6.0.0	515 510		
	780	780	6 9.2	5.15-5.16		
		94	6 9.2	5. 1 - 5.1 6	-	
-	(8)	(8)	5 1.4	1. 1-5.1 6		
	921	9,927	8 5. 7	1. 9-5.16		
		6,3 1 2	8 7.7	1. 1-5.1 6		

第14表 昭和43年度海区水系別からふとますふ化放流成績表

				_									_
海	水	系	事	業	場	収容卵気	死卵数	ふ出尾数	ふ化率	放	流		1
区				,,,		千粒	千粒	干尾	%	無給 餌干尾	給	餌 千尾	
	岩尾	别	岩	尾	別	5,8 1 0	413	5,397	9 2.9			5,3 3 0	
才	斜	里	斜		里	2,4 9 0	163	2,3 27	9 3.5	2,300			
ホ	藻	零	藻		零	2,0 4 9	136	1,9 1 3	9 3.4	1,9 1 2			
1	常	呂	北		見	3 6 8	104	264	7 1.7	258			
ッ	湧	別	湧		別	499	7 9	4 2 0	8 4.2	373			
	渚	滑	渚		滑	628	130	498	7 9.3	486			
2	雄	武	(中	雄	武)	252	5 4	198	7 8.6	150			
海	徳 志	别	徳	志	别	4,181	1,083	3,098	7 4.1			3,070	
区	屯	别	屯		別	353	44	309	8 7.5	3 0 6			
	⊁ ▽	라	本	年	度	1 6,6 3 0	2,206	14,424	8 6.7	5,785		8,400	
	海区	āī	前	年	度	2 4,5 0 3	2,3 5 4	2 2,1 4 9	9 0.4	21,625			
8	天	塩	中		Щ	133	10	123	9 2.5	123			
本海	海区	æL.	本	年	度	133	10	123	9 2.5	1 2 3			
K	一件 丘	ā1	前	年	度	0							
	羅	臼	羅		臼	605	116	489	8.0.8	485			
根	標	津	根		室	2,191	543	1,6 4 8	7 5.2	1,465			
	床	丹	(.)	床升	})	632	6 2	570	9 0.2	5 7 0			
室	西	别	II.		別	2,4 3 0	206	2,2 2 4	9 1.5	2,135			
海	矢 臼	别	(矢	白	別)	3 2	9	23	7 1.9	22			
(11)	風	蓮	浜		中	610	4 9	561	9 2.0	510			
区	別当	賀	厚		床	113	5	108	9 5.6	8 7			
	海区	計	本	年	度	6,6 1 3	990	5,623	8 5.0	5,274			
	件 区	a1	前	年	度	5,228	7 0 8	4,5 20	8 6.5	4,372			
襟海	+	勝	+		勝	13	2	11	8 4.6	11			
裳以	海区	計	本	年	度	13	2	11	8 4.6	11			
東区	(時)	БI	前	年	度	189	7 2	117	6 1.9	100			
													1

註: ()の事業場は民間簡易ふ化設備

数		仮収容卵数から収容卵数までの卵の動き事業場単位
at	放流期間	備 考
千尾	4	
5,3 3 0	3. 1~5.2 0	網走事業場経由で藻零へ 2,0 3 7 千粒、虹別へ 1,1 1 0千粒、八雲へ 2,148 千粒
2,300	2. 1~2.28	
1,912	3. 1~4.30	網走(岩尾別分)から2,037千粒、網走から12千粒
258	3. 1~3.31	_ = - *
373	2. 1~5.1 9	幌内から232千粒、中雄武へ252千粒
486	2.1 8~2.2 8	
150	3. 1~3.31	湧別から 2 5 2千粒
3,070	2. 1~4.1 5	歌登から 1,3 6 6 千粒
3 0 6	3.21~3.31	
1 4,1 8 5	2. 1~5.20	
21,625	1. 7~5.30	,
123	4. 1~4.10	
123	4. 1~4.1 0	
0		
485	4. 1~5.31	虹別から 5 6 9 干粒
1,4 6 5	3. 1~3.31	虹別から 1,069 干粒、伊茶仁(伊茶仁、標津分)から 1,122 干粒
570	3. 1~4.3 0	計根別(味丹分)から26千粒、(当幌分)579千粒、(春別分)27千粒
2,1 3 5	2. 1~2.2 7	岩尾別 1,110千粒、羅白~569千粒、根室~1,069千粒
2 2	2.25~2.28	浜中(矢臼別分)から2千粒
510	3.26~4.10	矢臼別へ32千粒
8 7	3. 1~3.31	
5,274	2. 1~5.31	
4,372	2. 1~5. 7	
1 1	4.2 0	
11	4.20	+
100	2.26-4,30	
	1.00	

海		1				- 1				放	流	尾
K	水系	不	事	業	場	収容卵粉 千粒	死 卵 数 千粒	ふ 出尾 数 干尾	ふ化率	無給餌干尾	給	餌 干尾
襟海	遊楽部	FFS	八		雲	2,1 8 8	300	1,888	8 6.3	596		1,280
襟裳 以 西 区	V- 17 =		本	年	度	2,1 8 8	3 0 0	1,888	8 6.3	596		1,280
西区	海区記	IT	前	年	度	2,275	283	1,992	8 7.6	1,986		
総	프		本	年	度	2 5,5 7 7	3,5 0 8	22,069	8 6.3	1 1,7 8 9		9,6 8 0
WE.	計		前	年	度	3 2,1 9 5	3,4 1 7	2 8,7 7 8	8 9.4	28,083		

数	計工程	放流期間月日~月日	備考	仮収容卵数から収容卵数までり卵の動き事業場単位 稚魚移殖放流括弧書き
	1,8 7 6	2,18-5.20	網走(岩尾	別分)から 2.1 4 8 千粒
	1,8 7 6	2,1 8-5.2 0		j = 00
	1,986	1 2,7 - 3.3 0		
2	1,4 6 9	2. 1-5.31		
2	8,083	1 2.7 - 5.3 0		-

第15表 昭和43年度支・事業場別からふとますふ化放流成績表

									龙
支	場	事	業	場	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ化率	無給餌
		ш		nu.	千粒	千粒	千尾 5,3 9 7	%	千尾
北	見	岩	尾	别	5,8 1 0	413		9 2.9	2222
		斜		里	2,4 9 0	163	2,3 2 7	9 3.5	2,3 0 0
		藻	零	零	2,0 4 9	136	1,9 1 3	9 3.4	1,9 1 2
		北		見	3 6 8	104	264	7 1.7	258
		湧		別	499	7 9	420	8 4.2	373
		渚		滑	6 28	130	498	7 9.3	486
		(=	中雄证	()	252	5 4	198	7 8.6	150
		本	年	度	1 2,0 9 6	1,0 7 9	1 1,0 1 7	9 1.1	5,4 7 9
		前	年	度	2 3,2 8 8	2,2 5 5	21,033	9 0.3	2 0,6 2 7
根	室	羅		日	6 0 5	116	489	8.08	4 8 5
		根		室	2,191	5 4 3	1,6 4 8	7 5.2	1,4 6 5
		(5	卡 ヂ	子)	632	6 2	570	9 0.2	570
		虹		别	2,4 3 0	206	2,2 2 4	9 1.5	2,1 3 5
		(5	天白別	川)	3 2	9	23	7 1.9	2 2
		厚		床	113	5	108	9 5.6	8 7
		浜		中	610	4 9	561	9 2.0	510
		本	年	度	6,613	990	5,6 2 3	8 5.0	5,2 7 4
		前	年	度	5,2 2 8	708	4,5 2 0	8 6.5	4,3 7 2
+	勝	+		勝	13	2	11	8 4.6	11
		本	年	度	13	2	11	8 4.6	11
		前	年	度	189	7 2	117	6 1.9	100
天	塩	徳	志	別	4,181	1,0 8 3	3,0 9 8	7 4.1	
		屯		别	353	4 4	309	8 7.5	306
		中		Ш	133	10	123	9 2.5	123
		本	年	度	4,667	1,1 3 7	3,5 3 0	7 5.6	429
		前	年	度	1,2 1 5	9 9	1,1 1 6	9 1.9	998
渡	島	八		雲	2,1 8 8	300	1,888	8 6.3	5 9 6
		本	年	度	2,1 8 8	300	1,8 8 8	8 6.3	596
		前	年	度	2,2 7 5	283	1,992	8 7.6	1,986
		本	年	度	25,577	3,5 0 8	2 2,0 6 9	8 6.3	11,789
合	計	前	年	度	3 2,1 9 5	3,4 1 7	28,778	8 9.4	28,083

註: ()の事業場は民間簡易ふ化設備

States			No.	拉茲尼樂	nt.	. (プロデ来物は氏间間勿み 化設 畑
流		尾	数	放流尾数	放流期間	備	考
	給	餌 千尾	計千尾	収容卵数%			
		5,3 3 0	5,330	9 1.7	3. 1- 5.20		
			2,3 0 0	9 2.4	2. 1- 2.28		
			1,9 1 2	9 3.3	3. 1- 4.3 0		
			258	7 0.1	3. 1- 3.3 1		
			373	7 4.7	2. 1- 5.1 9		
			486	7 7.4	2.18- 2.28		
			1 5 0	5 9.5	3. 1- 3.31		
		5,3 3 0	1 0,8 0 9	8 9.4	2, 1- 5.20		
			20,627	8 8.6	2. 1- 5.3 0		
			4 8 5	8 0.2	4. 1- 5.3 1		
			1,4 6 5	6 6.9	3. 1- 3.31		
			570	9 0.2	3. 1- 4.30	-	
			2,135	8 7.9	2. 1- 2.27		1
			2 2	6 8.8	2.25- 2.28		*
			87	7 0.0	3. 1— 3.3 1		r
			510	8 3.6	3.26- 4.10		
			5,274	7 9.8	2. 1- 5.3 1		
			4,372	8 3.6	2. 1- 5. 7		
			11	8 4.6	4 2.0		1
			11	8 4.6	4.20		
			100	5 2.9	3.2 6— 4.3 0		
		3,070	3,0 7 0	7 3.4	2. 1- 4.15		4
			306	8 6.7	3.21 - 3.31		
			123	9 2.5	4. 1- 4.1 0		
		3,0 7 0	3,4 9 9	7 5.0	2. 1- 4.15		
			9 9 8	8 2.1	1. 7— 3.31		*
		1280	1,876	8 5.7	2.1 8— 5.2 0		
		1,2 8 0	1,876	8 5.7	2.1 8— 5.2 0		
			1,986	8 7. 3	12.7- 3.30		
		9,680	2 1,4 6 9	8 3.9	2. 1- 5.31		
			28,083	. 87.2	12.7- 5.30		

§ 9 ひめます増殖事業

1 ひめます捕獲採卵概況

本年度の支笏湖におけるひめます捕獲採卵事業は10月8日に開始し、11月27日に終了した。 その結果、13,852尾(うち雌7,925尾)を捕獲し、計画達成率71.1%であつた。また採卵 は 2.688千粒で計画の 76,8%であり、捕獲では昨年より悪かつたが、採卵については昨年より 良い成績であつた。

第1表 昭和43年度ひめます親魚捕獲採卵成績表

			1-7		7.00	所	管	捕	獲	数	使	用親魚	数
	水系	系	採	卵	場	事	業場	P 尾	◆ 尾	計計尾	♀ 尾	∂尾	計尾
	支多	5湖	ポロ	2 L.	ナイ	支	笏 湖	4,9 8 0	4,4 0 6	9,3 8 6	3,7 3 9	613	4,3 5 2
			湖		畔		"	2,9 4 5	1,5 2 1	4,466	2,5 7 8	4 4 5	3,0 2 3
	合 請	=L	本	年	度			7,9 2 5	5,927	1 3,8 5 2	6,3 1 7	1,0 58	7,3 7 5
		計	前	年	度			9,0 5 5	9,656	18,711	7, 1 3 6	1,878	9,014

採 卵 数 干粒	増減卵数 二十粒	仮収容卵数 千粒	9 使	親用	魚 率%	平均採卵数 粒		施期間3~月日
1,5 5 7		1,5 5 7		7	5.0	4 1 6	10.	8~11.27
1,131		1,1 3 1		8	7.5	439	10.1	5~1 1.2 7
2,6 8 8		2,6 8 8		7	9.7	4 2 6	1 0.	8~1 1.2 7
3,3 5 0	△(供試)50	3,3 0 0		7	8.8	470	1 0.	9~1 1.3 0

2 ひめます種卵の移殖

ひめます種卵の移殖、試験供用に伴なう動き

総 採 卵 数

2,688千粒

△供 試 卵 数

25 "

△移 殖 卵 数

1,911"

支笏湖事業場総収容卵数 752 "

第2表 ひめます種卵の移殖(発眼卵)

供給	3 地		10 E# E E	3	圣 糸	合 共	<u>t</u>	移	殖卵	の内訳		**
支場名	事場	業名	移殖月日	支場	易名	事場	業名	移殖卵数千粒	移殖前死卵数干粒	移 殖 実 卵 数 千粒	死卵数%	摘 要
干才	干	才	43.12.26	根	室	虹.	別	768	3 6	732		(ベニサケ生産
	支笏	湖					"	1,143	61	1,0 8 2		事業用
合	計							1,9 1 1	9 7	1,8 1 4		

3 ひめますふ化放流成績概要

収容卵数 2,6 8 8 千粒のうち死卵数を除いた 2,5 9 6 千粒から虹別事業場へ 1,8 4 3 千粒をベニ さけ再生産事業用として移殖、残りは千歳事業場で収容管理を行なつた。1月中旬からふ出開始、 2月12日ふ出終了、その後5月末日まで飼育し、6月2日から標識(両腹ビレ切除)を行い、6 月9日に支笏湖へ放流 (380千尾)、152千尾については別標識 (右脂ビレ、脂ビレ切除)を施し、 支笏湖事業場で9月30日まで飼育して10月1日に支笏湖へ放流した。

第3表 昭和43年度ひめますふ化放流成績表

	水系		vist	-Ville	十四	Its do stee Mr.		iSer	366	,	山口岩	>	化	滋		放	流	尾	数
1	水	糸	事	耒	杨	収容卵数	死	ala	数	-92	出尾数	S.	16	42	無	給	餌	給	部 干尾
						干粒		:	干粒		干尾			96			F尾		干尾
-	支笏	湖	支	笏	湖	752			7 4		678		9	0.0					(15 2) 380
	支笏湖 合 計			年		7 5 2		7	74		678	*	Ş	0.0					(152) 380
		計	前	年	度	1,3 8 5			102		1,283		2	2.6		1,1	77		

thu thu	備	(A 4)	考	-
(1 0.1) 6.9 (1 0.1) 6.9	括弧の放流尾数Iである。	は9月まで飼育↓	て 10月1日に放流	したもの
5.27-5.28				
6.9			1,	
6.9				
5.27 -5.28				

§10 さけ。ます親魚蓄養成績

1) さけ

即日

本年度は捕獲早親魚108,695 尾のうち88,794 尾を採卵した。この内訳は即日採卵6,607 尾、長期或いは短期の蓄養によつて成熟採卵したもの82,187 尾で、全体の早親魚使用率は85.6%と昨年(75.1%)を上廻る成績であつた。これは主として、本年度の捕獲が最近にない不漁であったが、絶対親魚数が少なかつたことにより成績が向上したと思われる。

長期或いは短期の蓄養は69採卵場において94,992尾を蓄養し 82,187尾(蓄養数に対する割合86.5%)を成熟採卵させた。残りの12,577尾(13.2%)はへい死し、228尾(0.8%)については逃逸、老魚等による未利用数であつた。

個々の採卵場について早親魚使用率が80%(最底目標値)を下廻るものについて列記すると18個所あり、この内訳は75~80%に音別、汐泊、長万部、東33号、矢田別、60~65%に白老、広尾、50~55%に打内、勇払、歴舟、静内、50%以下に元浦川、有川、富川、貫気別、鵡川、天塩、石狩となつている。このうち、70%以下の個所については今後抜本的な対策が必要である。特に日高地区の採卵場での蓄養体制確立が早急に望まれる。なお、昨年同様、西別採卵場は虹別事業場構内の蓄養池へ、千代田、東33号採卵場は札内事業場構内の蓄養池へその親魚の一部を輸送蓄養して、使用率の向上を計つた。

2) さくらます

本年度は捕獲早親魚 10804尾のうち389尾を即日採卵し、また、9,398尾については19採卵場で蓄養を行ない、6,169尾(蓄養数に対する割合65.7%)を採卵に供した。この早親魚使用率は63.0%と昨年(81.0%)を大きく下廻る成績に終つた。これは本年度捕獲の大半を占めた北見支場管内の一部採卵場において、河川の異状渇水のため蓄養親魚が大量へい死し、当管内の早親魚使用率が52.4%と低調であつたことによる。

3) からふとます

本年度は捕獲早親魚 21.776 尾のうち 8 尾を即日採卵し、また 21.018 尾については 27 採卵場で蓄養を行ない、18.485 尾(蓄養数に対する割合 88.0%)を採卵に供した。この早親魚使用率は84.9%と好成績だつた昨年(92.4%)を下廻つた。しかし平年より良い成績といえる。しかし、個々の採卵場についてみると 70%以下が11個所あり、このうち半分は50%と低調であり、これらの個所のうちには混獲 親魚の採卵という条件があるとは云え、これら採卵場での成績向上が望まれる。

第1表 昭和43年度さけ親魚蓄養成績表

	776											v		
	項		1 -8-	獲	数			우 新	魚	の処	理			
采			捕	7受	双人 一	試	即日	採卵	審		養		蓄	養
明		目	우	8	計	験控除	浥数	即日使用率	要 蓄 数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	9	8
		7					尾	96	尾	尾	尾	96	尾	尾
岩	尾	别	217	2 4 8	465		45	2 0.7	172		172	1 0 0.0	172	169
斜		里	2,189	2,067	4,2 5 6				2,189		2,189	1 0 0.0	2,189	1,925
藻		琴	118	81	199		11	9,8	107	1	106	9 9.1	106	4 (
網		走	6,5 2 4	5,8 8 5	11,859		6 6	1.0	6,4 5 8	2	6,456	9 9.9	6,456	2,58
常		呂	890	905	1,795				890		890	1 0 0.0	890	81
佐吾	리탭	别	4.5	28	7 8				4.5		4.5	1 0 0.0	4.5	28
湧		別	2,885	3,7 5 8	6,588		173	6.1	2,662		2,662	1 0 0.0	2,662	724
渚		滑	389	568	957				389	1	388	9 9.7	388	151
興		部	7 3	2 5	9 8				7.8		7 3	1 0 0.0	78	2
幌		内	364	324	688				364	6	358	9 8.4	8 5 8	151
	計		1 3,6 4 4	1 3,3 3 4	26,978		295	2.2	1 8,8 4 9	10	18,389	9 9.9	18,839	6,11
羅		日	1,960	1,5 47	8,5 0 7		1,7 68	9 0.2	192	184	8	4.2	8	(
植		別	9 4	81	175		7	7.4	87		8 7	100	8 7	7 (
元帅	奇無	異	23	12	3 5		1	4.8	22		2 2	100	22	13
崎	無	異	377	189	5 6 6		14	3.7	363		363	100	363	15
薫		别	1,1 0 2	460	1,5 6 2		334	8.0.8	7 6 8		768	100	768	337
古	多	糠	10	7	17				10		10	100	10	
忠		類	329	156	485		68	2 0.7	261		261	100	261	12
伊	茶	仁	8,011	1,392	4,4 0 3		2	0.0 Å	3,009		3,009	100	8,0 0 9	1,17
標		津	2,179	1,698	3,877		5 5	2.5	2,1 2 4	2	2,122	9 9.9	2,122	1,11
当		幌	3,209	2,596	5,805		3	0.0 0	8,206		3,206	100	3,2 0 6	1,82
春		別	8 8 8	265	5 9 8	-			3 3 3		833	100	883	23
床		丹	619	445	1,0 6 4	1			619		619	100	619	3 2
西		别	2 4,696	3 6,6 5 7	6 1,353		6	0.0 2	24,690		24,690	100	24,690	7,96
矢	E	別	26	2 5	5 1				2 6		26	100	2 6	2
風		連	514	450	9 6 4				514		514	100	514	24
別	当	賀	986	936	1,922		2	0.2	984		984	100	984	8 2
穂		香	9	2 4	3 3				9		9	100	9	
	計		3 9,4 7 7	4 6,9 4 0	8 6,4 1 7	_	2,2 6 0	5.7	37,217	186	37,031	9 9.5	87,031	14,43
厚		岸	893	5 5 6	1,4 49				893		893	100	893	41

i i	養		内	彭							우	使
数	mid.		泛養	. 5	7	1 2					総使	用
計	催熟	催熟率	へい死	~ h		7	-			その他	用用	773
				死 率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	9
841	171	9-9.4	1	0.6				~			216	9 9.
4,114	2,135	9 7.5	5 4	2,5						-	2,185	9 7.
152	102	9 6.2	4	3.8							113	9 5.8
9,0 41	8,345	9 8.3	111	1.7							6,411	98,
1,201	812	9 1.2	7 0	7.9	6		2		8	0.9	812	9 1.5
6.8	4.3	9 5.6	2	4,6							43	9 5.€
3,886	2,466	9 2.6	196	7.4							2,689	9 3.
5 4 5	372	9 5.9	16	4.1							872	9 5.0
98	73	10 0.0									7.8	1.0 0.0
509	358	100.0									35 8	9 8.4
1 9,4 5 5	12,877	9 6.5	454	3.4	в		2		8	0.1	18,172	9 6.
1.4	8	100.0	0	. 0	0	0			0	0	1,7 7 6	90.6
168	84	9 6.6	0	0	0	8			8	3.4	91	9 63
3 4	22	100.0	0	0	0	0			0	0	28	100.0
514	327	9 0.1	0	0	28	8			36	9.9	341	9 0.1
1,100	768	100.0	0	0	0	0			0	0	1,102	100.
17	-9	9 0.0	1	1 0.0	0	0			0	0	9	9 0.0
387	257	9 8.5	4	1.5	0	0			0	0	825	9 8.8
4,185	2,9 6 4	9 8.5	4,5	1.5	0	0			0	0	2,966	9 8,1
8,2 8 6	2,090	98.5	3 2	1.5	0	0			0	0	2,145	98.4
5,026	3,196	9 9.7	10	0.8	0	0		, 4	0	0	8,199	9 9.
5 7 0	3 3 3	10.0.0	0	0	0	0			0	0	833	100.0
939	619	100.0	0	0	0	0			0	0	619	100.
8 2,6 5 7	24,165	9 7.9	525	2.1	0	0			0	0	24,171	9 7.8
46	20	7 6.9	.6	2 3.1	0	0			0	0	2 0	7 6.9
757	433	8 4.2	81	15.8	0	0			0	0	433	8 4.
1,809	9 4 5	9 6.0	3 9	4.0	0	0			0	U	947	9 6.0
14	9	1 0 0.0	0	0	0	0			υ	0	9	100.
5 1,4 6 8	3 6,2 4 9	9 7.9	743	. 2.0	28	11			3 9	0.1	38,509	9 7.
1.306	8.29	9 2.8	64	7.2			,				8 2 9	9 2.8
	Sy Y			N 7		1-	***					

Ţ	頁	+43:		数			マ 親	魚	の処	理		,	,
400	目	捕	沙	发 义	試	. 即 E	日採卵	7	蒈	羞	-	蓄	養
採卵	場	우	8	計	験控除	尾数	即日使用率	要 蓄 養 数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	우	8
釧	路	11,518	1 4,7 6 2	2 6,2 7 5		尾	%	尾 11,518	尾	尾 11,513	% 100	尾 11,518	尾 4,044
阿	寒	335	482	817				8 8 5		3 3 5	100	885	8 0
茶	路	8 2	197	279				8 2		8 2	100	8 2	3 (
打	内	1 2,7 8 5	2 4,6 7 3	3 7,4 5 8	2 3		-	1 2,7 6 2	361	1 2,4 0 1	9 7.2	1 2,4 0 1	318
東3	3号	1,665	2,2 8 6	3,9 0 1		2	0.12	1,6 6 3	40	1,623	9 7.6	1,623	7
幕	別	1,221	1,5 6 7	2,788		8	0.2 5	1,218	7	1,211	99.4	1,211	697
千个	田力	4,807	5,6 3 2	10.439	8			4,799		4,799	100	4,799	1,1 7 6
利	別	4	9	13	2			2		2	100	2	1
歴	舟	363	950	1,313		100	2 7.5	263	175	8 8	3 3,5	8 8	5 (
広	尾	44	248	292		2	4.5 5	4.2	2	4 0	9 5.2	4 0	2 9
猿	留	24	6	3 0				2 4		24	100	24	(
言	1	3 3,7 3 6	5 1,3 1 8	8 5,0 5 4	3 3	107	0.3 2	8 8,5 9 6	585	8 8,0 1 1	9 7.9	3 3,0 11	6,85
徳元	志 別	7.6 0	469	1,2 29		194	2 5. 5	566		566	100	566	148
北見	幌別	1,631	2,8 9 2	4,0 2 3				1,631	169	1,462	100	1,462	891
屯	別	155	177	3 3 2				155	1	154	100	154	8 (
天	塩	1,853	2,2 5 0	4,103				1,853	100	1,7 5 3	100	1,758	201
中	/11	4,3 2 8	3,7 1 8	8,041		875	2 0.2	3,458	133	3,8 2 0	100	3,820	5 5 8
普	+	8,7 2 7	9,001	17,728		1,06 9	1 2.2	7,6 5 8	403	7,255	100	7,2 5 5	1,39
石	狩	335	6 6 2	997		_	_	3 3 5	204	131	3 9.1	181	5
西	越	1.0 4 4	1,203	2,247		183	17.5	861	3 0	881	9 6.5	831	687
音	江	272	412	684		4	_	272	2 5	247	9 0.8	247	216
仁用	匪 別	7	6	13				7		7	100.0	7	6
幌	別	40	89	129				- 40	2	8 8	9 5.0	38	2 8
元 淮	前河	8 7	106	143				3 7	16	21	5 6,8	21	19
Ξ	石	34	49	88		17	5 0.0	17		17	1 0 0.0	17	2 !
静	内	1,626	3,0 4 9	4,675		8	0.2	1,623	188	1,435	8 8.4	1,485	63
新	冠	110	86	196		14	1 2.7	9 6	2 0	7 6	7 9.2	7 в	5 (
富	Ш	291	368	6 5 9		2	0.7	289	193	96	3 3.2	9 6	7 2
鹉	J11	293	487	7 8 0		3	1.0	290		247	8 5.2	247	4
勇	払	529	616	1.145		5	0.9	524		406	7 7.5	406	195
白	老	9 5	241	3 3 6		48	5 0.5	47		4.7	1 0 0.0	47	5

書	昏	養		内		訳					우	使
数		皆	養	· .	우	亲	見	1	魚		総	
計	催熟	催熟率	へい死	~ h		そ	. 0) , ft	b -		使	用
ĒΙ	惟熱	作然华	~V196	死 率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	その他の率	用数	率
尾 15,557	尾 9,9 5 9	8 6.5	尾 1,5 5 4	1 3.5	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾 9,959	% 8 6.5
415	291	8 6.9	44	1 3.1							291	8 6.9
112	6 7	8 1.7	15	1 8.3			i				67	8 1.7
1 2,7 1 9	6,809	5 4 .9	5,5 9 2	4 5.1	後中の	い死 5,	592) 建没し	尾の内たと推	2,35	7尾は蓄るもの)	6,8 0 9	5 8,8
1,6 8 0	1,815	81.0	308	1 9.0							1,317	7 9.2
1,908	1,169	9 6.5	42	3.5						.au	1,172	9 6.0
5,975	4,166	8 6.8	627	1 3.1			6		6	0.1	4,166	8 6.7
3			2	100.0								
138	8 8	100.0	1.2								188	5 1.8
6 9	26	6 5.0	12	3 5.0		2			2	5.0	28	6 3.6
3 0	28	9 5.8	1.2 11	4.2							23	9 5.8
39,862	24,742	7 5.0	8,261	2 5.0		2	6		8	0.0	24,849	7 3.7
7 1 5	422	7 4.6	144	2 5.4							616	8 1.1
1,857	1,395	9 5.4	67	4.6							1,395	8 5.5
240	134	8 7.0	1 . 20	1 3.0							184	86.5
1,962	352	2 0.1	1,401	7 9.9							852	1 9.0
3,8 7 8	2,9 3 3	8 8.8	384	1 1.6		3			3	0.1	3,808	8 8.0
8,652	5,2 3 6	7 2.2	2,016	27.8		3			8	0.0	6,305	7 2.2
136	32	2 4.4	7.9	6 0.3			20		20	1 5.3	3 2	9.6
1,518	7 2 1	8 6.8	8 5	1 0.2		4	18	3	2 5	3.0	904	8 6.5
463	216	8 7.4	81	1 2.6							216	7 9,4
13	7	1 0 0.0	4								7	1 0 0.0
6 6	3 4	8 9.5	14	1 0.5							3 4	8 5.0
40	18	8 5.7	3	14.3					a		18	4 8.6
42	13	7 6.5	i. i. 8	1 7.6	-	1			1	5.9	3 0	8 8.2
2,068	812	5 6.6	533	3 7.1	5 0	7	10	23	90	6.8	815	5 0.1
135	7 5	9 8.7	1	1.3					,		8 9	8 0.9
168	9 2	9 5.8	1 0 2	2.1	2				2	2.1	94	3 2.3
288	69	2 7.9	178	7 2.1							7 2	2 4.6
601	272	6 7.0	1 3 4	3 3.0							277	5 2.3
5 2	18	2 7.7	9	1 9.1	3			22	2 5	5 8.2	61	6 4.2

7	-SE	-	1			-		우 親	魚の	処 理			Ī	
/	項	B	捕	獲	数	試	即日	採卵		皆		Ė	蓄	養
採		\	우	8	計	試験控除	尾数	即日使用率	要 蓄 養 数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	우	8
~							尾	%	尾	尾	尾	%	尾	尾
敷		生	93	257	350		7.5	8 0.6	18	2	16	88.9	16	1
貫	気	別	3 0	5 0	80				3 0	17	18	4 3.3	18	22
	計		4,836	7,631	1 2,4 6 7		350	7.2	4,4 86	858	3,6 2 8	8 0.9	3.6 2 8	2,014
朱		太	16	30	46				16		16	1 0 0.0	1 6	3 0
冷		水	256	187	448		211	8 2.5	4.5		4.5	1 7.6	4.5	3 4
厚	沢	部	135	385	520		2	1.5	133		188	98.5	1 3 3	7 0
長	万	部	19	31	5 0				19		19	1 0 0.0	19	10
遊	楽	部	492	349	841	1	123	2 5.0	368		368	7 4.8	8 6 8	277
茂	辺	地	2,159	2,5 8 6	4,7 4 5		2,1 4 2	9 9.2	1.7	16	1	5.9	1	
亀		JII	4 4	3 3	77		3 6	8 1.8	8	2	6	1 3.6	6	6
有][]	2 5	29	5 4				2 5		2 5	1 0 0.0	2 5	19
知		内	5 2	39	91		12	2 3.1	110		40	7 6.9	40	11
汐		泊	277	86	163				77	2	7 5	9 7.4	7 5	84
	計		3,2 7 5	3,7 5 5	7, 0 3 0	1	2,5 2 6	7 7.1	748	2 0	728	2 2.3	7 2 8	541
合	4	計	108,695	131,979	235,6 7 4	3 4	6,607	6.4	97,054	2,062	94,9 9 2	97.9	94,9 9 2	31,856

*

書	i i	養		内			訳					우	使
数	177	蒈	養		2	2	ž	視	魚	ι		総	
=1	/III +41	(H) the b	a la Tra	^	5		7	- 0	他		7 - 11	使用	用
計	催熟	催熟率	へい死	死	率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	その他の率	数	率
尾	尾	%	尾		%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
17	16	1,00.0										91	97.8
3 5	8	6 1.5	3	2 8	3.1	2				2	15.4	8	26.7
5,6 4 2	2,3 9 8	6 6.1	1,065	2 9).4	5 7	12	48	48	165	4.5	2,7 4 8	5 6.8
46	15	9 3.7	1	(5.2							15	9 3.8
7 9	4 5	100										256	1 0 0.
203	129	9 6.9					4			4	3.1	181	9 7.
29	15	7 8.9	4	2	1.1	-						15	7 8.9
6 4 5	865	9 9.2	2		0.5		1			1	0.8	488	9 9,5
1	1	100									0.3	2,143	9 9,
12	6	100										42	9 5.1
44	8	3 2.0	17	6 8	3.0			1				8	8 2.
51	40	100										5 2	100.
159	61	8 1,1	14	1	8.6							61	7 9.
1,269	685	9 4.1	3 8		5.2		5			5	0,7	8,211	9 8.
		8 c.5											
126,348	8 2,1 8 7	8 6.5	12,577	1	3.2	91	33	56	48	228	0.8	88,7 9 4	85.

第2表 昭和43年度さくらます親魚蓄養成績表

項						우 新	魚	の処	理			
B	捕	獲	数	試	即日	採卵	Ť	寄 ء	É		蓄	養
採卵	우	8	計	験控除	尾数	即日使用率	要 蓄 数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	우	ð
場						%		尾	尾	%	尾	犀
岩尾別	7.6	2 5	101		尾	20	76	户	76	1 0 0.0	76	2 5
斜 里	3,282	2.1 4 5	5,427				3,2 8 2		3,282	1 0 0.0	3,2 82	2,1 4 5
渚 滑	1.187	708	1,8 9 5				1,1 8 7	5 2	1,1 3 5	9 5.6	1,1 3 5	2 4 8
興 部	2.0 2 1	617	2,6 3 8				2,0 2 1	420	1,601	7 9.2	1,601	377
幌 内	4	2	6		4	1 0 0.0						
計	6,5 7 0	3,497	1 0.0 6 7		4	0.06	-6,5 6 6	472	6,094	9 2.8	6,0 9 4	2,795
標 津	988	3 3 8	1,3 2 6		3 2	3.2	956		956	100.0	956	3 3 8
当幌	161	92	253				161		161	100.0	161	9 2
春 別	18	12	3 0				18		18	100.0	18	12
床丹	2 0	8	28				2.0		2 0	100.0	2 0	8
西別	86	4 6	132				8 6		8 6	100.0	8 6	4 3
矢日別	9 1	7 0	161				91		9 1	1 0 0.0,	9 1	7.0
風連	3 8 3	173	5 5 6				383	í	383	100.0	383	173
別当貿	457	317	774		8 6	1 8.8	371		371	1 0 0.0	371	200
加当具計	2,204	1,0 5 6	3,2 6 0		118	5.4	2,086		2,086	100.0	2,086	936
徳志別	9 2	9	101	-	1110	-	9 2	1 3	7 9	8 5.9	7.9	8
北見幌別	792	530	1,322				792	3 2	760	9 6.0	760	191
中川	136	3 7	173				136		1 3 6	1 0 0. 0	136	3 7
計	1,020	576	1,596				1.0 2 0	4.5	975	9 5.6	975	236
西越	7 2	7 0	142	+	9	1 2.5	6 3		63	1 0 0.0	63	61
仁雁別	8	2	10				8		8	1 0 0.0	8	6
計	8 0	7 2	152		9	1 1.3			7 1	1 0 0.0	71	6 7
名駒	414	88	502	-	258	6 2.3	1 5 6		156	3 7.7	156	29
朱 太	1 6	3	1 9				1 6		1 6	1 0 0.0	1 6	3
計	430	91	5 2 1	1	2 5 8	6 0.0			172	4 0:0	172	3 2
				1								
合 計	1 0,3 0 4	5,292	1 5,5 9 6	<u> </u>	3 8 9	3.8	9,9 1 5	517	9,3 9 8	9 4.8	9,3 9 8	4,066

	蓄	養		内		訳					우	使
数		蓄	養		우	亲	現	1	魚		総	
計	催熟	催熟率	へい死	~ h		ر ح	2 0) 1	也		使用	用
a!	惟 杰	1年873年	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	死 率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	その他の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
101	7 6	1 0 0.0									7 6	1 0 0.0
5,427	2,4 9 3	7 6.0	789	2 4.0							2,4 9 3	7 6.0
1,3 8 3	8 2 6	7 2.8	178	1 5.7	131				131	1 1.5	8 2 6	6 9.9
1,978	4 4	2.7	1,5 5 7	9 7.3							4 4	2.2
											4	1 0 0.0
8,8 8 9	3,4 3 9	5 6.4	2,5 2 4	4 1.5	131				131	2.1	3,443	5 2.4
1,2 9 4	790	8 2.6	166	1 7.4							8 2 2	8 3.1
253	157	1 0 0.0	4							-	157	9 7.5
3 0	18	1 0 0.0									18	1 0 0.0
28	2 0	1 0 0.0									20	1 0 0.0
129	83	9 6.5	3	3.5							83	96.5
161	5 5	6 0.4	3 6	3 9.6							5 5	6 0.4
5 5 6	108	2 8.2	275	7 1.8					*		108	28.2
571	370	9 9.7	1	0.3							456	9 9.8
3,0 2 2	1,6 0 1	7 6.9	485	2 3.1							1,7 19	7 8.0
8 7	6 4	8 1.0	15	1 9.0							6.4	6 9.6
951	705	9 2.8	28	3.7	27				27	3.5	705	8 9.0
173	1 2 6	9 2.6	10	7.4							1 2 6	9 2.6
1,2 1 1	895	9 1.8	5 3	5.4	2 7				27	2.8	8 9 5	87.7
124	6 1	9 6.8	2	3.2							7 0	9 7.2
10	6	7 5.0	2	2 5.0							6	7 5.0
134	6 7	9 4.4	4	5.6							7 6	9 5.0
1 8 5	151	9 6.8				5			5	3.2	409	9 8.8
19	16	1 0 0.0	-								1 6	1 0 0.0
204	1 6 7	9 7.1				5			5	2. 9	425	9 8.8
1 3,460	6,1 6 9	6 5.7	3,0 6 6	3 2.6	158	5			163	1.7	6,558	6 3.6

第3表 昭和43年度からふとます親魚蓄養成績表

項	44	Ytts	***			우	親魚	のタ	ュ 理			
	捕	獲	数	試	即	日採卵	1	蓄	羞	Ę	蓄	養
採卵場	우	8	計	験控除	尾数	即日使用率	要蓄養数	蓄養不能数	蓄養数	蓄養率	우	8
岩尾別	7,773	13,9 9 0	21,7 6 3	8	尾	%	尾 7,765	尾	尾 7,765	% 1 0 0.0	尾 7,765	尾 1,3 4 2
斜 里	1,5 6 5	1,412	2,9 7 7				1,5 6 5		1,5 6 5	1 0 0.0	1,5 6 5	5 4 4
藻 琴	0	2	2									
網走	10	8	1 8				10		10	1 0 0.0	10	8
常呂	279	330	609				279	3	276	9 8. 9	276	9 4
湧 別	3 2 3	4 4 5	768				3 2 3		323	1 0 0.0	323	105
渚 滑	756	1,1 2 9	1,885				756	3 1	725	9 5.9	7 2 5	119
興 部	96	6.8	164				9 6		9 6	1 0 0.0	9 6	27
幌 内	189	301	490				189	3 3	1 5 6	8 2.5	1 5 6	5 6
雄武	121	138	259				121	3 2	8 9	7 3.6	8 9	4 6
計	1 1,1 1 2	17,8 2 3	28,9 3 5	8			1 1,1 0 4	9 9	11,005	9 9. 5	11,0 0 5	2,3 4 1
サシルイ	5 3	3 4	8 7				5 3		5 3	1 0 0.0	5 3	11
春刈古丹	18	15	3 3				1 8		18	1 0 0.0	18	12
忠 類	50	2 3 1	2 8 1				5 0	3	47	1 0 0.0	4.7	15
標 津	1,2 4 3	4,8 9 2	6,135		3	0.2	1,2 4 0	*	1,2 4 0	1 0 0.0	1,240	4,8 8 5
当 幌	592	684	1,2 7 6				5 9 2		5 9 2	1 0 0.0	592	600
春 別	3 0	40	7 0				3 0		3 0	1 0 0.0	3 0	40
床 丹	27	2 2	49				2 7		27	1 0 0.0	2 7	*22
西 別	3,4 1 3	13,352	16,765	100			3,3 1 3	61	3,2 52	1 0 0.0	3,2 5 2	1,1 5 0
矢 日 別	3 0	6 9	9 9				3 0		30	1 0 0.0	3 0	69
風 連	474	1,026	1,5 0 0				474		474	100.0	474	116
別当賀	8 2	8 9	171			1	8 2		82	1 0 0.0	82	8 2
計	6,0 1 2	20,4 5 4	26,4 6 6	100	3		5,909	6 4	5845	1 0 0.0	5,8 4 5	7,0 02
釧路	1 9	1 1	3 0				1 9		19	100	1 9	11
計	19	11	3 0				19		19	1 0 0	1 9	11
徳志別	2,1 3 2	2,361	4,4 9 3				2,1 3 2	7	2,1 2 5	9 9.7	2,1 2 5	352
北見幌別	1,0 2 1	1,9 6 5	2,986				1,0 2 1	24	997	9 7.6	997	256
屯 別	854	755	1,609				854	173	681	7 9.7	681	2 3 8
猿 払	3 3 1	475	806			'	. 331	285	4 6	1 3.9	4 6	2 0

-	4	蓄	養		内		訳					우	使
	数		蓄	養		우	3	親		魚		総	ER
	⇒±	催熟	催熟率	へい死	~ h		7	. 0	他	7	12.0 /4	使用	用
	計	惟然	惟松华	- (4.90	死 率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	その他の率	数	率
	尾	戶	E %	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	96
	9,1 0 7	7,6 5 5	9 8.6	110	1.4							7,655	9 8.5
	2,1 0 9	1,427	9 1.2	138	8.8							1,427	9 1.2
	18	8	8 0.0	2	2 0.0							8	8 0.0
	370	242	8 7.7	3 4	12.3							242	8 6.7
	428	3 1 4	9 7.2	9	2.8							314	9 7.2
	8 4 4	430	5 9.3	295	40.7							430	5 6.9
	123	i 69	7 1.9	27	2 8.1							6 9	7 1,9
	212	130	5 3.1	115	46.7							130	41.9
	135	J									÷		
	1 3,3 4 6	1 0,2 7 5	9 3.4	730	6, 6							10,275	9 2.5
	6 4	2 9	5 4.7	2 4	4 5.3							2 9	5 4.7
	3 0	10	5 5.5	8	44.4							10	5 5.6
	6 2	3 3	7 0.2	14	2 9. 8							3 3	66.0
	6,125	830	6 6.9	410	3 3.1							833	6 7.0
	1,1 9 2	5 9 2	1 0 0.0									592	100.0
	7 0	3 0	1 0 0.0									3 0	1 0 0.0
	4 9	2 7	1 0 0.0									2 7	1 0 0.0
	4,4 0 2	2,8 2 4	8 6.4	428	1 3.2							2,8 2 4	8 2.7
	9 9	2 1	7 0.0	9	3 0.0							2 1	7 0.0
	590	362	7 6.4	47	9.9	65				6 5	1 3.7	362	7 6.4
	164	8 2	1 0 0.0		9.9							7 6	9 2.7
	1 2,8 4 7	4,8 4 0	8 2.8	940	1 6.1	6 5				6 5	1.1	4,8 3 7	8 0.5
	3 0	9		10	141							9	47.4
	30	9		10							,	9	47.4
	2,4 7 7	1,980	9 3.2	1 4 5	6.8							1,980	9 2.9
	1,253	953	9 5. 6	4 4	4.4							953	9 3.3
	919	230	3 3.8	3 1 0	4 5.5	141				141	2 0.7	230	2 6.9
	66	3 3	7 1.7	1 3	2 8.3							3 3	1 0.0

1	項	į		捕	÷		対	ii		娄	6				P	亲	見	魚		0	処	Ľ:	理				_	_						
lers		目		1H	3		93	E.		龙	X.		試	即日	採卵				蓄			1		力	É			}		書			1.246	妄
採	卵場	易	2	2			2	ì		מווון	†		試験控除	尾数	即使用图	至	要養	畜数	- 1	蓄不能	養	蓄	姜姜	效	蓄	養	率	2		9			8	
														尾		96		厚			尾		_	尾				%			戸尾			尾
中		111	1	8	0		1	3 1	1	3	3 1	1				1		18	0				1 8	8 0		1	0	0		1	8 (4 4
																	1,		3									}						
	計		4,5	51	8	5	, 6	87	1	0,2	0 :	5			}		4,	518	3	4 8	9	4,	0 2	2 9	}	8	9.	2	4	,0	29		9	1 0
遊	楽	部	1	. 1	5		1	23	-	2	3	8						115	5				1 :	1 5	1	0	0.	0		1	1 5		1	1 9
																{			-										×					
	計		1	1	5		1	23		2	3	8						1 5	-				1 1	5	1	0	0.0	0		1	1 5		1	1 9
合		計	21,7	7	6	44	,0	98	6	5,8	7	4	108	3	0.0	}	21,	6 6	1	6 5	2	21,	0 1	3		9	7.	0	21	0	1 3	10	,3	8 3

	蓄	養		内		訳				-	우	使
数	3		養		우		親		魚		総使	
計	催熟	催熟率	へい死	へ い 死 率		老魚	お調査	未熟	他計	その他の率	用数	率 率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
2 2 4	117	6 5.0	63	3 5.0							117	6 5.0
4,9 3 9	3,313	8 2.2	575	1 4.3	1 4 1				141	3.5	3,313	7 3.3
234	48	4 1.7	6 7	5 8.3	1. 15 %						4 8	4 1.7
234	4 8	4 1.7	6 7	5 8.3	58,0						4 8	41.7
3 1,3 9 6	1 8,4 8 5	8 8.0	2,3 2 2	. 1 1.1	206				206	0.9	18,482	8 4.9

§11 べにざけ生産事業

1 べにさけ生産事業の実施経過概要

べにさけ生産事業は準備事業を含めて数えると本年度事業で 8 年目が過ぎたことになる。この3 年間における本事業の実施経過を要約すると別表のとかりであり、これから生産して西別川へ放流した幼稚魚数は周年飼育して8mo1t型の大きさで放流したものが 4 2 年 8 月に14,000尾(虹別事業場から西別川へ放流)、48年5月に108,000尾(西別捕獲場下の西別川へ輸送放流)、それに44年5月に146,000尾(西別捕獲場下の西別川へ輸送放流)の合計268,000尾となつている。また、稚魚(Fry型またはFingerling型の大きさ)として放流したものは42年9月に198,000尾(虹別事業場構内の北湧水池へ放流して、そこから西別川へ自然降下させた)と48年4月に799,000尾(虹別事業場構集池からFryで自然放流)の合計992,000尾である。この放流幼稚魚の内訳は別表に整理した。これらの放流幼稚魚群のべにさけ親魚としての回帰については4年度は、周年飼育群の14,000尾の分が4年魚として、また、同じく周年飼育で放流した108,000尾と半年飼育して放流した193,000尾は8年魚として回帰することが期待されている。

なお、本年度(48年度)は、44年度事業用種卵として、9月にアメリカからべにさけ卵子146,000粒を移殖した。この卵子はアラスカ州のベア・レイクにそ上した親魚からの採卵(採卵月日43年8月9日)によるもので、これを日鮭協が購入し、当場へ寄贈された。また支笏湖産のひめます卵子は12月に1,813,000粒を移殖した。これらの卵子はいずれも虹別事業場に収容して、現在ふ化飼育中であり、この成績については44年度事業成績書に報告する。

ビレ、右腹ビレ) ② 虹別事業場構内北湧水池へ放流 平均放流魚体(FL8.1cm BW3.39) →1968年(43年)5月 108,000尾 ① 42年9月に全数(112,600尾) を標識(脂ピレ、左ビレ) ② 14線捕獲場下から西別川へ放流 ③ 平均放流魚体(FL16.5cm, BW36分) 3-(2) 43年度事業 → 1968年(48年)4月 799,000尾 1967年(42年)12月 1,135,000粒 短期飼育 ② 虹別事業場から西別川へ放流 ③ 平均放流魚体(FL4.2cm, BW0.45g) → 1969年(44年)5月 146,000尾 周年飼育 ① 無 標 識 ② 14線捕獲場下から西別川へ放流 ③ 平均放流魚体(FL1 5.4cm, BW8 7.39) 4-(3) 44年度事業・・・・・・事業実施中 1968年(48年) 9月 144,000粒 -------(アラスカ、ペア・レイク産べにさけ)

べにさけ生産事業経過一覧表

周年飼育

半年飼育

(収容卵数)

50,000粒 -

(卵子収容年月)

1965年(40年)12月

1966年(41年)12月 916,500粒 -

準備事業

2-(1) 4 2年度事業

(稚・幼魚放流年月) (稚・幼魚放流尾数)

① 41年8月に全数標識(脂ピレ、右腹

平均放流魚体 (TL1 2.4cm, BW1 8.2g)

② 虹別事業場から西別川へ放流

→ 1967年(42年)9月 193,000尾

① 42年9月に51,600尾を標識(脂ビ

ピレ)

周年飼育

周年飼育

1968年(43年)12月 1,813,200粒-----(支笏湖産ひめます)

第1表 西別川放流べにさけ幼稚魚一覧表

放流	年月日		放	流尾	数		放 流	魚の内	訳	
年	月日	放流場所	周年飼育 群 (smolt型)	半年飼育群 (finge- rling 型)	群	平均 フォー ク・レ ングス	魚体重	標識部位	飼育期間	4 4 年度回 帰期待魚の 年 令
			尾	尾	尾	cm	д			年魚
42	3.8	虹別事業場	14,000			(全長)	18.2	脂ピレ、 右腹ピレ	4 1.3. 6. ~4 2.3. 7	4
42	9.2 8	北湧水池 (事業場 構内)		193,000		8.1	3.3	"	42,211 ~42.9.27	3
43	5. 6~ 5.1 7	西別捕獲場下	1 08,000			1 6.5	3 6	″ 左腹ピレ	42.211 ~ ~4 3.4.3 0	3
48	4. 1~ 4.30	虹別事業場			79 9,000	4.2	0.45	無標識	4 3.3. 6 ~4 3.4.3 0	(2)
44	5.2 4~ 5.3 0	西別捕獲場下	146,000			1 5.4	3 7.3	無標識 但し1 00尾 にプラスチツ ク・タッグ		(2)
			-							
THE STATE OF THE S	+	×	268,000	193,000	7 9 9,0 0 0			©	1	

Ⅱ 43年度べにさけ生産事業結果

1 種卵の移殖並びにふ化

4 3年度事業に係る種卵の移殖は4 2年1 2月2 2日、2 3日に自動車便で行なつた。 との種卵は支笏湖のボロビナイ、湖畔の各採卵場において1 1月4日、5日に採卵したひめます 卵子1,1 3 5,0 0 0粒で、これを千才支場支笏湖事業場に収容して発眼卵で移殖したものである。 との卵子の発眼率は極めて良好であつたため検卵を行なわずに移殖した。発眼月日は1 2月9日 ~1 0日であつた。

移殖卵子1,1 35,000粒は虹別事業場第1ふ化室に収容し(12月24日)、検卵(死卵の除去)を行なつて、各槽に収容した。ととでの死卵は支笏湖事業場収容から虹別収容時の12月24日までにおける全死卵であり、この数は46,500粒であつた。従つて、実収容卵数は1,088,500粒であり、これからふ出までの死卵数は18,600粒、1,069,900尾の稚魚がふ出た。

2 以上は第€表に整理した。

第2表 種卵の採卵からふ化までの経過表

		卵		数	
事項	年月日	卵 数	死 卵 数	差し引き卵数	備考
採卵	43.11. 4	粒 1,13 5,000	粒	粒	支笏湖ボロビナイ採卵場(11/4)605円粒
	~ 5				湖畔採卵場(11/5)580千粒
発眼	4 3.1 2. 9 ~1 0	1,1 8 5,0 0 0			
移殖	43.12.2 2 ~23	1,1 3 5,0 0 0			支笏湖事業場────────────────────────────────────
収容	4 3.1 2.2 4	1,1 3 5,0 0 0	46,500	1,088,500	虹別事業場第一ふ化室
ふ化	43.12.25	1,0885,00	1 8,6 0 0	尾 1,069,900	"

2. 飼育管理

ふ出稚魚 1,0 6 9,9 0 0 尾は短期飼育群 8 6 9,9 0 0 尾、周年飼育群 2 0 0,0 0 尾の 2 グループに分け、前者をさけ稚魚池 (約 6 6 m²) に、後者を第 1 ふ化室 2 間槽 1 8 本にそれぞれ収容した。 (短期飼育群の飼育管理)

さけ稚魚池(約66m)に撒布した短期飼育群1,069,900尾の給餌は粉末餌料を練りなおし、 吊餌とする方式を主体とし、補助的に粉末餌料を撒布する方式で行なつた。この給餌期間中、池の排水部を開放しておき、稚魚が池から直接西別川へ降下するようにした。

この群の飼育成績は第5表のとおりで、平均浮上魚体でFL2.7cm、BW0.1gは飼育終了時に平均魚体でFL4.2cm、BW0.45gとなつた。

この間の投餌量は 6 5 8 Kg、飼育水温は平均 9.7 $\mathbb C$ (範囲 9.2 \sim 1 0.2 $\mathbb C$)であつた。 (周年飼育群の飼育管理)

第一ふ化室2間槽18本に収容した周年飼育群200.000尾は5月19日までことで飼育管理した。給餌方法は開始20日間は粉末を少量づつ1日6~7回の撤布給餌としたが餌料のロスが多いため、その後は粉末餌料を練り餌に作りなおし、吊り餌として与えたところ摂餌は非常に良好となつた。この間の減耗は10,800尾であつた。5月20日には中央試験地に設置した8個の金綱張生簀(1基の規模は1.85m×3.65m×0.6m)(47m³)に収容換えして、6月28日までこの飼育枠の中で飼育した。6月29日には飼育枠を撤去し、稚魚(平均魚体:FL6.2cm、BW2.49)は中央試験池全面(346m³)に放養した。

中央試験池放養後の給餌は7月中旬まではクランブル(稚魚前期用)にペレット(稚魚後期用)8 割程度を混合した餌を与えたが、成長と共にペレット一本に切り換えた。

その後稚魚の成長は順調に進行したが、1月に入つて摂鮮が不活発となり、1月3日頃から窒息状態でへい死する魚が目立ち、その後も1日当り400~500尾前後のへい死が続いた。これは渇水期に入り、飼育池の湧水量が減少したことによる酸素不足が原因と考えられたため、1月6日に第1 ふ化室の補助用水から400と/minを追加注入し酸素を補給すると同時に飼育魚の一部7万尾を飼育池用に工作したさけ浮上池に分散収容した。また、池底に蓄積された腐敗残餌を除去し、池の清掃を行なつた。へい死はエラ腐病によるものであり、これは上記の渇水期における水量不足、残餌の腐敗、過密収容によるものによるものと考えられた。へい死魚の出現は第4表のとおりで1月中は8.800尾(へい死魚の魚体範囲:F10.4~14.5㎝、BW10.0~28.09)2月中は10.400尾であつた。

第8表 魚病発生時の飼育魚へい死内訳表

月	旬	へい死尾数	備	考
	上	4,800尾	1	4-
	中	2, 8 0 0	魚体	1 0.4~1 4.5 cm
1	下	1,700		1 0.0~2 8.0 9
	計	8,8 0 0) "	1 0.0 - 2 0.0 7
	上	5, 6 0 0		
	中	3, 1 0 0		
2	下	1,700		
	計	1 0, 4 0 0		

8月に入ってからは多量へい死はとまったが、弱小魚のへい死はその後も若干尾を引いた。この周年飼育群の飼育成績は第 4 表のとおりであり、給餌期間 3 月 6 日~翌年の 5 月 1 5日 1 5日 1 6日間)、飼育水温 1 8.8~ 1 1.4 1 7 1 9.7 1 7 1 9.7 1 7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.8 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.7 1 9.8 1 9.7 1 9.7 1 9.8 1 9.7 1 9.8 1 9.8 1 9.9

第4表 周年飼育群の飼育成績表

註:中央試験池(846 m3)

									Elulu @	下入时间(0 至 0 110)
飼	飼	飼平	投	質	司 育	尾数	效	月末の魚	平均体	
育区分	育日数	育水温均	餌量	飼育尾数	へい死数	煮引き尾数	歩留り	F.L	B.₩.	備考
3月3		9.1		200,000	尾 5,400	尾 194,600	9 7.3	cm. 3.0	9 0.21	浮上魚体 体長 2.7 cm 体重 0.1 g
4 //	8 0	9.4	250	194,600	2,5 0 0	192,100	9 8.7	4.1	0.48	
5 //	8 1	9.9	150	192,100	9,100	188,000	9 5.8	4.8	0.8 7	
6 //	8 0	1 0.6	318	183,000	2,400	180,600	9 8.7	6.2	2.4	
7 //	31	1 0.5	465	180,600	400	180,200	9 9.8	7.2	3.7	
8 //	31	1 0.4	5 2 5	180,200	100	180,100	9 9.9	9.0	7.5	
9 //	8 0	1 0.0	900	18 0,1 0 0	100	180,000	9 9.9	9,8	9.1	
10 //	31	1 0.0	1,000	180,000	200	179,800	9 9.9	1 1.5	1 6.1	
11 /	3 0	9.8	800	17 9,800	100	179,700	9 9.9	1 1.8	1 8.7	
12 /	31	9.8	800	179,700	200	179,500	9 9.9	1 2. 2	1 9.7	
1 /	31	9.0	7 4 4	179,500	8,300	171,200	9 5.4	1 3.0	2 3.6	
. 2 //	28	8.9	1,120	171,200	10,400	160,800	9 3.9	1 3.9	2 5.4	
3 //	3 1	9.5	1,891	160,800	8,900	1 5 6,9 0 0	9 7.6	1 4.2	2 7.0	
4/	3 0	9.8	2,490	1 5 6,9 0 0	8 0 0	156,100	9 9.5	1 4.4	3 5.6	~ 死魚の5ち300尾は調査
5	15	9.7	59	156,100	500	155,600	9 9.7	15.4	37.3	5月24日~30日放流
計	436	9.7	11,642	200,000	44,400	1 5 5,8 0 0	7 7.8			

第5表 短期飼育群の飼育成績表 註: 稚魚池(66 m)

飼	飼	飼平	投		飼 育	尾	数	月末の魚)平均	
育区分	育日数	育水温均	餌量	飼育尾数	へい死数	差占隐尾数	歩留り	F.L.	B.W.	備考
月 3	26	°C 9.5	Kg 208	尾 869,900	尾 69,500	尾 800,400	% 92.0	cm 3.0	0.21	浮上魚体 {体重 2.70
4 //	3 0	9.9	450	8 00,40 0	1,0 0 0	7 9 9,4 0 0	9 9.9	4.2	0.45	自然放流
計	56_	9.7	658	869,900	70,500	799,400	9 1.9			

(粉末、クランプル、ペレツト)で、飼育開始時の平均魚体 F L 2.7cm、 B W 0.1 タは 飼育 終了時に は魚体F L 1 5.4cm (1 2.6~1 9.0)、B W 8 7.3 9 (1 7.9~7 8.4) に成長した。この間の歩留 りは155,600/200.000=0.778餌料係数は2.0であつた。

この周年飼育群の月別成長経過については毎月末に標本50尾を抽出測定し、その平均値と出現範囲 を求めた。この測定値は第7表のとおりである。

また、放流の1ヶ月半前に当る44年4月15日に200尾の標本を抽出して行なつた魚体測定値は 第4表に示した。

組6表 周年飼育群の各月末魚体

各月標本星数50星

事	項	フォーク	・レングス	cm		体	重	9	
月	平	均	範	囲	平	均	範		囲
8		3. 0	4.5			0.21			
4		4. 1	3.1~	4. 8		0.43	0.	~0	0.8 2
5		4. 8	3.5~	5. 8		0.87	0.	21~	1.7 5
6	1	6. 2	4.2~	7. 1		2.4	0.	3 ∼	3.9
7	-	7. 2	6.0~	8. 5		3. 7	1.9	~	6. 5
8	1	9. 0	8.1~	0.8		7. 5	5.	~1	1.4
9)	9. 8	8.2~	1 1.8		9.1	5. 5	~1	4. 7
1 0)	1 1.5	1 0.0~	1 3.6	1	6. 1	1 0.	~ 2	9. 0
1 1		1 1.8	1 0.1~	1 2.7	1	8. 7	1 2. 5	~ 2	5. 7
1 2	3	1 2.2	1 0.4~	1 4.7	1	9. 7	1 1.	5 ~ 8	7. 5
1		1 3. 0	9.8~	1 5.2	2	3. 6	1 1.0	~ 8	5.6
2	3	1 3. 9	1 0.7 ~	1 5.7	2	5. 4	1 1.	~ 4	4. 5
8	3	1 4.2	1 1.5 ~	1 4. 7	2	7. 0	1 8.) ~ 3	7.0
. 8	b	1 4. 4	1 1.4~	1 7.0	3	5. 6	1 3.	· ~ 6	4. 1
5	5	1 5.4	1 2.6~	1 9.0	8	7. 3	1 7.9	~ 7	3. 4

-98-

第7表 200尾の標本による魚体測定値(周年飼育群)

4 4年 4月 1 5日 測定

) 1 3 日 湖) 上
フォー	ク・レングス(F. L.)	体		重 (B.	W.)
範囲	尾数	平均標準偏差	範	拥	尾 数	平均標準偏差
1 0.1 ~ 1 1.0	2		1 4.1 ~	2 0.0	1 4	
1 1.1 \sim 1 2.0	9	_	2 0.1 ~	2 6.0	3 3	
1 2.1 \sim 1 3.0	5 1	F=1 3.6 1cm	2 0.1 ~	3 2.0	6 9	₩= 3 1.4 2 g
1 3.1 \sim 1 4.0	6 9	SF = 1.09cm	3 2.1 ~	3 8.0	4 7	SW = 8.16g
$1 \ 4.1 \sim 15.0$	5 5		3 8.1 ~	4 4.0	2 6	
1 5.1 \sim 1 6.0	1 0		4 4.1 ~	5 0.0	5	
1 6.1 \sim 1 7.0	4.		5 0.1 ~	5 6. 0	4	
	1 - 1-1		5 6.1 ~	6 2.0	2	*
	2 0					^
計	2 0 0		計		2 0 0	

3 放

A 短期飼育群

この群は前述のとおり飼育期間中、池(66m²)の排水部を開放して西別川へ自然降下させ た。降下期間は4月1日~4月30日で、その降下数、即ち放流数は799,000尾、放流魚 の平均魚体はF.L4.2cm(範囲 3.4~4.9cm)、B.W.O.45g(0.25~0.98g)であ oten

B 周年詞育群

4 3年 3月 6日~4 4年 5 月 1 5日 までの 4 3 6日 間飼育して Smolt 型の大きさに成長さ せた周年飼育群は放流まで餌止めを行ない、44年5月24日~5月30日に西別捕獲場下の 西別川へ輸送放流した。この放流尾数は146,000尾(調育終了時の尾数 155,600尾 からへい死数、即ち餌止中のへい死及び輸送時のへい死を差し引いた尾数)で、放流魚体は F. L. 15.4cm (12.6~19.0cm)、B.W. 37.3g(17.9~73.4g)であった。 放流魚のうち100尾については漂識として白色プラスチックタッグを背ビレ前部に施した。 輸送方法は4 t 0n 積みトラツク1台を使用し、 これに鉄パイプフレーム付きキヤンバス水槽 (400cm×100cm×94cm)と酸素補給装置を積載して行なつた。輸送距離は56km(所 要時間80~90分)。

この群に係る放流後の降下動向については第8表のとおりで、これによると6月中旬頃には多 数が沿岸に出現し、6月下旬には外洋へ去つたものと考えられる。

第8表 周年飼育群の放流後の動向

月	旬	放 流 群 の 動 向 概 要	水温
5 月	下旬	幼魚146,000尾を放流	1 0.0℃
6 月	上旬	西別川河口部で曳網を行なつたところ多数 (1回約500尾)の放流幼魚を確認し、 とれらを再放流した。	1 2.0
6 月	中旬	床丹沿岸及び走古丹沿岸の定置網に多数乗 網した旨、漁業者から報告を受けた。 これら乗網魚の一部は再放流された。	床 丹 11.8 走古丹 10.0
6 月	下旬	床丹、走古丹沿岸からの乗網報告なく離岸 したものと考えられる。	床 丹 1 7.2 走古丹 1 0.0

4 放流幼稚魚の河川内における保護

西別川へ放流された幼稚魚についてはひめます種卵から生産されたということから、これら放流幼稚魚の河川滞留期間をひめますという解釈のもとに河川遊漁者によつて釣獲されることが前年度事業に係る放流群において聞き込み調査並びに追跡調査で指摘された。このため遊漁者に対して本事業の主旨説明と保護協力依頼のためにポスターなどによる協力を呼びかけて来た。

本年度は道と協議の結果、べにさけ生産事業において生産されたひめます幼稚魚は放流時点からべにます(べにさけ)という解釈で扱うことになり、北海道内水面漁業調整規則第22条のベルますの適用を受けることになつた。

-100-

§ 12 ますのすけ増殖事業

1 種卵の移殖、収容

ますのすけ種卵は昭和 4 3年度、日本鮭鱒資源保護協会が米国ワシントン州(ワシントン州立 大学)から購入して、当場及び北海道庁へ寄贈されたもので、4 3年11月に4便(11月8日、 11月15日、11月22日、11月29日)に分かれて合計1,504,500粒が移殖された。 このうち第1便(11月8日)の334,500粒と第3便(11月22日)の430,000粒は 当場が受領して、11月8日、11月22日にそれぞれ天塩支場中川事業場に収容した。また、 第2便(11月15日)の300,000粒、第4便(11月29日)の440,000粒は道水産 部が受領し、道水産ふ化場千才支場へ収容された。

これらの種卵の受領から収容までの内訳は第1表、第2表のとおりである。

この移殖ますのすけ種卵は 42年度事業成績書(§ 12ますのすけ増殖事業:P104~P107)をもつて報告した 42年度移殖ますのすけ種卵と同じく、ワシントン州立大学構内のスース・クリークにそ上した親魚から採卵されたもので、一旦大学のふ化場に収容され、発眼卵で輸送された。即ち、このますのすけは元を辿ると大学がカラマ河からスース・クリークへ移殖し(1949年)、そこに定着させてスース・クリークの資源として管理しているもので、このますのすけは短い回遊で回帰する生態をもつている。

大学では、この資源に対して、品種改良、大学独自の餌料によって育てた稚魚を放流するという方法によって管理している。

第1表 43年度ますのすけ卵子の受領、輸送並びに収容結果 (北海道さけ・ますふ化場受領分)

事	項	第 1 便	第 3 便	計
受領、輸	送、収容年月日	4 3 年 1 1 月 8 日	4 3 年 1 1 月 2 2 日	
受 領		東京発 1:00	東京発 8:20	
	東京→千才	千才着 3:20	千才着 9:30	
		国内航空 Mail便	日本航空503便	
	受領検収時間	3 : 4 5	1 0 : 1 5	
	箱 数	10ケース	12ケース	22ケース
	卵 数	3 3 4, 5 0 0 粒	4 3 0, 0 0 0 粒	7 6 4,5 0 0粒
		底が若干吸水し、一部	全箱にわたつて底がかな	
	箱の状態	には四隅がつぶれかか	り吸水しつぶれかかつて	
		つているものがあつた。	いた。	

-101-

受領、輸送、収容年月日 43年11月8日 43年11月22日 卵子は極めて良好。 卵子は極めて良好。 発服してから割合初期の 根球が大きく黒ずみ、発 あのと判断された。 限して20日位たつたものと判断された。 のと判断。赤珠の卵子の外に赤珠のない黄味を帯びた透明状の卵子が含まれていた。 1段目卵子収容盆 6.9℃ 3″ 9.4℃ 5″ 10.2℃ 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%	
 発展してから割合初期のものと判断された。 りまのと判断された。 服して20日位たつたものと判断。赤珠の卵子の外に赤珠のない黄味を帯びた透明状の卵子が含まれていた。 1 段目卵子収容盆 6.1 ℃ 1 段目卵子収容盆 6.9 ℃ 3 ″ ″ 9.4 ℃ 5 ″ ″ 10.2 ℃ 6 ″ ″ 10.2 ℃ 6 ″ ″	
明子の状態 あのと判断された。 服して20日位たつたものと判断。赤味の卵子の外に赤珠のない黄味を帯びた透明状の卵子が含まれていた。 1 段目卵子収容盆 6.1℃ 1段目卵子収容盆 6.9℃ 3″ ″ 9.4℃ 5″ ″ 10.2℃ 5″ ″ 10.2℃ 7レーク氷の量 盆の8割程度 盆の6~7割程度 第1便に同じ 座席にビニール、毛布を敷き、その上に箱を置き、第1便に同じ 座席にビニール、毛布を敷き、その上に箱を置き、第1便に同じ 平才一天塩支場一中川事業場間の輸送距離へ所要時間 (4:10-10:45) に10:30-17:50) 収容時間 11:00-12:00 18:00-19:00 収容場所 天塩支場中川事業場 第1便に同じ	
明 子の状態 のと判断。赤珠の卵子の外に赤珠のない黄味を帯びた透明状の卵子が含まれていた。 1 段目卵子収容盆 6.1℃ 1段目卵子収容盆 6.9℃ 3 ″ ″ 9.4℃ 5 ″ 10.2℃ 5 ″ ″ 10.2℃ フレーク氷の量 盆の8割程度 盆の6~7割程度 第 1 便に同じ 座席にビニール、毛布を 敷き、その上に箱を置き、 第 1 便に同じ 座席にビニール、毛布を 敷き、その上に箱を置き、 第 1 便に同じ 平才一天塩支場一中川事業 場間の輸送距 (4:10-10:45) に10:30-17:50) 収容時間 11:00-12:00 18:00-19:00 収 容 場 所 天塩支場中川事業場 第 1 便に同じ	
外に赤味のない黄味を帯でた透明状の卵子が含まれていた。 1 段目卵子収容盆 6.1 ℃ 1 段目卵子収容盆 6.9 ℃ 3 ″ ″ 9.4 ℃ 5 ″ ″ 10.2 ℃ 5 ″ ″ 10.2 ℃ 5 ″ ″ 10.2 ℃ 5 ″ ″ 10.2 ℃ 5 ″ ″ 10.2 ℃ 万レーク氷の量 盆の8割程度 盆の6~7割程度 離 送車 営業車(マイタロバス)第1便に同じ 座席にビニール、毛布を 敷き、その上に箱を置き、 第1便に同じ 座席にビニール、毛布を 場・その上に箱を置き、 第1便に同じ 平才一天塩支場一中川事業 場間。6時間35分 時間:7時間20分 (10:30-17:50) 収容時間 11:00-12:00 18:00-19:00 収容時間 11:00-12:00 第1便に同じ	
びた透明状の卵子が含まれていた。 1 段目卵子収容盆 6.1℃ 1段目卵子収容盆 6.9℃ 3 ″ ″ 9.4℃ 5 ″ 10.2℃ 5 ″ ″ 10.2℃ フレーク氷の量 盆の8割程度 盆の6~7割程度 輸送車 営業車(マイクロバス) 第1便に同じ 座席にビニール、毛布を 敷き、その上に箱を置き、 第1便に同じ 平才一天塩支場間の輸送距場間・6時間35分 時間・7時間20分 (10:30~17:50) 収容時間 11:00~12:00 18:00~19:00 収容場所 天塩支場中川事業場 第1便に同じ	
## 送 1 段目卵子収容盆 6.1℃ 1 段目卵子収容盆 6.9℃ 3 " " 9.4℃ 5 " " 10.2℃ 5 " " 10.2℃ 7 以 2 を	
1 段目卵子収容盆 6.1℃ 1段目卵子収容盆 6.9℃ 3″ ″ 9.4℃ 5″ ″ 10.2℃ 5″ ″ 10.2℃ フレーク氷の量 盆の8割程度 盆の6~7割程度 輸送車 営業車(マイクロバス)第1便に同じ 座席にビニール、毛布を 敷き、その上に箱を置き、 第1便に同じ 紐で座席に固定。 干オー天塩支場一中川事業場間の輸送距離へ所要時間 6時間35分 時間:7時間20分 (10:30-17:50)収容時間 11:00-12:00 18:00-19:00 収容場所 天塩支場中川事業場 第1便に同じ	
卵 温 3 ″ ″ 9.6℃ 3 ″ ″ 9.4℃ 5 ″ ″ 10.2℃ 5 ″ ″ 10.2℃ 7レーク氷の量 盆の8割程度 盆の6~7割程度 輸 送車 営業車(マイクロバス)第1便に同じ 空席にビニール、毛布を 敷き、その上に箱を置き、 第1便に同じ 紐で座席に固定。 千才一天塩支場ー中川事業場間の輸送距離へ所要時間 6時間35分 時間:7時間20分 (10:30-17:50)収容時間 11:00-12:00 18:00-19:00 収容場所 天塩支場中川事業場 第1便に同じ	
10.2℃ 5	
カレーク氷の量 盆の8割程度 盆の6~7割程度 線 送車 営業車(マイクロバス) 第1便に同じ 摩席にビニール、毛布を 敷き、その上に箱を置き、 第1便に同じ 紐で座席に固定。	
輸送車 営業車(マイクロバス) 第1便に同じ 座席にビニール、毛布を	
職 送	
一	
程で座席に固定。	
千才一天塩支場ー中川事業場間の輸送距離へ所要時間 距離:341km 時間:35分 時間:7時間20分 (10:30-17:50) 収容時間 11:00-12:00 18:00-19:00 収容場所 天塩支場中川事業場 第1便に同じ	
場一中川事業 場間の輸送距 離へ所要時間 (4:10-10:45) 時間:7時間20分 (10:30-17:50) 収容時間 11:00-12:00 18:00-19:00 収容場所 天塩支場中川事業場 第1便に同じ	
場間の輸送距離へ所要時間 (4:10-10:45) (10:30-17:50) 収容時間 11:00-12:00 18:00-19:00 収容場所 天塩支場中川事業場 第1便に同じ	
収容時間 11:00-12:00 18:00-19:00 収容場所 天塩支場中川事業場 第1便に同じ	
収容 収容場所 天塩支場中川事業場 第1便に同じ	
以 谷 物 的 人 鱼 文 物 中 川 事 来 物	
71. 九小小月 分 0 6 7 划 印 庄	
1段目卵子収容盆 7.2℃ 1段目卵子収容盆 8.2℃	
卵 温 3 ″ ″ 1 0.7 ℃ 3 ″ ″ 9.5 ℃	
5 " " 1 1.8 °C 5 " " 9.8 °C	
ふ化用水温 9.0℃ 8.5℃	
収容卵数 334,500粒 430,000粒 764,5	0 0粒
死 卵 数 11,600粒(3.5%) 0.5%程度	
奶 径 0.6~0.9 cm 0.6~0.8 5 cm	
平均 0.86cm 平均 0.82cm	

-102-

第2表 43年度ますのすけ卵子の受領、輸送並びに収容結果 (道水産部受領分)

	事	項	第 2 便	第 4 便	計
į.	受領輸	送収容年月日	43年11月15日	43年11月29日	
		7.	東京発 8 : 2 0	東京発 18:20	
		東京→千才	千才着 9:30	千才着 19:30	
受	領		日本航空 503便	日本航空 523便	
		受領時間	1 0 : 0 0	20:30	
		箱 数	7 ケース	1 1 ケース	18ケース
		卵 数	3 0 0, 0 0 0 粒	4 4 0,0 0 0 粒	7 4 0,0 0 0粒
輸	送	千才 → 千才市 空港 → 巓 越	距 離:: 12 Km 時 間 : 20 分	第 2 便に同じ	
		収容時間	10:30-11:00	21:00-21:30	
		収容場所	北海道水産 ふ化場 千 才 支 場	第 2 便 に同じ	
			1 段目 卵 子収容盆 53 ℃	1段目卵子収容盆 5.8℃	
収	容	卵 温	3 " " 8.1 °C	3 ″ ″ 7.3 ℃	*
,,,	П		5 ″ ″ 9.7 °C	5 " " 8.2 °C	*
		ふ化用水温	8. 1 °C	8. 0 °C	
		収容卵数	3 0 0,0 0 0 粒	4 4 0,0 0 0 粒	7 4 0,0 0 0粒
		死 卵 数	0.4% 程 度	0.7% 程 度	
		卵 径	0.7~0.9cm	0.7~1.0 cm	
		如生	平均 0.83cm	平均 0.9 cm	

2 ふ化、飼育

43年11月8日、11月22日の2回亘つて中川事業場へ輸送した764,500粒のますのすけ卵子は当事業場ふ化室の塩ビ製アトキンス式ふ化槽に収容した。

この卵子は収容から約 1 ケ月後に当る 1 2月 1 3日~ 2 5日にふ出し(ふ出尾数 7 47,0 0 0尾) これを三角日覆屋根付きの稚魚池に撒布した。稚魚のふ上は 1 月下旬に行なわれ、 6 99,0 0 0尾がふ上した(ふ上尾数/収容卵数 = 0.9 1 4)。 「ふ上魚の平均魚体は \mathbb{F} . \mathbb{L} . 3.8 cm 、 \mathbb{F} · \mathbb{W} . 0.4 7 \mathbb{G} であつた。

飼育はふ上終了時の2月3日からはじめた。給餌の方法は昨年同様、給餌当初は粉末を練りなおして 置餌として与え、その後はクランブルを練りなおして置餌とする方式と、クランブルをそのままで撒 布する方式を併用して行なつた。

	第3表	四和4	3年版	. 惨旭 よ	,00	リの即月	以利其公			
区	Armada (Atrona		飼	育尾	数	期末の	平均魚体	飼育水温	/+ts	+/-
分、	飼育期間	投餌量	飼育 尾数	へい死 星数	差しり	F.L.	B.W	範囲(平均)	備	考
	月日 月日	Кg	梶	摇	稲	ст	g	°C	· .	
1	2.3 -2.1 7	102	699		699	3.8 2	0.47	4.3 - 5.0	註1~ パ 尾 パ 魚	日:1月下旬 数:699千尾 体:[体長3.82cm
2	2.18 - 228	100	699	1	698	4.0 4	0.59	3.9 - 4.3	[飼育池 面	体重 0.47g 積:140m²
3	3.1 - 3.3 1	500	698	2	696	4.57	0.86	(6.8)	註2 用 水 :	量:600l/min :7.3
4	4.1 - 4.3 0	7 20	696	7	689	5.21	1.28	(45)	_【 標識月日	: 5月21日~26日
5	5.1 ~5.3 1	8 8 2	689	7	682	6.13	2.39	4.5 - 7.0 (5.8)	註3 《 『 尾数 』 部位	: 5月21日〜26日 : 155千尾 : 右腹ビレ
6	6.1 - 6.1 6	280	682	7	675	6.5 4	2.87	7.0 - 7.3	放流月日	日 : 6月16日~25日 所: 天紅 技流 ペンケナイ川 故: 675千尾
計	2.3 - 6.1 6	2,584	699	2 4	6 7 5	3.8 2 → 6.4 5	0. 47 → 2.87	1		
						7 0.4 3			註 5 {餌 料係数	ます用クランプル1.6

第3表 昭和43年度移殖ますのすけの飼育成績表

3 放 流

稚魚の放流は 6月1 6日~6月25日に行ない、平均魚体でF. L. 6.5 4cm、B.W. 287gの稚魚 655,000尾を天塩川支流 パンケナイ川へ放流した。

この放流数の約23%に当る155,000尾については放流後の回遊並びに回帰確認のため、放流前の5月21日~26日に標識を施した。標識部位として右腹ビレを切除した。この放流数と昨年度の放流数を加えて、天塩川水系へ放流したますのすけ稚魚数を整理すると第4表のとおりである。このうち、昨年放流した群の沿岸出現については、北部オホーック海、天塩川河口付近の日本海の各沿岸漁協同組合における聞き込みに関する限りでは、その形跡はないようである。

第4表 ますのすけ 稚魚放流 結果(天塩川水系)

回	放流生	丰月日	放流尾数	平均	魚体	標	識	放流地点
	年	月日	100 M 76 W	F.L	B.W.	尾数	部 位	从机地从
1	4 3	7.15	4 1 0,0 0 0	6.9	4.9	1 5 8,0 0 0	脂 ビ レ 右腹ビレ	天塩川水系パンケナイ川
2	4 4	6.16 - 6.25	6 7 5,0 0 0	6.5 4	2.87	1 5 5,0 0 0	右腹ピレ	"
計			1,085,000			3 1 3,0 0 0		

-104-

§ 13 交配種增殖事業

1 捕獲採卵成績概要

本年度の交配種(F1: act + x から ふとます act + x から ふとます act + x から ふとます act + x の の の 他 隣接の 者滑川、常呂川の act + y を は の 月 act + y の し の 月 act + y と は の も の 子 位 を は い し た 。

第 1 表 昭和 4 3 年度交配種親魚捕獲採卵成績表

海	水系	採卵場	所管	捕	獲	数	使	用親領	魚数	150 cin 464	增減	仮収容	♀親魚	平均	-t- // //
区	VICN.	1491-00	事業場	우	8	計	우	8	計	採卵数	卵数	卵数	使用率	採卵数	実施期間
才				尾	尾	尾	尾	尾	千粒	千粒	干粒	千粒	%	粒	月日~月日
ホ	幌内	幌内	幌内	5	8	1 3	3	1	4	9		9	6 0.0	3,0 0 0	8.1~ 1 0.1 0
1	渚滑	渚 滑	渚滑	1 1	9	20		.7			.				7.29~
ツク	湧別	湧 別	湧 別	3 7	1 1	4 8	3 4	4	38	51		51	9 1.9	1,500	8.1~ 1 0.2 0
海	常呂	常呂	北見	4	3	7									8.1~
	合計	本年度		5 7	31	8 8	3 7	5	42	6 0		60	6 4.9	1,6 20	7.29~
		前年度		2 2	23	4 5	1 5	1 1	2 6	3 4		. 34	6 8.2	2,270	8.1~

2 ふ化放流成績概要

本年度は新たな交配種(F1)をつくらず、河川そ上の1代雑種F1間の交配による2代雑種60 千粒を生産し、勇別事業場に収容した。この卵子のふ化率は35%と低調で、更に、最終的には8 千尾の低い歩留りであつた。

これらの稚魚は F_2 の回帰確認のため、指ビレ、背ビレを切除する標識を施して湧別川へ放流した。第 2 表 昭和 4 3 年度交配種 (さけ \times からふとます) ふ化 放流成績表

海	水系	事業場	収容卵数	死卵数	お出	ふ化率	放	流	尾	数	放流期間	備	考
区			0.0		尾数	10-10-4-	無給餌	給	餌	計	AX VIG76 (H)	1/113	75
オホ			千粒	千粒	千糧	%	干粒	NR2		千粒	氢		
ホーツク	湧別	勇 別	60	3 9	21	3 5.0	8			8	3.25 - 3.26	F1	× F1
	∌1	本年度	6 0	3 9	21	3 5.0	8			8	3.2 5 - 3.2 6		
合	計	前年度	170	4 4	126	7 4.1	79			7 9	4.2 - 4.20		F2 を含む

-105-

§ 14.河口通過稚魚観測事業

1 実施方針

本年度の事業は前年度に引続き、観測精度を高めるため、簡易標識によるトラップ効率の決定、 稚魚の降河生態にもとづく観測体制の整備、観測業務、報告様式の統一を方針にして、根室支場の 当幌川、十勝支場のヌップク川、渡島支場の遊楽部川の3河川について実施・観測実施の困難な北 見・天塩・千才支場については休止した。

当幌川は前年度 観測場を河口近くに移し通過率が極端に低下したことから、飼育池を整備して飼育強化、放流尾数の確定等がどのように影響するかを中心に実施、ヌツブク川は養魚池の新設に伴つて放流尾数の確定が容易なことから 41年度の52.7%の通過率を再検する目的で実施 遊楽部川は噴火湾の拡大再生産計画に並行して河口通過数と回帰親魚の関係を明らかにするため前年同様の方法で実施した。

2 実施概要

(1) 観測対象稚魚の放流状況

第 1表 観測河川の稚魚放流状況

支	場	名	河	111	名	放流場所	放流期間	放流尾数	摘	要
根		室	当	幌]][計根別事業場	3/1~5/16	6,1 54,0 0 0	(体重) 0.3 3~0.8 5	給餌放流
+		勝	נע	ソプク	7)	十勝事業場	4/7~6/5	4,8 63,0 0 0	0.46~0.90	"
渡		島	遊	楽 部)()	八雲事業場	4/1~5/23	4,0 98,000	0. 4 2~0.8 1	"

(2)

第2表 観測河川の気象状況(旬別)

N/C	defil	111		3 月		4 月				5 月		6 月		
当	幌	}{}	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
気	温	°C	- 2.6	- 1.1	4.7	7.3	6.7	1 1.2	1 7.3	9.2	1 1.4	1 7.0	1 4.5	1 6.8
水	温	$^{\circ}$	-	0.35	0	2.2	4.0	6.9	1 0.6	9.9	9.0	1 1.6	1 0.9	1 4.4
水	梁	ст		147	177	1 2 5	1 3 2	105	9 6	100	104	100	103	101
Л	ф	m	-	1 7.6	1 7.6	1 7.6	1 7.6	1 7.6	1 7.6	1 7.6	1 7.6	1 7.6	1 7.6	1 7.6
流	速mノ	分	-	-	干満	の影響か	強く欠	則				κ		
流	量m ⁸ /	/分	-	- +										


					e 1										
×	ップ	<i>ا</i> اا	3	F	3		4	月		5)	1	6 月			7月
		2711	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上
戾	温	°C				7.0	1 1.8	1 3.9	1 8.2	1 6.7	1 3.3	1 8.4	2 3.5	22.6	2 4.5
水	温	$^{\circ}$ C			>.	3.1	6.3	6.9	1 0.4	1 1.1	9.7	1 0.1	1 1.0	1 1.8	1 1.5
水	深	cm		-		4.7	1 3.1	1 2.4	9.6	6.4	5.5	8.8	6.5	6.8	8.3
JII	ф	m				1 6.4	1 6.4	1 6.4	1 6.4	1 6.4	1 6.4	1 6.4	1 6.4	1 6.4	1 6.4
流过	東 m/	/分				4 1.6	5 7.9	5 5.7	5 0.2	4 6.4	4 4.7	4 9.6	4 6.9	4 6.5	4 9.4
流量	lm³∕	分	}		1	3 1.9	125.5	1 1 3.8	7 9.1	4 9.3	41.4	7 1.8	4 9.7	5 2.5	6 6.9

144	W +41	7 111		3 月		4	月			5 月			6	月
近	楽部	5)11 -	E	中	下	上	中。	下	上	中	下	上	中	下
気	温	°C	-4.1	-0.3	3.6	3.4	8.1	1 0.4	1 3.9	1 1.4	1 1.5	1 3.2	1 8.2	
水	温	°C	1.7	3.7	5.1	6.5	8.1	9.3	1 1.7	1 3.7	1 1.3	1 2.3	1 6.0	
水	梁	cm	37	3 9	44	5 7	5 3	48	3 9	3 0	3 4	46	2 5	
111	ιţ	m	3 9	50	8 0	101	107	107	7 8	65	6 5	9 2	5 2	
流	速加人	/分	0.19	0.21	0.77	1.0 5	1.0 4	0.91	0.8 5	0.83	0.69	0.79	0.5 9	
流	量m ⁸ /	/分	430	500	2,1 1 3	2.7 3 6	3.3 6 4	2.7 62	2.0 6 5	1.2 7 4	1.605	2.427	1.093	

第3表 河口通過稚魚観測状況

支場名	河川名(流下距離)	観測期間(乗網期間)	トラツブ設置場所	トラツブ基数、規模および設置方法
				基 数 2基
根室	当 幌 川 (40.0 km)	3/1~6/30 (4/2~6/26)	当幌捕獲採卵場 (計根別事業場 より40km)	規模 長さ 5 m 口径 0.5 m× 0.5 m 網目 6×6 m/m 4×4 m/m
				方法固定式
+		(104日間)	10年4年4年11年2月	基 数 4基
	ヌップク川 (17.6Km)	$4/2 \sim 7/15$ $(4/10 \sim 7/10)$	十勝事業場下流 9 km の愛国橋下	規 模 { 網目 4 m/m×4m/m
勝	i i			方 法 固定式・・・・トラップ末端
	-			から水路をもうけ網生簀に 連結
渡				基 数 4基
島	遊楽部川 (2 0.0 Km)	3/1~6/20 (3/25~6/13)	遊楽部捕獲場 八雲事業場より18 Km 河口迄2Km	普通 増水 3 基 1 基 口径 1 m× 0.5 0.5×0.5 長さ8 m×8 m 網目 6×6 m/m 本 4×4 m/m 方法 固定式
支場名	河 川 名	観測方法	推定総通過数	放 流 数 推定通過率%
根室	当 幌 川	隔 日(2 日) 24時間観測	1,128,997	6, 1 5 4, 0 0 0
十勝	ヌップク川	連 日 24時間 観測を実施	2,8 9 6,8 0 0	4, 8 6 3, 0 0 0 5 9. 6
渡島	遊楽部川	隔 日(1 日) 15時間観測	8, 1 6 0, 3 4 9	4,098,000 76.2

第 4表 放流と通過推定状況



(Ⅱ) 結果および考察

本年度は各河川毎にトラップ効率調査を前中後期の3回に分けて実施した結果当幌川(前期~0.28、中期0.96、後期0.48)ヌップク川(前期0.101、中期0.50、後期0.51)遊楽部川(前期0.11、中後期0.04)と前年同様、時期的、河川毎の変動が大きく法則性を見い出すことが出来なかつた。しかし本年は各河川とも前年に比較して一定時期に集中した降下傾向を示し、各河川共前年に比較して大中に通過率の向上が見られた。

当幌川

計根別事業場収容卵9,908千粒。出稚魚9,120千尾の55養魚池減耗2.968千尾を除いた6,154,000尾の飼育放流稚魚について3/1~6/30の間前年同様の方法、位置で観測した結果1,128,997尾(18.4%)の稚魚の通過を推定した。

この18.4%の通過率は他の河川に比較して低い数値ではあるが、前年通過率4.8%に比較すると大巾に向上している。

計根別事業場は、本年飼育池が整備され、このため稚魚の飼育強化と放流稚魚数の確定が行なわれ、 更に、上流域での餌料生物の発生時期に放流期が合致したこと等から通過率の向上が考えられ、前 年の通過率と対比した回帰率の向上が期待される。

ヌツプク川

十勝事業場収容卵子 6,256粒、ふ出稚魚 5,398千尾、養魚池滅耗 5,35千尾を除いた4,868,000尾の飼育稚魚について41年度実施した同じ方法、位置で観測した結果 2.896,800尾(59.6%)の通過を推定した。

本河川では連日 2 4 時間観測を実施、稚魚の逃逸防止のためトラップ入口に落差を与え、トラップ 末端から水路を作つて計数池に誘導する観測を実施したため、完全に逃逸の防止がなされ、計数精度 の高い観測結果となつている。

しかし本年新設の養魚池利用により放流尾数の確定を行なう計画であったが、稚魚の抑制金網の破損により一部逃逸したため放流尾数には若干の問題を残しているためこれ等を改善して継続実施する必要がある。

また本年の視測結果では 6 月以降に 3 3.3 %の降下稚魚があり、下流(十勝川本流域約 7 0 km)での水温上昇期の稚魚降下実態を調査する必要がある。

游楽部川

八雲事業場収容卵 5,0 7 2 千粒、ふ出稚魚 4,2 8 4 千尾から養魚減耗 1 8 6 千尾を除いた 4,098 千尾(給餌 4,0 4 3、無給餌 5 5)の稚魚について前年同様の位置方法で 3/1~6/20 の間観測した結果 3,1 8 0,3 4 9 尾(7 6,2 %)の通過を推定した。

本年の通過率は過去の平均通過率 4 7.0 %を大きく上廻つた結果となつているが、これは本年の飼育成績にも現われているとおり 稚魚の飼育強化放流時期が稚魚の河川降下時期と合致して減耗を少なくした結果と考えられる。

-110-

§ 15 降河稚魚保護事業

I 実施事項

本年度の放流稚魚に対する保護対策として下記事項について積極的に実施し、河川内における 稚魚の安全降河、減耗防止に努めた。 特に、本年度は最近にない不漁のため、各水系とも、そ の放流数が少ないことを考慮し、新規に河川パトロールを追加するなどして、更に保護の手を強 化した。

1. 稚魚の輸送放流

放流河川域に設置されているかんがい、防火用水等の取入口への稚魚迷入防止、或いは河川内の障害を回避するため、稚魚を安全地点まで輸送放流して、稚魚の減耗を防ぐ。また分散放流も積極的に行ない、生残り量の増大に努める。

2. 害鳥、害魚の防駆除

放流水路における害魚の駆除、或いは水路への害魚侵入防止を行ない、稚魚の食害を防ぐとと もに害鳥については稚魚の密集する水域を覆網あるいは威かく物で害鳥の飛来を防ぐと同時に、 地元猟友会の協力を得て、必要に応じ積極的に駆除する。

3. 河川清掃

放流水路に密生している水草及び流木、倒木等の各種障害物を除去して稚魚の安全降河を計る。

4. 河川パトロール

稚魚降河期の河川をパトロールして、稚魚の安全降河に努めると同時に突発的被害、今後の保 簔に対処する。

5. 弘報活動

管内における降河 雅魚の保護を更に強化するため、支場単位に、それぞれの地域に合った PR 用チラシを作成し、関係機関、団体に配付することにより、その徹底に努める。

11 実施結果

1. 稚魚の輸送放流

本年度、さけ稚魚については、15事業場から43水系の適地点へ38,876千尾を輸送放流して、取水口等への迷入防止、河川障害回避に努めた他、稚魚を良好な河川に分散放流してその生残り率の向上に努めた。 また、さくらます稚魚については3事業場で、からふとます稚魚については1事業場で実施した。

夫々の実施結果は別表のとおりである。

2. 害鳥、害魚の防駆除

(1) 害魚の防駆除

本年度は10事業場で刺網、曳網、タモ網、ウライ等を使用して、害魚の駆除を実施した。 また、これと並行して稚魚の食害状況を調査した。

食害調査については、害魚の採取が主として駆除に力点を置いていたため、各個所により、 採取時期がまちまちであるが、大体において昨年同様の傾向がみられた。 即ち、あめます、 いわな、にじますの稚魚食害の大きいことと、札内、幕別事業場の例のように、うぐいもそ の生息数の多い場合には 盛んに稚魚を食害することが観察された。

害魚の駆除並びに食害結果は、別表のとおりである。

(2) 害鳥の防駆除

本年度は各地域の猟友会の協力を得て、狩猟銃による害鳥の積極的駆除、威かくによる飛来防止を実施した。 即ち、10事業場で実施し、このうち、8事業場では上記の方法で、2事業場については古刺網による飛来防止を中心に行なつた。

実施結果は別表のとおりである。

3. 河川清掃

本年度は特に水草、雑草の密生或いは流沈木、土砂崩落のひどい放流水路をもつ下表の15 事業場で実施し、水路清掃を行ない、稚魚の降下を容易にした。

河川清掃実施事業場一覧表

支	場名			事	j	美	場		名		
北	見	北月	1								
根	室	羅日	日、伊	茶仁	、根	室、	計根分	别、	虹別、	厚床、	浜中
天	塩	徳る	京別、1	屯別	、中)11					
渡	島	八雪	、 尻	別、	利別	、厚	八部				

4. 河川パトロール

本年度より新たに加えた項目で、放流した稚魚の降河動向を監視して、その安全降河を計ると同時に突発的被害の防止並びにその対策と今後実施すべき保護手段を求めることを主眼として、19事業場、22水系で実施して、降河稚魚の保護に努めた。 実施結果は別表のとおりである。

5. 弘報活動

各地域の特性にあつた保護対策を行なうため、支場単位で降河稚魚保護依頼のパンフレッド、チラシを作成し、関係機関、団体に配付し、また、北見、根室、両支場管内においては主要河川に稚魚の保護を呼びかけた立看板を設置して、その徹底に努めた。

第2表 さけ稚魚輸送放流結果

				輸送	长放流場所		輸	送放流尾	数	輸
支場	事	業場	水	系	放 流 点	放流期間	輸送尾数	斃死尾数	放流尾数	官用車、借上車の別及び車種名
北見	網	走	網	走		4.15-4.16	千尾 1,000	千尾	千尾 1,000	官、借
			能取	文湖	鱒 取 川	4.23-4.25	1,000		1,000	" "
	北.	見	常	呂	端野大橋	4.20-5.10	702		702	官(1.5t車)
			ライコロ	1 1	栄 浦 橋	4.17-4.20	705		705	"
7-09-	湧	別	サベ	マッツ	河口上流約 1.2 Km	5.15	500	5	495	"
			バロ	- r		"	500	3	497	借 (2.5 t 車)
			幌	内	捕獲場上流 約800 m	4.24-4.26	1,500	11	1,489	借 (6 t 車)
	渚	滑	渚	滑	渚滑町 9 線	4,21-4.22	995		995	借(4t車)
			興	部	興部町7線	4,8 -4.12	500		500	"
	言	†					7,402	19	7,883	()-
根室	羅	白	植	別	at total	5.9 - 5.10	1,0 0 9	47	962	
			元無	崎異		5.12	500	4	496	
	伊索	仁	忠	類		5.20	500		500	
			古多	多糠	· ·	"	500		500	
			薫	別		"	1,000		1,000	
			標	津		5.14	145		145	
1	計材	艮別	春	別	*	4.24-4.25	1,0 0 0		1,000	
			床	丹		4.2 2-4.2 3	1,500		1,500	
	虹	別	標	津		5.1.2	500	2	498	-
			風	連		5.9 - 5.12	825	5	820	4
	Ē	+					7,479	5 8	7,421	,
十勝	釧	路	釧'	·路	弟子屈市街	3.28-4.15	7,3 7 1	42	7,329	借 (**ユピター) 2.5 t 車)
_			,	"	弟子屈町下鐺別	4.21-5.17	6,817	16	6,801	"
	i i	†					14,188	5 8	14,130	
天塩	天	塩	天	塩	ペンケナイ川	5.10-5.23	1,508	8	1,500	官(ヨシントクラウンペ)
	iii.	+					1,508	8	1,500	

送 方 法	1回	当りの輸	送状況		放流時の	#A 14 17 11
タンクの種類及び規模	事業場から放流点までの距離	酸素消費量	水量及び水温	輸送尾数	河川状況(水温、その他)	輸送目的
cm×cm×cm	Km	(酸素)(使用)	°C 4∼6	千尾	%	立体ふ化場(放流水路なし)
150×90×80 (キャルタ) 100×80×200 (アルミ製)	16	"	5 ~ 6			分散
	13	n	5~6	150	6~7	かんがい溝迷入防止、分散
.1111	5 0	"	3~4	140	4.5~5.7	
"	. 55	"	2.8~3.0	170	1 8.0	1
	2 5	"	4.5	2 5 0	1 9.0	分散放流
	106	"	2.5~3.0	300	6.0)
	5 7	"	3~4	340	9.0	立体ふ化場 (放流水路な
15×9×70 (キャンジ) 18×9×75 (")	3 2		7.2		3.5~9.2	L
キャンシスポリ容器その他	2 5.6		6~7.5		9	1
" "	3 0.2		6~8		8	
" " "	1 0.5		7~9		10	
" " "	1 2.3		7~10		10	
" " "	1 6.3		7~9		10	分散放流
キヤンバス製	1 1.8		8.5~9.0		1 1.5	
90×180×70 (アルミ製)	5 9.2		7~7.5		7	
"	6 5.7		7~ 7.5		6.9	
"	5 5.1				10~13.4	
"	6 7.0	×			10~11	
270×120×80 (キャル汉製)	9		1+on 7.4~	250~450	5.8~6.0 °C	釧路川上流部
270×120×80 (キャンス裏) #	1 1.5		1ton 7.6°C 8.5~ 120°C	150~550	PH5.1~6.4 8.7~1 0.2 ℃ PH 6.1~6.2增加	のAldオン障害
150×100×47 (ステハス製) 115×80×50 (キヤルン製)	. 75	50~90 Kg	650l 35-629 250l 50-589			かんが、溝、及び防止用水路迷入防止

				輸送	· 並流場所			輸	 送放流尾数	女	輸
支場	事美	类場	水	系		点	放流期間	輸送尾数	斃死尾数	放流尾数	官用車、借上車の別及び車種名
チオ	千	オ	石	狩	千才事業場 4Km下流	より	4.7	千尾 1,544	千尾	千尾 1.5 4 4	官(トヨ・シト・スタウト)
-			余	市	河口より上流	£4Km	3.30~4.4	1,000	-	1,000	借(シコピター)
			幌	満	河口より上流	E 1 Km	4.4	100		100	官(トヨペント・スタウト)
			幌	別	支 流		4.8	100		100	"
		,	元清	削	元浦川ふ化	場	"	100		100	"
			鵡	JIJ	鵡川捕獲場		4.9	100		100	
			勇	払	ウトナイ湖		4.9~4.25	835		835	
,			白	老	ウョロ川河 流 1.3 Km	口上	4.23	100		100	
			貫象	贰别	河口より上流	10Km	"	100		100	1.
	音	江	石	狩	音江捕獲場		4.2 5	452		452	
	静	内	幌	満				100		100	官(トヨヘツト・スタウト)
			幌	別	支 流			200		200	"
		×: ,	Ξ	石	延出川		3.24 4.12	77		7 7	"
			仁用	 E別	Ð		4.22~4.23	829		3 2 9	"
			静	内			4.9 ~4.10	811		811	"
je je			,	"			4.11~4.30	1,343		1,343	"
			新	冠	アクマツブ	Ш	325, 4.16	241		241	"
			沙	流	トマツブ川		3.2 6, 4.1 5	254	-	254	"
	敷	生	白	老	白老捕獲場(何口から上流)	1.5Km)	2.12	151	1	150	借
			敷	生	鉄橋下(河)流1Km)	口上	3.13	40		40	借
			メン	ソブ	河口上流 1.0	Km	2.12	222	2	220	借
			III.	it				8,199	8	8,196	
渡島	八	雲	長刀	万部	長万部町字美	畑	5.5.6	50		5 0	官(マスターライン)
			朱	太	黒松内町		5.15	50		5 0	"
			Dish	H				100		100	
合	İ	計			1 '			38,876	146	3 8,7 3 0	

送 方 法	1 回	当りの頼	爺 送 状 況		放流時の	
タンクの種類及び規模	事業場から放流 点までの距離	酸素消費量	水量及び水温	輸送尾数	河川状況(水温、その他)	輸送目的
cm×cm×cm 100×80×200 (アルミ製)	Km 4	- v	원 8.5	千尾 500	°C 9.2	迷入防止
キャンバス製	116		8.5	900		1
100×80×200 (アルミ製)	179	-	8.8	100		
"	175		8.4	100		
"	15		8.4	100	-	分散放流
キヤンバス製	511		8.5	100		
"	2 4		9.0	200		
"	5 6.1	,	9.0	100	13)
"	1 3 5.6	8	9.2	100	1 4.5	かんかい溝迷入
//	3			100		(4)
100×80×200 (アルミ製)					PH 7.2	
キヤンバス製	6 5		7.5		58~10.3	分散放流
キヤンバス製、アルミ製	3 6		5.6~9.5		6.5~9.0)
100×80×200 (アルミ製)	8.9		9.6~1 4.5			el.
"	4.5		8.5~1 1.9			
"	2.5		6.4~1 2.5		6.9~ 7.1	A #6+67#
キヤンバス製、アルミ製	2 7		7.4~ 9.9		62~10.7	分散放流
	5 0		7.1~ 9.9		3.5	7
ポリ袋 (70cm×85cm)	16		9.0	151	4.8	分散並びに 取水口迷入 防止
"	8		"	40	5.1) BOTE
. //	"		"	110		
ステンレス製	5 2		7.0	5 0	12.4	D #6.46.75
"	6 4		7.0	5 0	122	分散放流

第3表 さくらます稚魚輸送放流結果

			輸送	送放流場所	11649	輪	送放流尾	数	輸
支場	事業場	水	系	放流点	放流期間	輸送尾数	斃死尾数	放流尾数	官用車、借上車の 別及び車種名
北見	渚 滑	渚	滑	ウツツ川 (ウツツ村)	129~2.10	千尾 906	千尾	千尾 906	借 (2 t車)
天塩	徳志別	徳	志別	支流旧河川	1.9	279		279	馬ソリ
渡島	尻 別	尻	別	目名川 (国道 5号 線と目名川との合 流点)	5.15~5.16	780		780	官
	計			1 4 4 1		1,965		1,965	

送 方 法	1 回	当りの車	輸送状況		放流時の	
タンクの種類及び規模	事業場から放流 点までの距離	酸素消費量	水量及び水温	輸送尾数	河川状況(水温、その他)	輸送目的
cm×cm×cm 150×90×70 (キャンバス製)	Km 11		°C	千尾 100	°C 0.7 結水	,
120×80×60 (キャンパス製)	0.3		5	93	3.0	
ステンレス製	5.5		8	110	1 0.9	

第4表 からふとます稚魚輸送放流結果

支場事業場	14	輸	送放流場所		輸	送放流尾	数	輸	
支場	支場事業場		系	放流点	放流期間	輸送尾数	斃死尾数	放流尾数	官用車、借上車の 別及び車種名
						千尾	千尾	千尾	
北見	渚 滑	渚	滑	ウツツ川 (^{ウツツ木}) 1 1線	2.18~2.28	486		486	借 (2 t 車)

ž	* 方 法	1 回	当りの輔	6 送 状 況	,	放流時の	
	タンクの種類及び規模	事業場から放流 点までの距離	酸素消費量	水量及び水温	輸送尾数	河川状況(水温、その他)	輸送目的
	$cm \times cm \times cm$	Km		°C	程	°c	
1	50×90×70 (キャンバス製)	11		7.2		0.7~0.9	立体

第5表 害魚駆除並びにさけ、ます稚魚食害結果表

	1				7 作	
支	場	実 施	採取期間	採	取 場 所	採 取 漁 具
_	- 9/3	事業場	(実施日数)	水系	区間	
北	見	湧 別	3.1 0~5.1 0	湧 別	河口附近	長さ55m、幅35m 曳網(網目5cm)
根	室	伊茶仁	3.20~6.30	伊茶仁	伊茶仁事業場から河口まで	刺網、タモ綱
			()		の伊茶仁川	
	- }		` /		O N L	
		虹 別	3.8 ~4.18	虹 別	養魚池から下流 100 m地	エンビ製ウライ捕獲槽(害魚
			(全期間)		点	そ上防止、駆除用)
	1					
		計 根 別		当 幌		
+	勝	太田	5.8 ~5.31	尾幌	太田事業場から尾幌川合流	刺網
			(22日間)		点までのホマカイ川とその	
			(= = 1.15)		合流点から河口までの尾幌	
					Ш	
		_				
		鶴居	3.1 5~5.2 0	芦 別	鶴居事業場から雪裡川合流	刺網
		,,,	(6日間)		点までの芦別川	
				111	시 _ = ***	±1/452 (452 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		札,内	4.3 ~4.26	面川	札内事業場から十勝川合流 点までの面川	刺網(網目3.0cm、3.6cm、 巾 1.6 m、長さ 8.2.m)
			(20日間)		がま この面川	110 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
						ドウ(60×60×90cm)
		幕別	3.18~4.20	旧途別	幕別事業場から幕別川合流	刺網(網目 3 cm、長さ 8.2 cm、
		,,,,	(29日間)		点までの旧途別川	巾 1.6 m 3 反、網目 4 cm、長
			(2 0 1111)			さ8.2 m、巾1.6 m 2反)
						ドウ9 2×4 0×4 0cm 4個)
		十 勝	5.1 ~6.21	ヌップク	十勝事業場から愛国橋まで	刺網
			(36日間)		のヌップク川	トラップ
			(HIED)			
				at the man	High Late (but to 11) 1 the Line	
天	塩	徳志別	2.10~4.30	徳志別	放流水路(無名川)と徳志	木製ウライ捕獲槽(害魚そ上
			(全期間)		別川との合流点	防止ウライ)
渡	島	八雲	3.2 ~6.1	セイヨウベツ	八雲事業場稚魚池に接する	木製小型ウライ
仮	(EE)	八云		0,00	区域	
			(21日間)	· ·		タモ網

	採		取	魚	有	前食さ	h-	ていたさけ	ます稚魚	/告 -14
	魚	種	尾 数	体長範囲	魚	種		尾 数	体長範囲	備考
		,	. 尾	(フォークレクス)cm		-			cm	
2	۲.	N	899	12~25			_			
	めま	す	39	1 0.8~1 9.0	さ	H		50	3.3~5.0	
N	わ	な	63	1 0.0~2 5.6		//		111	3.4~5.0	
-	しよろさ		17	12.4~18.0		"		42	3.6~4.9	
	じま		8	1 3.0~3 4.0	さ	H		3 4	3.0~4.0	
あ	めま	す	5	1 3.0~2 3.5		"		17		
か	C	カュ	10	1 1.0~1 4.0		//		16		
5	わ	な	4	15.5~18.5		"		0		
P	玄	ベ	в	1 3.0~2 0.0		#		8 8		
				~						
あ	めま	す	77	27.0~40.0	さ	1	+	5 0	3.5~4.5	
か	じ	か	4.5	9.5~18.5		#		3 0	8.7~4.5	
3	<*	\Diamond	8 8 5	17.0~32.0		#		0		
カコ	ħ	5	31	14.5~27.0		//		2	4.5~4.0	
h	٤	9	7	3 2.0~5 5.0		//		0		
か	じ	カュ	2 2	4.7~13.5						
				~						
IC	じま	す	1	~	3	1	+	0		
か	C	か	11	9~ 2.0		//		40	3.6~4.6	
5	<-	5	272	10~ 3.0	-	//		62	3.6~4.8	
10	じま	す	1	* ×	3	1	+	0		
5	٤	9	2			//		3 6		
5	<-	S	886			//		727	3.8~5.0	
1/2	じま	す	18	24~ 36	3	V	+	361	3.5~5 5	トラップ採取は河口
カュ	C	カコ	18	10~ 23		"		82	3.6~5.4	通過稚魚観測事業と
5	<-	b	720	6~ 38		11		0		並行して実施
P	重	~	2	12~ 14	から	ふとます		2		
5	<-	S	94	5~ 27						
Į	じょ	9	2							
か	Ľ	カン	8				1			
	じょ		4.7							
	· ·			1	1		-			1

第6表 害鳥の防、駆除並びにさけ、ます稚魚食害結果表

支 場	実施事業場	実施 期間	実 施 区 域	実 施 内 容
北見	岩尾別		事業場の放流水路及びこ れに接する岩尾別川	放流稚魚が滞留する個所を古網で囲い害鳥 の飛来を防除
	斜 里		事業場稚魚池とそれに接 するエトンビ川	池、水路に飛来して飼育中の稚魚を食害する 害鳥を古網で防除
	網走	4.11~5.10	網走湖口より上流 1,500 mの間及び能取湖鱒取川 河口を基点として左右各 500 mの区域	鳥獣捕獲を得て、地元猟友会の協力により 積極的に駆除
	北見	4.1 0~5.3 1	常呂川、ライトコロ川及 びサロマベツ川の放流点	地元猟友会(網走支部常呂分会)の協力により積極的に駆除
	渚 滑	3.1 ~5.31	港滑川河口を基点として 上流 2 0 線地先の本流並 びに支流に至る区域	地元猟友会(紋別支部)の協力により積極 的な駆除並びに威嚇
根室	羅白	5.1 ~ 6.10	事業場から河口までの羅 臼川	放流稚魚の降河、降海期間に河川内ではカモ等、河口ではカモメの食害状態を観察を 主体にして調査
十 勝	幕 別	4.18~6.30	幕別、札内、十勝の各放 流河川である旧途別川、 面川、ヌツブク川の各全 域	狩猟者2名の協力により積極的な駆除と威. 嚇
天塩	徳志別	1.20~4.30	捕獲場下流徳志別川と放 流水路	放流水路については約400mの区間に古 刺網を張り飛来の防止並びに駆除を行なう 他本川では猟銃で積極的に駆除
	屯 別	2.1 5~5.3 1	ウソタン川流域一円	狩猟者 3 名の協力により積極的に駆除
	中川	2.1 3~4.1 8	事業場から天塩川合流点 までのパンケナイ川	

		害		鳥		0		駆	: B	余门。	v -				
XPH	X024	В		駆	除	害	鳥		捕	食.	稚	魚	1	備	考
94	猟	共	種		類		羽		種	類		尾			
													×		
	刺									*					
散	弾	銃	李	が	b			5		_			-		
	"														
	"		か		\$			2		_		,	-	,	
散	弾	銃	きんほお	じんろ じょる か	じろ が も ん			1 3 2 1 2					- - - -		-
猟古	刺	銃綱	かまし	から	ももぎ			0		_			_		
散	弾	銃	まか	から	\$			8		_			-		
	"		かも	(総	称)		1	8							

第7表 河川パトロール結果表

	実	施	パトロール期	1	トロール区域	
支場	1	業場	間(回数)		区域	パトロール状況及び結果
北見	斜	里	4.19~526	斜里	事業場から河口まで の間のエントピ川及 び斜里川	エトンビ川に注入する澱粉工場廃水、斜里川 本川の砂利採取等のもとでの稚魚の降河を監 視した。
	網	走	5.20~7.15	網走	網走湖と湖から河口 までの網走川	雅魚の放流を網走湖とその下流の網走川の2個所で放誕しているため、前者は主として湖内ワカサギ漁による混獲防止を後者についてはその動向観察を主眼として実施した。この結果、河口附近において多量のさけ稚魚が釣獲されていたため、直ちに網走支庁水産課と協議して釣獲防止のPR活動に努めた。
	渚	滑	4.8 ~5.20 (4)	清滑 興部	渚滑…放流交流と河口付近 用部…興部町 7 線と 河口付近	放流稚魚の動向観察、興部川は砂利採取のため汚濁が甚だしかつた。
根室	虹	別	4.1 5~5.7 (1 5)	西別	事業場から別海大橋 までの西別川	降河する稚魚の追跡を行なつたが、パトロール区域においては特に稚魚の降河に支障となる要因はなかつた。河川水温は 6.0~1 3.0 ℃
十勝	太	田	5.1 ~5.8 0 (10)	尾幌	事業場から河口まで のホマカイと尾幌川	害魚駆除と合わせて、降河稚魚の動向を観察 した。稚魚の安全降河に支障となるものはな く、順調に降河していた。
	鶴	居	62 ~616 (10)	雪裡	事業場から釧路川合 流点に至るまでの芦 別川と雪裡川	左記の区間においては、稚魚の迷入等の障害 環境はないが、害鳥、害魚が多いのでこれら の防駆除によつて、稚魚の安全降河の期待が 増大すると判断された。
	札	内	4.3 ~4.2 6 (7)	十勝	事業場から千代田堰 堤までの面川と十勝川	面川については害魚駆除と合せて実施し、河 川内の障害物除去と稚魚の降河状況を観察した
	幕	別	3.10~5.10 (7)	旧途別	事業場から猿別川合 流点までの旧途別川	害魚駆除と合せて実施、4月12日頃からの 融雪増水で、湿地帯の一部が湖水化して、そ こえ稚魚が多数迷入したが被害はなかつた。 5月下旬には上流域の稚魚が少なくなり猿別 川合流点付近で大群を形成していた。本年度 稚魚の生長が良好だつたためか降河が早かつた
	+	勝	5.15~5.81 (14)		事業場から札内川合 流点までのヌップク 川	ヌップク川は川巾が狭く、流速の小さい河川であり、その上、腰粉工場廃水、砂利選別排水、農薬等の流入する河川であるため、これらによる降河稚魚を保護することに力点を置いてバトロールすると同時に関係団体に協力を要請した。

-124-

支場	実 施	パトロール期		トロール区域	パトロール状況及び結果
,	事業場	間(回数)	水.系	区域	T TO IX O'MIX
	大 樹	5.1 0~5.2 7 (18)	歴舟	大樹橋から河口まで の歴舟川	歴舟川は川巾が広く(150~800m)急増水する河川であり、河川水の変動が激しいので、 このため生ずる降河稚魚の減耗防止に努めた。
天塩	徳志別	4.3 ~4.3 0	徳志別	事業場から河口まで の徳志別川及び河口 付近の沿岸	稚魚の降下状況に応じて随時パトロールしその観察に努めた。沿岸域では右岸山臼漁港付近で多くの稚魚の滞留が見られたが、左岸1,500 m 北寄りのオチャラベ川北にもからふとます、さけの稚魚の遊泳が見られた。
	屯 別	4.21~5.22 (16)	屯別	事業場から 6 線地先 までのウソタン川、 屯別川	本年度は比較的低温であつたため山間部の融 雪がおくれ、そのため急激な増水もなく、稚 魚の降河には極めて良好であると判断された。
	中川	5.1 7~5.3 0 (14)	パン ケナイ	事業場から天塩川合 流点までのペンケナイ川	稚魚の放流期の河川増水期が重なつたため、 あまり滞留せず、天塩川へ降河した。
千才	千才	4.10~4.22 (10)	千才	事業場から西越採卵 場までの千才川	放流稚魚の追跡観察を行なつた。
	静内	49 ~4.29 (21)	静内	事業場から河口までの静内川・	放流稚魚の追跡観察を行なつた。
	敷 生	213~8.31 (15)	メツプ白老敷生	メップ・放流点の上流 500km、下流 1,000 m の間、白老・・放流点の 上流 560 m、下流 1,500 mの間、敷生・・放流点 の上流 500 m、下流 1,000 mの間	メップ、白老、敷生の3河川に放流した稚魚 の降河動向を監視した。稚魚は放流当日に大 部分が降下し、一部はとどまつたが、そのう ちの多くが上流500 m地点までそ上し、そ の付近で10日前後留まり、その後急速に降 河したように観察された。3河川とも河川状 況が良好で稚魚の被害は認められなかつた。
渡島	八雲	2.20~5.31 (40)	遊楽部	事業場から砂蘭部川 合流点までのセイヨ ウベツ川、遊楽部川	降河に支障となる障害物の除去と増水後に生 じた水溜りに取残された稚魚の本川還元と通 水を行ない、安全降河に努めた。水溜部から 放流及び通水によつて2万尾位の稚魚を安全 降河させた。
j.	利別	3.1 1~8.3 1 (1 0)	利別	事業場から利別川合 流点までの冷水川と 合流点から下流 2 Km までの利別川	水田取水口よりの迷入有無と降河状況を観察 実施した。また増水後の河川水溜部に取り残 された稚魚の放流に努めた。
	厚沢部	2.25~2.28	目名	放流水路並びに目名川	河川の清掃と合せて、稚魚の安全降河に努めた。

§16 稚魚、飼育事業

1 飼育事業経過概要

本年は捕獲採卵成績の不振を考慮して飼育可能な30ケ所で飼育を実施し過去の平均飼育放流率

第1表 89年~48年の5ケ年間における飼育実績

		39 年 度			40 年 度		4	41 年
支場	実 施 事業場 (A)	放流尾数 (B)	飼 放流率 (C)	A	В	C	A	В
北見	2	千尾 1 9,5 6 9 5 4,0 1 0	% 3 6.2	2 9 (1)	1 9,3 5 7 8 6,9 6 8	2 2.8	5 8	3 1,4 5 9 5 5,4 0 6
根室	1 1 0(1)	1 9,7 2 4 1 2 1,6 9 3	1 6.2	1 11 (3)	19,999	1 0.3	4 1 5(6)	4 5,2 1 8 1 1 2,4 5 8
十勝	3 7	5 3,7 9 3 1 1 7,3 3 8	4 5.8	5 1 0 (3)	6 5,7 7 1 1 8 5,1 8 5	3 5.5	7 7	5 8,1 7 1 6 4,4 7 6
天塩	· 1 5	6,1 8 5 1 8,6 1 4	3 3.2	1 5	5,8 2 0 2 5,5 7 4	2 2.8	4 4	10,433
チオ	1 6(1)	3,089 10,880	2 8.4	1 8 (1)	8,5 4 7 3 4,1 2 5	2 5.0	6(3) 9(4)	8,5 8 8 1 3,5 9 0
渡島	6(1)	1,2 8 5 1 1,9 2 6	1 0.8	1 8 (3)	1,7 8 0 2 2,9 9 0	7.7	3 7(3)	3,628 14,856
(計)	9 4 2(3)	103,645	3 1.0	11 51 (11)	1 2 1,2 7 4 5 4 9,2 7 7	2 2.1	2 9(3)	1 5 7,4 9 2 2 7 2,0 3 6

註 年度は事業年度

欄中の括弧内数字は民間簡易ふ化場数 上段は飼育、下段は放流総数 飼育放流率=飼育放流尾数/総放流数×100 4 3.8 %を大きく上廻る 9 2.4 %となつて 1 9 1,6 2 8 千尾のさけ稚魚飼育放流が実施された。 この外さくらます 2 8 2 千尾、からふとます 9,6 8 0 千尾、ひめます 5 3 8 千尾、ますのすけ 6 9 9 千尾等が実施された。過去 5 ケ年間の飼育経過の詳細は第 1 表の通り

度	4	2 年 度		4	3 年 度		5 ケ年 ³	平均(39~	43年)
C	A	В	C	Ą	B.	C	実 施事業場	放流尾数	飼 育 放流率
5 6.8	4 7(1)	3 8,3 0 5 8 7,5 4 3	4 3.8	5 7	8 0,6 5 0 8 2,0 4 9	9 5.6	4· 8(1)	千尾 27,868 63,195	% 44.2
4 0.2	5(1) 1 2 (5)	47,012 132,331	3 5.5	6 9 (2)	7 4,2 0 8 7 8,8 7 8	9 4.1	3(1)	41,231 127,958	3 2.1
9 0.2	6 9 (3)	9 3,6 0 3 1 4 1,5 4 4	6 6.1	7 9(2)	61,058 64,056	9 5.3	6 8 (2)	6 6,4 7 9 1 1 4,5 2 0	580
9 2.7	4 5(1)	1 5,1 7 8 2 3,6 8 9	6 4.].	6(1) 8(3)	1 3,0 2 8 1 3,5 4 3	9 6.2	3 (1) 5 (1)	10.129	5 4.7
6 3.2	3 8 (4)	1 0,0 7 7 3 0,6 5 0	3 2.9	3 7 (3)	7,6 4 5 8, 5 3 7	8 9.6	3 (1) 8 (3)	7,5 8 9 1 9,5 4 0	3 8.9
2 4. 4	7 6(3)	6,986 18,972	3 6.8	3 7 (3)	5,0 3 9 1 0,3 7 5	4 8.6	2 7(3)	3,7 4 4 1 5,8 1 4	2 3.7
5 7.9	2 4 (1) 4 7 (17)	2 1 1,1 6 1 4 3 4,7 2 9	4 8.6	3 0 (1) 4 7 (13)	191,628	9 2.4	21(1) 47(1)	1 5 7,0 4 0 3 5 9,5 6 2	43.8

2 当初飼育計画

本年度の増殖計画は、採卵数 6 5 5,0 4 0 千粒、放流尾数 5 2 4,0 3 1 千尾を見込んだため、 当初飼育計画は飼育放流率 5 2.0 % に当る 2 7 2,0 0 0 千尾の飼育を計画した。その内容は第 2 表のと かり。

第2表 当 初 飼 育 計 画 数

支 場	飼育 場	飼育尾数	支 場	飼育場	飼育尾数
北 見 (4ヶ所)	斜 網 走 見 湧 別 (計)	千尾 7,000 6,000 6,000 22,000 41,000	天 塩 (5ヶ所)	德 歌	千尾 5,000 1,000 2,000 8,000 9,000
根 室 (5ヶ所)	羅伊中計紅針別	6,000 22,000 7,000 8,000 51,000 94,000	千 歳 (3ヶ所)	千 歳 敷 生 静 内 (計)	2 5,0 0 0 6,0 0 0 2,0 0 0 5,0 0 0 1 3,0 0 0
十 勝 (5ヶ所)	太 鶴 十 幕 利 内	6,0 0 0 1 2,0 0 0 1 1,0 0 0 2 6,0 0 0 3 3,0 0 0	渡 島 (4ケ所)	利 別 八 雲 厚 沢 部 尻 別 (計)	2,500 6,000 1,500 1,000 1,000
	(計)	8 8,0 0 0	26ケ所	合 計	2 7 2,0 0 0

3 本年度稚魚飼育事業

1) 実 施 方 針

本年度の捕獲採卵成績の不振を考慮しながら下記の事項を事業方針とした。

- 1. 推進整備計画の方針にもとずく、日本海区、襟裳以西海区の飼育強化をする。
- 2. 稚魚強化のバロメータを増重において摂餌要求に応じた積極給餌を行なう。
- 3. 飼料は乾燥配合餌料に統一実施する。
- 4. 事業効率を高めるため細部実施計画を支場立案とする。
- 5. さけ稚魚以外の稚魚についても一部飼育を実施する。

2)事業実施要領

当場の事業実施要領を中心に索餌場所整備、餌料係数、給餌率表、放流 適 期、分散放流等を考慮して実施した。

3) 事業実施結果

1. 実施事業場

本年の採卵成績の不振(241.114千粒)から飼育可能場の全場飼育を方針としたため 当初計画より、飼育尾数では77.523千尾減少したが、飼育場では、岩尾別、厚床、釧路、 大樹事業場、増毛民間ふ化場を追加、収容の関係から尻別事業場を中止して第3表のとおり 実施した。

第3表 43年度飼育場別飼育尾数

支 場	飼 育 場	飼育尾数	支 場	飼 育 場	飼育尾数
北 見 (5ヶ所)	岩 解 組 選 見 別 (計)	千尾 2,0 8 7 5,9 3 4 1 0,0 2 0 2,2 4 4 1 0,7 0 2 3 0,9 3 7	天 塩 (5 <i>ケ</i> 所+ 1ヶ所)	德歌 頓 中 天 (增 (計)	千尾 2,068 2,807 905 5,250 1,520 892 13,452
根 室 (6ヶ所)	羅伊中計 虹厚(計)	5,9 3 0 1 1,7 7 5 5,1 6 0 8,8 5 4 4 3,5 4 2 2 0 2 7 5,4 6 3	千 歳 (8ヶ所)	千 歳 敷 生 静 内 (計)	4,0 5 0 4 1 8 3,3 9 2 7,8 6 0
十 勝	太 釧鶴幕 札 十 大 (計)	3,400 14,392 8,500 10,900 17,740 5,290 1,406	八 雲 (3ヶ所) (29ヶ所+ 1ヶ所)	利 別 厚 沢 部 (計) 合 計	7 0 8 3 1 0 5, 1 4 3

4) 餌 料

従来、生配合餌料を使用していたが、稚魚の生理機構および飼育事業の合理化の観点から乾燥配合餌料に統一し、餌付用粉末を総餌料の10%にして良好な結果を得た。その成分は第4表の通り

第4表 43年度使用餌料成分表

主成分	配合成分	微量添加物	備,考
粗脂肪 5.6 粗繊維 0.4		VB 6、VB 12、ニコチン酸	クランブル 粒径 0.5~1.69 粉 末 // 0.1 %以下 粉末はクランブルを粉砕したもので総餌料の10%製造

-130-

5) 実施状況

本年度の飼育事業は6支場29事業場、1民間ふ化場でさけ、194,488千尾(其の他は別途)の稚魚に乾配(クランブル)62,886段を1月10日から6月4日まで給餌、歩留98.5%で191,628千尾を飼育放流し飼育率92.4%となつた。成績は、体長成長率1.5倍体重成長率8.1倍と前年に比較しても良好な成長を示し当初の計画目標(増重比2.0)を大きく上廻つた。

1. 飼育池の状況

前年同様稚魚池の稚魚が80~90%浮上した頃から稚魚池の水位を高め(20~50cm)で飼育池として給餌し易い条件とした。また本年の放流尾数の不足を稚魚の強化でカバーするため、稚魚池から放流河川に連絡する部分に仮設の索餌場所を設備、水深10m前後を確保して給餌効果を高めた。飼育用水の不足している網走事業場では、親魚蓄養池に網生簀(クレモナ4%)を設置して飼育池の整備を実施、給餌効果を高めた。飼育密度は1㎡当り9566尾となつて前年度11600尾に比較して薄い密度となつている。これは飼育尾数の減、素餌場所整備による飼育施設の拡大のためであるが、増重倍率が31となつているため実質密度は前年を上廻つている。飼育用水量は各飼育場の条件によりまちまちであるが全道平均用水18/分当り、4、229尾で前年度より若干尾数減となつているが増重倍率の関係から飼育密度と同様の関係にある。水量不足から稚魚の一部斃死を生じたケ所は、網走、北見、羅臼、中標準となつているが、増重強化にともなつて全道的に飼育用水量の不足傾向を示している。水温は全道平均7.5℃と前年とほぼ同様であつたが、北見、十勝支場管内の岩尾別、網走、幕別、十勝事業場では飼育期間中10.0℃以上の水温較差を生じた。

2. 給餌および摂餌状況

使用餌料は乾燥配合餌料に統一し、餌付用粉末餌料を前年度より $\frac{1}{3}$ 滅じて当場の事業実施要領にもとずいて餌付初期は粉末給餌を行ない、3日頃から少量のクランプルを添加、10日目頃から、クランプルのみとする前年同様の方法で良い成績を収めた。

特に本年は手動および動力式の散粒機を整備して給餌作業の効率化をはかつた。 稚魚の摂餌要求は各飼育場の水温、水量、水質等の飼育環境によつて差異はあつたが全般的 に好調であつた。

3. 成長保留

全道平均成長率は、体長 1.5 倍、体重 3.1 倍と当初の目標を大きく上廻つた良好な成績を得たが、全道の平均餌料係数が 0.5 となつており、標本抽出方法、放流尾数の確定等について検討する必要がある。歩留は全道平均 9 8.5 %と前年度の成績に比較して良好な結果を収めたが、飼育用水量の不足および千才、伊茶仁事業場に発生した魚病(縮瘡病,サイクロキーター)等の問題もあり、飼育環境の整備を実施して今後一層の成績向上をはかる必要がある。

6) 実施結果

稚魚飼育事業の詳細な成績は第5表の通りであるが、各支場別の飼育結果は次の通り

第5表昭和43年度飼育事業成績

(飼	育	4人 <i>於</i> 17 回。	\$\frac{1}{4}\frac{1}{4	飼	育	尾数	女	浮上	魚体	2	微石厂米位	放	流	尾	数
場	名)	給餌量	実施期間	尾	数	重	量	体 長	体	魚	斃死数	尾	数	重	量
		Kg			工星		Kg	cm		g	千尾		千尾		Kg
岩尾			3/10~5/20		37		611	3.4	0.3		12		,025		972
斜	里		3/1 ~5/9		34		077	3.4	0.3		4.4		,890		6,479
網	走		3/1 ~5/10	1 0,0			204	3.0	0.3		160		,860		8,827
北	見		3/17~5/7	2,2	244	,	875	3.7	0.3	9	34		,210		1,364
湧	別	3,040	3/7 ~5/24	10.7	02	3,	555	3.4	0.3	3	37		,665		7,383
(計)	9,400	3/1 ~5/24	3 0,9	37	10,	322	3.4	0.3	3	287	30	,650	2	24,525
羅	日	2,160	3/13~5/10	5,9	30	- 1,	779	3.2	0.3	0	113	5	,817		7,092
伊茶	仁	3,877	3/20~5/31	11,7	775	3,	784	3.5	0.8	3 2	300	11	,475		9,032
中標	津	1,150	3/20~6/4	5,1	60	1,	592	3.5	0.8	31	155	5	,005		3,747
計根	别	2,560	2/20~5/16	8,8	354	2,	595	3.5	0.2	9	200	8	,654		5,725
虹	別	12,740	2/20~4/20	43,5	542	14,	368	3.3	0.8	3	485	4.8	3,057		17,894
厚	床	100	3/2 ~5/5	2	202		80	3.0	0.4	60	2		200		260
(3	-)	22,587	2/20~6/4	7.5,4	163	24,	198	3.5	0.8	3 2	1,255	7.4	,208	_ ′	7 3,7 5 0
大	田	770	3/21~5/20	3,4	400	1,	170	3.4	0.8	3 4	82	8	,318		2,097
釧	路	5,210	2/28~5/15	14,8	392	4,	807	3.3	0.8	3	58	14	,334	:	0.636
鶴	居	2,330	3/1 ~5/20	8,8	500	2,	635	3.2	0.8	3 1	80	8	3,420		12,461
幕	別	4,960	3/1 ~5/7	10,9	000	5,	450	3.7	0.5	0	270	10	0,630		L 4,882
札	内	7,810	2/4 ~4/30	17,	740	5.	273	3.8	0.4	b	10	15	7,730		24,290
+	勝	1,820	3/29~5/20	5,2	0 6 5	2	169	3.8	0.4	l 1	27		,263		4,895
大	樹	400	2/26~4/15	1,	406		590	3.6	0.8	3 2	43]	,363		1,799
(言	(1	23,300	2/4 ~5/20	61,6	328	22	094	3.5	0.8	3 6	570	6]	,058		71,060
徳志	別	1,100	2/10~4/15	2,0	068		682	3.5	0.8	3 3	12	2	2,056		3,701
歌	登	170	2/18~3/6	2,5	807	1	,096	3.8	0.8	3 9	307	1	2,500		1,087
頓	別	570	2/1 ~3/31	1	905		332	3.5	0.3	3 6	, 5		900		1,164
中	Ш	960	2/3 ~5/31	5,2	250	1	459	3.5	0.2	8 5	47	:	5,203		13,682
天	塩	610	4/1 ~5/14	1,	530	-	520	3.4	0.8	3 4	30		1,500		1,065
(増	毛)	520	5/1 ~6/4		892		339	3.4	0.8	3 8	22		870		814
(計	t)	3,930	2/1 ~6/4	13,	452	4	,429	3.5	0.3	3 3	424	18	3,028		21,513
千	歳	525	2/25~4/25	4,	050	1	,208	3.4	0.2	8 2	71		3,9 7 9	1	2,109
敷	生	174	1/10~3/12		418		148	3.3	0.3	3 5	8		410		447
静	内	780	1/27~4/26	3,	392		946	2.9	0.2	8 8	136	1	3,2 5 6		1,930
(計	-)	1,479	1/10~4/26	7,	860	2	,302	3.5	0.5	2 9	215		7,645		4,486

-	放流	魚体	11- 677	1米手Ue	成長	長率	水温	°C	D.,	- D.O.	水 量	飼育面積
1	体長	体魚	歩留	增重比	体長	体重	低~高	平均	PH	DO	0/分	m²
1	cm	8	%		cm	8	(°C)			ppm		
	3.8	0.4/8	9 9.4	1.6	1.1	1.6	2.0~13.0	7.1		,	150	209
	5.5	110	9 9.3	3.1	1.6	3.1	7.8~ 8.0	7.9		7.6~1 0.4	1,000	. 922
	4.6	0.84	98.4	2.6	1.5	2.6	1.0~14.5	8.6	6.8~7.2	5.8~11.7	380	985
	4.3	0.62	9 8.5	1.6	1.2	1.6	5.8~ 8.6	7.2	6.5	8.3	650	569
	4.5	0.69	9 9.7	2.1	1.3	2.1	6.0~ 9.5	7.6	6.3~6.5	6.9~ 9.4	6,000	944
	4.5	0.80	99.1	2.4	1.4	2.4	1.0~1 4.5	7.7			8,180	3,629
	4.6	122	98.1	4.1	1.4	4.1	4.5~12.0	8.2	7.0~ 9.1	7.4	900	594
	4.8	0.79	9 7.5	2.5	1.4	2.5	4.8~14.5	9.7	6.8~7.4	12.7~13.2	3,880	985
	4.4	0.75	97.0	2.4	1.3	2.4	4.0~1 2.4	8.6	6.8~7.1		936	5 5 8
-	4.3	0.6 6	97.7	2.3	1.3	2.3	6.2~ 8.4	7.1			220	300
	5.0	111	9 8.9	3.4	1.5	3.4	9.0~ 9.8	9.5	7.2	6.8~102	2,600	475
	5.0	1.30	9 9.0	3,3	1.7	3.2	5.0~ 8.0	7.0			50	14
	5.0	0.9 9	983	3.0	1.4	8.1	4.0~14.5	8.4			8,586	2,9 2 6
	4.3	0.68	9 7.6	1.9	1.3	1.9	2.0~1 1.2	6.1	7.0	11.3~10.6	820	1,524
	4.6	0.7 4	9 9.6	2.2	1.4	2.2	6.3~10.2	7.5	7.5	1.0.0	400	1,9 9 4
	5.7	1.48	99.1	4.8	1.8	4.8	4.2~11.0	6.7	7.1	1 0.0	2,000	838
	5.5	1.40	9 7.5	2.8	1.5	2.8	2.0~1 2.0	6.2	6.8	10.9	4,500	2,5 40
	5.6	137	9 9.9	3.4	1.5	3.4	4.8~12.4	8.1	6.8~7.2	5.2~1 0.8	9,800	3,800
	5.8	0.93	9 9.5	2.3	1.4	2.3	18~15.2	7.9	6.6~6.8	10.0	1,400	771
	5.6	132	9 6.9	3.1	1.6	3.1	6.2~ 7.8	6.6	6.6	1 2.0	1,690	135
	5.2	116	9 9.1	3.2	1.5	3.2	1.8~1 5.2	7.0		,	20,610	11,602
	5.9	1.80	9 9.4	5.5	1.7	5.5	5.4~ 6.4	5.8		i.e.	400	116
	4.1	0.44	8 9.1	1.2	1.1	1.1	5.0	6.0	6.2		600	9 7
	5.3	1.30	9 9.5	3.6	1.5	3.6	5.2~ 7.5	6.3			500	168
	5.9	2.63	9 9.1	9.5	1.7	9.4	3.5~ 8.1	5.2	7.8	92	1,200	100
	4.2	0.71	9 8.0	2.1	1.2	2.1	4.3~11.7	6.6	6.6	7.2~1 0.7	630	330
	4.6	0.9 4	9 7.5	2.5	1.4	2.5	1.8~ 7.5	4.4	6.2	110	150	146
	5.7	1.65	9 6,9	5.0	1.6	5.0	1.8~1 1.7	5.7			3,480	952
	4.1	0.52	9 8.2	1.9	1.2	1.9	8.0~ 8.2	8.1	6.7		7 5 0	330
	5.1	1.15	9 8.1	3.3	1.5	3.3	9.0~ 9.6	9.3	•		192	46
	4.1	0.5 9	9 6.0	2.1	1.4	2.1	4.4~11.2	7.1			450	154
	4.1	0.58	97,3	2.0	1.2	2.0	4.4~11.2	8.2			1,392	530

(飼	育	4.4 Apre 103	cts 14s thrill B	飼 育	尾 数	浮上	魚体	information Wile	放 流	尾 数
場	名)	給餌量	実施期間	尾 数	重 量	体 長	体魚	斃死 数	尾数	重量
八	雲	Kg 1,200	3/15~5/23	千尾 4,125	Kg 1,754	cm 3.2	9 0.43	千尾 82	千尾 4,043	Kg 3,684
利	別	350	3/4 ~4/13	7 0.	233	3.6	0.83	17	691	756
厚涉	陪罗	140	2/1 ~3/22	3.10	119	3.4	0.3 9	5	305	478
(言	†)	1,690	2/1 ~5/23	5,143	2,106	3.1	0.41	104	5,039	4,918
全道	計	62,386	1/10~6/4	194,488	65,451	3.5	0.8 4	2,8 5 5	191,628	200,252

北見支場

121

H

当初の飼育計画外に網走、岩尾別事業場を追加した5事業場で80.937千尾の稚魚に乾配 (クランク) 9.400 版を8月1日から5月24日まで給餌し歩留99.1%で80.650千尾 を飼育放流して放流率が95.6%となつた。網走、北見事業場の用水不足、岩尾別事業場の水温較差等から平均成表率では全道平均を下廻つて体長1.4倍、体重2.4倍となつているが索餌場所を整備して飼育環境の良好な斜里事業場では、体長1.6倍、体重3.1倍と良好な結果を得た。網走事業場で実施した網生資利用の飼育方法については今後一層改良する必要がある。

根室支場

当初計画に厚床事業場を追加した 6 事業場で 7 5,4 6 3 千尾の稚魚に乾配 2 2.5 8 7 なを 2 月 2 0 日から 6 月 4 日まで給餌し、歩留 9 8.3 %で 7 4,2 0 8 千尾を飼育放流して飼育放流率が 9 4.1 %となつた。羅臼、中標津事業場での用水不足(高温)伊茶仁事業場でのサイクロキーターの発生等から一部の減耗を生じたが体長 1.4 倍、体重 3.1 倍と全道平均成長率を示した。水量、水温、索餌場所等の条件の良好な、虹別、羅臼事業場では体重で 3.4 倍~ 4 倍ときわめて良好な成長率を示した。

十 勝 支 場

当初計画に釧路、大樹事業場を追加し、7事業場で61,628千尾の稚魚に乾配23,300 塚を給餌し、歩留99.1%で6,1058千尾を飼育放流して飼育放流率が95.3%となつた。 十勝、太田事業場の低水温の問題はあつたが、成長率は体長1.5倍、体重3.2倍と全道平均成 長率を上廻つた良い成績であつた。本年度は飼育尾数の少ない関係から問題とならなかつたが 十勝川水系の札内、十勝事業場の飼育用水不足、釧路事業場の放流河川水の砂性化等の対策を講 ずる必要がある。

天 塩 支 場

当初計画に増毛民間ふ化場を追加し、5事業場1民間ふ化場で13.452千尾の稚魚に乾

放流	魚体	II- DO	West Lle	成長	逐率	水温	(°C)	PH	DO	水 量	飼育面積
体長	体魚	歩留	增重比	体長	体重	低~高	平均		10	€/分	m ²
cm 5.3	9 0.9 1	% 98.0	2.1	cm 1.7	9 2.1	5.5~ 9.0	6.8	8.0~8.2	ppm	2,200	479
5.7	1.10	976	3.3	1.6	3.3	4.0~ 8.0	6.0	7.2		840	78
5.5	1.58	9 8.4	4.1	1.6	4.0	102~110	10.5			700	140
5.4	0.98	98.0	2.4	1.7	2.4	4.0~11.0	7.8			3,740	692
5.3	1.0 5	9 8.5	3.1	1.5	3.1	1.0~15.2	7.5			45,988	20,331

配 3.9 3 0 kgを給餌し、歩留 9 6.9 %で 1 3.0 2 8 千尾を飼育放流して飼育放流率は 9 6.2 % となつて全道一高い飼育率となつた。成長率は、歌登事業場を除いて全般的に良好な成績で体長 1.6 倍、体重 5.0 倍となつているが抑料係数の面から、標本抽出、放流尾数の確定等に問題が残され今後とれ等の点を早急に解明する必要がある。

千 歳 支 場

日本海区、以西海区の飼育強化の方針にそつた当初計画のとおり千歳、敷生、静内 8 事業場で 7.860千尾の稚魚に乾配 1.479 ぬを 1月10日から 4月26日まで給餌し歩留 97.8%で 7.645千尾を飼育放流し、飼育放流率が 89.6%となつた。飼育率の低下は飼育環境の悪い音江事業場、民間ふ化場の飼育中止のためである。成長率は体長 1.2倍、体重 2.0倍全道平均成長率を大きく下廻つているが、これは千才、静内事業場の飼育用水量(湧水)の不足に起因しており、千才事業場における癤瘡病の発生等を含めて飼育環境の整備を重点的に実施する必要がある6

渡島支場

当初計画どおり飼育方針にしたがつて八雲、利別、厚沢部 8 事業場で、 5,1 4 8 千尾の稚魚 に乾配 1,6 9 0 版を 2月 1日から 5月 2 8日まで給餌、歩留 9 8.5 %で 5,0 3 9 千尾を飼育放流し飼育放流率は 4 8.6 %となつた。この飼育放流率の低下は知内事業場の季節経営、民間ふ化場の無給餌の関係から生じたもので、飼育体制の基本的整備が必要である。

追加・其の他魚種

1) からふとます

推進整備計画におけるます資源拡大方針により今後からふとますの飼育事業の実施が考えられるため、本魚種に関する飼育技術で確立を目的に、岩尾別、徳志別、八雲事業場において2月10日から5月20日にかけて9.764千尾の稚魚に対して乾配2.110㎏(さけ同様)を給餌し歩留99.1%で9,680千尾を飼育放流した。成長率は体長1.6倍体重3.0倍とさけ稚魚に比較して良好な成績を収め次のような飼育上の留意点が判明した。

- イ 初期の餌付が悪いがさけ稚魚より成長が早い。
- ロ 餌付開始時はさけ同様80~90%浮上頃がよい。
- ハ さけに使用している乾配(クランブル)で特に問題がない。
- ニ からふとます稚魚は警戒心が強く初期の餌付が難しいので素餌場所には水流を与え、水深を深く覆をして暗くする必要がある。またさけ稚魚との混養も警戒心を取り除くのに効果的であった。
- ホ 給餌方法は、散粒機(手動式)を使用して静かに撒布給餌することにより警戒心を取り除き 良い結果を得た。

2) ひめます

従来支笏湖への放流は100万尾の定数放流を実施していたが、採卵成績の不振と支笏湖の資源管理方法確立調査の目的から、放流尾数の減を余義なくされたため飼育強化によつて放流尾数の不足を補う目的で実施された。飼育は427千尾の稚魚に対して3月15日から6月20日まで乾配211版を給餌歩留90.5%で386千尾を飼育放流したA群と220千尾の稚魚に対し3月15日から10月1日まで乾配557版を給餌歩留69.2%で152千尾を飼育放流したB群の2群に分け各群とも夫々標識を付して放流した。

飼育成績は下記の通り

	Æ2 → #0 88	M=+= D #4	496 TF: 466	++ **	浮	上	放	流
	飼育期間	飼育尾数	斃 死 数	放 流 数	体 長	体 重	体長	体 重
A 群	3/15~6/20	427千尾	41千尾	386千尾	2.1 cm	0.06 8	5.1 cm	1.20 %
B 群	3/15 ~10/1	2 2 0	6 8	152	2.1	0.0 6	7.5	4.70
計	3/15 -10/1	647	109	5 3 8				

3) さくらます

前年度に引継き人工的に降海型さくらます幼魚の生産を目的に尻別事業場において346千尾の幼魚について43年4月1日から44年3月31日まで乾配(ベレット)9.760以を給餌して歩留81.5%で282千尾を飼育標識放流した。放流時の平均魚体は体長16.0cm、体重40.0%であつた。

-136-

§ 17 調 查 研 究

調 杳 研 究 項 目

(1) さけ・ます稚魚の生理、生態に関する調査	139
1 楽部川及び噴火湾におけるさけ・ます稚魚の生態	139
2 余市川におけるさけ稚魚の生態	1 3 9
3. さけ稚魚の飼育用餌料に関する実験	1 3 9
(2) さけ・ます類異種交配に関する調査	140
(3) さけ・ます親魚の生理、生態調査	1 4 1
1. 親魚のエネルギー代謝について	141
2. 蓄養技術改善試験	1 42
(4) 環境条件ならびにその保全に関する調査	1 5 5
1 水質汚濁に関する調査(十勝川)	1 5 5
2 さけ・ます親魚のそ上と稚魚放流の障害防除に関する調査	171
(釧路川における放流稚魚のへい死原因について)	
3 中川事業場さけ稚魚異状へい死の調査結果概要	179
(5) さけ不受精発生原因に関する調査	192
(6) 閉鎖水域におけるさけ属の数量変化に関する調査	197
1 昭和43年度における支笏湖の湖沼条件	197
2 支笏湖におけるひめます調査	198
(7) 沿岸水域調査	203
1. あきさけ親魚の標識放流試験(昭和43年度)	203
(襟裳以西海区)	
2 からふとますの標識魚の回帰について	207
(8) 河川、湖沼の理化学的性状の調査	208

§17 調 查 研 究

(1) さけ・ます稚魚の生理生態に関する調査

1 遊楽部川及び噴火湾沿岸におけるさけ、ます稚魚の生態

昭和44年~43年の間の生態調査の結果、遊楽部川におけるさけ稚魚の降海は2月下旬から始まり、4月中旬~5月上旬の増水期にその主群が降海し、一部は6月下旬頃まで河川に残留する。一方、からふとます稚魚は放流後直ちに降海し、長期間河川に残留するものがない。

降海後のさけ稚魚は遊楽部川を中心に長万部方面と落部、森方面に広く分散するが、標識魚の分布状況から主として噴火湾内の反時計廻りの潮流にのつて森、砂原方面に回遊し、体長10cm内外で外洋生活に移ることがうかがわれた。

からふとます稚魚の降海後の生活は、さけ稚魚とほぼ同様と考えられるが今のところ明らかでない。

さけ稚魚の沿岸域での混獲は5月1中旬~6月下旬の間で、その盛期は6月上旬~中旬の間である。

2 余市川におけるさけ稚魚の生態

石狩湾内のさけ資源の造成を目的として昭和44年千歳支場から余市川にさけ稚魚 150万尾の 移殖放流を実施した。放流稚魚の河川降下状況、成長ならびに沿岸域の分布回遊について調査した。 その結果3月下旬に放流したさけ稚魚は、6月上旬頃まで一部残留するものが認められたが、そ の主群は4月の増水期に降海したことが明らかにされた。沿岸域滞留期間は河川と同様4月下旬~ 6月上旬で、主に余市湾内の小女子漁具に多量の乗網が認められたが古平、美国及び塩谷、小樽方 面への回遊は少ない。生長は河川内よりも沿岸域において大きく、特に5月以降極めて急速で、体 長10cm内外で沖合い生活に移ることが明らかにされた。

3 さけ稚魚の飼育用餌料に関する実験

さけ稚魚の適正な飼育用餌料に関する開発研究の一環として現在市販されている「ます稚魚用餌料」と、特に試作された「さけ稚魚用餌料」とを用いてさけ稚魚に対する飼育効率について予備的な実験を行なつた。しかし、実験段階において一部取扱いの誤りから計画を充分みたすことが出来なかつたが、実験結果から両種の餌料間の生長度の優劣の差は明らかではないが海水移行時における生理的障害を起すこともなく発育は極めて健康的であった。

稚魚池内で置餌給餌をした場合、両者の摂餌度合いに若干の違いが示され、ます用餌料の方がさけ用餌料よりも幾分食べ易い傾向がらかがわれた。

とのことは給餌方法の影響によるものか、或いは活発を摂餌活動をうながす物質存在の有無の差によるものが明らかにすることはできなかつた。

(2) さけ・ます類異種交配に関する調査

昭和42年春、成熟産卵期のさけ(♀)×からふとます(3)組合せの結果得られた稚魚を幌内事業場から湧別川 VC移殖放流した。

との結果、交配魚として昭和43年8月~10月にかけてオホーック沿沿岸および河川で総計131尾の採捕報告があつたが、この中に幌別川の2尾、徳志別川、網走川の各1尾、湧別沿岸、サロマ湖内定置に乗網した4尾は、調査の結果「ぎんさけ」と確認されたので上記尾数から除外して123尾であつた。

交配魚の沿岸来遊は8月初旬~9月中旬で、湧別、常呂両地区に集中し、特に常呂沿岸で多く採取された。そ上河川は湧別川、渚滑川で両河川の採捕尾数は前者が42尾、後者が22尾、計64尾で残余は沿岸で採捕された。

沿岸、河川で採捕報告のあつた交配魚の標識は「脂びれ」、「腹びれ」が完全に欠除するか、 一部再生していたとと、加えて鱗の輪線形成および年令査定によりすべて交配 2 年魚であること が分つた。

河川内採捕魚の雌雄の出現度合いは雌 550%、雄 450%で多少雌の方が多かつたがそれほど極端な差はなかつた。

以上のことから交配魚も他のさけ、ます類と同様に稚魚を放流した母川を中心とする河川に集 中して回帰する傾向がうかがわれた。

固定標本による形態、形質変異についての詳細は分析検討中である。

また、さけ(♀)×からふとます(8)組合せから発生した稚魚群が8~4cmに生長すると稚魚の体側にパール・マーク及び背部斑紋が存在し、褐色のさけ形形質をもつものと、パール・マーク、斑紋がなく、青藍色を呈するからふします形(ことでは、きず形と呼ぶ)の二形が明らかに認められる。この表現形の相違が、精子、卵子のいづれに由来するか、二形の出現割合いを確かめるため、雌雄一腹毎による交配を数組作成し比較した結果、各組稚魚の色彩には濃~淡、斑紋に明瞭~不明瞭の変異差はあるけれども、かならず各組に二形が出現することが分つた。次に両形の出現する割合いは各組稚魚とも"さけ形"が"まず形"に比較していづれも若干尾数が多く、"さけ形"は52.7%に対し"ます形"は47.3%であつたが、一般的にほぼ同数の出現率と判断される。表面的観察では両形稚魚が出現する成因は遺伝的隔離によるものかどうか現在のところ明らかでない。

"さけ形"稚魚と"ます形"稚魚の生長を比較すると、前者は餌付きが良く生長が極めて早いのに反し、後者は餌付きが悪く生長も悪いため小形である。それ故、"ます形"稚魚があるいは 淡水中では生長に伴つて生存できずに減耗することも考えられるので、現在"ます形"稚魚だけ を分離して飼育し、減耗度合いを調査中である。

(3) さけ・ます親魚の生理、生態調査

1 さけ親魚のエネルギー代謝について

健全卵確保のための親魚蓄養上の地域的問題を解明するために石狩川、標津川および静内川に そ上したさけ親魚のそ上開始における保持エネルギー量ならびからみた成熟程度については遅れの傾向かみら れた。これらのことから、くわしいことはエネルギーの定量的な検討を待たなければならないが、完 熟するまでの日数が減少の傾向にあることも考え合せると、最近十勝川にそ上する親魚の卵の造 成ならびに完成は短期間に、かつ極めて効率よく行なわれていることが推察された。

また、この結果については、蓄養施設その他の環境条件の改善、それに加えて捕獲親魚の減少に伴なう蓄養条件の向上などがら収容親魚が例年以上に安静の状態に保たれたこと、ならびに熟度選別作業が迅速に行なわれた可能性があることなどを考慮しなければならない。

しかしながら、エネルギー源としての蛋白の質的問題を検討するに際してにその後の利用状況と、十勝川にそ上したものとの差異を予備的に調べ、そ上後の成熟期間と著養限界の地域差を検討した。

また、蓄養限界を簡便に求めるためにそ上親魚の電気抵抗特性を調査した。

なお、地域性の問題を解明するためには十勝川そ上魚におけるエネルギー特性上の経年変化についての検討を必要とする。これらの問題は経春的に蓄積された資料の解析を必要とし、現時点では充分な定量的解析も行なわれていないので、一応の経過を報告する。

1) 十勝川そ上親魚の生理的な経年変化について

そ上開始時の保持エネルギーは昭和39年を最大にして減少の傾向が見られたが、エネルギー的に成熟程度の進んでいる傾向に反して、卵単の体重比、前年に較べて抽出操作時に著しい相違(抽出蛋白のゲル化)が見られた。

そ上時エネルギーの特異性をも加味した場合、先に述べた結果は海洋生活期の餌料の問題 にまで発展することも考えられる。

2) 石狩川、標津川、静内川かよび十勝川にそ上した親魚のエネルギー的地域特性について そ上開始時の保持エネルギー量については、魚体の形態的検討がなされていないう気に、 各河川によつてそれぞれ成熟程度に著しい違いがみられるため地域性を比較することが困難 である。しかし、卵巣の体重比を基準にして検討した場合に次のような結果が得られた。 標津川で11月18日に得られた未熟魚は、昭和39年頃、十勝川東33号捕獲場または 千代田捕獲場までそ上した魚と同様の成熟度合いであつたが、保持エネルギー量については 同様に成熟期または放卵時の残余量と同程度であつた。(このことについては、十勝川にかける経年変化と同様に完熟期にかける抱卵量の経年的減少のあつたことも考えられる。) 標津沿岸定置で得られた魚については河口で獲られたものと同様に、昭和39年の十勝川 にかける卵増成期と同程度の成熟度を示してかり、これは、千歳川西越捕獲場で10月11

日に捕獲されたものの残余エネルギーと同程度と考えられた。

これらのことから、標準沿岸定置後期の魚はほぼ1週間以内に完熟することが予想され、 抱卵量については完熟時期が予想より早い場合は他河川のものよりいくらか少なくなる傾 向があることがうかがわれた。

11月2日、標津沿岸定置で得られた魚は体色のみならず成分的にも明らかに二種の系統群の混在が認められた。すなわち、捕獲直後、体色にいくらかでも"プナ毛"の認められたものは成熟度合いが、鹿部沿岸地域の定置で漁獲されたものよりも遅れているのに、保持エネルギーは逆に鹿部のものより少ないことが認められた。

3) 保持エネルギーを簡便に知るための電気抵抗値の利用について

同時期、同一場所における魚肉の電気抵抗は未熱魚より水分の多い完熟魚ほど大きい傾向が認められた。しかし、成熱に伴なう電気抵抗値の変化については予備的調査の段階であるために明かにすることは出来なかつたが、成熟状態との間に相関関係は認め難いようである。

これらの問題は、淡水域で捕獲されたものよりも水分量に関係なく海産のものほど電気 抵抗値の小さいことが明らかにされたことから、成熟時には水分の増加に伴なり電気抵抗 値の減少と、体成分のエネルギー的転化に関連する微量成分の減少に起因する電気抵抗値 の増加とが、互にきつこうすることも考えられる。

なお、魚肉中の塩分濃度が比較的安定した状態にあるものと予想される海産魚でさえ、その電気抵抗値については、幌泉沿岸のものよりも成熟度合いの進んだ標準沿岸のものが大きな値を示した。しかし、これは単に栄養成分の消費にもとずく電導性の低下とは考えられない。

これら抵抗値の相違は完熟時にもみられ、標準沿岸の魚は、十勝川および静内川のもの より抵抗値が大きく、石狩川河口部産のものと同程度の値を示した。

以上の問題については、計器類の保持上の問題ならびに性能にも起因することも考えられ、すべて地域性によるものと断定できないが、地域性または系統特性解明の上で、何らか利用可能なこともうかがわれる。

2 蓄養技術改善試験

昭和43年度、北海道沿岸のさけ来遊量は近年稀な不振のため河川そ上親魚の減少に伴い例年に比較して畜養率も低くその結果調査計画を変更して次の事項について調査を実施した。(本年度大改善を行つた十勝川千代田捕獲採卵場の畜養池には親魚が収容されず、その改善効果の検討については充分な結果を得られなかつた。)

1) 札内蓄養池環境条件の検討

- ① 蓄養池用水量について
- ② 蓄養池内流速について
- ③ 容存酸素について
- 2) 親魚輸送条件の検討
- 3) 千代田蓄養池環境条件の検討


(1) 札内蓄養池環境条件の検討

十勝川札内事業場構内の蓄養池の利用は昭和41年度から実施されたが、43年度は施設改造が行なわれた。前年度までは第1図水門下流のA~C間を仕切り、蓄養池として使用したが、43年度は更に下流部を改造拡張したもので、水門通過水とふ化用水を併せて利用することで用水量の増加、収容増が計られたのでこれらの蓄養条件について検討した。

1) 蓄養池用水量について

札内事業場用水はメム川の水をダムにより貯水して引用しているが、一部は事業所裏の水門(第 $1 \boxtimes A$ 点)から余剰水として流し、ふ化用水は橋(H 点)を通つて池に貯水されたものを使用している。

メム川の水は札内川の伏流水といわれ、水量の変化は少いが本流札内川の変化に伴つて変動がある。



-142-

用水量の測定は 1 0月 9日に行つたが、これはこの時期の大体の平水量と考えられる。 測定は A点、H点及びふ化用水の総排水量を測定検討した。その結果は次の通り。

- ① A点(水門)通過量 34.7トン/分
- ② H点(橋下)通過量 16.3トン/分
- ③ ふ化用水排水総量 15.4トン/分

一般的にはA点とH点の通過水量がメム川の総水量と考えられる。

また、②H点通過水量と③ふ化用水排水総量は同量であるべきと考えられる。しかし、測定の結果②と③の差は0.9トン/分という数値が出た。これは貯水池から地下に滲透したものと考えられる。即ち養魚池の各所で小さい湧水が認められることからも相当量が滲透していると考えられる。このことは水門上流部でも同様の状況でメム川の天然産卵床の湧水源となつていると推定される。

したがつて、蓄養池で使用されている水量は①+②の 5 0.1トン/分より多い ものと考えられる。

2) 蓄養池内流速について

蓄養池の配置は2つの養魚池を通過した余剰水が合流する点から蓄養池として使用している。 従つて蓄養池内の流速は3方向から水が流入する関係で場所によつて著しい差がある。

1 0月 9日 に 測定した結果は 第1 表及び 第2図 に示した。 これによると 5.1 cm/sec ~ 1 4.4 cm/sec、 の範囲内で殆んどの部分は 10 cm/sec 前後である。

今までの調査結果では一般的には親魚の蓄養に適した流速は 10 cm/sec、附近が最も良好で、親魚の体力の消耗も少いと考えられている。

従つてこの蓄養池は流速の面からは一部用水が停滞する個所を除き、かなり良い条件と考え られる。

3) 溶存酸素について

親魚を蓄養する場合その収容尾数を拘束する条件のうちもつとも重要なものは容存酸素(以下DO)と考えられる。用水を循環使用する場合は炭酸ガス、アンモニア等も重要な要素となるが利内、千代田等一般の蓄養池ではDOが大きな要素となる。

札内蓄養池では 4 2年度 に、第 1図 A~Cの部分で蓄養を行い、C点附近から下流でDO不足のためジェット・ポンプを使用した例があり、DOの面で必ずしも充分な条件とは考えられないので、10月9日、18日及び11月1日にDOの分布について調査した。測定の結果は第1表及び第3~5回に示した。この結果を見ると、メム川のDOは決して多い方ではなく、著しい運気が行われると考えられる水門の下でも多いときで90%、時には80%以下となる。

養魚池下流では2面ともDOは増加しているが水門下流の流水と養魚池通過後の流水との混合 状況と、蓄養魚内のDO消費に影響されることは当然である。養魚池通過水は水門通過水より少いが、この混入する部分に若干高いDOを示した。

本年は蓄養尾数が少なかつたにも拘らず、8号池以下ではかなりDOの低下が見られたことから、平常の蓄養尾数の場合は充分警戒の必要がある。

水門下流でDOが次第に減少する原因として、事務所裏のボーリング水及びC点の湧水の低酸素水の流入が考えられるが流水量との関係から見て、この水の流入のみによる低下とは考えられない。

11月1日の測定はとの間の事情を明らかにするために行つたもので第1表及び第5図に示した通り、午前9時と午后8時の2回の測定であるが、一般に夜間はDOが低下するがその度合は水門下流と養魚池では異なる傾向を示した。


即ち水門下流では昼夜間共にD0の減少が認められ、特に夜間の減少が著しいことから、なんらかの生物の生活による影響が著しいことが考えられる。このことは只1回の測定であるが著養池内の細菌数調査の結果(第1表)水門下流側蓄養池最上部で100当り14120箇の細菌数を数えた。他の細菌数との対比から、測定上の問題が残つているが生物学的要素について検討する必要がある。


次に、養魚池内にはあおみどろなどの緑藻類が川底に密生しており、その代謝の関係から考えると、夜間には当然かなりのD0の低下が予測されたが、実際には昼間とほとんど差がないことから、養魚池の水深が浅く、瀑気効果が藻類のD0消費を上廻つていると考えられる。

以上を総合して考えると、札内蓄養池のDO量は必ずしも充分でなく、蓄養池上流部でなんらかの澤気方法を行なうことが必要と考えられる。たとえば水門下流の用水を出来るだけE点その他から養魚池を通過させるか、ふたはふ化室、養魚池を通過させて澤気効果を高めるとか、水門下流部を階段状にして澤気効果を高めると同時に清掃を充分にして、生物などによるDOの減少や、昼夜間のDO差を少なくするなどの方法が考えられる。


第1表 札内蓄養池水温、DΟ流速分布並びに細菌数

定	1	0 月 9	日	10月	18日	11月1	日 9 時	11月1日	1 20 時	10月18日
点	水温	D0%	流速	水温	D 0 %	水温	D 0 %	水温	D 0 %	細菌数
1			5.1							個/1cc
2	1 1.6	8 6 5	8.7	130	8 6.5	122	7 4.0	1 1. 3	6 0.0	14120
3			11.7							
4	1 1.7	86.5	8.1	1 2.5 12.5	8 1. 0 9 5. 5					940
(5)	1 2. 2	92.7	7. 5	12.5	100.0					
6			1 1.7				-			
0			1 0. 2	12.0	980					-
8	1 2 2	9 4.5	9.4							
9	1 1.4	9 4.5	8.2							9
10			12.9	1 1. 0	9 6 0					
0	1 1.0	88.0	9. 0	1 1.5	95.5		1			550
13	1 1.9	8 4.0	129	13.0	88 0					
0	120	9 3.5	7.5	12.0	9 2. 0					
13	1 1.4	9 0.0	7.9	1 1.6 1 1.5	9 1. 5 8 9. 5		1 _			
13			10.6	1 30	88.0				*.	
13	1 2.1	86.5	1 4. 4	1 2 5	920					8 6 0
O	1 2.1	8 2 5	12.1	1 2.0	9 0. 0	1				570
13			8.2	1 1.7	89.5					
19	1 2.2	7 9. 5	11. 0			1				660
20	119	780	13 6							
2	117	70.0	9. 9							8 2 0
23	11.4	69.5	6.9							
A	1 1.3	9 6 0		10.5	93.0	9. 2	80.5	10.4	85.0	5"
В				1 3 5	75.0					
C				130	86.0					*
D		(750)						10.7	79.9	
E						101	79.5	1 1.1	777	
ŕ					-4	10.4	8 6.4	1 1.0	8 0. 6	
, G						9. 3	9 1.0	10.3	9 0. 4	





Mm 83 6 WMm 型 mm (1) 120 C 90% (B) 11.7 °C 89.5% (B) 125 C 92% (D 130 C 88%) 10月18日水温、榕存酸素(飽和度)分布 × 116 C 91.5% (B) 12°C 92% (4) 11.5°C 89.5% 田 居 跦 12.0°C 98% 型 www 4 X 81% 导 (II) X 115 C 95.5% 起 第4図 86.5% × 13.0°C 380% O %96 Q011 赳 125°C 100% 型 展 魚 獭 撇. 125°C -149-



(2) 親魚輸送条件の検討

十勝川千代田捕獲場から札内事業場蓄養池までの間、蓄養池までの間、蓄養さけ親魚を輸送する際の水中溶存酸素(DO)、炭酸ガス(OO2)の変化について検討した。

調査期間中、さ親魚捕獲尾数が著しく少なく、多量輸送の場合の検討は出来ず、10月19日、 ♀32尾、34尾計36尾の輸送について実施した。

輸送の経過時間とDO、CO2の測定値を表示すれば次のとおり。

経過時間	D 0 %	CO ₂ ppm	備考
収 容 前	9 8	6. 6	
3 分	9 4		砂利道路
5	8 9		舗装道路
8	7 7		"
1 0	7 2		"
1 2	8 5		砂利道路
1 5	8 3	(4	"
1 7	8 2	2 8 6	"
	1		

輸送は酸素を通気しながら行つたが、出発後約5分は砂利道で、この間は若干DOが減少した。 その後5分間は舗装道路のため振動が少なく、DOは17%も激減した。その後再び砂利道になって若干回復した。

この試験は 8 6 尾という少量の輸送でしかも酸素を通気しながら17分という短時間であつたが、 このよう ICD Oが減少することから特に舗装道路での輸送は効果的な酸素通気の方法を検討する必要がある。

 CO_2 については 1 7分間の輸送で約 4 8 倍に増加した。 CO_2 は時間の経過に伴つて増加するもので、別の実験結果では、容量 2 0 ℓ の水中にさけ 1 尾(体重 2 7 kgの 3)を入れ酸素が充分な状態に保つても、 CO_2 が次第に増加して 4 7 p p m になると横転して反応がにぶくなり、 3 時間で約 7 0 p p m に増加した。

とのように一定の水中に魚を置くと、通気が充分であつても CO2 の増加 のため危険な状態となる。もし、この場合 DOが減少すると危険度は急激に高まる。

このことから舗装道路を長時間輸送する場合は酸素の通気も大切であるが、タンク内の水をボン

-151-

プで循環瀑気させて C O 2 の除去も併せて行な 5 方法が効果的 と考えられる。 また、代謝を抑制するために氷の使用などで低水温で維持することは勿論有効である。

(3) 千代田蓄養池環境条件の検討

十勝川千代田捕獲採卵場内の蓄養地は前年度、DO不足により蓄養中、さけ親魚が多量に窒息した。本年は注水瀑気法に改善を試みたので、その効果の検討も含めてDOならびに流速の分布を測定した。その結果は第2表および第6図に示したが、本年度、親魚が全く蓄養されなかつたためボンブによる注水瀑気の効果について明らかな結果が得られなかつた。

即ち、用水は920~945%のD0飽和度を示したが、木格子通過後は98%近くまで高まり、流水は98~99%前後を示したため、注水の効果は明らかでない。しかし、ボンブによる注水澤気は、そのD0が少ない場合ほど酸素の溶入が容易であるから、養魚池上流から未使用の水をポンプ・アップするよりは、D0が低下した蓄養池内の水をポンプ・アップして澤気注水した方が計算上では収容尾数が増加するし効果的と考えられる。たぶし、この場合沈澱物の関係からなるべく表面水をポンプ・アップすることが望ましい。


第2表 千代田蓄養池 D O 並 IC 流速分布

No	DO	(%)	流 速(cm/sec)
No	表層	底 部	表層	底 部
1	9 2 0	9 3 0	9. 4	1 0. 2
2	9 8 5	9 4. 0	9. 4	1 0. 9
3	9 4. 0	9 4. 1		
4	9 4. 5	9 4. 5	9. 4.	1 2 5
5	970	9 7 5		
6	9 8 0	9 & 1	7 1	-
7	9 5. 2	9 7 0	7. 6	7 1
8	9 & 5	9 & 5	5. 5	7 1
9	9 5. 5	9 7 0	4, 8	5. 5
1 0	976	9 8 0	5. 5	4. 8
1 1	9 & 5	9 9. 0	9. 6	5. 5

No.	D O	(%)	流速((cm/sec)
,	表層	底 部	表層	底 部
1 2	9 8 7	9 8 8	5. 5	5. 5
1 3	9 8 5	9 8 9	1 1. 7	5. 5
1 4	9 8 9	9 9. 0		
1 5	9 9. 0	9 9. 1	2	
1 6	9 9. 5	9 9, 5	7.9	7. 9
1,7	9 8 7	9 8 7	1 1. 7	9. 4
1 8	9 8 7	9 8 7		
1 9	9 8 9	9 9. 0	9. 4	1 1. 7
2 0	9 8 7	9 9. 0	7 1	1 0.2
2 1	9 8 9	9 8 9	7. 9	7. 1
2 2	9 8 9	9 9 0	9. 4	7 9
2 3	987	9 9. 0	7.1	6. 3
2 4	9 8 9	9 9 1	1	
2 5	9 9 8	9 9 0	1 2 9	1 1. 7
2 6	9 9 6	9 9. 0	-	
2 7	9 9. 0	9 9. 0	7 1	7. 1
2 8	9 & 6	9 & 5		
2 9	9 & 8	9 9. 0		
3 0	9 9. 0	9 9. 0		
3 1	9 🗢 5	_	1 5. 6	1 1. 7

備考

- ① 観測時、水温 9.4℃~9.6℃
- ② 底部は池底から約20㎝上部で測定
- ③ 測定時、蓄養魚なし



第6区 千代田蓄養地略図

(4) 環境条件ならびにその保全に関する調査

1 水質汚濁に関する調査 (十勝川)

9月中旬から11月上旬のさけ親魚そ上期間中5回にわたり十勝川および沿川の主要澱粉工場の水質調査を行つたが、そ上親魚が少ないためもあつて、昨年度大量へい死を招いた千代田捕獲採卵場の蓄養池に親魚を蓄養するまでにいたらず、河川水質と蓄養親魚の状況との関係は把握できなかつた。調査結果は第1表~第5表に示すとおりで、各調査項目別の概況は次のとおり。

(1) 十勝川および打内蓄養池

РН

本川の祥栄橋下を除く各地点は 6.8~7.2 と比較的変動が大きいのは明らかに M 澱粉工場廃液の 影響と思はれる。(祥栄橋下の採水地点は M 工場廃液排出河川合流点下 2.0 0 m の地点であ る。)

B . O . D

祥栄橋を除く各地点は 1.0~3.01 ppmで、祥栄橋は 2.0~15.2 ppmと変動も大きく高い値が得られたが、明らかにホクレン芽室澱粉工場廃液の影響である。調査期間中"ノロ"の流下も顕著であることが観察され、臭気も認められたのは祥栄橋付近だけであつた。 祥栄橋より 1.4.5 km下流の十勝大橋では 1.17~2.05 ppmと本流の稀釈、自浄作用によつて回復している。

$C \cdot O \cdot D$

祥栄橋を除く各地点は $1.02 \sim 5.2$ ppm (9月13日、打内蓄養池入口) は蓄養池上流約 2.00 mの地点における河川切替後せつ工事のためである。

浚也つ工事地点の切替により 8.87 pp m以下と良好な結果が得られた。 祥栄橋は最高値 7.28 pp mを示して汚染の影響を示している。

アンモニア熊窒素

調査期間を通じて祥栄橋を除く地点は 0 0 ~ 0 3 9 ppmであつた。アンモニア態窒素は無機体で河川に容出していることがあり、必ずしも汚染の指標とはならないが、祥栄橋でのピークは 1 4 4 ppmを示して通常河川より極めて高い値が得られたが、下流 1 4.5 kmの十勝大橋では 0 1 2 ~ 0.3 ppmを示していることからみて明らかに廃液の影響と思はれる。

D . 0

飽和度でみると調査期間中の各地点を通じて884~1113%と変動が大きいが、これ

は汚濁による影響よりも流速、水塊その他河川の状態によるところが大きいものと思われる。 比較的高い値が得られたのは清水大橋(最上流)と千代田えん堤下である。

清水大橋では987~1118%で流速も早く、大気中からの酸素溶入も活発と思われ、千代田えん堤下では993~1065 pp mを得たが、明らかにえん堤による瀑気効果である。

最も低い値を示したのは打内蓄養池出口で884%(10月18日、第4表)が得られたが、 蓄養尾数(約1万尾)の影響と思われ、11月1日の調査では925%(蓄養尾数8600尾 第5表)と上昇傾向を示している。

総鉄量(Fe)

第 1 表~第 5表に示すとおり分析結果からみると特に問題点はないが、調査期間を通じて $0.00 \sim 0.55$ ppmで各地点とも時期的にランダムな結果が得られた。人為的な影響よりも 底質など天然によるものと思ばれる。

リン酸イオン

リン酸イオンは地質的要因によつて存在することがあるが、工場廃液などの混入による場合 が多いので汚染の一指標となる。

調査期間中、常時検出されたのは祥栄橋(008~022ppm)だけであるが、明らかに M澱粉工場の廃液によるものと思はれる。そのほかの地点についてはアンモニア態窒素と同様 時期的にランダムな傾向を示している。調査結果からは特にとりあげるべき問題点は得られな かつた。

その他

浮遊物質、透視度についてみると概して清澄河川とほぶ同様を結果が得られたが、浮遊物質は十勝橋で29pm(第3表)38ppm(第5表)と比較的高い値を得たのは上流の砂利採取の影響である。また、打内蓄養池入口188ppm、同出口162ppm(第1表)を得たのは河川切替工事の後せつ水の影響である。なお、浚せつ水は828ppm (第1表)であつた。

硝酸態窒素は祥栄橋で検出(002ppm以下、第3表、第4表)された時もあつたが、これは廃液の影響と思はれる。

亜硝酸態窒素は検出されなかつた。(0002 pp m以下)

硅酸、塩素イオン、硫酸塩、硬度については特筆すべき点はない。

打内蓄養池出口の底質 C, O. Dは 9.1 ppm (第 3表)と極めて良好な結果を得た。

(2) 澱粉工場

十勝川沿川には多数の澱粉工場が存在するが、原料処理量についてみると、ホクレン芽室澱粉工場、土幌農協澱粉丁場の2工場が占める割合いは昭和42年度で70.5%(芽室35.2%、

士幌 3.5.8%、ホクレン調べ)となつており、廃水調査はこの 2 工場について行なつた。 芽室澱粉工場

昭和42年度の原料処理量は112548トンで、操業期間は823~1128である。 工場廃水についてみると、フリューム廃水、土液、2次セパレータ廃水、蛋白汁廃水、その他雑用水があつて、廃水河川(ビウカ川)に放流するのは主としてフリューム廃水(沈澱処理)、セパレーター廃水(瀑気、沈澱処理)である。ビウカ川は十勝川合流点付近(水深50㎝、川巾3m)で採水した。ビウカ川は汚濁している時と澄んでいる状態を呈している場合もあつたが、河川水に澄明でも臭気は著しく、必ずしもB・O・Dか低いとい言えない。調査結果は第6表に示すとおりである。

B・O・Dでみるとピウカ川は528~1530ppmであるが、十勝川で稀釈されて下流約200mの地点(祥栄橋下)では20~152ppmとなつている。

十幌澱粉工場

この工場は規模もほぼ芽室工場と同一で、工場廃液は支流音更川(十勝川合流点上流約272kmの地点)に放流される。

調査期間中の放流河川は濁つており透視度も20~60㎝と低い。放流廃水は約3,0トン/secで途中湿地帯で稀釈されて4.5トン/secとなる。このため比較的D・0飽和度も15.8~51.3%と廃液河川としては高い値を示している。B・0・Dについてみると44.8~1305ppmとピウカ川より低い値が得られた。(第7表)

この廃液の影響については約27km下流の音更川十勝新橋では $B \cdot O \cdot D$ 最高値 4.7pp mを得た。この付近でも泡の流下が観察されたことから、工場廃液の影響を受けていると思われるが(第1表~第5表、地点L)4~5トン/se cの廃液を放流しても、十勝川との合流点に至るまでに河川水の稀釈、自浄作用により浄化され、廃液の及ぼす影響も微少になるものと推定される。

質	分		析	表	
G		Н	I		
	長	日	打内蓄	養	ì

	A	В	C	D	E	F
1 1 1	清水大橋	十勝橋	祥栄橋	十勝大橋	十勝温泉	千代田えん
採 水 場 所	(右)	(右)	(右)	(右)	(右)	上(右)
採水年月日	68912	"	"	"	9.13	"
採 水 時 刻	1 0:0 0	9:0 0	1 3:5 5	1 4:4 0	1 0:0 0	1 1:2 0
採水部位 (深度)	2 0 cm	"	"	"	2 0 cm	"
天候	В	"	"	"	В	"
風 向 • 風 力					et e	
気 温(℃)	2 5. 6	2 2 0	2 2. 6	2 1. 0	174	2 2 0
水 温 (℃)	1 3 2	1 2 0	1 6 3	1 5.0	1 2. 9	1 3 0
水 色	clear		e			
味 • 臭 気	_					
濁			7			
水素イオン濃度(PH)	7 0	6. 9	6.9	7. 0	6.8	6. 9
硬 度(CaCO ₈) ppm	2 9 0	2 2 0	2 0. 0	2 1. 0	2 5. 0	2 2 0
容存酸素(D.O) ppm	1 1 3 0	1 0. 9 2	9.92	1 0. 4 6	10.60	1 0. 7 7
容存酸素飽和度 %	1113	1 0 4. 6	104.72	1 0 8 3	1037	1 0 5 6
C.O.D ppm	1.30	1.02	1.86	1. 9 5	1. 1 9	1. 5 8
B.O.D ppm	1.48	1.4 5	2. 0	1.17	1. 0 3	1. 3 2
塩素イオン(cl-)ppm	8.5	1. 9 0	5. 7	6.65	7.6	6. 2
硅 酸(SiO ₂)ppm	2 5. 0	1 9 5	1 6 6	1 8. 5	1 9. 0	188
リン酸イオン(P0,一)ppm	0.05	0.125	0.215	0.05	0.05	0.05
アンモニア態窒素(NH4一N)ppm	-	0.012	0.08	0.01		0. 0 7
亜硝酸態窒素(NO2-N)ppm						
硝酸態窒素(NO ₃ -N) ppm						
硫酸塩(SO ₄) ppm	3. 9	4. 8	2. 2	9. 2	6. 5	2. 2
鉄 (Fe) ppm	0.1	0.08	0.06	0.12	0. 2	0. 0 6
全蒸発残留物 ppm						
熱灼残留物 ppm			*			
熱灼減量 ppm					2	
浮遊物質 ppm	1 0	1 5	1 5	1 0	1 0	1 5
透視度 ст	8 0以上					
備考						
		-158-				

G-	H	I	J	K	L	
堤	長日	打内蓄養	池	清水橋	十勝新橋	
下(右)	(右)	入口	出口	(左)	(左)	河川注入水
"	"	"	"	9. 1 2	"	,,
1 1:0	1 2:3 0	1 3:0 0	1 3:2 0	1 0:2 0	14:55	6:0 0
"	"	"	"	"	"	*
"	"	"	"	"	"	
2 2 0	2 0 2	2 0. 0	2000	2 5. 4	2 2 8	
1 2 0	1 6 0	1 6 3	1 6.3	1 1 6	1 2 0	
		muddy	muddy	clear		
						*
6. 9	6.8	6.8	6.8	6. 8	7.4	1
2 3 0	26.0	2 3 2	2 5. 0	170	3 4. 0	
1 0.87	9.68	9.4.5	9. 2. 2	1 0. 8 9	,	-
					1 1.2 3	
1 0 6 5	1 0 1. 2	9 9. 1	9 7 1	1034	1 0 7 6	
2. 2 3	158	5. 2	4.93	1.77	1. 7 7	
1. 3 2	2.18	296	2 2 5	1.79	1. 3 2	
8 5 5	9. 0	2 5. 6	26.6	8.0	8. 0	+
1 8 5	198	2 5 5	2 5. 0	160	2 5 0	
_	0.08	0.0/82	0.083	_	0.05	
0.02	0.01	0.89	0.28	0.01	_	
				,		
2. 2	3. 9	3. 3	3.4	201	6.5	
_	0.12	9. 6	0.75	0. 2	0. 2	
		2 2 5	193		٠. ٠	000
		8 2				986
			5 9			2 1 5
		1 4 3	1 3 4			7 7 1
8	2 1	188	1 6 2	1 5	1 0	8 2 8
		6.5	8 0	3 0以上		2. 0
		Stock				
		5 2	0			

-159-

·					
	A L defe	B	C C	D	E
採 水 場 所	清水橋	十勝橋	祥 栄 橋	十勝大橋	十勝温泉
	(右)	(右)	(右)	(右)	(右)
採 水 年 月 日	0. 2 6	"	"	"	"
採 水 時 刻	1 1. 0 0	1 0.3 0	1 2 1 5	1 3 3 0	1 5 3 0
採 水 部 位(深度)	2 0 <i>cm</i>	"	" -	"	"
天候	С	"	" ,	"	"
風 向 風 力					
気 温 (℃)	1 6 0	1 4. 0	1 6. 4	1 8 6	166
水 温 (℃)	1 2 2	1 2.1	1 3. 0	1 3 0	1 5 0
水色	clear	*			
味 • 臭 気	-		+		
濁 度		· v			
水素イオン濃度(PH)	7. 0	7.1	7. 2	7. 0	6.8
硬度(CaCO ₃)ppm	2 4. 0	1 6 0	2 3. 5	2 2. 0	1 9 5
容存酸素(D.O)ppm	1 0. 3 7	9. 4. 3	9. 2. 8	9. 2 8	9. 6 7
溶存酸素飽和度 %	9 9. 9	9 0. 7	9 1. 0	9 1. 0	9 9. 1
C . C . D ppm	1. 3	1.35	2 5 2	1. 5 2	1.40
B.O.D ppm	1. 1 7	1. 6 4	6.04	1.60	1. 5 6
塩素イォン(cl-)ppm	9. 5	7.79	8 5 5	6.65	6.65
硅 酸(SiO ₂)ppm	2 6 0	2 5. 4	2 2 0	2 4. 0	2 3 0
リン酸イオン(P〇4一) ppm			0.1 1	+	+
アンモニア態窒素(NQ2-N)ppm		\	0.35	0.015	_
亜硝酸態窒素(NO2-N)ppm					
硝酸態窒素 (NO ₃ —N) ppm		10			
硫酸塩(SO ₄) ppm	1 6 5	6.67	4. 8	4. 0	8 4 6
鉄 (Fe) ppm	++	++	+++	++	++
全蒸発残留物 ppm	!				8
熱灼残留物 ppm		,			
熱灼減量 ppm				40	
浮遊物質 ppm	8	1 5	1 3	1 0	6
透 視 度 <i>cm</i>	30以上				
備備考			泡ノロの流		
, and ma		1	下顕著		*
		1.00	I MX 4E		

F	G-	Н	I	J	K	L
F代田えん堤 し		長 日	打内蓄養池		清 水 橋	十勝新橋
(右)	(右)	(右)	入口	出口	(左)	(左)
11-	"	9. 2 7	,"	"	9. 2 7	"
1700	1720	1 1. 3 0	1 2.4 5	1 3 0 0	1 1. 2 0	1 5.00
"	"	"	"	"	"	"
"	"	вс	"	"	O	"
1 2. 8	1 2 8	2 1.2	178	180	1 5. 2	17.8
1 3 2	1 3 8	1 3 8	1 4. 1	1 4. 8	1 1. 8	1 5. 2
				-		
7. 0	6.9	6. 9	7.0	6. 9	7.4	7. 4
2 5. 0	3 4. 0	3 1. 5	3 0. 0	1 5. 0	3 9.5	2 1. 0
9.67	1 0 2 1	9. 2 0	9, 3 6	9. 2 8	6. 4. 5	850
	10191	9 1. 8	9 4. 1	9 4. 6	8 0, 6	8 7. 5
1. 4 5	1.25	2. 1	1. 8	1.76	1. 3 5	1. 6
0 0 0	1. 2 0	1.87	2.2 6	2.30	1. 8 5	2. 2 3
8.55	5. 7	7 6	9. 5	8.08	5. 2 2	5. 7
2 2. 5	2 1. 4	2 2 5	4 0. 0	3 7. 6	3 8 6	3 0. 0
~ ~ 0	" "					+
0.11		0.015				+
u 1 1		4010				h.
7	1.00	1000	110	1 2 9	2. 2	6.7
7. 5.1	1 0. 2	1 0 2 3	11.3	1	× ×	
++	++	++	0. 2 5	0.02	++	++
						2 000
6	1 0	9	1 8	1 3	1 9	1 5
			-		-	
	6			ocked 6,400		
				4.4.00		

	A	В	С	D	E
	清水大橋	十勝橋	祥 栄 橋	十勝大橋	十勝温泉
採 水 場 所	(右)	(右)	(右)	(右)	(右)
採水年月日	1 0.8	"	"	"	"
採水時刻	1 1:1 0	11:5 0	1 3:1 5	1 3:4 5	1 6:1 0
採水部位(深度)	2 0 cm	. "	"	"	"
天候	С	"	"	"	,. "
風 向 • 風 力					8
気 温(で)	1 4.7	1 3 8	11.8	1 3.8	1 3 6
水 温(で)	9. 7	. 9. 4	1 L 2	106	11.2
水色	clear	muddy	clear		
味 • 臭 気		*	+		
濁度		1		,	,
水素イオン濃度 (PH)	6. 9	6 9	6. 6	6.9	6. 9
硬 度(CaCO ₃)ppm	2 1.	2 0.0	2 2 0	2 2 0	3 2 6
容存酸素(D.O.)ppm	1 1. 0 8	1 0. 7 6	1 0. 0 3	1 0. 6 9	1035
容存酸素飽和度 %	1 0 0 7	9 7 1	9 9 4	9 9, 3	9 7 5
C.O.D ppm	1. 3 0	1. 2 1	2.87	2.0	1.4 0
B.O.D ppm	1. 1 5	1. 1 0	1 0 3	1. 24	1. 0 5
塩素イオン(cl-)ppm	6.7	6.1 7	2.85	4. 8	4. 6
硅酸(SiO ₂) ppm	2 4. 0	224	18.5	2 4. 0	1 9. 5
リン酸 イオン(PO ₄ -N)ppm	¥	3.	0. 1 2	+	
アンモニブ態窒素(NH,一)ppm	.* ,		1. 2	0.04	
亜硝酸態窒素(NO—N)ppm					
硝酸態窒素 (NO ₈ —N)p pm			+		
硫酸塩 (So₄) ppm	9. 0	9.0	8.5		9. 0
鉄 (Fe) ppm	+	+	0.1 5	++	+
全蒸発残留物 ppm		8 9			4
熱灼残留物		1 9			
熱灼減量	8	2 9			
浮遊物質	3 0以上	2 3	1 7	1.5	1.0
透視度	0 0以上	2 3	17	1 5	1 0
備考			泡、ノロの		
			流下顕著		

F	G	H台	I	J	K	L
千代田名ん堤			打内蓄養池		清水橋	十勝新橋
上(右)	下(右)	(右)	入口	出口	(左)	(左)
"	"	1 0. 9	"	"	1 0. 8	"
1 6:3 0	1 6.4 0	1 2:3 0	1 8:5 0	1 4:0 0	11:30	1 5:5 0
"	"	"	"	"	"	"
"	"	ВС	"	"	"	"
9.8	9. 8	1 8 0	1 5. 5	1 5. 5	1 4. 2	1 2 2
1 1 1	110	1 0. 6	1 0.8	1 0. 9	7.8	1 3 2
		muddy			clcar	-
6. 8	6.9	6. 9	6. 8	6. 8	6. 7	7.4
21.4	220	2 4. 4	20.8	3 0. 0	1 3. 0	3 5. 0
1 0 6 1	11.14	1 0. 5 9	1 0.14	10.00	1 1 4 8	10.76
9 9. 6	1 0. 4 4	983	9 6. 0	9 8, 5	9 9. 7 8	1 0 6 0
1.50	1.50	2.00	2.00	1.9 5	2.00	2. 6 4
1. 0 5	100	2.10	1. 4 6	1.79	2 3 8	4.00
4. 5	4. 0	9. 5	9. 5	9. 0	4, 7 5	4.70
2 0. 5	2 1. 5	2 0.0	3 8 5	3 & 0	3 5. 6	2 8 5
0.045		0.048		0.15		0.02
			+			
8. 0	8.0	8.0	8. 6	9, 0	4. 8	7 2
+	+	+	0.45	0.40	+	+
		. 6 8	180	7 3	-	
		3 🕏	1 1 3	4 0		
		3 0	6 7	3 3		
		2 8	1,11	3 6		
1 3	1 0	2 5	1 8	2 5	1 0	1 5
			Stocked			
			底質 C O I	= 9, 10		

Č					
	A	В	С	D	E
採水場所	清水大橋	十勝橋	祥 栄 橋	十勝大橋	十勝温泉
	(右)	(右)	(右)	(右)	(右)
採水年月日	1017	"	"	"	"
採 水 時 刻	1 0:3 0	1 1:0 0	1 1:4 5	1 2:1 5	1 6:1 5
採 水 部 位 (深度)	2 0 cm	"	"	" .	"
天 候	В	"	"	"	"
風 向 。風 力	1 3 0	1 0 8	1 0.8	1 1. 8	1 1. 0 0
気 温(℃)	8 7	8.8	150	9. 8º	1 0. 8
水 温(℃)	clear	muddy	clear		
水色	٠				
味 • 臭 気			+		
濁度		4			
水素イオン濃度(PH)	6 9	6.8	6.6	6.8	6.9
硬 度(CaCO ₃)ppm	2 4 0	22.0	2 3 0	2 4. 4	2 4. 6
容存酸素 (D . O) ppm	11.85	1 1. 1 5	9.4 5	10.84	1 0 4 5
容存酸素飽和度 %	1 0 5 1	9 9. 1	9 6 8	980	9 7 5
C.O.D ppm	1.07	1. 2 3	7 2 8	1.9 4	2. 1 5
B.O.D ppm	1.5 2	1. 6 0	1 5 2 0	1.80	1.9 6
塩素イオン(cl-)ppm	10.77	8.60	8 2 6	9. 6	1 1. 5 0
硅 酸(SiO ₂)ppm	29.5	2 3 0	2 0 0	2 4. 4	264
リン酸イオン(POF)ppm			0.22		
アンモニア態窒素(NH、N)ppm		Α.	1. 4 4	0. 3	0.1 7
亜硝酸態窒素(NO ₂ —N)ppm					
硝酸態窒素 (NO ₈ -N) ppm			+		
硫酸塩 (SO ₄) ppm	7 8	7 6	6. 9	6.7	8 7
鉄 (Fe) ppm	0.15	0.18	0.05	0.1	0. 1
全蒸発残留物 ppm					
灼熱残留物 ppm					
灼熱減量 ppm	ч				
浮遊物質 ppm					
透視度cm	380以上	1 0	2 5	8 0以上	
備考			泡、ノロの 流下顕著		

F	G	H	1	J	K	L
千代田紀ん堤		長 臼	打内蓄養池		清水橋	十勝新橋
上 (右)	下(右)	(右)	入口	出口	(左)	(左)
1 0 1 6	"	1018	"	"	"	"
1 6.4 5	1 7:0 0	8:0 0	9:3 0	9:4 5	1 0:4 5	1 6:0 0
"	"	"	"	"	"	"
В	"	вс	"	"	"	"
8.8	8_6	1 0. 4	1 1. 4	2.		
10.0	10.0	9. 4	9. 7	9. 7	8.2	1 3 4
				-		
6.8	6. 9	6.8	6.8	6.8	6. 8	7.2
2 2. 0	226	3 6. 4	270	20.0	1 5.4	3 6. 8
1029	1115	1 0 5 8	9. 9 5	9.72	1 1. 3 8	1 0. 7 6
9 4. 2	1 0 2 1	9 5.0	9 0. 5	8 8 4	9 9. 7	1 0 6 4
1.70	1.90	2.33	2 1 5	2.50	2.4.4	2.3 5
1.68	1. 6 0	2.03	2.03	2.1.5	4. 2	4.7
8 6 1	8 0 7	1 0 9 3	1283	1 2 8 3	8 6 5	7 6 9
2 4. 5	29.0	2 0.0	2 1. 5	2 2. 0	2 4. 0	3 0 8
~ 4. 0	2 4 0	~ ~ ~	~ 1. 0	0.02	2 4 0	0 1 7
0.23	0.26	0.16	0.15	0.18	0. 2 4	0.20
u 2 8	0.20	u 1 0	0.13	ulo	u. 2.4	420
7. 6	9.0	0.0		0.5	100	+
	8.6	9. 0	8.0	9.5	1 0. 2	7 6
+	0. 1 5	0.19	0.05	0.25	+	0.04
				-	8	
					1	
				*		
4			^			
			Stoced	10,000		
	L	L				

	A	В	C	D D	E
	清水大橋	十 勝 橋	祥 栄 橋	十勝大橋	十勝温泉
採 水 場 所	(右)	(右)	(右)	(右)	(右)
採水年月日	1 0. 3 1	(4)		(1)	
探水時刻		1 2:3 0	1 3:2 0	1 4.3 0	1 6*1 0
採水部位 (深度)	2 0 cm	2 220	2 0 6 20 0		
天候					
風 向 · 風 力					
気 温(℃)					
水 温 (℃)	9. 1	8.7	9. 7	9. 9	9. 8
水 色	clear		1		
味。 臭 気	01.041	1			
濁		3.			
水素イオン濃度(PH)	6. 9	7. 0}	6. 7	6. 9	7.0
硬 度(CaCO ₃)ppm	2 2 5	2 0. 8	2 1.5	2 2. 8	2 2. 5
容存酸素(D.O)ppm	1 1. 0 2	1 1. 0 2	1033	1024	9. 8
容存酸素飽和度 %	9 8. 7	978	9 & 9	9 3 5	8 9. 5
C.O.D ppm	1.48	1.08	7 2 0	1.85	262
B.O.D ppm	1. 1. 4	1. 6 0	1 8 5	205	8. 0
塩素イオン(cl-)ppm	9, 8	9. 6	9. 6	9. 4	1 0. 5
硅 酸(SiO ₂)ppm	3 9, 1	2 6. 0	2 5. 0	2 5. 0	2 3 0
リン酸イオン(PO4)ppm			0. 1. 4		*
		0.08	1. 4 4	0, 1 8	0.15
アンモニア 熊窒素 (NO ₂ —N) ppm 亜硝酸態窒素 (NO ₂ —N) ppm					
硝酸態窒素(NO,-N)ppm					
硫酸塩(SO ₄) ppm	1 0.7	1 2 0	1 2 0	9. 4. 5	1 2. 9
鉄 (Fe) ppm	0.175	0. 5	0, 5 5	0.075	0.15
全蒸発残留物 ppm		1 3 1			
熱灼残留物 ppm		8 4	٠		
熱灼減量 ppm		4.7			
浮遊物質 ppm		3 8			
透視度 cm	30以上	1 6	30以上		
		上流	泡、ノロの流	Ē.	
備考		砂利採取	下顕著		

F	G	Н	I	J	K	L
		£ 8	打内蓄養		清水橋	十勝新橋
	下(右)	(右)		出口	左	左
工(石)	1(4)	11.1	7 H	<u> </u>	1031	<u> </u>
1 6:3 0	1 6:4 0	1 1:3 0	1 3:0 0	1 3:3 0	1 2:1 0	1 6:0 0
1 0.0 0	10,10	1.00	10.00	1 0.0 0		
9. 8	1 0 0	8.4	8.0	8.0	8.6	1 2.5
., .						
		1				
6. 9	6.8	6. 9	6. 9	6. 8	6. 8	7 4
2 1. 5	2 1. 6	3 4. 1	2 8 5	2 1. 0	1 4. 4	3 4. 0
9.85	1 0 8 5	1 0. 9	1 0.6	10.1	1 1 0 0	1 0.0 5
8 9. 7	9 9. 3	9 5. 5	9 2 5	9 2, 5	973	97.4
1. 6 9	1. 2 5	260	2. 9 0	3. 3. 7	2.45	260
a 0 1	2. 5 1	289	2.06	2. 2 9	210	4.0 5
7 0	7 5	8 6	1 1.8	1 1 5	8.0	7 0 5
2 2 0	2 4. 0	2 6 5	2 7. 0	2 9 1	26.5	295
		£ # 5		0.14		
0.04	0. 0 2	0.085	0.04	0.1 3 5	0.20	0.18
		0.0.2.5				
				169		
1 2 0	9. 3 5	1 3. 8	1 5. 6	0.05	1 1. 5	1 2.8
0. 1	0.05	0.05	0. 5 3			0.06
		4.4				
			0.5	0 =		
	-	2 5	2 5	2 5		治の法下
			Stocked	0,009	*	泡の流下

-167-

		芽室デンプン		処理池		
採 水 場	121	セパレータ 処理 前	処理後	放流水	貯留池	ピウカ川
採水年	月日	9. 1 2	"	//	"	"
採 水 時	刻					
採 水 部 位	(深度)	2 0 cm	"	"	"	"
天	候	В	"	"	"	"
風向·風	カ					
気	(°)		-			
水	且(℃)	1 6 5	1 6 0	174		
水	色					muddy
味 • 臭	戾	++	+'+	++	+++	++
濁	度		*			
水素イオン濃度(рн)	-	,			6. 3
硬 度(CaCO)ppm		,			
容存酸素(D.C) PPm					
容存酸素飽和度	%					
C . O . D	ррm	7 1 6	1 7 9. 4	1 4 6 9	7 1 9. 8	6 2. 7
B . O . D	ъъш	8 0 6 5	2 3 4. 0	2030	8 4 7	8 7 3
塩素イオン(cl-) ppm	*				
硅 酸(SiO ₂)) ppm					
リン酸イオン(PO4ー) ppm					
アンモニア態窒素(N	H ₄ -N) prm					
亜硝酸態窒素 (NC	0 ₂ -N)ppm	<u>.</u>				
硝酸態窒素 (NO3-	-N) PPm					
硫酸塩(SO4)	ppm	5	4.			
鉄 (Fe)	ppm					
全蒸発残留物	ppm					
熱灼残留物	ppm					-
熱灼減量	ppm					
浮遊物質	ppm					
透視度	ppm	2. 5	2.0	3. 3	2. 0	2. 5
備	考	操業開始 8月20日 バレイショ豊	VE.			

		-	十幅デンプン				
"	"	")				
1 0.8	1017	1 0. 3 1	9.12	9.26	10.8 %	1017	1 0.3 1
1 2 5 0	1 1 3 0	1 4.0 0					7
"	"	"	2 0 cm	"	11.11	"	"
c	ВС	В	В	С	C	В	В
			į.				
1 3 2	1 1. 0	15.8		1 6 8	1 1.8	1 2.0	
1 2 2	1 1, 9	1 2.4		1 4. 6	11.6	128	15.15
			muddy				
++	++	++	++	++	++	++	++
6. 1	6. 2	6.3		6.3	6.3	6.0	6.2
					^		
	1.56						500
							51.3
	4.	1	1	1			29.9
6 4. 6	1580	1 3 0.7	1 3 0. 5	6 9. 7	4 4.8	765	7 9. 0
}							
					- 7	200	2.0
3.85	1 0. 0	1 2 5			27	326	3.0
1	100				108		
1 4.0					1 40		
	201		413	3 3 6	298	326	
Ė							
				1	1		
					1		
	7.2						2.5
 			放流水は湿地	世帯で一部稀	釈される		
			放流水	約 3 七/	8001	L5 t Sec	
	1 0 8 1 2 5 0 " C 1 3 2 1 2 2 ++ 6 1 1.3 7 1 3 2 1 7 9	1 0 8 1 0 1 7 1 2 5 0 1 1 3 0 " " B C 1 3 2 1 1 0 1 2 2 1 1 9 ++ ++ 6 1 6 2 1 3 7 1 5 6 1 3 2 1 4 9 1 7 9 2 0 0 6 4 6 1 5 3 0	1 0 8	放 流 水 1 0 8	# 一		

() は河口からの距離Km 佐 幌 Ш 勝 III 0 士幌澱粉 清水橋 音 111 清水大橋(930) 上 新 十勝親橋 十勝橋(82.0) 祥栄橋 (73.5) ホクレン芽室 澱粉工場 十勝温 十勝大橋 (59.0) 千代田えん堤 ピウカ川 (45.0) 111 途別川 札 遠 打内 0 長臼 (3.0) -170-

調查地点略図

2 さけ親魚のそ上と稚魚放流の障害防除に関する調査 (釧路川における放流稚魚のへい死原因について)

昭和42年3月、釧路事業場から釧路川(美留和川合流点付近)に放流したさけ稚魚の大量へい死については、第1表に示したとおり、昭和42年3月および4月に行つた十勝支場の調査から、水中のアルミニウム化合物による窒息あるいは高酸性水による蛋白の凝固などによるへい死と考えられ、さけ・ます再生産事業に重大な問題として提起された。

第1表 昭和42年3月~4月における釧路川の水質検査ならびに 生物試験結果

			美留和川	= -		稚魚
			合流点前	合流点後	弟子屈町	放流点
月		日		4 月	1 9 日	
水	温	С	- ,	8.0	-	1 0.8
	PН		4. 9	5. 4	6.15	6. 7
AL	mg/	/L	1. 6	1. 6	1.5	0.4
2 4 B	寺間の	1	1 0 0	-	-	-
~ h	死率%	2	2 5			_

分 析;北大工学部

生物試験;釧路事業場

へい死率1、河川に生簀を設けて行つた場合

2. 10ℓの河川水に20尾の稚魚を収容して行つた場合

とのため昭和43年9月、北大工学部後藤助教授らによつて詳細な水の分析調査が行なわれ (第2表)へい死はほぼ川湯を起源とするアルミニウムに起因するととが明らかにされた。

第2表 釧路川さけ稚魚へい死場所における水質 (北大工学部調査報告43.95より抜すい)

		水温	PH	金Aℓ	モジマー	Zh	Fe	S O 4
釧 路合 流	川前	166	4.7	2.0	0.95	_	0.15	8 5
美留	和川	110	7 5	0.08	-	-	0.10	1 5
美留 合 流	和川	16.7	5.2	1. 5 5	0.27	0.023	0.13	8 0

調査課は後藤助教授らによる調査に参加すると同時にアルミニウムイオンの毒性試験を行な う機会を得たので、水中におけるアルミ化合物の状態ならびに問題点の解説を含めてその結 を報告する。

(1) アルミニウム化合物の水中における形状と問題点

アルミニウムの塩は古くから両性化合物とじて知られ、酸性液中では次式のように塩基と しての性質を現わす。

$$A\ell_2 (80_4)_8 + 6H_2 0 \rightarrow 2A\ell (0H)_3 + 3H_2 80_4$$

 $2A\ell (0H)_3 \rightarrow A\ell^{3+} + 30H$

しかし、 $A\ell$ は金属イオンとしては存在しなくてPH 3以下では、 アコ 錇 1オン $\{A\ell(OH)n\}$ n

という安定した形をとつて存在する。

この形のアルミニウムはアルミニウムイオン(モノマー)と称せられるが、PHが4より高くなるように従つて水酸基の部分が縮合反応を起し、不溶性の水酸化アルミニウムム 【Aℓ(OH)3 (OH2)28 ∞として沈澱するまでの種々の段階の量合度をもつで塩基性の多核アルミニウムイオン(ボリマーとも言われる)に変化することが知られている。このボリマーは 微酸性で極めて安定に存在することが知られている。

以上のように水中のアルミニウム化合物にはモノマーに溶解するもの、同じくボリマー に溶解するものおよび浮遊物として存在する固形の水酸化アルミニウムの3つの形がみら れる。

したがつて、放流稚魚が安全に放流されるためには、アルミニウムがどのような状態に なつたときに害がなくなるかを知つて放流地点を決定しなければならない。

-172-

以上の観点から、アルミニウム化合物の毒性について生物試験を試みた。また、多量に浮遊する固体の水酸化アルミニウムについても、呼吸ならびに餌料生物えの影響など、稚魚の降海生理、生態のうえで当然問題を提起することも考えられるが、この点については今回の予備試験から除外した。

なお、モノアルミニウムイオンは第8表に示したようにPHの増加によつて容存量が減少するため、生物試験にはPHの規制を行つた。

PH 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.8 5.4 5.4
£/マー 3.6 2.3 1.4 0.9 0.57 0.36 0.23 0.14

第3表 PHとモノマーアルミニウムイオンの溶解量

(2) アルミニウムイオンの毒性試験

① PHの制御

アルミニウムイオンは前項で述べたようにあるPH範囲ではほとんどポリマー状態になって容存する。


アルミニウムの毒性については、もしイオン状のアルミニウムが体粘膜にふれた場合に不容性のアルミニウムとなつて付着し、呼吸障害を起すものとすれば、ボリマー状のものとモノマー状のものの2つの性質のものについて検討しなければならない。

なお、モノマー状のアルミニウムイオンは PH 6以上ではほとんど存在することが出来ない。したがつてポリマーイオンによる影響を知るため、燐酸緩衝液を添加して PHの制御を試み、その結果を第1図に示した。また、 PHの増加によるモノマーイオンの重合を防ぐため、塩酸ならびに酢酸緩衝液による PH制御を試み同じく第1図に示した。

これらの結果、PH501M酢酸緩衝液を1L当b5CC注入することにLb、TLM測定時間内のPHをほぼ一定に保つことが予想された。

また、PH6の保持には、1 M燐酸緩衝液 5 0 CC/Lの注入により可能と考えられた。 したがつて、生物試験実施に際しては、PH5、1 M酢酸緩衝液 5 CC/L、および PH 6.2、1 M燐酸緩衝液 5 0 CC/Lを添加して PHを制御した。

-173-




第1図 PHの経時変化と緩衝液による制御

- A 0.1 N HCL 4.9 CC/L添加
- B PH 5.0 1 M 酢酸 buffer 3.5 CC/L 添加= 3.5×10⁻³ M
- C 同じく12CC/L添加=1.2×10⁻²M
- D PH 4.9 0.2 M 酢酸 buffer 28CC/L添加= 4.6×10⁻³ M
- E PH 6.2 1 M 燐酸 buffer 100 CC/L添加= 1.0 ×10⁻⁸ M
- F PH 5.8 1 M 燐酸 buffer 50CC/L添加= 0.5×10⁻⁸ M

② アルミニウムの毒性試験


a この試験は種々濃度の 2ℓ のカリ明ばんおよび 1ℓ の硫酸アルミニウム被検液にそれぞれ 10 尾の稚魚 (銀付後約 $1\sim 2$ 週間) を収容していつた。



-174-

また、鱧の開放や洗剰運動など異常な行動を始めるものが生じたが、それらの濃度は硫酸アルミ区および明ばん区で異なつた。

48時間後における半数へい死は1.4ppm相当の濃度区でみられ、へい死ま近いと思はれた1.4ppm相当の濃度区で発生した。




第3図 被検液のモノアルミニウムイオン量

なお

なお、水中のアルミニウムイオンは、PHの調整にもかかわらず第8図に示したように極めて短時間で激減した。これは供試尾数に対して被検液が少ないため、魚体や器壁に対して吸着したために生じたことも考えられる。

従つて、上に述べた致死濃度は真の値を示さない。また呼吸や遊泳行動にみられた異常についても同様に、使用容器が小さかつたため、酸素不足によつて生じたことも考えられる。(第4図)とれらのととから被検液量を多くして次の実験を行つた。




D 被検液 4 € に 3 尾の稚魚を収容し、致死濃度、呼吸およびその他の異常を観察した。 その結果は第 5 図に示したとおり 0.8 4 pp m相当の濃度区では 4 8 時間内に全数へ い死した。このときのP Hからみたアルミニウムの容存可能量は 0.5 2 pp mが計算された。従つてモノアルミニウムイオンの致死濃度は 0.3 4 pp mを越えることはないも のと考えられる。

ポリマーイオンの影響については全試験期間を通じて見られず、本実験で設定した濃

「硫酸アルミニウム使用」

尾数 3/4 &



第 5 図 多量の被検液を用いた場合の "モノマーアルミニウムイオン" の毒性

度条件(2ppm)では生理的な障害はないものと考えられる。

(3) アルミニウムイオンの毒作用について

被検液に収容した魚は洗剰運動を行なつたり、"ひれ"や鰮が白色の物質で被われるため、アルミニウムイオンの毒作用の1つとしては、鰓葉表面に形成される水酸アルミニウムムの被膜によりガス交換が阻害されることも考えられる。

しかしこの実験では容存するアルミニウムイオンの絶対量からみて、鰓などに大量に付着する白色物質が水酸化アルミニウムの沈着物とは考えられない。

このため、アルプミンの水溶液にアルミニウム溶液を添加したところ、蛋白質に対して凝固 作用のあることが認められた。従つて、このモノアルミニウムイオンによる稚魚のへい死は、 無葉表面の粘質と変性による呼吸障害に起因することで推察される。

なお、河川ではかなりの低濃度でもその作用を継続的に受けるため、鰓葉は致命的な損傷を 受けることが考えられる。同時に大量に流下する固体の水酸化アルミニウムは損傷を受けた鰓 の呼吸障害を一層助長することが考えられる。

※

- i 釧路川放流稚魚のへい死は、河川に含まれるモノマー態アルミニウムイオンによる呼吸障害に起因するものと考えられる。
- アルミニウムイオンによる障害については、呼吸器表面の蛋白変性ならびに水酸化アルミの付着によるガス交換機能の阻害と推察される。
- iii 致死濃度については正確な値を知ることが出来なかつたが(本実験では 0.84 ppm以下) 河川の魚は新鮮な一定量のアルミニウムイオンに常におかされているため、かなり低い濃度 条件(例えば 48年9月5日美留和川合流点にて 0.27 ppm)でも危険が伴なうものと考 えられる。
- iV 流水中にみられる水酸化アルミニウムの白濁物については、呼吸障害を一層助長すること も考えられるため、実際の致死濃度測定にあたつては、当然河水に浮遊する水酸化アルミニ ウムの直接あるいは間接的影響を考慮しなければならない。
- V アルミニウムイオンの致死濃度測定には、流水式で行なり必要がある。
- 3 中川事業場さけ稚魚異常へい死の調査結果概要

昭和42年度に中川事業場において発生した異常へい死については、昭和43年6月におこな つた水質調査から多量に溶存した窒素ガスに起因するものと推測されたが、本年度(昭和43年 度)も前年度同様12月初旬から著しく発生した。

このため本年は、へい死発生時に疫学的ならびに化学的調査を実施し、それらの結果から、へい死原因を検討した。

- (1) 疫学的調查
- ① ふ化用水中の細菌数

ふ化用水の細菌数について調査した結果は第2表のとおりである。

との結果によれば、ふ化用水の第1ポンプが最も少なく27個/CCとなつており問題にな

らない数である。しかしこれは千歳などの湧水に比して多い方である。第2ポンプでは40個とほぼ同数であり、水温の関係から見ても明らかなように、第2ポンプは水深が第1ポンプより浅く、河水を直接的に揚水している。場に室の排水部は363箇/CCと増加しており、へい死魚の多い箇所の下部の低7で166箇/CC、低14で162箇/CCと増加している。これはへい死魚による汚染であるが、その汚染の進行具合は特に著しいものではない。

② 細菌ならびにビールス感染試験

中川事業場では"ますのすけ"など他の魚種についてはへい死をみていないことから、病原体が種の特異性を示す場合も考えられる。ビールスは特に種特異性が強いことから考えて、ビールスによる感染も考慮されたので、細菌数ならびにビールスによる感染も考慮されたので、細菌数ならびにビールスによる感染試験を試みた。

試験方法

へい死が多数発生しているふ化槽(M7)の稚魚のうち動作が緩慢となつている稚魚をA区とし、へい死魚が出始めた第2養魚の中央部の稚魚をB区として、2群について試験した。 これらA、B2群の稚魚を冷蔵して持ち帰り、それぞれホモジナイザーにかけて微細化し、 それを次のように処理した。

• 滅菌 万過

細菌は沪過により除去し、病原ビールスが存在する場合通過する。

- ・ 滅菌戸液を熱処理 ビールスを熱処理によつて滅菌
- ・ 普通戸過 普通戸過によつて体組織のみを排除、細菌は通過する。
- 対 照 区

供試稚魚

干歳支場養魚池ならびにふ化槽の稚魚から、中川の稚魚へい死発生の時期と同一ステージの稚魚ならびに"臍のう"吸収直前の稚魚を本場に輸送したものを使用した。

飼育条件

 1ℓ のビーガーに300CCの井戸水を入れ、これに前記戸過物を各5CCづつ溶かした中に、稚魚を各15尾づつ入れて止水飼育を行つた。(水温 $7\sim10$ C)。5日毎に同一条件で換水を行なつて、へい死魚発生ならびに変化を観察した。

結果並に考察

2月5日~2月20日まで観察した結果、各区共に1尾のへい死も出ず、正常に臍の うの吸収が進んだ。

その他へい死直後および直前の稚魚の体内から細菌の採取を試みたが、前年度同様疑わしい細菌は培養されなかつた。

前年度の結果ならびに本年の結果からみると稚魚のへい死原因が、細菌その他戸過性病原体に起因する伝染性の病気による可能性は極めて少ないと判断される。

(2) 化学的調查

- 1 時期および調査方法
- ① 昭和48年6月5~7日および昭和44年1月12~15日には、ふ化用水中の容存 ガス量ならびに揚水後の瀑気効果の現況を調査した。
- ② 昭和44年1月29日~2月1日には、窒素溶存量とへい死との関係を知るため6区 の溶存条件を実験的に変えたふ化槽(第1図)および飼育池の溶存ガス量と離魚へい死 状態を調査した。
- ③ 容存ガスの予備的な制御による試験区の設定には、
 - ・ 瀑気塔内の水を水中ボンブで汲み揚げ、ふ化室の注水樋に瀑下させたもの(以下再 瀑気水)。
 - ・ ふ化槽(長さ18m、巾03m、水深03m)に活魚輸送用分散器1箇を用いて空気を圧送し、気泡による窒素の拡散除去効果を期待したもの。

の各種ふ化槽に砂利を入れ、沪過効果を期待したもの(以下沪過水と称す)を用いた。

④ 溶存窒素の測定には菅原の方法およびウインクラー、菅原の改良法に工夫を加えたものをそれぞれ使用した。

2 結果および考察

① ふ化用水ならびに河水中の溶存ガス量

第1図、第2図および第1表、第2表に測定箇所および分析値を示した。通常さけ・ます類のふ化用水について、へい死の原因となり易いものとして、酸素不足による窒息死があるが、第1表に示したように酸素については揚水時にやや低溶存量(第1井戸で酸素飽和度64~45%、同じく第2井戸94~74%)を示すものの、瀑気塔での瀑下中ならびに注水樋(親槽)通過などの間に空中より溶入し、飼育池においても極めて良好な条件にあるものと考えられる。

なお、酸素以外にも一般に知られている炭酸ガスによる呼吸障害やアンモニアおよび硫化物などによるへい死があるが、いづれも極めて少なく、へい死の原因にならないものと考えられる。

しかし、窒素ガスについては、1 2の調査から第1表に示したように極めて高い溶存量が測定されかなりの瀑気が期待された。飼育池においてさえ魚が窒素ガス病で慢性的にへい死することが知られている量(飽和度で12%)以上の1225~1259%と言う極めて著しい過飽和状態であるととが測定された。

また、パンケナイ川の河水は 1、2回の両調査時とも、異常に高い窒素飽和量(1206% および 1247%)を示した。この結果当事業場のふ化用水の水源および溶存窒素は、3回目 の調査結果(第2表)を含めた河水およびポンプ窒素絶対量の収支などから、パンケナイ川お よびその河水に起因するととが推察される。

なお、第1回の調査時には、ポンプ揚水中の窒素量が、河川より低い水温条件で増加(16 →72℃、溶存量162→203mℓ/L、鮑和度1206→1281%)したことから、 事業場周辺の地質にもなにか関係のあることがうかがわれる。また、第3回目の調査時には、 窒素溶存量が河水およびポンプ揚水ともに著しく減少していた。この原因については明らかでないが、窒素の放出速度に気温、水温の下降が何らか関係していることも考えられる。

② 瀑気効果および除去方法について

瀑気塔の効果は、第1表に示したように酸素では 30%以上(第1回目第1ポンプ)も増加するのに反して溶存窒素は $0.5\sim4.0\%$ 減少するにすぎなかつた。従つて、通常の瀑気方法では窒素の除去は極めて困難と考えられる。

しかしながら砂利層を通過させた場合の効果については、通常のふ化用水を用いたものおよび再爆気水を用いたもののそれぞれについて測定したところ、溶存窒素は 8 2 % および 1 2 1 %の減少がみられた。しかしこの場合には溶存酸素は同じか 5 2 % も減少し表。

なお、空気混入による気泡の拡散効果について はふ化用水の気泡に対する接触時間が短かいため、ふ化用水の流入量および水深との関係を知る必要があるものと考えられる。

以上の結果から溶存窒素は砂利層による沪過について最も効果的に除去された。そしてとの 溶存窒素減少の理由は明らかでないが再爆気水の場合著しいことから、再爆気により水中に生 じた気泡または酸素が何んらかの効果を有するととも考えられる。このため瀑気塔での瀑 気、および砂利による沪過などを同時におこなうことは、窒素の除去法として有効な方法 になるかも知れない。

いづれにしても窒素の除去には窒素の水中に対する混入係数の高いことも起因して相当 強力な瀑気が必要であり、種々の方法を併用しなければならないものと考えられる。


③ 窒素溶存量とへい死について

窒素溶存量とへい死との関係については、溶存条件を実験的に変えたふ化槽および飼育 池の稚魚について調べた。すなわち、第2図に示したように沪過水を用いたA、E槽でへ い死がほとんどみられなかつた。との理由について、E槽では窒素の減少(飽和度で968 %)とも考えられるが、しかしA槽での窒素溶存量が著しいへい死をみせたD槽と同じか、 むしろ多い状態であつたため明らかにすることが出来なかつた。


なお、予備実験として同ステージの稚魚(千蔵支場でふ化)を瓶に入れて窒素ガスを通 気したところ、臍のう突端部に白点状のものが生じてへい死するものが生じた。しかしこ の場合の溶存ガス量が不明であつたため再び同様実験を行ない、へい死の溶存ガス量を測 定した。この場合すべての魚がへい死する直前に通気したための正確な致死溶存量とはい えないが、1357%にも達していた。

また、上記実験水に、水温 7 ℃以上、溶存窒素 1 1 0 %以下の水にあつた稚魚を投入したところ瞬間的にへい死した。しかしながら、このときの実験温度は 1 8 ℃にまで上昇したため、この実験でのへい死原因は窒素のみによるとは限らないが、その影響を強く受けたものと考えられる。





通常 槽も斃死なし



i				
溶存	酸素	遊 離 炭 酸	アンモニ アーN	流下物
CC / L	飽和度%	CC/L CO2	mg/L	CC/L H ₂ S
6. 0	8 6. 0		_	0. 2 2
5. 5	6 4.0	1 1 2	0.08	0.18
7 2	8 4. 0	1. 9 3	0.08	0.18
		71		
8.3	9 & 0			
5. 8	6 8 0			
	1 1 1 4			
	1 0 6 7 (9 4 ~ 9 1) 5 5 8			
	4 5 5 (4 4) 9 8 2 (9 0) 8 9 8 (8 2) 9 4 0	2.6 1.7→1.6		
	1054	1. 3		
	1 0 8 6	1, 2		4
	1 7. 1			

中川事業場ふ化用水溶存ガスなよび細菌

2表

1969130~31

10	I m	=r		36	溶存	窒 素	溶存	酸素	DO 1 11	w di **
N6.	場	所	水 DOX	温	CC/L	%	CC/L	%	DOメーター による	細菌数
11	JII	水	0.45	0.7	2 1.1	1 1 4.6	1 0. 4	103	100	41
1	親	槽(30日)	7.6	73	180	1 1 4. 4	7 0	8 3 2	8 5. 0	2 7
1		(31日)	"		180	1 1 4.1	7.1	8 4. 6		
2		1 Kg	"	7.3	179	1138	7. 6	9 0. 9	9 1. 5	
2	第	宿空気 { 3 Kg	"		177	1121	8.4	1006		
4		よる瀑 1 Kg	"		184	1166	7,9	9 1. 4	*	
4	ボマ気	8 K <i>g</i>	"		177	1121	8.	101.8		
1 0	プジー	ャリ槽通過後	"		177	1122	7. 0	8 & 8	8 5. 2	
5	再排	易水後親槽	"	7.4	173	1 0 9. 5	7	9 0.1	92.0	
6	ジー	ヤリ槽通過後	"		15.2	9 6.3	7 2	8 5. 5	880	71
7	普	通槽			175	1112	8.7	1035	8 9. 5	166
8	親村	曹流下後	"			1 1 0.0		9 2.3	9 &	
	\$1	化室排水部								3 6 3
12	瀑	気 前	4.4	4.0	189	1116	6.8	7 4.3	8 2	4 0
13	第二ポポンプ	再揚水 気後 { のもの と混合	4.3	3.9	19.8	1173	9. 5	1033	1003	8 2
1 4	第部	2養魚池排水	3.9	3.7	19.5	114.4	8.5	9 2.3	9 5.8	162

前回の調査(1968年12月)に用いた器具との誤差

同一場所にて新旧

窒素② 1144→1141 酸素② 832→846 № 1

B 1122→1157 B 838→824 1610

旧

© 114.4-115.6 © 923-93.4 1614

-190-


中川事業場の地学的環境について

当事業場のふ化用水に含まれる窒素ガス量の異常性については、その原因の一つとして 考えられる地質学的な問題を検討した。その結果は下図に示したとおり、ふ化場をとりま く周囲の山々を形成する泥岩は、有機物に富む岩石と言われるが、地下水中の溶存ガス量 を異常に増加させるほどのものではないと言われる。

(地下資源調查所、山口博士談)

しかしながら、平地は有機物の極めて豊富な沖積層(礫、砂、粘土および泥炭)であり、 河水が各所で伏流することも関連して、本調査でもその可能が考えられたとおり、地層に 含まれるガス成分が地下水に溶け込む可能性の強いことが示唆された。

なお、上に述べたことについては一般に炭酸ガスやメタンガスなども多くなると言われているが、当ふ化用水の遊離炭酸は極めて少ないため、いづれにしても異常な地下水であることが指摘された。



(5) さけ不受精発生原因に関する調査

太平洋さけ、ます類はたゞ一回のそ上、産卵で生涯を終り、比較的短期間に全卵が成熟することが知られている。それ故人工採卵、受精を行うのに極めて便利な魚種と言つてよい。しかしながら現在まで人工ふ化行程中に屢々大量の不受精卵が発生し発見されることがある。不受精卵が発生する原因は種々雑多な要因があろうが、一般に人為的操作上の技術によるもの、魚自体の生理或は病気などによるものなどが考えられる。

これら不受精卵出現の原因を見極め排除するためには卵の成熟過程、排卵、未熱及び過熱などの 基礎的調査をする必要がある。(この調査については「昭和 4 2、 4 3年度さけ、ます増殖事業に 関する調査報告」を参照)ここにはその要点だけを述べる。

o 排卵について

さけの卵巣卵が未熟から成熟の正常な過程を経て、体腔内に排出されることで、最初に排卵を 始めてから全卵が排卵される時間は個体や取扱い等によつて相違するが、調査の結果、早い個体 は最初に排卵が始まつてから20時間内、遅くても48時間以内には完全に分離卵(所謂バラ子) になることが判明した。

o 未熟卵試験

人工採卵を実施する際、時に見掛け上成熟しているようでも、切開開腹してみると、未だ卵巣 卵の一部が残つている場合がある。この様な個体は残つている卵巣卵が成熟過程中にあり、後僅 かの時間で成熟する事を意味している。体腔内の排卵が約70%に達した時には略々80%以上 が完全な受精率を示し、90%排卵を越えた卵はほぼ正常に受精し、全卵が成熟段階に達している。 事を物語つている。

o 過熱卵試験

産卵そ上して未熟魚を蓄養し催熱させる場合、次々と捕獲魚を池に入れて、採卵、受精する前に採卵可能魚を選別する。その際、完全に全卵が成熟しているか、何日経過したか魚体からは判らない。それ故多くの蓄養魚の中には、過熱魚が混つていることが考えられる。それ故始めて排卵してから一定時間更に蓄養し、その受精率を調べたところ、過熱日数6~8日では223%~8842%と広い巾があつた。しかし10日過熱したものでも987%の高率を示した個体があったことから、安静にした場合には不受精卵も少なく、受精率も悪くなかつた。過熱魚は殆んど池の底に静止し殆んど動かなかつた。しかしながら、一般には多くの個体を蓄養池に入れるため、遊泳中の衝突、魚同志のストレスなど多くの諸要因も加わり、自然放卵という現象も起り得るため、どれ程長い期間保持することが出来ず、従つて不受精卵が発生するものと考える。この点は

さらに検討する必要がある。

o 体腔液

卵の混入と精水量に関する試験人工ふ化の受精法として、卵に精を加えて良く、混和し、更に 情水を加える乾導法はプロスキ(1877)が初めて試み、湿導法とくらべ極めて受精率がよく、 天然産卵の場合に卵・精を同時に放出し水中で良く混和される状況に近くなつているということ が出来よう。

さけの卵精は体腔液の中ではかなり長時間にわたつて受精力を保ち、卵は賦活されず、また精子もほとんど活動しないか、あるいはその運動が極めて緩慢である。また野村(1964)によれば運動が停止したものでも淡水を加えるととによつてふたゝび活発に運動すると言われている。自然産卵の際、卵精と共に体腔液も放出され、受精になんらかの役割をはたしていることが考えられ、水中に混じた体腔液が短時間ではあるが清水と界を生じていることからも推察される。

体腔液中では精子は清水に接した時の2~3倍から数十倍も長く活動し、また卵も清水に入れずにおくか、体腔液(あるいは等調リンゲル液など)に入れておくと数時間から10数日も受精力の変らないことが知られている。それ故体腔液の役割とそれが受精に及ぼす影響について検討してみた。

1) 体腔液量と受精についての実験

体腔液の存在が人工受精した場合、どのように作用するかを知るため次のような割合で体 腔液を添加した。一般に雌親魚の体腔液量は個体により異なり、また成熟度が進むにつれ増 加の傾向を示している。しかし、この傾向は成熟排卵後外部からの淡水の侵入することも考 えられるので、体腔液そのものの増加であるかどうかは明らかにされなかつた。

体腔液量は卵容量に対し、4~5%から10%程度でその量はいづれるあまり多くない。 (1 参照)

1. さけの成熟卵容量と体腔液量の関係

個体16	卵容量	体腔液量	割	合	備	考
1	7 8 OCC.	3.4CC	-	4.4 %		
2	700	3 9	100	5.6		
3	600	3 5		5.8		
4	710	5 5		7.7		
5	650	5 4		8.3		
6	800	70		8.8		
7	800	76		9. 5	腹部多	 * * * * * * * * *
8	750	76		1 0.0		
9	800	84		1 0. 5		

これらつ卵容量と体腔液量についての結果から下表の割合で体腔液を加え媒精水量は卵容量の $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、精液を1 CC つつ加え、受精率を調べた。

受精の方法は実験卵をビーカーに採り、それぞれの量の体腔液を加えて混和し、さらに 1 cc の精液を加えてよく混和したあと、清水を加えた(混和はいずれもヒーカーを振り動かして行い、そのあと 5 分間静置して後大量の清水に移した)。

2-A 体腔液添加受精実験

実験16	卵容量	体腔液量	媒	精	水	量		受	精落	K	備		考	
1	2 0 0	CC. 1 0	1 0		卵量の	1/2)		1	0 (検査卵数1	0 0 粒	Ī.	
2	2 0 0	1 5	100	(")		1	0 (0	",,	(8~165)割卵)
8	2 0 0	2 0	10) ("	1)	1	1	0 ()	"	(")
4	2 0 0	3 0	1 0) (")	1	,1	0 ()	, ,,	(")

2-B 体腔液添加受精実験

実験%	卵容量	体腔液量	媒 精 水 量	受精率	備		考	
1	2 0 0	CC. 1 0	cc 50(卵量の1/4)	100	検査卵数10	0 粒		
2	2 0 0	1 5	5 0	1 0 0	"	(8	~16分害	则卵)
3	200	2 0	5 0	1 0 0	"	(")
4	2 0 0	3 0	5 0	100	"	(")

2) 媒精水量と受精についての実験

自然産卵の場合は大量の清水中で卵精が放出され、良好な受精率が得られているが、人工受精における媒精水量と、受精率の関係および体腔液の添加による効果などについて実験を行い下表のような結果を得た。(3 - 1-2)

3-A 体腔液を除いた成熟卵に対する媒精水量についての実験

実験16	卵容量	媒 精 水 量	受精率	備考
1	1 0 0	CC 10(10%)	1 0 0.0	検査卵数 1 0 0 粒 (2 0 粒宛の平均)
2	100	20(20%)	9 6 0	"
3	100	30(80%)	9 9 0	
4	1 0 0	40(40%)	1 0 0 0	"

3-B 体腔液10CC宛を添加した場合の受精実験

実験 16.	卵容量	体腔液量	媒精水量	受精率	備考
1	CC 1 0 0	CC 1 0	% 5	1 0 0	検査卵数100粒 (20粒宛の平均)
2	100	1 0	1 0	1.00	"
3	100	1 0	2 0	100	"
4	100	1 0	3 0	100	"

実験(3)ー1、2ともに100%近い受精率を示し、媒精水量5%以上の場合は、ほとんど正常な受精の行われることが知れた。(3)ーAに於ける個体船2、3に不受精卵が出現したことは実験(3)ーBとの対比から本実験において条件とした媒精水量、体腔液に関連した原因によるとはみえず、他の原因によるものと考えられる。今後多くの追試をして原因を究明する必要がある。

3) 潰卵の混入と受精との関係

人工受精を行う場合費卵が存在すると受精率が悪くなることは、良く経験しているところであると共に多くの研究者によつて知られている。

それでどれ位の潰卵の存在が卵に悪影響を及ぼすか実験を行なつた。受精方法は前実験同様、体腔液、潰卵および精液をそれぞれ混和して行つた。

実験1~4を通じて、実験4で最も不受精卵が出現したことは費卵内容物の混入が不受精の原因になつているものと推察される。さけ卵の内容物は大部分が蛋白質および脂肪で粘調を帯び、その混入は卵の表面に附着して、卵門をおおい、精子の活動を鈍らせるばかりでなく、

淡水に接すると内容物が凝固して卵門から精子の浸入を妨げるものと思かれる。僅かではあるが潰卵が増加するに従つて、不受精の出現増加か認られるが、さらに多くの潰卵が混入した場合媒精水量との関係が問題になるので、それらの関係を詳細に究明するため再検討する必要があろう。橋本(1962)によれば、等調液による洗浄は不受精卵出現防止に効果があると言うことが知られている。

4. 費卵添加受精実験

実験 16.	卵容量	体腔液量	媒 精	水 量	潰 卵 数 個	受	精 率
1	CC. 1 8 0	1 0 CC.	1 8 0 (į	卵量と同じ)	1(約0.13%)	9706	20粒宛の平均)
2	180	1 0	180(″)	2(約0.20%)	960("
3	180	1 0	1 8 0 (")	8 (約0.41%)	970(<i>"</i>
4	180	1 0	180(″)	4(約0.55%)	9 2. 0 (<i>"</i> ·)

(6) 閉鎖水域におけるさけ属の数量変化に関する調査

1. 昭和 43 年度における支笏湖の湖沼条件

48年は春、夏、秋の8回にわたり支笏湖の物理、化学的条件の調査を行つた。その結果は表 1の通りである。これから調査した項目に関する限り特異な現象は見当らない。ここ数年安定した状態が続いているようである。

表1 昭和43年における支笏湖の物理・化学的性質

深度	水	温	(°)		02 (0	c/()		02 %	
m	1968— 3—19	1 6 8 - 8 - 1 2	'68- 11-1	68- 3-19	1 68- 8-12	1 68- 11-1	1 68- 3-19	1 68- 8-12	168-
0	2.4.5	2218	1 1.0 0	866	6.02	751	9 3 4	1006	999
5	2.40	21.48	1 0.66	872	612	7.58	93.9	101.1	1000
1 0	2.42	1570	1 0.5 2	865	7 3 2	7.53	9 & 1	1077	9 8 9
15	2.3 8	9.83	10.56	861	857	755	9 2.7	1096	9 9. 3
20	2.40	8.3 6	9.56	865	876	7.9 7	9 3 1	1097	1027
3 0	2.3 9	6.45	6.63	864	894	9.16	9 3 0	1068	1097
5 0	2.3 9	4.8 6	4.8 0	8.67	8.64	879	9 3 3	992	100.7
7 5	2.96	4.31	_	843	848	_	9 2.1	9 5.2	
100	3.24	4.03	4.05	831	862	848	9 1. 5	967	95.4
200	361	3.83	387	8.03	839	824	89.2	9 3 7	9 2. 3
300		3.76			791			884	

深度		PH		S	SiO ₂ (mg/l/)			P(μ9/	(L)
m	1 9 68- 3-19	1 68- 8-12	1 68- 1 1-1	1 68- 3-19	6 8- 8-1 2	168-	1 6 8— 3—1 9	68- 8-12	168-
0	7.4	7.7	7.6	2 9	23	19	0	0	0
5	7.4	7.7	7.6	28	23	18	0	0	0
10	7.5	7.6	7 6	27	2 2	19	4	9	0
15	7.4	7.6	7 6	3 0	24	19	16	1 4	0
2 0	7.4	7 6	7.6	28	2 3	21	14	6	0
3 0	7.4	7 5	7.5	2 6	25	2 1	14	4	0
5 0	7.4	7.4	7.5	2 6	2 5	17	0 .	14	0
7 5	7 3	7 3	-	2 6	2 8	-	4	8	_
100	73	7.3	7.4	2 6	2 4	20	4	7	0
200	7 8	7.2	73	27	2 5	19	0	5	0
300	_	7 2	_	-	2 9	_	-	4	-

深度	透	明 度	(m)
m	68-3-19	68-8-12	68-11-1
0	1 4	1 7	2 0
5	- 1		
10			,
15			
2 0			
3 0			
5 0			_
7.5			2
100	,		
200			
3 0 0			

2 支笏湖におけるひめます資源の調査結果概要

(1) 6~8月の漁獲試験結果

シシャムナイ地区において 6月19日 ~7月4日まで、定置網1ケ統により、および 6月12日~8月31日まで刺網(38 \times 3m; 5.5cm目) 27反により漁獲試験を行つた。その結果は次表のとおりである。

表1 シシヤムナイ地区漁獲試験結果

					漁	獲	尾	数尾	年	令 組	成 %
漁	具	操業日数	延日数	4	4 年	5	年	at	4 年	5 年	ā∱
定員	置網	28	- ^E	1 8	687	2 6,	725	4 5, 4 2 2	4 1. 1	5 8 9	1 0 0.0
刺	網	5 6	741	5	417	2 0,	338	25,755	21.0	7 9, 0	100.0
合	計	6.3	_	2 4	,104	4 7,	073	71,177	3 & 9	661	1000

表 2 定 置 網 に よ る 漁 獲 状 況

月			6 月		2	7. 月		合 計
有	J	中	下。	計	初	中	計	'm
4年	尾	5,937	1 0,2 6 2	1 61 9 9	2,4 7 7	11	2,488	18687
44	%	(457)	(388)		(417)	(783)		(41.1)
= 45	尾	7,054	16213	23,267	3,464	4	3,468	26735
5年	9	(54.3)	(612)		(588)	(267)		(589)
V ≅1	尾	1 2,9 9 1	26,475	3 9,4 6 6	5,941	1 5	5, 9 5 6	45422
合計	(%)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)
1日当	b	847~	1520~	847~	28~	15	15~	15~
最低~	最大	2,730	4,580	4,5 8 0	2,1 5 5		2,1 5 5	4,580
1日当	b	尾						
平均	漁	1,855.9	2,645.8	2,3 2 1.5	5, 9 41	15.0	5415	1, 6 4 4. 2
獲尾	数							

表 3 刺網の反当り尾数の推移

月		6	月		7	月		8	月	_	大
旬	中	下	計	中	下	計	初	中	. 下	計	計
4年	20.2	6.5	19.6	6.3	3.9	4.9	5.1	5. 6	8.0	6.0	7.3
5年	2 4.0	9 1.3	2 6.7	4 0.0	19.0	285	25.7	2 3 2	3 1.9	264	274
計	4 4.2	978	46.3	463	2 2.9	3 3. 4	3 0.8	287	3 9. 9	3 2.4	3 4.8

表 4 刺網試験漁獲結果(6~8月)の経年変化

		V6 444 101	- / -		年 令	組成	(%)
	使用反数反	漁獲尾数尾	尾/反	- 8	4	5	6	7
昭 4 0	2, 1 1 8	4 5, 5 1 7	2 1. 5	0. 2	7 8	8 9. 4	2. 5	0. 2
昭 4 1	2, 0 7 2	5 6, 9 7 3	2 7 4		9 6 3	2. 2	1. 5	-
昭 4.2	1, 6 0 1	6 2, 5 4 8	3 9. 1	-	6 2.8	3 7. 2	_	_
昭 4.3	7 4 1	2 5, 7 5 5	3 4. 8	_	2 1 0	7 9. 0	_	_

(2) 6~8月の釣人数の調査結果

漁場 6ヶ所からの釣人数の毎日の結果は表5のとおり。

表 5 半日当りの釣舟及釣人数の推移状況

	月		次	6)	月		7			月		8		月			合			計	
	釣	舟	数	1	4,	7	6	0		6,	0	3	0	2,	0	6	3	2		2,	8	5	3
-	釣	人	数	2	4,	0	7	0		8,	5	8	1	2,	7	9	9	3		5,	4	5	0

(3) 定置網漁獲魚の標識放流試験結果

網漁獲および釣獲の強度を検討するため本年も前年に引続いて定置網漁獲魚の標識放流を 実施し、その再捕状況を調査した。放流は6月25、26日に4年魚155尾、5年魚338 尾合計493尾を漁獲場所の沖合い約1000mの地点に、背部に、ビニールチユーブに赤 ラベルを付して放流した。その結果は表6のとおり。

(4) 昭和39年春放流の標識稚魚の再捕結果

人工ふ化放流の効果と天然産卵発先群の実体を知り、今後の増殖方法についての資料を得るため、昭和39年春より昭和43年春までの5ケ年間、毎年100万尾づつの定数放流を実施し、それと併行して稚魚の標識放流をほぼ隔年毎に実施している。

昭和 3 9 年春に放流稚魚数 1 1 4 万尾中、 1 0 万尾の両腹びれを切除して放流した。その再捕結果は表 7 のと 3 9 6

表 6 6月25~26日のビニールチューブ標識魚の再捕結果

	漁	獲	数(尾)	再	捕 (尾)	再	捕率	(%)
	4年	5 年	合 計	4	5	計	4	5	計
627 — 711 定 置	1 0,3 1 2	1 1,5 2 6	21,838	1	1	2	0. 6	0.3	0.4
6.27—8.3.1 刺 網	8,500	18,063	21,563	5	18	2 3	3. 2	5.3	4.7
合 計	1 3,8 1 2	29,589	43,401	6	19	2 5	3.8	5. 6	5.1
611~831 の 全漁獲に 対する推定値	2 4,1 0 4	47073	71,177	-	_	_	(141)	(138)	(155)

- 註 1 尚、釣り魚より57尾の再捕が確認されたがこの再捕率は12%と計算される。
 - 2. 秋親魚捕獲の際の再捕率は4年魚-19%、5年魚-86%となつている。

表 7 昭和39年春の稚魚標識放流結果

年		S 42			S 43			合 i	H	
	捕獲	標識	人工ふ化の効果率	捕獲	標 識	人工ふ化の効果率	捕獲	標 識	人工ふ化の効果率	天然產卵
	(尾)	再捕×11.5	(%)	(尾)	再捕×115	(%)	(尾)	再撤 115	(%)	推定効果
湖早畔	714	6 2 1	870	1,5 3 9	207	1 3 5	2,253	8 2 8	3 6 7	6 3.3
	1,615	1,730	1000	487	150	3 0.8	2,102	1,765	7 9. 1	2 0.9
ポロピ	1,734	0	0	4.2 0 6	3 5	0.8	5,940	3 5	0. 6	9 9.4
ヒナイ刺	4,890	0	. 0	3,984	1 2	0. 3	8874	12	0.1	9 9.9

註) 尚、標識魚の開漁期漁獲魚に対する混獲率は予想以上に低く、網漁獲に対しては昭和42 年037%、同43年013%の効果率が計算されたにすぎない。

(5) 産卵親魚に関する調査結果

産卵親魚の地区別、漁具別の捕獲結果および年令組成は表8のとおり。

Lbyse to 5	e.			=1					4	1	年	-						5	年			
捕獲場所	Л	合		aT			,	%				E	邑			%				E	星	
湖畔	우	. 1,	7	4	3	:	1	L	9	0		2	0	4	8	8.	1	0	1	5.	3	9
(曳)	8		6	8	5	1	S	8	9	5		1	9	8	7	1.	0	5		4	8	7
	計	2,	4	2	8			1	6.	6		4	0	2		8	3.	4	2,	0	2	6
湖畔	우		2	0	2			1	2.	9			2	7		8	7.	1		1	7	5
黒 岩	8		8	3	6			1	2.	1		2	0	1		8	7.	9		7	3	5
(刺)	計	1,	0	3	8			1	2.	3		2	2	8		8	7	7		9	1	0
ポロピナイ	우	4,	8	9	0	,	1	3.	9	9		6	8	4	8	6.	0	1	4.	2	0	6
(刺)	8	4,	4	0	6			9.	5	8		4	1	2	9	0.	4	2	3,	9	8	4
1	計	9,	2	9	6			1	1.	9	1,	0	9	16		8	8.	1	8,	1	9	0

表 8 秋 親 魚 の 地 区 別 及 び 年 令 組 成

(6) 環境条件の調査

湖沼条件では全般的に透明度が幾分低下している傾向が認められたほか、湖沼のプランクトン条件も比較的安定していた。

(7) 沿岸水域調査

1 あきさけ親魚の標識放流試験(昭和43年度) [襟裳以西海区 - 1]

I まえがき

北海道沿岸域に来遊するあきさけ魚群は、その約90%はオホーツク海区、根室海区、襟裳以東海区に来遊しており襟裳以西海区、日本海区はその来遊は少い。特に襟裳以西海区の道南域及び日本海区では2~3%にすぎない。当場ではこれら不振地域の資源を大きいものとするために種々の計画を検討し、すでに実施の段階に至つているものもある。その一端として噴火湾一帯の資源の増殖を計るために先づ遊楽部川より稚魚を多量に放流して或る程度の資源を育成し、その後、隣接河川の有効利用により現在の資源の5倍以上にすることを計画している。しかしながら、噴火湾域に回帰する魚群の回遊経路については目下のところ想定の域を脱せず、資源の評価を適格に行うことが出来ない現状にある。従つて資源の評価と効果の把握、更に、その回遊生態を知るために親魚の標識放流試験を行つたものである。

今回はその回遊状況についてのみ報告する。

Ⅱ 標 識 放 流

① 放流点と放流時期

噴火湾域に来遊する魚群は日高方面より南下し、鹿部沿岸域を回遊するものとの想定から、 放流場所として鹿部及び木直地域を選定した。

放流時期については魚期を初期、盛期、後期の3期に分け初期は9月下旬~10月上旬 盛期は10月下旬~11月上旬、終期は11月下旬とし、標識放流を行つた。(第1図)

② 供試魚及び標識

鹿部地域ではさけの漁獲は多くないためさけ定置網漁業は行われていない。しかし、雑小型定置網漁業は行われておりあきさけは混獲される程度である。そのため、雑小型定置網乗網魚を供試魚とした。また、木直地域についてはイカ定置網により混獲されるものを供試魚とした。

標識は供試魚を生簀に収容し、港内まで曳航し、MS・22202万分の1溶液で麻酔をかけ、魚体測定、採鱗を行つた後、背びれの前側筋肉部に標識票を附着させ、標識票はスパゲイ・タツクを用いた。

標識魚は生簀に入れ、沿岸より3000m以上の沖合で放流した。

③ 標識放流尾数

標證放流尾数は第1表に示した。

表にみられる通り、初期群は14尾、盛期群は190尾、終期群は8尾放流した。

第1表 標識放流場所、月日及び尾数

時期	放流月日	放 流 場 所	番	号	尾数	備考
477	4 3 1 0 4	鹿 部	北岛 1~	2	2	
初	<i>"</i> 1 0. 5	"	″ 3 ~	1 0	7	
期	" 1 0. 6	"	″ 11~	1 3	3	
797	" 1 0. 7	"	" 15~	1 6	2	
	小 計				1 4	
	43.10.30	鹿 部	北岛 17~	4 9	2 9	4尾欠番
盛	" 1 0. 3 1	"	″ 50∼	5 5	6	
20tt	" 1 1. 1	"	" 5 6~	6 9	13	1 尾欠番
	" 1 L 2	"	" 70~	8 2	1 2	1 尾欠番
	″ 1 1. 3	"	″ 83 ~ ;	9 6	1 3	1 尾欠番
	" 1 L 4	"	" 9 7 ~	1 2 8	3 1	1 尾欠番
期	" 1 1. 5	"	" 129~	1 3 9	1 0	1 尾欠番
2,54	<i>"</i> 1 1. 8	"	" 140~	1 9 1	4 8	4尾欠番
	<i>"</i> 1 1. 9	木直	" 192~	2 2 0	2 8	1尾欠番
	小 計	9			190	
終	4 3 1 1 2 7	鹿 部	北岛 231-	235	5	
期	" 11.29	"	" 236-	237	2	
舟	" 1130	"	" 238		1	
	小 計				8	A
	合 計			2	2 1 2	

初期群については9月下旬に1つの群が通過したが時化のため標識放流を行うことが出来ず魚群が5すくなつた10月上旬に行つたため僅かしか放流が行われなかつた。また、終期群も魚群が5すかつたため8尾しか放流出来なかつた。

■ 標識魚の再捕状況

① 再捕数

再捕については第2表に示した。

-204-

初期群は14尾の放流に対して12尾(再捕率857%)の再捕があり、盛期群は190尾(563%)、また、終期群については8尾の放流に対して6尾(750%)の再捕がみられた。

② 再捕場所 再捕場所については第1表、第2図に示した。

初期群の12尾の再捕のうち上磯地域で8尾とその大部分を占めた。そして噴火湾の遊楽部川で1尾、青森県の八戸沿岸で1尾の再捕がみられた。

盛期群については107尾の再捕のうち茂辺地、上磯地域で44尾(41.1%)と最も多く、また9尾は茂辺地川で再捕されている。次いで放流地域の南に位置する鹿部~木直の沿岸域で42尾(39.3%)の再捕がみられた。そして、噴火湾域の八雲沿岸域で1尾、貫気別川で1尾の再捕があつた。本州域の太平洋側では青森県の下北半島沿岸域で2尾、岩手県の種市、山田湾、船越湾、久慈沿岸で夫々1尾づつ再捕された。また、日本海側では青森県の深浦沿岸で2尾、鯵ケ沢沿岸で2尾、秋田県の男鹿半島沿岸で2尾、山形県の飽海沿岸、鶴岡沿岸で夫々1尾、日光川で4尾、月光川で4尾再捕された。

このことは鹿部、木直沿岸域を通過する主群は沿岸添いに南下し、その688%は主として茂辺地川之回帰し、本州の太平洋域えは94%、日本海域へは188%回遊することを示すものであり、噴火湾域への回帰魚は3%程度と少いことがうかがわれる。終期群は6尾再捕されたが、茂辺地、上磯地域で4尾、岩手県の宮古沿岸、及び津軽石川で各1尾であり、各地域の漁期の実態から終期群は盛期群に比べて本州方面之回遊するものの多いことが予想される。

③ 回遊経過日数


a 初期群

放流から再捕までの日数については、初期群では上磯沿岸で再捕されたものは3日目~36日目で10日前後のものが一番多い。また、遊楽部川での再捕は13日目であり八戸沿岸のものは27日目であつた。

b 盛期群

盛期群では鹿部一木直間の沿岸で再捕されたものは2日目~11日目であり3日目~5日目のものが多い。上磯、茂辺地沿岸では4日目~14日目であり6日目~7日目のものが多い。しかし茂辺地川での再捕は6日目~26日目であり、多くのものは15日目~28日目である。とのととは上磯、茂辺地沿岸域で長期間滞泳し成熟が近くなつてからそ上するととがうかがわれる。そして放流時期の遅いものは比較的速く再捕されている傾向がみられる。また、噴火湾の貫気別川での再捕は9日目、八雲沿岸のものは7日目であつた。

第 1 図 放 流 点 (⊗印箇所)



本州域の太平洋沿岸域では5日目~28日目、日本海沿岸域では18日目~32日目であり、また、月光川での再補は22日目~26日目であつた。

C 終期群

茂辺地、上磯地域では4日目~15日目であり、盛期群より移動が若干速い傾向がみられる。岩手県の宮古沿岸での再捕は11日目、津軽石川では20日目であつた。

Nまとめ

- 1) 噴火湾沿岸域へ来遊するあきさけ魚群の回遊経路、回遊状態を知るために標識放流試験を行なつた。
- 2) 漁期を初期・盛期・終期の3期に分け、鹿部及び木直より夫々14尾、190尾、8 尾合計212尾放流した。
- 3) 再捕は初期群 12尾(再捕率 8 5 7 %)、盛期群 10 7尾(563%)、終期群 6尾(750%)であつた。そして、鹿部、木直地域では44尾(352%)、上磯、茂辺地地域で56尾(448%)、噴火湾域で3尾(24%)、本州の太平洋域9尾(72%)、日本海域で12尾(96%)であつた。
- 4) 魚群の移動は初期の群より盛期の群、盛期の群より終期の群の移動が若干速い傾向が みられる。
- 5) 茂辺地川えそ上する魚群は沿岸滞留期間が長い。しかし、時期の遅い群程沿岸滞留期間が短くなる傾向がみられる。
- 6) 鹿部、木直沿岸を回遊する魚群は70%弱のものが茂辺地川へ回帰する魚群であり、本州地域へは30%弱のものが回帰し、噴火袴域えは僅か数%程度のものが回帰するものと想定される。そして、噴火袴えの回帰魚は時期の早い群には盛期群より若干多く含まれており、本州之回帰する群は盛期群、終期群に比較的多く含まれていることがうかがわれる。

2 からふとます標識魚の回帰について

昭和41年、42年春、遊楽部川におけるからふとます稚魚の放流適期を 把握するため放流期を 3月と4月に区分し、夫々別々の標識をつけて放流した。

前者は湧水管理、後者は河水管理とした。この結果、42年、43年秋には遊楽部川、八雲沿岸を中心として、長万部、落部の噴火湾沿岸域での回帰が認められ、移殖の効果、母川への回帰性が明らかに確認された。河川内への回帰は42年0056%、43年0024%を示したが、湾内の漁獲統計値から両年ともおりよそ06%前後の回帰があつたものと推察された。

(8) 河川、湖沼の理化学的性状の調査

北海道においてさけ・さくらます・からふとますの各種が河川にそ上し、現在河川が汚染されておらず、かつ、近い将来も汚染されることがないと思われる河川の代表として道南地方の遊楽部川を選定し、本年度から5ヶ年計画で本川の理化学的性状を調査することとした。本調査は国際生物学事業計画の研究と協同によるものである。

本年度は遊楽部川本、支流に6観測点を選び、24時間の同時観測を行ない、また本流に流入する各支流の観測も行つた。(図1、表1)その結果から、遊楽部川の化学的性状について、およそ次のようなととが明らかになつた。

表 1

採水地点番号	採 水 地 点
1	セイヨウベツ川 鶴見峠 定点 1
2	"" な化場 "2
3	遊 楽 部 川 " 3
4	" 4
5	#
6	// 捕獲場 // 6
7	キソンペタヌ川 大 曲
8	キソンペタヌ川 南満河橋
9	ユーラップ川 上遊楽橋
1 0	// 大富橋(セイヨウベツ川合流後)
1 1	トワルベツ川
1 2	ベンケルベシュベ川
1 3	鉛 川 鉛川橋
1 4	音名川
1 5	サランベ川 サランベ橋





図 1 ユーラップ川水系略図





- 1) 主成分についてはその濃度範囲からみて、北海道のほかの一般河川と異なる点はなく、どく一般的な河川である。たぶ、こまかくみると、季節的に差はあるが硅酸含量がやや多いこと、また年間を通じてPHが70~78と他の一般河川の66~72に比較して高いことが挙げられる。
- 2) 各観測点とも窒素化合物、燐の含量は少なく、また浮遊物やCODの量も非常に少ない。 これらのことから、化学成分上、2つの水系は人為的な影響がない清浄な河川と言える。
- 3) 2つの水系で特に異なる点は、1支流の鉛川の成分含量が他と比較して多いことであろう これは二の川の上流に菱マンガン鉱および硫化物を生産する鉱山があり、その廃水と、その 鉱山内およびその周辺に湧出する温泉水の流入が原因と考えられる。しかし、この支流が本 流に与える影響は、その川の規模からして大きくないようである。また金属成分(Fe、 Mn)も他に比較すれば多いが、大きな影響は与えていない。
- 4) 図・2に1967年8月7~8日に行なつた2時間おき24時間観測の結果を示す。図のように、化学成分についてはほとんど変動は認められなかつた。

§18 資料の刊行

- 1968年度(昭和43年度)の北海道沿岸河川域へのあきさけ来遊予報、並びに1967年度(昭和42年度)の来遊状況について 昭和43年8月
- o 魚と卵 127~128 昭和43年7月~昭和43年12月
- ふ化場研究報告 22号 昭和44年3月