# 昭和44年度

# 事 業 成 績 書


水産庁



虹 別 事 業 場 庁 舎 (改築) 115.61㎡



徳志別事業場飼育屋家(アーチ型コルゲート) 飼育池 143.24㎡ 上 家 129.5㎡



幕 別 事 業 場 飼 育 池 554.7㎡



岩尾別事業場全景

ふ 化 室
 213.57㎡
 養 魚 池
 619.3㎡




床材 (エキスパンドメタル)





ふ化用水配管 (VP φ 200mm)





### 刊行のことば

昭和44年度の事業の結果を報告します。

本年度は「さけ・ます増殖事業推進整備計画」(3ヵ年計画)の第2年目 に当ります。

さけ・ます資源を維持し、増大するためには、その再生産事業を拡大してゆかなければなりませんが、まづ第一に親魚、種卵の確保が重要な課題であることは論をまたないところであります。しかし、再生産用種卵を計画的に漸増するためにはその種卵を収容して効果的な管理を行なうためのふ化室、飼育池の整備促進もまた欠かせない条件でもあります。

こうしたことから、収容管理施設の整備に重点をおき、さらに機械化を導 入して合理的な管理体制の整備強化を図りました。

また、北海道、関係市町村、漁業協同組合などの協力によって一層、その 効果を推進することができました。

さらに、本年度は道立水産ふ化場森支場が新設されましたが、日本海、襟 裳以西海区に対しての資源の均てん化、増大対策の意に沿ったものであり今 後に期待されます。

整備計画はさらに次年度に引継がれますが、当場では総合的なさけ・ます 資源増大に努めてまいりますが、広く関係各位のご協力とご叱声をお願い申 し上げます。

昭和46年3月20日

水産庁北海道さけ・ますふ化場 場 長 逸 見 文 彦

# 水産庁北海道さけ・ますふ化場事業成績書

次

§ 1	さけ。ます捕獲事業実施体制	. 1
§ 2	さけ。ますふ化放流実施体制	. 3
§ 3	ざきけ・ます増殖事業経費	. 5
§ 4	北海道さけ。ますふ化場の現員	6
§ 5	北洋さけ・ます漁業	. 7
§ 6	さけ。ます増殖事業成績総括	. 9
§ 7	さけ増殖事業	13
1 11	1. さけの来遊(漁獲)状況と捕獲採卵の概況	13
	2. 沿岸漁業とそ上率	15
	3. さけ種卵の移殖	36
	4. さけふ化放流成績頻要	42
§ 8	ます増殖事業	57
	1. 捕獲採卵概要	5
	2. ます卵の移殖	- 78
	3. ますふ化放流成績将要	84
§ 9	ひめます増殖事業	. 99
§10	さけ。ます親魚蓄養成績	102
§11	べにさけ生産事業	- 118
§12	ますのすけ増殖事業	141
§13	交配種增殖專業	148
§ 14	河口通過稚魚観測專業	140
§15	降下稚魚保護事業	152
§16	稚魚飼育事業	170
§17	調査研究結果	185
§18	資料の刊行	26

# § : さけ・ます捕獲事業実施体制

暗和44年度のさけ。ます捕獲採卵事業は、道内 75河川、84捕獲場(さけ44カ所、さけ+ます 33カ所、ます6カ所、ひめます1カ所)で実施した。このうち国が実施した捕獲場は4カ所(徳志別、 雲別、遊楽部なよび支笏湖)、民間団体に実施させた捕獲場81ヵ所で、この詳細については第1表の とおりで、支場別に整理したものが第3表である。 ○さけ

⊚さけ、べにさけ

○さくらます

oからふとます

畑ひめます

つさくらます、からふとます

第1表 昭和44年度さけ。ます捕獲採卵事業実施体制

**あからふとます、交配種** 

海		1	捕	獲		所	管	実	施	区	分	海			捕	獲	所	管	実	施	区	分
"	水泽							3	H	ま	寸		水	系					さ	け	主	寸
区			深」	卵場	7	事業	場	国	民	国	民	区			採	卵場	事	<b></b>	国	民	国	民
	岩尾兒	11 4	当 月	笔 另		岩犀	2 211		0		0	_	尻	- 別	名	駒	尻	Dil				
	オクシベン			セッシベン		斜	里					日本	朱	太	朱	太		別"		0		0
	斜里		計	 	- 1	15-1					0	海	不利	別	小冷	水	利	別		0		
	藻翠		页			藻	琴		0			区		沢部		沢部		パ部		0		
	網走	1	経	力	1	網網	走				0	計	-	8	/-9-	11	13-6	8		0	-	
オ	// EM	1"	四角			MA .	/		0			E I	ル	#	ル		羅	o Él	-	9	1	5
ホ	常呂		当不	NG A E	ା	北	見				0			ハイ		ンルイ		"		0		
	ライトコド	- 1 '		בר		+L			0		Ů		羅	日	羅			,,				۰
	佐呂間別	. 11		間別	- 1	,,			0					11日子		小古丹		,,		0		
ッ	湧 另		角	另	1	湧	別		0		^		植	別	植	別	蔗	別		0		0
1	潜	1	哲	为		洛	消		0		<u>A</u>			奇無異		奇無異		נינ <i>ו</i>		0		
	興	Ι,	田	台		113			0		0	根				無異		"		0		
海	幌 P	1	記	Þ	~ I	幌	内		0		-			無異	蓝	無別		,,		0		-
区	雄道		進	P F	- 1	ibc n			0		0		茂士	別		多些		,,				
	德志另			志另		徳志				0	Ů	室	古	多糠	忠	多		茶仁		0		
i			足	心方		歌	登	0	0	0	0		忠	類	i	茶仁		// //		0		0
			泊額	5		敬頓	豆別		0	-	•		伊丽	茶仁	標標	* 1-	根			0		0
		.	設置	力		代.E			0			海	標	津"	3	1 線	1	# #		0		0
計	1 7	+	尺	1 8	-		1	1	1 /	1			NV.			- 幌		· 退別		0		0
		-	天		台	天	塩	1	0	1	14		当	幌	当春	別		以加		0		0
	"	1	へ 中			中	川					区	春中	別	日床	丹		,,		0		0
B	"	- 1			11	T /			0.		0		床	丹		別		別		0		0
本	小平等	.			日は		塩		0				西	別	西		虹浜	加中		0		0
海	石		ī.,			天工			0		•		矢風	白別	天風	日列連	1	"		0		0
区	"	1	西	迫		千	歳		0		0			連		-	l			0		0
		_ 1	音士	. Y	胡胡	音	江		0	<b>A</b>	0		別	当賀	別職	当賀	厚	床		0		0
-	2001	1 .	支	勿	נעי	支笏	7 (97)			個			穂	香	穂	香				0		

海			捕		獲	所	管	美	施	区	分	海				捕		獲	所	管	身	2 施	区	分
	水	系						3	H	京	す	114	水		系						3	け	重	す
区			採	卵	場	事美	<b></b>	国	民	国	民	図				採	卵	場	爭	業場	国	民	国	民
計		2 0		2	1			1	18		13		Ξ		石	Ξ		石	静	内		0		
	別簿	《辺牛	厚		岸	太	田		0				静		内	静		内		//		0		
	釧	路	釧		路	釧	路		0		•		新		冠	新		冠		#		0		
Lutate	[snj	寒	阿		寒	阿	寒		0			襟	沙		流	富		][]		//		0		
襟	茶	路	茶		路	鶴	居		0			N.	鵡		Ш	鵡		][[	丰	歳		0		
裳	+	勝	打		内	+	勝		0			裳	勇		払	勇		払		//	1	0		
-22		<i>"</i>	東	3 3	号	札	内		0				白		老	白		老	白	老		0		
以		"	利		別	蘇	别		0			以	敷		生	敷		生	敷	生		0		
		//	幕		別	/	,		0		0	西	貫	気	別	貫	戾	別		"		0		
東		#	干	代	田	+	勝		0			Ka	長	万	部	長	万	部	八	雲		0		
海	歴	舟	歷		舟	大	樹		0			海	遊	楽	部	遊	楽	部		#	0			
114		似	豊		似	/	,		0			- 6	沙		泊	汐		泊		"		0		0
区	楽	古	楽		古	1	,		0		)	区	大		野	大		野	知	内		0		
	広	尾	広		尾	/	,		0				戸	切	地	戸	切	地		"		0		
	猿	留	猿		留	,	,		0				茂	辺	地	茂	辺	地		″		0		
計		10	T	1	4		8		14		2		亀		][[	亀		111		<b>"</b>		0		
	仁	雁別	仁	雁	別	静	内		0		0		知		内	知		内		"		0	1	
	锯	別	幌		別	,	,		0			計		2	0		2	0		6	1	19	1	3
	1	浦川	元	浦	Ш	,	7		0			合計		7	5		8	4		4 1	3	74	3	37

#### 第2表 前年度対比変更個所および事項

1 3	Ż.	場	捕獲場	魚	種	摘	要	支	場	捕	獲場	魚	種	摘	要
4	S	見	オクシベツ	からふと	ます	新規で	上調査	+	勝	费	似	さけ		新規。	そ上調査
		1	ライトコロ	さけ		"	"		-	樂	古	"		"	"
			佐呂問別	- 11		継続	"			猿	留	"		継続、	そ上調査
- 5	2	塩	下中川	"		新規、	独立	渡	島	汐	泊	さけ、さく	らます	"	"
1			小 平 蘂	さけ、か	ふるとます	"				大	野	さけ		分離、	独立
13	Ż	華		さけ・		新規そ	上調査			F	切 地	" -		独立、	そ上調査

#### 第3表 支場別さけ。ます捕獲事業実施体制

	-			捕		獲	9	起	方	色	区	分		,	
支	場	水	系				ż	H			主		す	備	考
				採	卵	場	国	民	B		玉	民	間		
北	見		1 3		1	4	-		1	2			1 1		
根	室		2 0		. 2	1	. 1		1	8			1 3		
+	勝		1 0		1	4			1	4			2		
天	塩		6			8	1			6	1		5	1	
7	歳		1 4		1	6			1	5	1		4	ますの項、国は	いめます
渡	島		1 2		1	2	1		1	0	1		2		
	計		7 5		8	4	3		7	5	3		3 7		
4 3	年度		7 0		7	8	4		6	9	4		3 0		

# § 2 さけ・ますふ化放流実施体制

昭和43年度のさけ。ます人工ふ化放流事業は66カ所(国40カ所、道1カ所、民間25カ所)で実施し、58水系に稚魚を放流した。そのほかに、捕獲を実施しているがふ化場のない水系、捕獲、ふ化とも行なっていない24水系にも稚魚を放流した。

昭和43年度のさけ。ますふ化放流実施体制については第1表から第4表に示したとおりである。

第1表 昭和44年度さけ。ますふ化放流実施体制

海区	放		流	放	流美	<b>E施</b>		-FEI	魚	種	海	放		流	放	<b>荒実施</b>		Tes	魚	種
区	水	系	名	事	業	場	支	場	さけ	ます	区	水	系	名	事	業 場	文	場	さけ	京寸
	岩	尾	别	岩	尾	別	北	見	0	0	根	標		津	根	室	根	室	0	0
	斜		里	斜		里	"		0	0	室		"		中	標準	"		0	
オ	藻		翠	藻		琴	"		0	0	<b></b> 海	当		幌	計	根別	"		0	
ホ	網		走	網		走	"		0	0	区	西	别	別	虹	別	"		0	0
1	常		묌	北		見	"		0	0		風		連	浜	中	"		0	
<b>"</b>	湧		別	湧		别	"		0	0	-	別	当	賀	厚	床	"		0	0
2	渚		滑	渚		滑	"		0	0	計			8		9	"	1	9	4
海	幌		内	幌		内	"		0	0	Jobs.	別類	<b></b>	牛	太	田	+	勝	0	
区	德	志	別	徳	志	別	天	塩	0	0	襟	釧		路	釧	路	1	,	0	
	妃		别	歌		登	"		0	0	裳		"		鶴	居	/	,	0	0
	頓		別	頓		別	//		0_	0_	以	阿		寒	[30]	寒	"	,	0	
計		1	1		1	1		2	1 1	11	東	+		勝	+	勝	"	,	0	0
	天	-	塩	天		塩	天	塩	0		海		"		幕	別	"	,	0	
		"		曲		Ш	"	,	0	0	区		"		札	内	"	,	0	
B	石		狩	千		歳	干	歳	0	0	<u> </u>	歷		舟	大	樹	/	'	0	
4:		//		音		江	"		0	0	計			5		8		1	8	2
海	支	笏	湖	支	笏	湖	"	,		囫	襟	静		内	静	内	千	蒑	0	
区	尻		别	尻		别	渡	島	0	0	裳以	白		老	白	老	//		0	
	剂		別	利		別	"	,	0		西	敷		生	敷	生	/	,	0	
	厚	沢	部	孠	沢	部	"	, 	0		海区	遊	楽	部	八	雲	渡	島	0	0
計			6			8		3	7	5		知		内	知	内	/		0	
根	羅		日	羅		日	根	室	0		計			5		5		2	5	1
室	煮		别	燕		别	"	,	0		合計									
	伊	茶	仁	伊	茶	仁	1	,	0	0	計		3	5		4 1		6	4 0	2 3

第2表 道、民間仮収容施設

海		区	放		流	1	流 実	1	支		場	魚	種	備	考
			水	术	名	簡	所	名				さけ	ます		
オホー:	1 2	海区	常		呂	福		Ш	北		見		0	常呂漁協	
			雄		武	雄		武		//			0	雄武漁協	
			時		前	時		前	天		塩	0		宗谷漁協	
日 本	海	区	大		沢	大	沢	111		"			0	船泊漁協	T A SE T TOTAL THE STREET, IN
		*	増		妃	增		幌		//		0	0	宗谷漁協	
			暑	寒	別	增		毛		//		0		增毛漁協	

					1
海 区	放 流	放流実施	支場	魚種	備考
	水系名	箇 所 名	~ ***	さけます	
根 室 海 区	ルサー	ルサー	根 室	0 0	羅 白 漁 協
	古 多 糠 忠 類	古多糠、忠類、	"	00	標準漁協
	床 臼 別 番	床 丹 別 種	"	00	野付漁協別海漁協根室漁協
傑 裳 以 東 海 区	· 院 戸 別	幌ム利広猿	十 勝 "	00000	浜 白 漁 漁 瓶 田 漁 瓶 田 漁 風 尾 泉 駅 原 駅 町 協 町 協 町 協 町 協 町 県 泉
镁裳以西海区	歌 別 仁 雁 別 元 浦 川	歌 別別 別別 川	千 歳	0000	が 様 似 町 調 川漁 路 北 海 道
	大 野 茂 辺 地 亀 川	有 川 茂 辺 地 単	" "	000	上磯漁協茂辺地漁協木古内町
合 計	2 5	2 6	6	19 9	

第3表 還元および移殖放流河川

○ さくらます・ からふとます

					-			_	- /
海区	放流水系	放流 実施事業場	所管場	魚種さけます		放流水系	放流実施	所管支場	魚種がす
オホーツク日本根	オ藤能ラ佐芭興窟小余古朱春はシ沸 ト間 平 時	斜粗走 " 北見 "	北 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0000000 00 0	以東 襟 裳 以 西	庶茶厚仁幌幌三新沙勇長沙戸 雁 万 切 万 切	鶴居 " 勝 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	十	0000 00000000
室	植別	伊茶仁 計根別	//	0	計	2 8	1 7	6	24 8

第4表 支場別さけ。ますふ化放流実施体制

	支	場	放 流 水系数	国営	化 道 営	施 設 民間	計	実がさけ	区分ます	備考
Charles of the control of the contro	北根十天千渡	見室勝塩歳島	9 15 9 8 9	8 9 8 5 6 5	1	2 7 5 4 4 3	10 16 13 9 10	000000	000000	ひめますを含む
1	<u></u>	H	58	41	1	25	67			-

# § 3 さけ・ます増殖事業経費

昭和44年度、さけ・ます増殖事業のために要した経費、予算および決算額は下記のとおりである。

第1表 昭和44年度さけ。ます増殖事業のための予算額および決算額

区分	予 算 額	決 算 額	決算額(開発局分を含む)
(組 織)			
水			
(項)			
北海道さけ。ますふ化場	3 3 6,7 0 0,0 0 0	322.866.814	336421814
( 目 )			
人 当 経 費	1 8 8,3 8 1.0 0 0	188130898	188.130.898
職 負 旅 費	6,0 2 0,0 0 0	6.019.695	6.0 1 9.6 9 5
施設施工旅費	256,000	141.888	255.888
庁 費	8,6 2 9 0 0 0	8.62 8.711	8.628.711
採卵ふ化放流庁費	9 2,0 6 5,0 0 0	9 2.0 6 4.5 3 3	9 2.0 6 4.5 3 3
施設施工庁費	192.000	116869	191869
土地建物借料	1,4 6 0,0 0 0	1.4 3 6.6 2 5	1.4 3 6.6 2 5
各所修繕費	8,1 2 4,0 0 0	8123.965	8.1 2 3.9 6 5
施設整備費	31,367,000	17.998.000	31364.000
国有資産所在市町村交付金	206,000	2 0 5.6 3 0	205.630

# § 4 北海道さけ・ますふ化場の現員

昭和45年3月31日現在の本場および支場別人負配置状況は第1表のとおりである。

第1表 北海道さけ。ますふ化場職員本、支場別人員配置表

場	名	技		官	事	務 官	計	
本	場		2	9	1	5	4	4
北	見		1	8		3	2	1
根	室		2	1		4	2	5
+	勝		2	1 ,		4	2	5
天	塩			9 '		3	1	2
千	歳		1	1		3	1	4
渡	島			8		3	1	1
Ī	it .	1	1	7	3	5	1 5	2

註:本場の技官のうち9名は研究員

# 5 北洋さけ・ます漁業

#### 1) 漁 業 規 模

第1表 母船式さけ。ます流し網漁業(隻数)

企業別		昭和年	4 3			4	4		
母		船		1	1			1	1
独	航	船	3	6	9		3	6	9

第2表 48度以南流し網、はえなわ漁業(許可隻数)

許可別昭和年	4	3	-		4 4
大臣~中型さけます流し網	太日	3	2	7 4	3 2 7 1 0 5
大臣~中型さけますはえなわ		3	6	9	3 6 9
知事~太平洋 7トン以上流 し網				5	4

第3表 その他さけ。ます漁業(道知事許可隻数).

許可別		4	3			4	4	
太平洋小型流し網7トン未満	1.	2	7	5	1	2	7	5
日本海小型流し網		2	0	5	or of sufficient and sufficient	1	7	4
津軽海峡流し網		1	0	0		1	0	0
日本海小型はえなわ		4	8	3		4	8	3
太平洋小型はえなわ		2	6	3		2	8	0 .
ォホーック海小型はえたか								9
宗谷海峽小型はえなわ							6	0
支庁長~さけ。ますはえなわ						5	0	0

資料。「漁業養殖業、漁獲統計表」および「北海道漁業現勢」

### 2) 昭和44年度さけ・ます漁業実績

第4表 漁獲割り当て量と実績 (単位トン)

操	業区	或	漁業種類	魚		種	割り当て量	実 績
A	区	域	母 船 式	~ 1	てき	H		1 1.6 6 7
				し	ろ さ	け		1 5.5 9 2
		İ		ぎ	し さ	け		2566
				重		す		9.270
				ます	のす	- H		1.179
		į			計		4 0.4 0 0	40.274
			48度以南流し網	さ		Vt		8.0 7 6
		į		主		寸		1.239
				そ	0	他		
			Company and the second of the second		計		9.3 5 0	9.315
			計	j			4 9.7 5 0	4 9.5 8 9
В	区	域	48度以南流し網	さ		け		11413
				重		重		2 2.0 0 9
				そ	0	他	140	
		j			計		31.150	3 3.4 2 2
			はえなわ	さ		H		647
				京		す		1 4.6 9 4
				そ	0	他		
					計		14.000	1 5.3 4 1
			日本海流し網	वं		H		0
				至				3.6 2 5
				そ	0	他	3	
					計		3.500	3.6 2 5
			日本海はえなわ	さ		H		0
				호		す		2.9 9 3
				そ	0	他		
					計		2.500	2.9 9 3
			7トン未満流し網	さ		H		742
				幸		す		4.0 4 5
				そ	0	他	1000	1 77 0 0
					計		4.300	4.7 82
			計			-	5 5.2 5 0	60168
規	制区	域	合 計				105.000	109.757
規	制区域	外		さ		H		4.918
	(沿岸)			变		す		11.645
				そ	0	他		10-00
	diction at most firm a time-parable steps to the				計	ng to all manufacture	105000	16.563
	総		合 計				105.000	126.320

- 1. 資料は第15回日ソさけ。ます委員会準備資料による。
- 2. さけの内訳はべに、しろ、ぎん、すけを含む。

# § 6 さけ・ます増殖事業成績総括

昭和44年度さけ。ます捕獲採卵事業は5月22日から1月26日までをもって終了し、給餌飼育を行ない、1月1日から6月30日までの間に放流した。その成績は第1表のとおりである。

第 1 表 海区别、魚種別成績集計表

	魚			種				ð	***************************************		け				さく	らま	-3	-	nga Proper da ang ang arang da ang ang ang ang ang ang ang ang ang an			から	あと	幸	す	
海	Z	Ţ			目	水系数	実施箇所数	捕獲数	採卵数 千粒	水系数	実施箇所数	放流数	水系数	実施箇所数	捕獲数	採卵数 千粒	水系数	実施箇所数	放流数千尾	水系数	実施箇所数	捕獲数尾	採卵数 千粒	水系数	実施箇所数	放流数千尾
		and the second s	計		画	12	13	101.000	115.600	19	12	96.900	7	7	8.200	7.684	7	5	5.520	14	14	40.700	2 5.6 0 0	1 4.	11	18.650
オホ	- ッ	ク海区	実		續	14	15	176.489	140.738	19	12	101.796	7	7	7.475	6.3 6 9	5	5	5.1 5 8	15	15	88228	6 8.6 0 7	13	12	4 3.2 3 3
			達	成	率			174.7	1 2 1.7			1 0 5.0			91.2	8 2.9			9 3.4			21 6.8	2 6 8.0			231.8
			計		画	5	8	16.000	18.000	8	9	41.300	4	5	1.400	1.837	5	5	2.097	1	1	200	100	2	2	330
B	本	海 区	実		續	6	10	8.916	9429	10	9	19.839	3	4	1.242	2.003	5	5	2.961	2	2	123	82	5	4	7.000
			達	成	埊			5 5.7	5 2.4		0	4 8.0			88.7	109.0			1412			61.5	8 2.0			212.1
		The same of the sa	計		固	17	18	187200	198.500	18	13	126.400	8	8	4.200	4.842	8	8	3.875	13	13	9.7 0 0	5.5 0 0	12	12	5.980
根	营	海 区	実		艦	18	19	139.046	174.786	15	13	107.524	8	9	4.260	6.499	6	6	4143	12	12	13.041	6.648	6	6	7.631
			達	成	芸			101.0	8 8.1			8 5.1			101.4	134.2			106.9			1344	120.9			127.6
			計		画	7	11	265.000	212200	8	10	138400								2	2	900	500	2	2	400
談 \$	发以	東海区	実		績	10	14	191104	136.966	11	12	100.630			4	-				2	2	1.173	750	2	2	615
			達	成	率			72.1	6 4.5			7 2.7										130.3	150.0			153.8
		tions of the same	計		画	18	18	20.800	22200	18	11	50200	1	1	100	96	1	1	77	1.	1	500	200	1	1	180
襟急	と 以	西海区	実		續	20	20	12283	10.810	21	13	31.782	2	2	163	327	3	2	241	3	3	324	80	6	3	6.0 7 7
			達	成	率			5 9.1	48.7			6 3.3			1 6 3.0	3 4 0.6			277.9			6 4.8	4 0.0	-		3 3 7.6
			計		画	59	68	590.000	566.500	.71	55	453200	20	21	13.900	1 44 5 9	21	19	11569	31	31	52.000	31.900	31	28	2 5.5 4 0
4	ì	計	実		續	68	78	577.836	472.529	76	67	361.571	20	22	1 3.1 4 0	1 5.1 9 8	19	18	1 2.5 0 3	34	34	102889	76.167	32	27	64.556
			達	成	率			97.9	8 3.4			7 9.8			9 4.5	1 0 5.1			1081			197.9	2 3 8.8			2528

魚		種		Ŭ.	めま	\$	交	5香	種	~	にさ	け			合		計		
海	項		<b>B</b>	捕獲数尾	採卵数于粒	放流数 千尾	捕獲数尾	採卵数于粒	放流数	捕獲数尾	採卵数千粒	放流数千尾	水系数	実施箇所数	捕獲数	採卵数	水系数	実施箇所数	放 流 数
	計		画												149.900	148.884	19	13	131.070
オホーツク海区	実		績				43	10	_				17	18	272233	21 5.7 24	14	14	150187
	達	成	率												181.6	144.9			114.6
	計		画	20.000	3550	1.000	4								3 7.6 0 0	2 34 8 7	10	11	44.727
日 本 海 区	実		續	1 4.5 88	2856	1.122	, }						8	12	24869	14370	9	11	30.922
and the state of t	達	成	率	7 2.9	80.5	1122	,			1.11					6 6.1	61.2			6 9.1
	計		画												201.100	208842	19	13	136.255
根室海区	実		績							120	27	146	20	21	206467	187.960	15	16	119.444
	達	成	率												1 0 2.7	9 0.0			8 7.7
	計		画							,					265.900	212700	8	10	138.800
襟裳以東海区	美		績										10	14	192277	137.516	9	13	101245
	達	成	率			na destina									7 2.3	6 4.7			7 2.9
y tanan makatisan 1794 am. au manayin Ba Jibani Magamit Militani	計		画												21400	2 2 4 9 6	18	11	50457
襟裳以西海区	実		績										20	20	1 2.7 7 0	11.217	12	13	38.100
	達	成	率		×										5 9.7	4 9.9			7 5.5
province of the second	計		画	20.000	3.550	1.000				The contract of the					6 7 5.9 0 0	616.409	74	58	491.309
合 計	実		績	14.588	2.856	1.122	43	10		120	27	146	75	85	7 0 8.6 1 6	566.789	59	67	439.898
	達	成	率	7 2.9	8 0.5	112.2			The second secon						104.8	91.9			8 9.5

からふとます 1 4.5 % 8 尾 さくらます 1.9 % 1 3.1 4 0 尾 捕 獲 数 708 616 尾 ち 7 7.8 3 6 尾		
からふとます 14.7% 64556 千尾 放 439.8	1 2.5 0 3千尾 ひめます 0.3 % 1.1 2 2千尾 流 数 1.571千尾 卵 を含まず)	

-11-

第2表 海産親魚からの採卵数(さけ)

	ř	Ħ		2	Σ	地	区	別	採	卵	数		千粒	備		考
						岩	尾	別		1	. 0	6	5	ウトロ	漁協	
	才	ホ		ッ	1	斜		里				7	2	斜里第-	一漁協	
-						常		呂			1	9	6	常呂	漁協	
							計			1	. 3	3	3			
						羅		臼		,	2	4	4	羅白	漁協	
						古	多	糠	ś		1	4	9	標準	漁協	
	根				室	床		丹			1	1	9	野 付	漁協	
						穗		香	,	<b>}</b>	1	4	0	根室	漁協	
							計				6	5	2			
						歷		舟			2	6	5	大 樹	漁協	
	襟	裳		以	東	広		尾			5	2	7	広尾	漁協	
	NV	200		~		猿		留				2	0	幌 泉	漁協	
							計				8	1	2			
	-					仁	雁	別		4	3	1	6	様似	漁協	,
	襟	裳		以	西	元	浦	Ж			2	1	0	浦河	漁協	
						戸	切	地				9	7	上碳	漁協	
							計				6	2	3			
			合				計			3	. 4	2	0			

#### -12-

### § 7 さけ増殖事業

#### 1 さけの来遊概況

昭和44年(1月~12月)の全道の沿岸来遊量(沿岸+河川)は417.3万尾と最近5カ年の平均を上廻り、昭和40年(474.9万尾)、昭和42年(450.1万尾)に次く豊漁であつた。また、過去に400万尾以上の来遊があつた年は4年魚が主群であるが、本年は3年魚(1966年級群)が主群であつた。河川そ上数(捕獲数)は沿岸に400万尾以上の来遊があつた年は4年魚が、本年は3年魚(1966年級群)が主群であつた。

河川そ上数(捕獲数)は沿岸に400万尾以上の来遊にも拘らず13.8%、57.8万尾にとどまつた。これはオホーツク海区において、魚群の来遊期が比較的遅く、さらに、漁業調整(定置網操業期間の短縮)の結果、河川そ上率が、従来の数%から向上し、11.8%を示した反面、襟裳以東海区において、従来20.0%以上のそ上率が16.4%に低下したことによる。

本年度の計画目標数は親魚補獲数59万尾、採卵数5億6千650万粒の計画をもつて、68水系78捕獲採卵場で美施した。

Α	第1表 事	業計画と 美額7	よりひに削牛屋	ととの比較	
	昭	和 4 4	年 度	昭和43年度	前年度との対比
区分	計画数	実 績	達成率 %	実 績	増 滅 △
捕獲数 尾	590.000	577836	9 7.9	235.674	342.162
採卵数 千粒	566.500	472529	8 3.4	235.086	237.443
放流数 千尾	453100	361571	7 9.8	207438	154133
	1		Í	1	

第1表 事業計画と実績ならびに前年度との比較

各海区の状況は次のとおりである。

#### (1) オホーツク海区

この海区は150万尾の来遊が見られ、昭和41年に次ぐ好漁であった。そして、3年魚が主群で82.9%、124万尾と前例がない程多くの来遊であり、4年魚は16.0%24万尾と非常に少なかった。

9月下旬に冷水滯が知床半島の突端付近に張出し、例年と異った海沢を示した。このため来 遊期は例年より10日前後の遅れとなり、さけ定置漁業の終期にあたる11月中、下旬になっ ても沿岸の漁獲は減少せず、11月上、中旬が最盛期であった。

魚体は来遊初期が比較的大型であったが、最盛期には小型魚となった。

例年、斜里、網走地区が多くの漁獲があり西側地区ほど極端に低くなる傾向があったが、例 年に比して、との地区でもかなりの漁獲が見られた。即ち、斜里、網走地区で90万尾程度で 例年並み、常呂、湧別地区で25万尾の漁獲があつた。次に、紋別、興部、雄武地区も8万尾と比較 的多く、また、枝幸、屯別地区は9万尾と、この地区としては豊漁であった。

河川そ上数は来遊量に対して11.8%、18万尾と近年にない高い比率を示した。これは終期群が多量に来遊し、加えて漁業調整(漁期の短縮措置)が有効であったことを示したもので、特に網走川、湧別川が顕著であった。また、岩尾別川に5千尾のそ上がみられたが、大部分は3年魚であった。

#### 2 日本海区

日本海区は2.4万尾と近年の最低を記録した。この海区の主再生産河川である天塩川の主群は4年魚であるが量的には少なく、また、石狩川は3年魚が主群で、4年魚は11.1%と著しく少ない回帰量であった。しかし、道南域の厚沢部川では95.7%が3年魚で、その沿岸では近年にない3千尾程度の漁獲があった。また利別川も3年魚が主群であった。

河川そ上率は37.5%と高率を示したが、絶対量としては9千尾程度にとどまった。

#### (3) 根 室 海 区

この海区は昭和40年以降1年毎に豊漁を繰返し、本年は120万尾と豊漁であった。特に別海、野付地区は33万尾と近年最高を記録した。また、羅臼地区は好漁であったが標準地区は比較的不振であり、根室、湾中地区は不漁であった。

各河川の年令構成は薫別川、伊茶仁川、標津川、別当賀川は3年魚の回帰は多かったが、 4年魚は非常に少なかった。しかし羅臼川、風連川は4年魚が主群であるが、風連川は量的 には少ない。西別川も4年魚が主群であり、3年魚も比較的多く出現した。

河川内捕獲は来遊量に対して15.9%に当る19万尾であり、その大部分は西別川である。

#### (4) 襟裳以東海区

この海区は117万尾と好漁であった。これは十勝川の回帰魚が卓越したためである。大津・厚内地区は46万尾と最も多く、庶野、広尾、大樹地区は24万尾とこの地区としては最高を示した。昆布森、釧路、白糠地区は20万尾にとどまった。

この海区の来遊期は例年同様に9月上旬から11月中旬までの比較的短期間であるが、本年は特に9月下旬から10月上旬の約20日間が来遊盛期を示し、9月下旬のピークでは全来遊量の43%を漁獲した。

来遊魚の年令組成は4年魚約60%、3年魚約38%を示したが、初期には4年魚78.4%、3年魚18.0%、盛期には4年魚、3年魚とも49.0%と同率、後期には3年魚が86.1%と圧倒的に多かった。河川では十勝川、釧路川が4年魚が主群であり、量的にも多かった。 歴丹川、別寒辺牛川は3年魚が多く、4年魚は極端に少なかった。

河川捕獲は来遊量の16.4%、19万尾でこの海区としては少なかった。これは特に十勝川における河川のチ上環境が悪く、また沿岸漁獲の条件が好かったものである。

#### (5) 藻 裳 以 西 海 区

この海区では29万尾の来遊が見られ海区全体としては並漁であった。しかし、沿岸漁獲の75%に当る21万尾が日高沿岸で漁獲され、この地区では並漁を若干上廻った。これは親魚の標識放流試験の結果、襟裳以東海区の初期群がこの地区に回遊、張出しのものが漁獲されたものである。また、胆振地区は回帰魚が少なく極端に不漁であった。噴火湾域では遊楽部川の回帰魚が比較的多かったため好漁であったが、上磯、茂辺地区は茂辺地川の回帰魚が少なく、やヤ不漁であった。

年令構成も遊楽部川は4年魚が主群であるが、茂辺地、静内川は若令魚が多かった。 河川そ上率は44%、12万尾と非常に少なかった。

#### 2 沿岸漁業とそ上数

北海道沿岸におけるさけ漁業は、漁獲量の大部分がさけ定置網によっており、現在、河川そ上親魚によってさけ漁業資源の再生産をはかっている人工ふ化事業は、これらの漁獲努力によって大きな影響がある。

本年度、北海道沿岸に来遊した秋さけは417.3万尾で、このうち河川へのそ上は、13.9%、57.8万尾で、そ上率は最近5カ年の平均とほぼ同率を示した。しかしさけの漁業資源を増大させるためには再生産計画に必要な親魚を確保することが重要課題であり、このための方策が早急に確立されなければならない。

各海区における秋さけを対象としたさけ定置網の許可統数については、前年度は全道総計470 カ統、このほか整理対象の小定置295 カ統のうち127 カ統が短期免許とされたが、本年度、第4次漁業権の切替が行なわれた初年度に当り、さけ定置網統数は516 カ統となり、支庁別、海区別の内訳は第2表のとおり。

i	海		-		区	支	庁	支	庁	別	統	数	海	区	別	彩	充 数
	オ	ホ	_	ッ	ŋ	網	走			1	0	6			1	2	7
						宗	谷				3	5					
						留	萌				1	5					
	$\Box$		本		海	石	狩				1	6				5	1
						後	志			-		6					
						檜	Ш					~		-			-
	根				室	根	室			1	2	0			1	2	0
						釧	路				5	9				-	
	以				東	+	勝				3	6				9	6
		*****			***	В	声				8	1					
	以				西	胆	振				2	6			1	2	2
						渡	島				1	6					
			٠.		Ē	t				5	1	6			5	1	6

第2表 昭和44年度さけ定置数

第3表 北海道におけるさけの沿岸漁獲数並びに河川捕獲数と河川そ上率

1	年		1.000	1.501	1000	1000	1001
海区	項	度	1960 (35年度)	1961 (36年度)	1962		(39年度)
オホ	沿	岸	1.010	1.5 4 3	1.2 5 0	1.821	1.546
1 "	河	Ш	1 3 8	6 2	5 7	6 6	5 0
ク海区	合	計	1.1 4 8	1.605	1.3 0 7	1.887	1.5 9 6
IX.	河川そ	上率	1 2.0	3.9	4.4	3.5	3.1
В	沿	岸	3 6	2 6	6 9	6 2	3 9
本	河	111	8	1 4	2 2	2 2	1 2
海	合	計	4 4	4 0	91	8 4	5 1
区	河川そ	上率	1 8.2	3 5. 0	, 24.2	2 6.2	2 3.5
根*	沿	岸	114	4 1 5	+ 293	5 2 9	5 0 4
室	河	Ш	6 6	152	125	121	182
海	合	計	180	5 6 7	418	650	686
区	河川そ	上率	3 6.7	2 6. 8	2 9.9	1 8.6	2 6.5
	沿	岸	160	3 6 5	4 2 7	6 3 9	8 3 8
襟東	河	111	8 0	178	1 4 5	1 3 6	3 3 6
裳海	合	計	2 4 0	5 4 3	572	775	1.1 7 4
以区	河川そ	上率	3 3.3	3 2.8	2 5. 3	1 7.5	2 8.6
襟西	沿	岸	104	165	3 4 9	3 5 7	2 9 3
裳海	河	Ш	13	2 1	2 2	1 6	1 4
以区	合	計	117	186	3 7 1	3 7 3	3 0 7
	河川そ	上率	1 1.1	1 1. 3	5. 9	4.3	4.6
全	沿	岸	1.4 2 4	3.5 1 4	2.3 8 8	3.4 0 8	3.2 2 0
道	河	][[	305	427	3 7 1	3 6 1	5 9 4
合	合	計	1.7 2 9	2.941	2.7 5 9	3.7 6 9	3.8 1 4
計	河川そ	上率	1 7.6	1 4.5	1 3.4	9.6	1 5. 6

<sup>(</sup>注)1. 千尾未満の数字は四捨五入によりまとめた。

2. 上表の河川そ上率とは河川捕獲数÷(沿岸漁獲数+河川捕獲数)である。

単価 捕獲数:千尾 そ上率: %

	The second secon	CONTRACTOR SALES CONTRACTOR SALES CONTRACTOR SALES			
1005	1066	1067	1968	1964~1968	1969
1965	1966	1967			
(40年度)	(41年度)	(42年度)	(43年度)	5ヵ年平均	(44年度)
1.0 7 6	1.5 2 4	1.3 1 7	7 6 9	1.2 4 6	1.3 2 1
2 5	7 1	4 8	3 3	4 5	177
1.1 0 1	1.5 9 5	1.3 6 5	8 0 2	1.2 9 1	1.4 9 8
2.3	4.5	3.5	4.1	3.5	1 1.8
2 2	3 3	4 7	3 3	3 5	1 5
1 3	1 6	1 2	1 7	1 4	9
3 5	4 9	5 9	5 0	4 9	2 4
3 7.1	3 2.7	2 0.3	3 4.4	2 8.6	3 7.5
1.207	7 1 3	1.4 4 0	5 6 1	8 8 5	999
162	138	1 6 3	8 6	146	189
1.3 6 9	8 5 1	1.6 0 3	6 4 7	1.031	1.1 8 8
1 1.8	1 6.2	1 0.2	1 3.3	1 4.2	1 5.9
1.3 6 5	7 6 6	803	3 2 9	1.820	9 7 7
5 9 6	154	3 5 3	8 5	3 0 5	191
1.961	920	1.1 5 6	414	1.1 2 5	1.1 6 8
3 0.4	1 6.7	3 0.6	2 0.5	2 7.1	1 6.4
273	3 7 2	3 0 2	210	290	283
10	1 8	1 6	1 5	1.5	1 2
283	3 9 0	3 1 8	2 2 5	3 0 5	2 9 5
3.5	4.6	5. 0	6.5	4.9	4.1
3.9 4 3	3.4 0 8	3.9 0 9	1.902	3.276	3.5 9 5
8 0 6	3 9 7	5 9 2	2 3 6	5 2 5	5 7 8
4.749	3.8 0 5	4.5 0 1	2.1 3 8	3.801	4.1 7 3
1 7.0	1 0.4	1 3.2	1 1.0	1 3.8	1 3.9

第4表 昭和44年度27年令組成(北海道。河川)

	aaaaaaaaaaaaaa	西側域の3年魚の比率は非常に	高く、また湧別川、網走川の3	年群も非常に多く回帰した。 消	呂川はやン少なかった。この海区	の回帰主群は3年魚である。	戴别川, 伊茶仁川、標準川, 別	当賀川の回帰魚は3年魚が主群	であり、4年魚の回帰量は非常	に少なかった。 風連川、羅臼川	は3年は少なかった。西別川は	3年魚、4年魚ともに回帰量は	多かった。		十勝川、釧路川の主群は4年魚	であり、3年魚も多くの回帰が	みられた。別寒辺牛川、歴舟川
1	る 本 数	4 33	181	184	3 4 8	230	6 8	250	380	440 1	185	2 4 0	113	4 0	5.4	631	204
	9	nd nghrasanagin din i				Total Control of	4	}		ng dag di Prince Prince para		0.8					-
180	5	No. gang ganda. Secure	1.1	2.7	efficient company	0.8	7.3	3.2	The same of the sa	1.1	8.7	2 1.3	3.5			9.0	2.9
組 成	4	3.7	3,3	3.9.1	1.1	2 0.9	8 0.6	12.0	2.4	3 4.3	7 1.3	57.5	1 5.9	5 2.5	7.4	5 7.6	6 3.2
4	3	9 4.9	9 5.0	5 8.2	8 8.1	7 8.3	1 2.1	8 4.8	9 7.1	6 2.3	2 0.0	1 9.6	9.08	4 5.0	9 2.6	4 0.7	3 2.9
年	2	1.4	9.0	,	0.8				0.5	2.3		0.8	***************************************	2.5		1.1	1.0
-	一	氮 泻 三	点 口 三	田 三	領 別 川	總走川	三 四 躁	瀬 別 川	伊茶介川	瀬 瀬 川	西別川	風運運川	別当賀川	a	別寒辺午川	部 路 川	三部十
奥	M		k #		3	rana taribina	-18		敬				MH	,	粪	三級 经	公康

					Name of Street or other		7
の主群は3年魚であった。	天塩川は4年魚が主群であるが	他の河川は3年魚が主群であっ	た。特に厚沢部川は3年魚が多	く回帰した。	静内川の2年魚が著しく多く遊	楽部川は平均的組成である。	and the second state of the profession made and the concept the second second second second second second second
7.5	257	163	202	230	394	5 4 9	
	-		and the second of the second o	to confidence of the confidence of the confidence of		and province and part of	And the second s
1.3	2 9.6		1.5	And the state of t	1.8	5.3	Canada and
1 0.7	4 1.6	11.1	1 0.4	3.9	4 0.4	6 4.3	
88.0	27.2	8 7.1	8 4.1	9 5.7	1 2.4	2 8.8	
	1.6	1.8	4.0	0.4	4 5.2	1.6	
=	E	Ξ	E		H	Ξ	
牢	确	续	别	沢 部	Æ	楽	
劉	$\mathbb{K}$	円	承		繿	遊	
			<del> </del>		五	图	

第5表 昭和44年度さけ年令組成(北海道。沿岸)

-19-

NATIONAL OF TRANSPORT						- To any respective	
中	e de selection de la constante		and designation to the state of				
	3.4. 数	4 1 1	4.4	195	8 6 1	5 3 5	ເດ
	9					0.2	n de la companya de l
8	2	6.6	2.2	5.1	1.7	1.5	1.8
組成	4	7 9.5	3 6.4	67.7	5 9.8	5 8.5	8 0.0
年令	3	1 3.9	6 1.4	2.7.2	3 7.1	3 8.9	1 8.2
7	2		gis profesyment		1.4	6.0	
- 1	我 又 必	10 Marie 1980 - C.	湖	植、氏	路		A 職
	<u>M</u>	嵌	とを発	K	文 極	+	图

本州。河川) 度さけ年令組成( 年 昭和4 表 9

. 4	松												
****	備					*				The second secon			
1	縣本数	122	296	191	8 6	9.2	10	7.1		294	2 1	1117	3 5
	9							5 4		9.0	**********		
成 %	5	7.4	5.7	1.6	6.1	6.5				2.4		1 5.3	5.7
柳	4	3 2.0	6 5.6	5 0.2	7 1.4	1 8.5	2 0.0	1.4		18.0	2 8.6	7.7	17.2
年	က	2 9.5	28.4	3 7.2	1 2.3	3 4.8	5 0.0	38.0	7 2.5	7 5.9	5 2.4	6 5.0	0.09
	2	3 1.1	0.3	1 0.5	1 0.2	4 0.2	3 0.0	9.09	27.5	3.1	1 9.0	1 2.0	1 7.1
Ξ	(元) 中 日	後 笠 川	軽石川	梅		田	新田川	宜	鬼怒川	雄物川		囲	魚 野 川
嫂	M	na i Katakana ne		<b>*</b>	Ħ			±					ŧ

根室海区 オホーック海区 オホーック海区 根室海区 2 9.8 % 3 7.0 % 3 0.5 % 3 2.7 % 174.786千粒 189.046 尾 140.738 干粒 176487尾 採 卵 数 獲 数 472.529千粒 577.836尾 襟裳以東海区 襟裳以東海区 2 8.9 % 3 3.1 % 136.766千粒 191.104尾 10.810千粒 12.283尾 以西海区 2.3 % 2.1 % 以西海区 2.0 % 9.429千粒 1.6 % 8.916尾 日本海区 日本海区 根室海区 オホーツク海区 根空海区 オホーツク海区 2 9.8 % 2 8.1 % 27.6% 3 1.1 % 107524 143.756千粒 127.613千粒 191.796千尾 千尾 放 流 数 収容卵数 361.571千尾 461.628千粒 襟裳以東海区 襟裳以東海区 2 7.8 % 2 7.0 % 100.630千尾 124443千粒 8.8% 31.782千尾 以西海区 8.6 % 39.682千粒 以西海区 5.7% 日本海区 5.5% 19.839千尾 日本海区 26134千粒

第7表 昭和44年度 海区別さけ事業成績

項		捕	獲	採	90	成
海	捕	獲 炎	枚 (尾)	♀性比	♀親魚使	同使用 率
X	P	8	計	%	用数(尾)	%
オホーツク海区	6 6.5 6 6	109.921	176.487	3 7.7	63.368	9 5.2
日本海区	3.967	4.949	8.916	4 4.5	3.4 5 3	8 7.0
根室海区	79.174	109.872	189046	4 1.9	7 5.7 8 5	9 5.7
襟裳以東海区	68.424	122.680	191.104	3 5.8	5 2.0 7 2	76.1
襟裳以西海区	4.666	7.617	1 2.2 83	3 8.0	4.213	9 0.3
合 計	222.797	355.039	577.836	38.6	198891	8 9,3
昭和43年度	103.695	131.979	235,674	44.0	88.794	8 5.6

第8表 昭和44年度 支場別さけ事業成績

	Į	Ę				捕	獲採	卵	成
支			目	捕	發	数 (尾)	9 性比	♀親魚使	同使用率
	場			<b>P</b>	8	計	%	用数尾)	%
北	見	支	場	61.890	101334	163.224	37.9	5 9.7 9 1	9 6.6
根	室	支	場	79.174	109872	189.046	41.9	7 5.7 8 5	9 5.7
+	勝	支	場	68.424	122.680	191.104	35.8	5 2.0 7 2	76.1
天	塩	支	場	5.8 5 6	10.012	1 5.8 6 8	36.9	4.5 5 7	7 7.8
千	歳	支	場	4.119	6431	1 0.5 5 0	3 9.0	3.447	837
渡	島	支	場	3334	4.710	8.0 4 4	414	3.239	97.2
合		Ē	it	222.797	355.039	577.836	3 8.6	198.891	8 9.3

	續				5 化	放 流	成 績	
平均採卵数	採	卵 数	捕獲。採卵	収容卵数	ふ出尾数	多出率	放流尾数	44. >+ +0 81
粒	Ŧ	一粒	実施期間	千粒	千尾	%	千尾	放流 期間
2.220	14(	0.738	911~1227	127.613	104186	81.6	101.796	222~6.17
2.730	9	0.4 2 9	821~1210	26.134	22284	8 5.3	19.839	2,1 ~6.1
2.310	174	.786	911~ 126	1 4 3.7 5 6	119837	8 3.4	107.524	41 ~6.30
2.6 3 0	136	6.766	9.5. ~1230	124443	110.915	89.1	100.630	3,20~6.3
2.570	10	.810	9.1 ~1230	3 9.6 8 2	32.282	81.4	31.782	2,20~5.20
2.380	472	2.5 2 9	821~ 126	461.628	389.504	8 44	361.571	2.1 ~6.3
2.650	235	5.086	824~ 11,5	241.114	215.976	8 9.6	207.438	2.1 5~6.2

, A	黄		and the second s	ふ化	放 流	成 績	
平均採卵数	採卵数	捕獲。採卵	収容卵数	ふ出尾数	ふ出率	放流尾数	
粒	千粒	実 施 期間	千粒	千尾	%	千尾	放流期間
2.190	131.042	9.1 ~ 1.13	111.800	91.355	8 1.7	89.315	2.24~6.6
2.310	174.78€	9.1 ~ 1.26	143.756	119.837	8 3.4	107.524	4.1 ~6.30
2.630	136.766	9.5 ~1 2.3 0	124443	110.915	8 9.1	100.630	3.20~6.3
2.7 0 0	12298	9.1 ~1 2.1 0	27.933	2 3.3 3 5	8 3.5	22.823	4.1 ~6.17
2.800	9.641	821~1225	26.864	2 2.0 6 5	8 2.1	20.510	31 ~5.20
2.470	7.996	9.10~12.31	26.832	21.997	82.0	20.769	2.1 ~5.12
2.3 8 0	472529	8.21~ 1.26	461.628	389.504	8 4.4	361.571	21 ~6.30

第 9 表 昭和 4 4 年度海区水系別さけ親魚捕獲採卵成績表

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	No.	THE COURSE OF STREET	infe	答	捕	獲	数	使	用親魚	
岩尾別岩尾別岩尾別 1694 3.708 5.402 1.693 368 斜 里斜 里斜 里 10437 16.171 26.608 9429 5.858 藻 澤 澤 澤 澤 849 1.115 1.964 802 278 網 走網 走網 走 23.866 40.806 64.672 23.131 5.929 개 四網走 " 83 94 177 83 27 23.949 40.900 64.849 23.214 5.956 19 21.097 20.67 3.164 10.25 619 21.097 20.67 3.164 10.25 619 21.097 20.67 3.164 10.25 619 21.097 20.67 31.64 10.25 619 21.097 20.67 31.64 10.25 619 21.097 20.67 31.64 10.25 619 21.096 83 13.0 42 22 84 22 12 84 25 12 84 2		水系	採卵場	業場	우	8	計	우	8	
新 里 新 里 新 里 10437 16171 26608 9429 5.858 藻 琴藻 琴 849 1.115 1.964 802 278 網 走網 走網 走 23.866 40.806 64.672 23.131 5.929 ボ 『 西網走 『 83 94 177 83 27 パートコロライトコロ 『 42 42 84 22 12 42 84 22 12 42 84 22 12 42 84 22 12 42 84 22 12 42 84 22 12 42 84 22 12 42 84 22 12 42 84 22 12 42 84 22 12 42 84 22 12 42 84 22 12 42 84 22 12 42 84 22 12 42 84 22 12 42 84 22 12 45 84 22 12 84 25 12				-	尾	尾	尾	尾	尾	
京   東   東   東   東   東   東   東   東   東	110	岩尾別	岩尾別岩	尾別	1.694	3.708	5.402	1.693	368	
無 走網 走網 走 23.866 40.806 64.672 23.131 5.929 ボ 西網走 " 83 94 177 83 27 177 83 27 187 187 187 187 187 187 187 187 187 18	-	斜 里	斜 里斜	里	1 0.4 3 7	16.171	26.608	9.429	5.8 5 8	
<ul> <li>網 走網 走網 走 23.866 40.806 64.672 23.131 5.929</li> <li>ボ 西網走 " 83 94 177 83 27</li> <li>ボ 小 計 23.949 40.900 64.849 23.214 5.956</li> <li>常 呂 常 呂 北 見 10.97 20.67 3.164 10.25 619</li> <li>ライトコロ ライトコロ " 42 42 84 22 12</li> <li>佐呂間別 佐呂間別 " 47 83 130 42 22</li> <li>湧 別 湧 別 湧 別 20.223 31.715 51.938 20018 5.384</li> <li>ク 湧 別 選 部 " 213 246 459 207 120</li> <li>海 内 幌 内 幌 内 832 1.264 2.096 832 464</li> <li>徳 志 別 徳 志 別 徳 志 別 130 188 318 125 59</li> <li>正 北見幌別 北見幌別 歌 登 4147 7.883 12.030 3.073 1.045</li> </ul>	+	藻 睪	藻 琴藻	琴	849	1.115	1.964	802	278	
ボ パ 小 計 23.949 40.900 64.849 23.214 5.956 常 呂 常 呂 北 見 1.097 2.067 3.164 1.025 619 ライトコロ ライトコロ パ 42 42 84 22 12 数 佐呂間別 佐呂間別 パ 47 83 130 42 22 第 別 湧 別 湧 別 湧 別 20.223 31.715 51.938 20.018 5.384 ク 濱 滑 渚 滑 渚 滑 2.507 4.023 6.530 2.507 11.36 與 部 別 213 246 459 207 120 海 幌 内 幌 内 832 1.264 2.096 832 464 徳志 別 徳志 別 徳志 別 徳志 別 130 188 318 125 59 北見幌別 北見幌別 歌 登 4147 7.883 12.030 3.073 1.045	7	網 走	網走網	走	23.866	40.806	64.672	23.131	5.9 2 9	
<ul> <li>パ 内 計 23.949 40.900 64.849 23.214 5.956</li> <li>常 呂 常 呂 北 見 10.97 20.67 3.164 1.025 619</li> <li>ライトコロ ライトコロ パ 42 42 84 22 12</li> <li>少 佐呂間別 佐呂間別 パ 47 83 130 42 22</li> <li>湧 別 湧 別 湧 別 30 20.223 31.715 51.938 20018 5.384</li> <li>夕 撰 商 澤 稽 滑 渚 滑 2.507 4.023 6.530 2.507 11.36</li> <li>與 部 興 部 パ 213 246 459 207 120</li> <li>海 内 幌 内 幌 内 832 1.264 2.096 832 464</li> <li>徳 志 別 徳 志 別 徳 志 別 130 188 318 125 59</li> <li>正 北見幌別 北見幌別 歌 登 4147 7.883 12.030 3.073 1.045</li> </ul>	75	"	西網走	"	83	94	177	83	27	
ウイトコロ ライトコロ パ 42     42     84     22     12       ツ 佐呂間別 佐呂間別 パ 47     83     130     42     22       湧 別 湧 別 湧 別 湧 別 20.223     31.715     51.938     20018     5.384       ク 渚 滑 渚 滑 渚 滑 2.507     4.023     6.530     2.507     1136       與 部 興 部 パ 213     246     459     207     120       梅 内 幌 内 幌 内 幌 内 832     1.264     2.096     832     464       徳志 別 徳志 別 徳志 別 130     188     318     125     59       区 北見幌別 北見幌別 歌 登 4147     7.883     12.030     3.073     1.045		"	小 計	10	2 3.9 4 9	40.900	64.849	23.214	5.956	
少     与イトコロ ライトコロ	1	常呂	常呂北	見	1.0 9 7	2.0 6 7	3.1 6 4	1.0 2 5	619	
9     別 湧 別 湧 別 湧 別 湧 別 31.715     51.938     20018     5.384       9     渚 滑 渚 滑 渚 滑 2.507     4.023     6.530     2.507     1136       9     部 興 部 " 213     246     459     207     120       海 幌 內 幌 內 幌 內 832     1.264     2.096     832     464       徳志 別 徳志 別 徳志 別 130     188     318     125     59       正 北見幌別 北見幌別 歌 登 4147     7.883     12.030     3.073     1.045	•	ライトコロ	ライトコロ	"	42	42	84	22	12	
湧別湧別湧別湯別     別別別別別別別別     20.223     31.715     51.938     20018     5.384       夕潤溶潤溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶溶	ッ	佐呂間別	佐呂間別	"	47	83	130	42	22	
與 部 與 部 "     213     246     459     207     120       海 幌 内 幌 内 幌 内 思 別 信志 別 信志 別 信志 別 信志 別 130     1.264     2.096     832     464       極志 別 徳志 別 徳志 別 130     188     318     125     59       正 北見幌別 北見幌別 歌 登 4147     7.883     12.030     3.073     1.045		湧 別	湧 別湧	別	20.223	31.715	51.938	20018	5.384	
海 幌 内幌 内幌 内 832 1.264 2.096 832 464 德志 別 徳志 別 徳志 別 130 188 318 125 59 北見幌別 北見幌別 歌 登 4.147 7.883 12.030 3.073 1.045	2	渚 渭	渚 滑渚	滑	2.5 0 7	4.023	6.5 3 0	2.5 0 7	1136	
德志別德志別德志別 130 188 318 125 59 北見幌別 北見幌別 歌 登 4147 7.883 12.030 3.073 1.045		與 部	興 部	"	213	246	459	207	120	
区 北見幌別 北見幌別 歌 登 4147 7.883 12.030 3.073 1.045	海	幌 内	幌 内幌	内	832	1.264	2.096	832	464	
Z .		徳志別	徳志別徳	志別	130	188	318	125	5 9	
	区	北見幌別	北見幌別 歌	登	4.1 4 7	7.883	1 2.0 3 0	3.0 7 3	1.0 4 5	
		屯 別	屯 別屯	别	399	516	915	379	208	
海区計 本年度 66.566 109.921 176.487 63.368 21.529	1	<b>海 (7 )</b>	本年度		66.566	109.921	176.487	63.368	21.529	
前年度 16.190 16.372 32.562 15.317 6.424			前年度		16,190	16372	3 2.5 6 2	15.317	6.424	
天 塩 天 塩 天 塩 620 822 1.442 449 66		天 塩	天 塩天	塩	620	822	1.442	449	6 6	
# 中川中川 355 423 778 339 64		"	中 川中	Щ	355	423	778	3 3 9	64	
" 下中川 " 201 179 380 192 67	-	"	下中川	"	201	179	380	192	67	
日 " 小 計 1176 1.424 2.600 980 197	B	11	小 計		1176	1.424	2.600	980	197	
本 小平蘂 小平蘂 天 塩 4 1 5	本	小平藥	小平藥天	塩	4	1	5		-	
石 狩西 越千 歳 1.642 1.674 3316 1.561 715	Mrs.			歳	1.6 4 2	1.674	3.3 1 6	1.5 6 1	715	
" 西越第二 " 236 341 577 56	(hft.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	西越第二	"	236	3 41	577	5 6		
区 " 音 江音 江 173 298 471 120 30	区	"	音 江音	江	173	298	471	1.20	3 0	
" 小 計 2.051 2.313 4.364 1.737 745	o de Maria de April de la constante de la cons	"	小 計		2.051	2.3 1 3	4.3 64	1.737	745	
朱 太 朱 太 尻 別 23 50 73 23 11	-	朱太	朱 太尻	別	23	50	73	23	11	
利 別 冷 水 利 別 256 388 644 256 114			1	i	256	388	644	256	114	
厚沢部厚沢部 厚沢部 457 773 1.230 457 248	- Transmission	厚沢部	厚沢部厚	沢 部	457	773	1.230	457	248	

数計	採卵数	增減卵数	仮収容卵数	♀親魚	平均採卵数	実施 期間
尾	千粒	千粒	干粒	发用率	粒	
2.061	3.300	海 1.065	4.365	9 9.9	1.950	1021~12.25
15.287	21.052	海 72	21.124	9 0.3		9.5 ~1 2.23
1.080	1.824		1.824	9 4.5		9.20~12.24
29.060	50.729		5 0.7 2 9	9 6.9	2190	9.1 ~ 1.6
110	177		177	100	2130	12.21~12.31
29.170	50.906		50.906	9 6.9	2.190	9.1 ~ 1.6
1.644		海 196	2.655	9 3.4	2.400	9.1 ~1 2.2 0
34	48		48	5 2.4	2170	10.1 4~1 1.3 0
64	95		95	8 9.4	2.250	10.1 ~12.20
25.402	43415	8	43.415	9 9.0	2.170	9.1 ~ 1.13
3.6 4 3	5.1 8 8		5.1 8 8	100	2070	10.1 ~12.29
327	525		525	9 7.2	2.5 4 0	103 ~1225
1296	2230		2.230	100	2.680	9.20~12.3
184	377		377	96.2	3.0 2 0	9.1 ~1.0.3 1
4.118	8279		8.279	7 4.1	2.690	9.1 ~11.25
587	1.0 4 0		1.040	9 5.0	2.7 4 0	9.10~11.29
84.897	140.738	海 1.333	142.071	95,2	2.220	9.1 ~ 1.13
21.741	41.839	海 3.415	45.254	9 4.6	2.7 3 0	9.1 ~1 2.2 7
515	1.177		1.1 77	7 2.4	2.620	9.11~1 0.28
403	896		896	9 5.5	2.6 4 0	9.1 ~11.15
259	529		529	9 5.5	2.760	10.1 ~12.10
1177	2.602	10 mm	2.602	83.3	2.660	9.1 ~1 2.1 0
						4.0
2.276	4.4 1 1	公供試 6	4.405	9 5.0	2.830	9.6 ~1 1.2 6
56	158		158	2 3.7	2810	9.5 ~1 0.2 0
150	267		267	6 9.4	2.230	8.21~10.20
2.482	4.8 3 6	△供試 6	4.830	8 4.7	2.780	8.21~11.26
34	69		69	100	3.000	1 0.1 ~1 1.3 0
370	682		682	100	2.660	9.23~11.30
705	1.240		1.240	100	2.710	9.26~11.25

-24-

海	-de =7	採卵場	所管	捕	獲	数	使 用	親魚
区	水 系	採卵場	事業場	\$	8	計	우	8
В				尾	尾	尾	尾	尾
本海	* 5 3	本年度		3.967	4.949	8.916	3.453	1315
区	海区計	前年度		8.239	8.842	17.081	5.714	1.5 91
-	ルサ	ルサ	羅白	85	119	204	81	113
-	羅白	羅 臼	"	2.5 8 5	4.1 2 2	6.707	2.5 7 6	3391
	植 別	植 別	葉 別	217	299	516	207	105
根	元崎無異	元崎無異	. "	18	41	5 9	18	10
	崎無異	崎無異	"	175	317	492	166	76
	薫 別	煮 別	"	5 5 7	710	1.267	551	170
-	古多糠	古多糠	"	4 5	5 9	104	41	18
室	忠 類	忠 類	伊茶仁	282	381	663	280	111
	伊茶仁	伊茶仁	"	3.7 2 2	5.825	9.5 4 7	3.670	1.360
	標 津	標準	根 室	3.208	5.578	8.786	3.174	1.414
	//	31 線	"	18	1 24	42	18	10
海	"	小計		3.226	5.602	8.828	3.192	1.424
	当 幌	当 幌	計根 別	1.813	1.661	3.474	1.783	948
	春 別	春 別	"	171	88	259	171	88
	床 丹	床 丹	"	420	206	626	419	205
ro'	西 別	西別	虹 別	64.907	89.349	154.256	61.762	2 3.8 1 8
X	矢 臼 別	矢臼別	浜 中	12	14	26	11	7
	風連	風 連	"	427	406	833	387	164
	別当賀	別当賀	厚 床	425	658	1.083	417	580
	褪 香	穂 香	"	87	15	102	53	15
	海区計	本年度		79.174	109.872	189.046	7 5.7 8 5	3 2.6 0 3
	194 125 BT	前年度	-	3 9.4 7 7	4 6.9 4 0	86.417	38.509	1 5.4 8 6
	別寒辺牛	厚 岸	太 出	744	1.265	2.009	725	283
襟	釧路	釧路	釧路	21.698	2 3.4 3 0	45.128	17361	6.2 4 6
裳	阿寒	阿寒	阿 寒	219	349	568	185	22
以	茶 路	茶路	鶴 居	228	553	781	175	58
東海	十 勝	打 内	十 勝	2 6.7 5 9	61.795	88.554	17.188	2110
区	"	東33号	札 内	4.277	8.439	12.716	3.667	14
j	"	利別	幕 別	3 5	58	93	32	14

数計	採卵数	增減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚 使 用 率	平均採卵数	実施 期間
尾	千粒	干粒	干粒	%	干粒	
4.768	9.429	△供試 6	9.423	8 7.0	2.730	8.21~12.1
7.305	14.980	△供試 22	14.958	69.4	2.6 2 0	8.24~12.1
194	156		156	9 5.3	1.930	10.16~12.2
5.967	6.218	海 244	6.462	9 9.7	2.410	1014~122
312	441		441	4 5.4	2.130	9.1 1~1 2.2
28	38		38	100	2.110	9.21~1 2.2
242	334		334	94.9	2010	9.11~122
721	1.196		1.196	98.9	2170	9.18~12.2
5 9	91	海 149	240	91.1	2.220	9.21~12.2
391	673		673	99.3	2410	9.5 ~1 2.2
5.0 3 0	7.799		7.799	98.6	2130	9.1 ~1 2.3
4.588	7.978		7.978	98.9	2510	9.1 ~1 2.2
28	52		52	100	2.890	9.1 ~1 1.3
4.616	8.030		8.030	98.9	2.520	9.1 ~1 2.2
2.731	3.975		3.975	98.3	2.230	9.1 ~1 2.1
259	372		372	100	2.180	9.1 ~1 2.1
624	851	海 119	970	9 9.8	2.030	9.1 ~12.1
85.580	1 4 2.3 5 3		142.353	9 5.1	2.300	9.1 - 1.2
18	27		27	91.7	2.460	9.1 ~11.
551	1.030		1.030	90.6	2.660	9.1 ~1.1.1
997	1.073		1.073	98.1	2.5 7 0	9.1 ~11.2
68	129	海 140	269	60.9	2.430	911~11.3
108388	174.786	海 652	175.438	9 5.7	2310	9.1 ~ 1.2
5 3.9 9 5	94.351	海 2.390	96.741	9 7.5	2.450	91 ~ 1.1
1.008	2.074	The second secon	2.074	97.4	2860	98 ~11.2
2 3.6 0 7	42.172		42.172	8 5.7	2.430	9.6 ~1 2.1
207	545		5 4 5	8 4.5	2.950	9.6 ~11.1
233	433		433	7 6.8	2470	9.16~11.2
19.298	5 0.0 6 4		5 0.0 6 4	6 4.2	2.910	9.10~11.2
3.681	9.3 6 4		9.3 6 4	8 5.7	2.5 5 0	910~103
46	89		8 9	91.4	2780	911~11.

	-14		_	453	da.	+121	所		管	捕	獲	数	使 用	親魚
海区	水		系	13%	明	物	事	業	場	P	8	計	우	8
										尾	尾	尾	尾	尾
	+		勝	幕		別	幕		別	5.0 5 4	9.105	14.159	4.494	2.5 9 1
襟		"		干	代	田	+		勝	8484	16.169	24.653	7.623	2255
		"		小		計		"		4 4.6 0 9	9 5.5 6 6	140175	3 3.0 0 4	6.984
裳	歷		舟	歴		舟	大		樹	519	1.152	1.671	280	128
以	豊		似	豊		似		"		11	17	28	7	3
東	楽		古	楽		古		"		0	1	1		
海	広		尾	広		尾		″		389	336	725	330	140
区	猿	thet.	留	猿		留		"		7	11	18	5	10
				本	年	度				68424	122680	191.104	5 2.0 7 2	13.874
	i !			前	年	度				3 3.7 3 6	51.318	8 5.0 5 4	24.849	6.5 6 9
	仁	雁	别	仁	雁	别	静		内	16	' 22	38	14	9
	幌		別	幌		別		"		88	154	242	80	3 4
	元	浦	Ш	元	浦	]]]		"		121	186	307	120	69.
1	Ξ		石	≡		石		"		40	96	136	3 7	26
襟	静		内	静		内		"		922	2152	3.074	767	227
	新		冠	新		冠		"		61	118	179	52	3 5
裳	沙		流	富		JII		"		318	581	899	294	127
	鵡		Ш	鵡		][[	Ŧ		歳	224	312	536	115	32
以	勇		払	勇		払		"		80	117	197	36	1.4
西	白		老	白		老	白		老	8.6	122	208	86	4 9
1	敷		生	敷		生	敷		生	112	258	370	109	73
海	貫	気	別	貫	炭	別	八		雲	9	10	19		
1	長	万	部	長	万	部		"		9	33	42	8	4
区	遊	楽	部	遊	楽	部		"		53.9	480	1.019	480	205
	汐		泊	汐		打		"		141	192	333	135	113
-	大		野	大		野	知		内	2	3	5	2	2
	戸	切	地	戸	切	地		"		55	38	93	45	27
	茂	辺	地	茂	辺	地		"		1.718	2.559	4.277	1.713	893
	亀		][[	亀		Ш		″		57	58	115	5 4	5 5
	知		内	知		内		"		68	126	194	66	40

数	採卵 数	抽	減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚	平均採卵数	実施 期間
計	JA 90 80	70	V9V 9/1 62X	IX IX II SI	使用率	1 - 320001 80	X 25 737 [14]
尾	干粒		干粒	千粒	%	粒	
7.085	10.989			10.989	889	2.440	916~1210
9.878	19.364			19.364	8 9.9	2.5 4 0	9. 5~1215
3 9.9 8 8	89.870			89.870	7 4.0	2.7 2 0	9. 5~1 2.1 5
408	695	海	265	960	5 3.9	2480	9.2 2~1 2.3 0
10	21			21	6 3.6	3.0 0 0	10. 8~11.25
							10. 8~11.25
470	941	海	527	1.468	8 4.8	2.8 5 0	10. 1~12.20
15	15	海	20	35	71.4	3.0 0 0	10. 9~12.29
6 5.9 4 6	1 3 6.7 6 6	海	812	137578	76.1	2.630	9. 5~1 2.30
31.418	7 2.5 4 7	海	122	72.669	73.7	2.920	9.11~12.25
23	41	海	316	357	87.5	2.9 2 0	9. 1~12.25
114	215	1		215	90.9	2.6 9 0	9.20~1220
189	290	海	210	500	99.2	2.4 2 0	9.20~12.20
63	90	1		90	9 2.5	2.4 4 0	9.11~12. 6
994	2.1 2 4			2.1 2 4	83.2	2.770	9.11~1 2.25
87	130			130	8 5.2	2.5 1 0	9. 1~1 2.1 8
421	908			908	92.3	3.0 9 0	917~11.27
147	316			316	5 1.3	2.750	9. 1~11.15
5 0	108			108	45.0	2.990	9. 1~1 0.3 1
135	239			239	100	2.780	9.16~12.25
182	344			344	97.3	3.150	9.1 6~1 2.2 5
		4					9.11~11.20
12	25			25	88.9	3130	9.10~11.20
685	1.444			1.444	89.1	3.0 1 0	9.1 1~1 2.3 1
248	352			352	9 5.7	2.610	9.20~1 2.3 0
4	6			6	100	3000	9.21~1 2.22
72	136	海	97	233	8 1.8	30 2 0	9.21~12.22
2.606	3.7 4 4			3.7 4 4	99.7	2.190	10. 5~12.30
109	119			119	9 4.7	2200	1020~12.20
106	179	İ		179	97.1	2.7 1 0	1 0.1 4~1 2.1 5.

海	-1.	507	ing on the	所 管	捕	獲	数	使 用	親魚
区	区水系		採卵場	事業場	<u>ې</u>	8	計	우	8
					尾	尾	尾	尾	尾
	海区	計	本年度		4.6 6 6	7.617	12283	4213	2.034
	THE IZE		前年度		6.0 5 3	8.5 0 7	1 4.5 6 0	4.405	2198
			本年度		222.797	3 5 5.0 3 9	577.836	198891	71.355
台	î ä	it	前年度		103.695	131.979	235.674	8 8.7 9 4	32.268

数計	採卵数	增減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚 使 用 率	平均採卵数	実施 期間
尾	千粒	千粒	千粒	96	粒	
6247	10.810	623	11433	9 0.3	2.5 7 0	9. 1~1 2.30
6.603	11.369	733	1 2.1 0 2	72.8	2.580	8.24~1 2.31
270.246	472529	海 3.420 △供試 6	475.943	8 9.3	2.380	821~ 1.26
121.062	235.086	海 6.660 △供試 22	241.724	8 5.6	2.650	824~ 1.15

第10表 支場。事業場別さけ親魚捕獲採卵成績表

Co. Non		AU.	Lun	捕	獲	数	使 月	
支 場	事	業	場	9	8	計	<u></u> P	8
****				尾	尾	尾	尾	尾
	岩	尾	別	1.694	3.708	5.402	1.693	368
北	斜		里	10.437	16.171	26.608	9.429	5.8 5 8
	藻		琴	849	1.115	1.964	802	278
見	網		走	23.949	40.900	6 4.8 4 9	23.214	5.9 5 6
支	北		見	1.186	2.1 9 2	3378	1.089	653
1-H1	湧		別	20.223	31.715	51.938	20.018	5.384
場	滑		滑	2.720	4.269	6.989	2.7 1 4	1.256
	妃		内	832	1.264	2.0 9 6	832	464
55.L	本	年	度	61.890	101.334	163224	5 9.7 9 1	20.217
計	前	年	度	1 3.6 4 4	13.334	26.978	13.172	5.776
A SERVICE PROPERTY.	羅	a crandon	白	2.670	4.2 4 1	6.911	2.657	3504
根	流		別	1.012	1.426	2.438	983	379
	伊	茶	仁	4.0 0 4	6.206	1 0.2 1 0	3.950	1.471
室	根		室	3.226	5.602	8828	3192	1.424
支	計	根	別	2.404	1.955	4.359	2.3 7 3	1241
Lin	虹		别。	64.907	8 9.3 4 9	154.256	61.762	2 3.8 1 8
場	浜		中	439	420	859	398	171
	厚		床	512	673	1.185	470	595
B.1.	本	年	度	79174	109.872	189.046	75.785	3 2.6 0 3
計	前	年	度	39.477	4.6 9 4 0	86417	3 8.5 0 9	1 5.4 8 6
School Section	太		田	744	1.265	2.009	725	283
	釧		路	21.698	23430	45.128	17.361	6.246
+	鶴		居	228	553	781	175	5.8
游	阿		寒	219	349	568	185	2.2
	+		勝	3 5.2 4 3	77.964	113.207	24.811	4.36
支	札		内	4.277	8.439	12.716	3.667	1 4
場	森		別	5.089	9.163	1 4.2 5 2	4.5 2 6	2.60
	大		樹	9.26	1.517	2.443	622	28
25.1.	本	年	度	6 8.4 2 4	122680	191.104	5 2.0 7 2	1 3.8 7
計	前	年	度	3 3.7 3 6	51.318	8 5.0 5 4	24.849	6.5 6 9

数		,		,	♀ 親 魚		
計	採卵数	增	減卵数	仮収容卵数	使用率	平均採卵数	実施 期間
尾	千粒		干粒	干粒	%	粒	
2.061	3.300	海	1.0 65	4.365	99.9	1.950	1021~1225
15.287	21.052	海	72	21124	9 0.3	2230	9. 5~1223
1.080	1.824			1.824	9 4.5	2270	920~1224
29.170	56.906			50.906	9 6.9	2.190	9. 1~ 1. 6
1.742	2.602	海	196	2.798	91.8	2390	9. 1~1 2.2 0
25.402	43.415			43.415	9 9.0	2170	9. 1~ 1.13
3.970	5.7 1 3		·	5.7 1 3	99.8	2.110	10. 1~12.29
1.296	2.230			2230	100	2.680	920~12. 3
80.008	131.042	海	1.3 3 3	132375	9 6.6	2190	9. 1~ 113
18.948	3 5.5 4 2	海	3.415	38.957	96.5	2.700	9. 1~1 2.27
6.1 6 1	6.374	海	244	6.618	99.5	2.4 0 0	10.14~1226
1.362	2100	海	149	2.249	97.1	2.1 4 0	9.11~1224
5.421	8.472			8.472	98.7	2140	9. 5~1231
4.616	8.030			8.030	9 8.9	2.5 2 0	9. 1~1 2.2 5
3.614	5.198	海	119	5.317	98.7	2190	9. 1~1 2.1 0
8 5.5 8 0	142.353			1 4 2.3 5 3	9 5.1	2.3 0 0	9. 1~ 126
569	1.057			1.057	9 0.7	2.660	9. 1~1112
1.065	1.202	海	140	1.342	91.8	2560	9. 1~11.30
108.388	174.786	海	652	175.438	9 5.7	2.310	9. 1~ 1.26
53.995	94.351	海	2.390	96.741	97.5	2.4 5 0	9. 1~ 1.15
1.008	2.074			2.074	97.4	2.860	9. 8~1127
23.607	42.172			42172	8 5.7	2.4 3 0	9. 6~12.10
233	433			433	7 6.8	2470	916~1128
207	5 4 5			5 4 5	84.5	2950	9. 6~1116
29.176	6 9.4 2 8			69.428	70.4	2.800	9. 5~1 21 5
3.681	9.3 6 4			9364	85.7	2.550	9.10~1029
7.131	11.078			11.078	88.9	2.450	911~1210
903	1.6 7 2	海	812	2.484	672	2690	9.22~12.30
6 5.9 4 6	136.766	海	812	137.578	76.1	2.6 3 0	9. 5~12.30
31.418	7 2.5 4 7	海	122	7 2.6 6 9	73.7	2.920	9. 1~1 2.2 5

-4- 451	<b>本 米 1</b> 5	捕	獲	数	使	用親魚
支 場	事 業 場	٩	8	計	<u>٩</u>	8
		尾	尾	尾	尾	尾
	徳 志 別	130	188	318	125	59
天	歌 登	4.1 4 7	7.883	1 2.0 3 0	3.073	1.0 4 5
塩	屯 別	399	516	915	379	208
支場	天 塩	624	623	1.447	449	6 6
- 4/3	中川	556	602	1.1 5 8	531	131
計	本年度	5.856	1 0.0 1 2	1 5.8 6 8	4.5 5 7	1.509
āl	前年度	8.727	9.0 0 1	17728	6.3 0 5	1.473
of the particular and the second section of the second section of the second section s	千 歳	2.182	2.4 4 4	4.6 2 6	1.768	761
千	音 江	173	298	471	120	3 0
茂	静内	1.566	3.3 0 9,	4.875	1.3 6 4	527
支場	白.老	86	1223	208	86	49
	激 生	112	258	370	109	73
計	本年度	4.119	6.431	10.550	3.4 4 7	1.4 4 0
D I	前年度	4.836	7.631	12467	2.7 4 8	1.355
	八雲	698	715	1.413	623	322
渡	知 内	1.900	2.7 8 4	4.6 5 4	1.880	1.0 1 7
島	尻 別	23	5 0	73	23	1,1
支場	利 別	256	388	6 4 4	256	114
	厚 沢 部	457	773	1.230	457	248
ät	本年度	3.334	4.710	8.0 4 4	3.239	1.712
14.1	前年度	3275	3.755	7,0 3 0	3.211	1.609
A =1	本年度	222.797	355.039	577.836	198891	71.355
合 計	前年度	103.695	131.979	2 3 5.6 7 4	8 8.7 9 4	32268

数	採卵数	增減。	in 266	仮収容卵数	♀ 親 魚	平均採卵数	実施期間
計	1/4 All 800	*E 094 9	17 82	IXVII OPEX	使用率	July	
尾	千粒		干粒	千粒	%	粒	
184	377		and the same of th	377	9 6.2	3.020	9. 1~10.31
4.118	8279		100	8.279	7 4.1	2.690	9. 1~11.25
587	1.040		1	1.040	9 5.0	2.740	9.10~1129
515	1.17.7			1.1 7 7	7 2.0	2.620	9.11~10.28
662	1.425			1.425	9 5.5	2.680	9. 1~12.10
6.0 6 6	12.298	***************************************		12298	77.8	2.700	9. 1~1 2.1 0
7.778	1 6.9 4 3			1 6.9 4 3	7 22	26 9 0	9. 1~12.10
2.529	4.993	△供試	6	4.987	81.0	2.820	9. 1~11.26
150	267			267	6 9.4	2.230	821~1 0.20
1.891	3.3.7 9 8	海	526	4.324	87.1	2.780	9. 1~12.25
135	239			239	100	2.780	9.16~12.25
182	344			344	97.3	3.150	9.16~12.25
4.887	9.641	△供試	6 5 2 6	10.161	8 3.7	2.800	8.21~12.25
4.1 0 3	8.364	△供試海	2 2 5 5 5	8897	5 6.8	3.0 40	8.24~12.31
945	1.821		000	1.821	8 9.3	2.920	9.1 0~1 2.3 1
2.897	4.184	海	97	4281	98.9	2.230	9.21~1 2.30
3 4	69			6 9	100	3000	10. 1~11.30
370	682			682	100	2.660	9.23~11.30
705	1.240			1.240	100	2.710	9.26~11.25
4.951	7.996	海	97	8.0 93	97.2	2470	9.10~12.31
4820	7.339	海	178	7.517	98.0	2290	9.10~12.30
270246	472.529	海 △供試	3420	475.943	89.3	2380	821~ 1.26
121.062	2 3 5.0 8 6	海  △供試	6.6 6 0 2 2	241.724	8 5.6	2.650	8.24~ 1.15

#### 3 さけ種卵の移殖

本年度、オホーック、根室、襟裳以東の主要3海区で好漁に恵まれ、再生産用種卵も計的として積極的な移殖を行った。

長距離の種卵移殖は発眼卵で行なりことを原則とするが、収容に急を要する事情があっ 従来鉄道を利用したが、本年は自動車を利用した。

発眼卵で移殖する場合、その卵子の履歴上の死卵(移殖前の死卵)を含めて移籍卵数と とれら種卵の移殖の状況については、第11表~第15表に示したとおり。

第11表 さけ種卵の移殖ならびに試験供用に伴なり動き

支	場	① 卵子収容能力	採卵数	増減、海産卵	卵 数	仮収容卵数
北	見	1 3 3.2 0 0	131.042	1.333		132375
根	室	1 8 5.6 0 0	174.786	652	599	174.839
+	勝	2 3 1.2 0 0	136.766	812		137,578
天	塩	4 1.4 0 0	12298			12298
千	歲	5 2.7 0 0	9:641	526	6	10.161
渡	島	5 9.1 0 0	7.996	97		8.093
	āt .	7 0 3.2 0 0	472.529	3.420	605	475.344

註 ① 道、民間を含み、一部では増収設備も含む。

② 発眼卵の移殖は移籍卵数。

画の80%以上となったので、資源の広域的な均てん化ならびに不振地域の資源育成と拡大を目 て、一部空輸(防衛庁の協力によりヘリコブターを使用)を行った。また、本州への種卵移殖は して処理した。

单位。千粒

	受精直後	卵の移殖	△ 発眼卵の	発眼」	卵の移殖内	②	最 終	収容能力IC
	供給卵数	受給卵数	供試卵数	供給卵数	受給卵数	△本 州	収容卵数	対する収容 率 %
				17.561	2.6 3 7	5.651	111.800	8 3.9
	6.901			20.218	4.101	8.0 6 5	143.756	77.5
1		819		1 3.9 5 4			124443	5 3.8
					1 5.6 3 5		27.933	67.5
					16.703		2 6.8 6 4	5 1.0
	**	6.0 8 2			1 2.6 5 7		26.832	45.4
	6.901	6.901		51.733	51.733	13.716	461.628	65.6

第12表 道内移殖(供給状況)

供	給		2 3			Ť	-	2		地		殖卵の	内 訳	i i	
				移植	E月E		-		Γ			1		摘	要
支場	易名	事業	場名			1	支持	易名	事第	美場名		移前列約			-
											千粒	干粒	千粒	est of the control of	
北	見	斜	里	45.	2.	5 7	2	歳	干	旋	952	68	884	) Almithe	
		"			"		"		静	内	1.040	95	945	}斜里/ 産	
		"			2.	6	//		元	浦川	3302	501	2.801	}斜里川網法	E)11
	ĺ	小	計			1					5.294	664	4.6 3 0	(240千粒	)產
	1	網	走		2.	5 7	-	歳	干	歲	1.821	252	1.569		
	1	"			"	1	#		静	内	1238	132	1.106	} 網走川産	
	į	"			2.	6	"		元	浦川	280	40	240	ال	
		小	計			į		-4-			3.3 3 9	424	2.915		
		北	見		3.	1.		室	虹	別	2.200	779	1.421		
		湧	別		1.2	0 7		塩	屯	別	5.404	1.399	4.005	「湧別」陸	
		, "	55.)		"	1	"		歌	登	1.324	324	1.000		
		小	計								6.728	1.7 2 3	5.005		
		計	-			-					17.561	3.590	13.971		
被	室			45.	2.2	U 渡	2	島	来	雲	2.000	, 216	1.784		)
		"			2.2	1		歳	千	歲	1.000		1.000		
	1	小	計								3.0 0 0	1 216	2.784		
		虹	别	44.1	2.2	5 湖	ŧ	島	( 3	森 )	( 2.100)	(250)	(1.850)	受精直後卵	
		"		1	2.2	6	"		厚	尺部	1.229	108	1121		
	4	"			"		"		知	内	1165	109	1.056	# 1	
	1	"		1	2.2	8	"		( 3	<b>柒)</b>	2.470	145	2325		
	į	"		4 5.	1.1	0	"			"	25	3	22		1
		"			"	-	//		,	"	(1.597)	1		受精直後卵	西别川産
		"			1.1		. "		1	"	(2.385)	1		"	
		"			1.2	1			釧	路	(819)	I .	(819)	"	
	ĺ	"			1.2	1			天	塩	8.907	550	8.357		
		"			2.2				千	歳	1.003	405	1.003		
	į	, "	25.1	1	"	W.	支	島	八	雲	2.419	$\{ \begin{pmatrix} 425 \\ 1447 \\ 1340 \end{pmatrix}$	1.994 (5.454) 15878	受精直後卵	
		//>	計			-					17.218	1		発眼卵	
		at	-								20.213	(1.447) 1.556	(5454) 18.662		
	勝	札	内	441	2.2	6	变	島	八	雲	1729	163	1.5 6 6 ;	1	
		//			"		"		利	别	1.620	186	1.434		
	į	小	計								3.3 4 9	349	3.000		
		+	勝	45.	1.1	6=		歳		生	2.3 8 2	382	2.000	1 male to bede	
		"			"		"		静	内	3.685	585	3.100	<b>十勝川産</b>	
		"			2.2			見		走	2.6 3 7	417	2.220		
		"			3.				虹	别	1.3 4 3	197	1.1 4 6		
		, "			3.	3	"		甲	標津	558	84	474		
		小	計								10.605	1.665	8.940	1	
		計		-		-					13.594	2.014	11.940		
											(6.901)	(1.447)	(5.454)	受精直後卵 発 眼 卵	
		合	計								5 1.7 3 3	7350	4 4.5 7 3	光版师	
				-							38-				

第 1 3 表 道内移殖(受給状況)

			·	( ) 发 桁					
受	給	地	移殖年月日	供	給 地	<del> </del>	直卵の内	容	摘 要
支場	名	事業場名		支場名	事業場名	移籍卵数	移館的數	移殖実卵数	
北	見	網 走	45. 224	十 勝	十 勝	2.637	417	千粒 2.22 0	
		計				2.637	417	2220	
根	室	虹 别			十 勝	1.343	1197	1.146	
	1	//	3. 3	北 見	北見	2200	779	1.421	
	1	小 計中標準	3. 3	十 勝	_L R96	3.5 4 3 5 5 8	976	2.5 6 7	
		十 徐年	3, 3	Di	十勝	556	84	474	
		計				4.101_	1060	3.0 4 1	
+	勝	釧「各	1.20	根室	虹别	(819)		(819)	受精直後卵
		計			1	(010)		(010)	
天	塩	歌 登	1.20	北 見	湧 別	(819)	324	1.000	
	ann.	屯別	1.20	16 90	(5) (1)	5.404	1399	4.005	
		天塩		根室	虹 别	8.907	550	8.357	
	Jbe.	計	1909-104 20 0		fwl -	15.635	2273	1 3.3 6 2	
千	歳	元浦川		北 見	斜里	3302	501	2.801	
		小 計	"	"	網走	280	40	240	
		小 計 内	1.16	十 勝	十 勝	3.582	541 585	3.0 4 1 3.1 0 0	
		# 63		北 見	斜里	1.0 4 0	95	945	
		"	"	"	網走	1.238	132	1.106	
		小 計				5.963	812	5.151	
		千歳	2. 5	北見	斜 里	952	68	884	
		"	"	"	網走	1.821	252	1.569	
		"	2.20	根室	計根別	1.000		1.000	
		//	"	"	虹別	1.003		1.003	
		小計	116	上原	1 1946	4.776	320	4.456	,
		敷生計	1.1 6	十 勝	十勝	16.703	382 2055	2.000	
渡	島	八雲	4 4.1 2.2 6	十勝	札内	1.729	163	1566	
		"	45. 220	根室	計根別	2.000	216	1.784	
		"	"	"	虹 別	2419	425	1.994	
		小計				6148	804	5.3 4 4	
		利別	4 4.1 2.2 6	十 勝	札内	1.620	186	1.434	
		厚沢部 知 内	"	根 室	虹 別	1229	108	1.121	
		知 內(森)	44.12.25	"	"	(2.100)	(250)	1.056 (1.850)	受精直後卵
		"	1228	"	"	2.470	145	2.3 2 5	~1000
		"	45. 1.10	"	"	25	3	22	
,		"	"	"	"	(1.597)	(529)	(1.068)	受精直後卵
		"	45. 1.15	"	"	(2.385)		(1.717)	受精直後卵
		小 举		1				(4.635)	14.
		小計				(6.082)	148 (1.447)	(4.635)	
		計				12.675	1355	11.302	
		H-H-1		1	1	(6.901)	(1.447)	(5.454)	受精直後卵
4	全	計			}	51.753	7160	44.573	発 眼 卵

-39-

第14表 第1次本州移殖

4: 8	合 地		受	給 地	移	殖卵の内	訳	-
支持名	事業場名	移殖年月日	県 名	ふ化場名	移殖卵数	移前死的数	移殖実卵数	摘 要
北見		45. 2.10		本 入瀬田川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川	千粒	千粒	予復美別数 100 300 300 100 100 200 1.600 200 300 100 100 100 100 100	新里川産 新里川(½)産 網走川(½)
	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	11 11 11 11	富山"""小計	黑部川 " 布施川 " 神通川 " 庄 川 " 小矢部川 "	339 565 565 905 113 2487	39 65 65 105 13 287	300 500 500 800 100 2200	
根 室	虹 別	45. 2.10 " " " " " " " " " " "	育宮福     " " " " " 計       森城島     " " " 財城 計	奥阿白鮫新真熊木 久那鬼 パルル パッパ パッパ パッパ パッパ パッパ パッパ パッパ パッパ パッパ	5.6 51 20 68 2 20 1.60 6 1.60 6 1.69 7 55 9 1	651 168 20 206 206 206 197 197 591	1.900 200 200 300 300 300 300 1.400 500 700 300 1.500 5.000	<b>→西別川産</b>
合	計				11.242	1.242	10.000	

第15表 第2次本州移殖

付	<b>共</b> 統	地	移殖年月日		受	給		地	移	殖卵の内部	5	摘 要
支	場	事業場	AS/E/	県	名	S	化	場名	移籍卵数	移殖的死卵数	移殖実卵数	
根	室	計根別 " "	45. 219	宮福	森城島	白石鮫	)[[	ふ化場 水系 " " " "	千粒 750 200 180 304	千粒	千粒 750 200 180 304	
		"" " 3	W.	小茨	城"	真熊木 久那鬼	)II	""	80 80 80 724 250 370 180 800		80 80 80 724 250 370 180 800	西別川産
1 1	合	計							2474		2.474	

註) ※中標津事業場供給分474千粒を含む。

### 4 さけふ化放流成績概要

本年度は採卵数472,529千粒のうち,試験卵6千粒,交配種卵用599千粒を供出し,寄移出し,最終収容卵数461,628千粒を67事業場(道有1カ所,民間施設25カ所を含む) 給餌稚魚ともに2月1日から6月30日までの間に361,571千尾の稚魚を生産し放流した。 ふ化率,歩留り(収容から放流まで)とも昨年より若干低下したが,夫々84.4%,78.3% 水系別,支場別さけふ化放流或績は第12表,第13表のとおり。

また, 飼育効果の確認, 回帰効果の確認を目的として, 羅臼川, 十勝川支流幕別川, および知

第16表 昭和44年度海区水系別さけふ化放流成績表

海	水系	事 業 場	収容卵数	死卵数	ふ出尾数	ふ化率	放	危 尾
区	30 70	4· X 1/12	(千粒)	(千粒)	(千尾)		無給餌(千尾)	給 餌 (千尾)
	岩尾別	岩尾別	5,782	464	5,318	9 2.0	3,262	1,988
	奥藥別	斜 里			¥			440
オ	斜 里		2 2,4 0 7	2,265	2 0,1 4 2	8 9.9	7,0 0 0	12,160
	藻 琴	藻 峷	3,5 0 1	306	3,195	91.3	3,650	
ホ	辭 沸 湖	網走					2,0 7 0	
	網走		29,175	4,4 4 3	2 4,7 3 2	8 4.8	1 0,3 0 3	7,253
1	能 取						3,6 5 0	
	常品	北見	8,5 0 5	1,471	7,034	8 2.7	2,8 7 3	1,751
ッ	ライトコロ							1,0 6 3
	佐呂間別							1,1 3 6
2	芭 露							1,998
	湧 別	湧 別	27,028	6,813	20,215	7 4.8	5,777	1 2,2 8 2
海	渚 滑	渚 滑	8,140	1,908	6,2 3 2	7 6.6	4,7 4 4	2
	與 部						1,430	
X	幌 内	幌 内	7,262	2,775	4,487	6 1.8	-	4,485
	徳志別	徳志別	4,658	378	4,280	9 1.9		4,0 0 0
	北見幌別	歌登	4,211	1,020	3,191	7 5.8		3,1 5 3
	屯 别	屯 別	6,444	1,5 4 1	4,903	7 6.1		4,888

贈海産卵 3.4 2 0 千粒を受入れ,仮収容卵数 4 7 5.3 4 4 千粒の中から道外に 1 3.7 1 6 千粒をで管理し,ふ出稚魚 3 8 9.5 0 4 千尾のうち約 7 1 %に当る 2 7 6.5 1 9 千尾に給餌を行ない,無

であつた。

内川から夫々第18表のとおりの放流を行つた。

注 ( )の事業場は民間簡易ふ化設備

数	放流期間	仮収容から収容までの卵の動き・・・・・・ 事業場単位 備 考
計(千尾)		稚魚移殖放流・・・・・・・・・・ 括弧書
5,250	5.1 ~5.30	網走から 1,4 1 7 千粒
440	5.6 ~5.7	(斜里から440千尾移殖放流)
19,160	4.1 5~5.3 1	千才, 静内, 元浦川へ5,294千粒, 網走へ586千粒, 本州へ5,651千粒, 網走から12,814千粒
3,650	3.1 ~4.30	(網走から550千尾移植放流)網走へ927千粒、網走から2,604千粒
2,070	4.21~4.22	(網走から 2,070 千尾移殖放流)
1 7,5 5 6	3.2 5~5.2 0	千才, 静内, 元浦川へ3,339千粒, 岩尾別へ1,417千粒, 斜里へ12,814千粒, 斜里から586千粒, 藻琴へ2604千粒, 北見へ5,708千粒, 十勝から26,37千粒, 藻琴から927千粒
3,650	4.23~4.25	(網走から3,650千尾移動放流)
4,624	4.3 ~5.15	ライトコロ、佐呂間別分143千粒を含む、網走から5,708千粒、渚滑から520千粒 湧別から2,200千粒、幌内へ520千粒、虹別へ2200千粒
1,0 6 3	4.28	(北見から 1,0 6 3 千尾移植放流)
1,1 3 6	4.29~4.30	(北見から 1,1 3 6 千尾移殖放流)
1,998	5.20~5.22	(湧別から1,998千尾移殖放流)
1 8,0 5 9	3.10~6.6	歌音, 屯別へ6.728千粒, 幌内へ3.985千粒, 渚滑へ3,474千粒, 北見へ2,200千粒
4,7 4 4	2.2 2~5.1 7	興部分525千粒、 獲別から3,474千粒、 北見へ520千粒、 幌内へ527千粒
1,4 3 0	5.4 ~5.7	(渚滑から 1.4 3 0 千尾移殖放流)
4,485	3.1 0~5.3 0	湧別から3,985千粒。北見から520千粒。 渚滑から527千粒
4,000	4.1 ~5.11	幌別から 4,282 千粒
3,153	4.2 0~5.1 5	湧別から1,324 干粒, 徳志別へ4,282 干粒, 増毛へ1,110 干粒
4,888	41 ~4.30	<b>湧別から 5,4 0 4</b> 干粒

海							放步	危 尾
区	水 系	- 東	収容卵数 (千粒)	死 卵 数 (千粒)	ふ出尾数 (千尾)	ふ化率 (%)	無給餌(千尾)	給 餌 (千尾)
	時 前	(時前)	500	4 3	457	9 1.4	-	440
	海区計	本年度	127,613	23,427	104,186	8 1.6	44,759	5 7,0 3 7
	(## (Z. EI)	前年度	4 3,8 1 0	5,0 3 0	3 8,7 8 0	8 8.5	1,399	36,191
B	增 幌	(增幌)	509	3 7	472	9 2.7		450
	天 塩	天 塩	8,907	1,302	7,605	8 5.4		7,5 3 2
本	"	中川	1,594	167	1,427	8 9.5		1,2 3 0
	"	小 計	10,501	1,4 6 9	9,0 3 2	8 6.0		8,762
75	小平藥		5.1%					150
	暑寒別	(增毛)	1,110	110,	1,0 0 0	9 0.0		980
区	石 狩	千 オ	8,907	1,673	7,2 3 4	81.2		2,9 3 1
	"	音 江	267	32	235	88.0	233	
	"	小 計	9,184	1,705	7,469	8 1.3	233	2,9 3 1
	余 市						-	2,000
	尻 別	尻 別	6 9	1 2	5 7	82.6	5 5	
	朱 太							400
	利 別	利 別	2,302	226	2,0 7 6	90.2		2,0 1 4
	厚尺部	厚沢部	2,4 6 9	291	2,1 7 8	88.2	300	1,5 6 4
	海区計	本年度	2 6,1 3 4	3,850	22,284	8 5.3	588	19,251
	() ()	前年度	1 6,7 0 7	1,484	15,223	91.1	525	1 1,5 4 2
	ルサ	(ルサ)	3,0 1 6	2,5 1 6	500	1 6.6	350	
根	羅白	羅 臼	11,142	2,0 0 2	9,1 4 0	8 2.0		3,9 2 6
	植別							999
室	薫 別	薫 別					-	1,993
海	古多糖	(古多糖)	1,3 2 8	82	1,2 4 6	9 3.8	1,200	
区	忠 類	(忠類)	2,0 0 4	143	1,8 6 1	9 2.9	1,8 4 2	
	伊茶仁	伊茶仁	3 5,4 3 6	6,8 9 7	28,539	8 0.5		9,889
	穆 津	根 室	1,0 3 4	437	597	5 7.7	585	1 6,280
	"	中標準	1 1,0 6 9	1,819	9,250	8 3.6		8,730

数 計 (千尾)	放流 期間	仮収容までの卵の動き・・・・・ 事業場単位
440	6.7 ~6.1 7	中川から 500千粒
101,796	2.22~6.17	
3 7,5 9 0	2.15~6.9	
450	6.7 ~6.17	中川から 509千粒
7,5 3 2	5.28~6.6	虹別から 8,90 7千粒
1,230	5.1 ~6.1 3	天塩,中川分2,602千粒,時前へ500千粒,増幌へ509千粒
8,7 6 2	5.1 ~6.1 3	•
150	5.1 5	(中川から150千尾移殖放流)
980	6.1 ~6.10	歌登から 1.110 干粒
2,9 3 1	4.21~4.27	勇払分108千粒,斜里,網走,虹別,計根別から4776千粒,鵡川へ540千粒
233	3.28	
3,1 6 4	3.28~4.27	
2,000	5.1 4~5.1 5	( 千才から 2,000千尾移殖放流 )
55	4.19	
400	5.8	(森から400千尾移殖放流)
2,0 1 4	3.11~4.30	札内から 1.6 2 0千粒
1,864	2.1 ~5.4	虹別から 1.2 2 9 千粒
19,839	2.1 ~6.1 7	
1 2,0 6 7	3.3 ~6.2 5	
350	6.15~6.20	羅臼から 3,016 千粒
3,926	4.1 ~5.31	1.334 1479 到1997-301 00 1479 129 13910 1479 日至4日 11 05 00 1439 15494
999	6.5	(伊茶仁から 9,9 9千尾移殖放流 ) 2,0 04 干粒
1,993	5.16~5.17	(虹別から 1.993千尾移殖放流)
1,200	5.1 5~6.1 0	羅臼から 1.3 2 8 千粒
1,842	5.20~5.31	羅臼から 2,0 0 4 千粒
9,889	5.1 2~6.3 0	1000172 下流手吧、3.510 142 145 145
1 6,8 6 5	5.20~6.16	~503十程(伊尔仁邓约16280 十毛粉组双加)
8,730	4.1 ~6.6	虹別から1,675千粒,伊茶仁から1,980千粒,十勝から558千粒,根室(標準31線分)から7,330千粒,本州へ474千粒

海	水系	事業 場	収容卵数	死 卵 数	ふ 出尾数	ふ化率	放	流尾
×		7,0	(千粒)	(千粒)	(程)	(%)	無給餌(千尾)	給 餌(千尾)
	標準	小 計	1 2,1 0 3	2,2 5 6	9,8 4 7	81.4	585	2 5,0 1 0
根	当幌	計根別	1 4,3 5 2	1,599	1 2,7 5 3	8 8.9		7,936
	春 別				×			1.5 9 5
室	床 丹				1 1			2,290
	西別	虹 別	5 7,0 2 9	7,2 1 8	4 9,8 1 1	8 7.3		41.024
毎	風連	浜 中	6,7 4 7	1,1 2 6	5,621	8 3.3	4,695	
	別当賀	厚 床					15	3,280
X	想 香	(穂香)	599	80	519	8 6.6		910
	₩ F/ -	本年度	1 4 3,7 5 6	23,919	119,837	8 3.4	8,672	9 8,8 5 2
	海区計	前年度	9 2,3 2 5	9,832	82,493	8 9.4	4,670	7 4,2 0 8
	幌 戸	(幌戸川)	1.0 9 7	112	985	8 9.8	887	
	別寒辺牛	太田	6,501	583	5,918	9 1.0	5,0 6 7	
崇	釧路	釧路	2 5,5 9 4	1.407	2 4,1 8 7	9 4.5	9,159	1 4,9 2 5
	"	鶴居	1 1.8 6 4	1.4 5 2	1 0,4 1 2	8 7.8		8,800
	"	小 計	37,458	2,859	3 4,5 9 9	92.4	9,159	2 3,7 2 5
裳	庶 路					1217		750
	茶 路					3	F = 13	750
以	音 別	(47/11)	2,185	206	1.979	9 0.6	1.900	1,000
	厚内				*		1 1 10	1,600
東	十 勝	十 勝	1 3,6 6 2	1,5 3 9	1 2,1 2 3	8 8.7		7,983
	"	幕 別	2 4,9 0 0	2,7 1 9	2 2,1 81	8 9.1	150	2 1.7 3 3
毎	"	札内	2.3,878	2,820	21,058	8 8.2	3.7.1	1 4,2 5 0
E2	"	(利別)	89	8	81	9 1.0	76	
X	"	小 計	6 2,5 2 9	7,086	5 5,4 4 3	88.7	226	4 3,9 6 6
	歷舟	大 樹	5,005	866	4,1 3 9	8 2.7	1-000	3,900
	広 尾	(広尾)	8,4 7 7	1,554	6,923	81.7	3,0 4 0	3,7 6 0
	猿留	(猿留)	1.191	264	929	78.0	900	
	海口・雪	本年度	124,443	1 3,5 2 8	110,915	8 9.1	21,179	7 9,4 5 1
	海区計	前年度	7 2,6 6 7	7,062	65,605	90.3	2,998	61,058

数		仮収容から収容までの卵の動き・・・・・・ 事業場単位
計	放流期間	· 广 · 一 · · · · · · · · · · · · · · · ·
(程)		稚魚移殖放流・・・・・・・・・・・・括弧書き
25,595	4.1 ~6.1 6	
7,936	4.1 ~5.31	虹别协ら14,190千粒,羅日へ155千粒,八雲、千才へ3,000千粒,本州へ2000千粒
1,595	5.19~5.20	(計根別から1,595千尾移殖放流)
2.290	5.21~5.23	( " 2,290 " ')
41.024	4.1 ~5.20	十勝から 1,3 4 3 千粒, 北見から 2,200 千粒, 渡島, 天塩, 千才, 十勝管内へ 2 4,1 19 千粒, 根室支場管内へ 5 9,1 5 7 千粒, 本州へ 5,5 9 1 千粒
4,695	4.5 ~6.15	虹別から 4.617千粒, 厚床(別当賀分) 1.073千粒
3,280	4.6 ~6.13	(虹別から400千粒, 浜中から800千尾移殖放流)
910	5.5 ~5.16	(虹別から400千尾移殖放流)虹別から330千粒, 穂香分269千粒
107,524	4.1 ~6.30	
78,878	3.1 ~6.15	
887	5.2 ~5.20	太田から 1.097千粒
5,067	5.2 ~6.3	釧路から 5,081 千粒,十勝から 1,190千粒,鶴居へ 1,852 千粒
24,084	3.2 6~5.1 3	虹別から819千粒,太田他事業場へ8,363千粒,鶴居へ9,034千粒
8,800	4.2 0~5.3 0	太田から 1.852 千粒,茶路,阿寒分 978 千粒,釧路分 9,034 千粒
3 2,8 8 4	3.26~5.30	
750	4.27	(鶴居から750千尾移殖放流)
750	4,28	( " )
2,900	5.1 <b>∼</b> 5.28	(十勝から 1.000 千尾移殖放流 ) 釧路から 2,185 千粒
1.600	5.30	(十勝から 1.600 千尾移殖放流)
7,983	4.20~6.3	
21.883	4.1 ~5.1 5	渡島,千才,北見,根室各支場の事業場へ13,954千粒
14,250	3.20~5.20	十勝支場管內事業場へ13,387 千粒
76	4.5 ~5.20	
44,192	3.20~6.5	
3,900	4.20~5.20	十勝から 4,0 4 5 千粒
6,800	4.15~5.31	″ 6.988 ″ 広尾, 豊似分 1.489 千粒
900	4.2 3~5.2 0	″ 1.156 ″ 猿留分35千粒
100,630	3.20~6.3	
64.056	3.16~6.4	

- 47-

海	-l =	中 光 相	1177 957 900 3844	死 卵 数	ふ出尾数	८ ४७ च	放	流尾
-	水系	事業 場	収容卵数 (千粒)	化卵 级 (千粒)	(千尾)	ふ化率 (%)	無給餌	給 餌
K.							(千尾)	(千尾)
ì	歌 別	(歌別)	1,3 9 7	292	1,1 0 5	7 9.1	405	
	仁雁別						664	
	幌 別		-	(#			1,196	
ĺ	元浦川	(元浦川)	4,297	702	3,5 9 5	8 3.7	1.467	
襟	三 石		-				800	6.8
	静 内	静 内	8,1 7 5	1,591	6,584	8 0.5		3,959
	新 冠							812
轰	沙流							1,753
	鵡川	(鵡川)	856	74	782	9 1.4	781	
以	勇 払				1	-	>	962
	白 老	白 老			,			1,027
	敷 生	敷 生	2965	4 3 5	2,530	8 5.3		1,452
西	買気別	-						500
	長万部	遊楽部						500
	遊樂部	八 雲	7,617	1,5 3 9	6,078	7 9.8		5,995
海		(森)	8,577	2,159	6,418	7 4.8		
	汐 泊			_			304	900
X	大 野	(有川)	239	47	192	8 0.3	185	
1	戸切地		-					500
	茂辺地	(茂辺地)	4,096	364	3,732	9 1.1	3,410	2,000
	亀 川	(亀川)	119	23	96	8 0.7	94	500
	知 内	知内	1,344	174	1.1 7 0	87.1	548	1,000
		本年度	39,682	7,400	3 2,2 8 2	81.4	9,854	21,928
	海区計	前年度	15,605	1,730	13,875	8 8.9	5,703	9,144
		本年度	461.628	7 2,1 2 4	389,504	84.4	85,052	276,519
合	青	前年度	241,114	25,138	215,976	8 9.6	15,295	192,143

### さけ卵子の採卵から収容までの働き

採 卵 数

472,529千粒

海產卵数

-48-

3,420 "

供 試 卵 数

△ 605 W

数		仮収容から収容までの卵の動き・・・・・・ 事業場単位
計	放流 期間	備 考 稚魚移殖放流・・・・・・・・・・・・・・・・・ 括弧書き
(千尾)		
405	5.1 1	静内から 1.3 9 7 千粒
664	5.4 ~5.1 4	( 歌別から 6 6 4 千尾移殖放流 )
1,196	4.28	(元浦川から 1,196 千尾移殖放流)
1,467	4.28~5.15	静内(元浦川,幌別分)から715千粒、斜里から3,302千粒、網走から279千粒
868	4.3 0~5.1 0	( 元浦川から 800千粒, 静内から 68 千尾移殖放流 )
3,9 5 9	3.1 ~ 5.1 8	新里から 1.040 千粒,網走から 1.239千粒,十勝から 3.685千粒,静内富川,新冠,三石分 3,252 千粒,歌別へ 1.397 千粒
812	5.4 ~5.1 4	(静内から 812千尾移殖放流)
1.753	3.10~4.7	(千才から 1.000 千尾,静内から 753 千尾移殖放流 )
781	5.20	鵡川分316 干粒,干才から540 干粒
962	5.8	(干オから962千尾移殖放流)
1.027	3.2 ~4.23	( 敷生から 1.0 27 千尾移殖放流 )
1,452	3.2 ~4.23	白老から239 干粒, 十勝から 2382千粒
500	5.6	(森から500千尾移殖放流)
500	5.7	( " )
5,995	3.26~5.31	長万部分25千粒、札内から1,729千粒、計根別から2000千粒、虹別から2419千粒
1.204	4.1 0~4.1 4	(茂辺地から304千尾,森から900千尾移殖放流)
185	3.20~4.30	
500	4.15	(森から 500千尾移殖放流)
5.410	2.20~4.20	( " 2,000 " )
594	3.20~4.30	( " 500 " )
1,5 4 8	3.20~5.9	( " 1.000 " )
3 1,7 8 2	2.20~5.20	
1 4,8 4 7	2.25~5.23	
361,571	2.1 ~6.3 0	
207,438	2.15~6.25	

仮 収 容 卵 数

475,344千粒

本州移殖卵数

△13,716 "

収 容 卵 数

461,628 "

-49-

放 支 場 事 業 場 収容卵数 死 卵 教 ふ出尾数 ふ化率 (千粒) (千粒) (元星) (%) 無給餌(千尾) 北見 岩 尾 別 5,782 464 5,318 3,262 92.0 斜 里 22,407 2,265 20,142 7,000 89.9 琴 藻 3,501 306 3,195 3,100 91.3 網 走 29,175 4,443 24.732 84.8 16.573 北 兒 8.505 1.471 7,034 2,873 82.7 湧 别 27,028 6,813 20,215 74.9 5,777 8.140 渚 滑 1.908 6,232 76.6 6,174 ജ 内 7,262 2.775 4,487 61.8 本 年 度 111,800 20,445 91.355 44,759 81.7 前 年 度 37,409 4,496 \$ 32,913 1,399 88.0 根室 (ルサ) 3,016 2,516 500 350 1 6.6 羅 11.142 EI 2,002 9.140 82.0 ( 古多糠 ) 1.328 82 1,246 1,200 93.8 (忠類) 2,004 143 1.861 9 2.9 1,842 伊 茶 仁 35,436 6,897 28,539 30.5 30 1,034 437 585 597 5 7.7 標準 17 11,069 1,819 9,250 83.6 計 根 别 14,352 1.599 1 2,7 5 3 88.9 虹 别 57,029 7,213 49,811 87.3 6.747 4,695 1,126 5.621 83.3

註 ( )の事業場は民間簡易ふ化設備

	流尾	数	放流尾数	放流 期間	備	考
給	餌(程)	計 (千尾)	収容卵数(%)	22 010 793 123	ИU	•
	1,988	5,250	90.8	5.1 ~5.30		
	1 2,6 0 0	1 9,6 0 0	8 7.5	4.1 5~5.3 1		
		3,1 0 0	8 8.5	3.1 ~4.3 0		
	7,253	23,826	81.7	3.25~5.20		
	3,950	6,8 2 3	80.2	4.3 ~5.1 5		
	1 4,2 8 0	20,057	7 4.2	3.1 0~6.6		
		6174	7 5.8	2.24~5.17		
	4,485	4,485	61.8	3.1 0~5.3 0		
	44,556	8 9,3 1 5	7 9.9	2.24~6.6		a Simple Market of Contract Section 2
	30,650	3 2,0 4 9	8 5.7	3.5 ~5.31	on he se	
		350	1 1.6	6.15~6.20		
	3,9 2 6	3,926	3 5.2	4.1 ~5.31		
		1,200	90.4	6.5 ~6.10		
		1.840	9 1.9	5.20~5.31		
	27,168	27,168	7 6.7	5.1 2~6.3 0		
		585	5 6.6	5.20~6.16		
	8,730	8,730	7 8.9	4.1 ~6.6		
	11,821	11,821	82.4	4.1 ~5.3 1		
	45,987	45,987	80.6	4.1 ~5.20		
	800	5,4 9 5	81.4	4.5 ~6.15		
	420	420	70.1	5.5		and another Addition of the contract of the co
	9 8 8 5 2	107,524	7 4.8	4.1 ~6.30		
	7 4,2 0 8	78,878	8 5.4	3.1 ~6.15		
		5,0 6 7	7 7.9	5.2 ~6.3		
		887	8 0.9	5.2 ~5.20		
	1 4,9 2 5	2 4,0 8 4	9 4.1	3.26~5.13		

80

23,919

9,832

583

112

1.407

86.6

83.4

89.4

91.0

89.8

9 4.5

3,672

4,670

5,067

887

9,159

519

119,837

8 2,4 9 3

5.918

985

24,187

( 穆 香 )

本 年 度

前年慶

( 幌戸川 )

田

路

太

細

十鹏

599

143,756

9 2,3 2 5

6,501

1,097

25,594

					İ		放
支	場	事 業 場	収容卵数(千粒)	死 卵 数 (千粒)	ふ出尾数 (T尾)	ふ化率 (%)	無給餌(千尾)
+	勝	鶴 居	1 1.8 6 4	1,4 5 2	1 0,4 1 2	8 7.8	
		(音別)	2,1 8 5	206	1,979	9 0.6	1,900
		幕 別	24,900	2,7 1 9	2 2,1 8 1	8 9.1	150
		(利別)	89	8	8 1	9 1.0	76
		札 内	23,878	2,8 2 0	2 1,0 5 8	8 8.2	
		十 勝	1 3,6 6 2	1,5 3 9	1 2,1 2 3	8 8.7	
		大 樹	5,0 0 5	866	4,1 3 9	8 2.7	
		(広尾)	8,477	1,5 5 4	6,9 2 3	8 1.7	3,0 4 0
		(猿 留)	1.191	262	, 929	7 8.0	900
		本 年 度	1 2 4,4 4 3	1 3,5 2 8	110,915	8 9.1	2 1,1 7 9
		前 年 度	7 2,6 6 7	7,0 6 2	65,605	9 0.3	2,998
天	塩	徳 志 別	4,658	378	4,280	9 1.9	
		歌 登	4,211	1.0 2 0	3,1 9 1	7 5.8	2
		屯 別	6,4 4 4	1,5 4 1	4,903	7 6.1	
		(時前)	500	4 3	457	91.4	
		(增 幌)	509	37	472	9 2.7	
		中 川	1,594	167	1,4 2 7	8 9.5	14.
		天 塩	9,907	1,302	7,6 0 5	8 5.4	Ĩ
		(增毛)	1,110	110	1,000	9 0.1	
		本 年 度	27,933	4,5 9 8	2 3,3 3 5	8 3.5	
		前 年 度	1 6,9 4 3	1.4 5 9	1 5,4 8 4	91.4	
Ŧ	才	千 才	8,907	1.6 7 3	7,2 3 4	8 1.2	
		音 江	267	32	235	8 8.0	. 233
		(歌 別)	1,397	292	1,1 0 5	7 9.1	1,0 6 9
		(元浦川)	4,297	702	3,5 9 5	8 3.7	3,4 6 3
		静内	9,1 7 5	1,5 9 1	6,5 8 4	8 0.5	
		(鵡川)	856	74	782	91.4	781
		敷 生	2,9 6 5	435	2,5 3 0	8 5.3	

流尾	数	放流尾数/		
給 餌(千尾).	計 (千尾)	収容卵数(%)	放流 期間	備 考
1 0,3 0 0	1 0,3 0 0	8 6.8	4.20~5.30	,
	1,900	8 7.0	5.1 ~5.20	
21,733	21,883	8 7.9	4.5 ~5.15	
	7 6	8 5.4	4.5 ~5.20	
1 4,2 5 0	1 4,2 5 0	5 9.7	3.20~5.20	
1 0,5 8 3	1 0,5 8 3	7 7.5	4.20~6.3	
3,900	3,900	7 7.9	4.2 ~5.20	
3,760	6,8 0 0	8 0.2	4.15~5.31	
	900	7 5.6	4.23~5.20	
7 9,4 5 1	100,630	8 0.9	3.20~6.3	
61,058	6 4,0 5 6	8 8.2	3.1 6~6.4	a construenting and construent of the construent
4,0 0 0	4,0 0 0	8 5.9	4.1 ~5.1 1	And the state of t
3,1 5 3	3,1 5 3	7 4.9	4.20~5.15	
4,888	4,888	7 5.9	4.1 ~4.30	
440	440	8 8.0	6.7 ~6.1 7	
450	450	8 8.4	6.7 ~6.1 7	
1,380	1.380	8 6.6	5.1 ~6.13	
7,5 3 2	7,5 3 2	8 4.6	5.28~6.6	
980	980	8 8.3	6.1 ~6.10	
2 2,8 2 3	2 2,8 2 3	8 1.7	4.1 ~6.1 7	Α
1 3,5 4 3	1 3,5 4 3	7 9.9	2.1 5~6.2 5	
6,893	6,893	7 7.4	4.7 ~5.1 5	
	233	8 7.3	3.28	
	1,069	7 6.5	5.4 ~5.1 4	
	3,463	8 0.6	4.2 8~5.1 5	
5,5 9 2	5,5 9 2	6 8.4	3.1 ~5.18	
	781	91.2	5.2 0	
2,479	2,479	8 3.6	3.2 ~4.23	

							放
支 場		事 業 場	収容卵数(刊粒)	死 卵 数 (干粒)	ふ 出尾 数 (千尾)	ふ化率 (%)	無給餌(千尾)
干黄		本 年 度	26,864	4,799	2 2,0 6 5	82.1	5,5 4 6
1 /0	1 2050	前 年 度	9,8 3 7	996	8,8 4 1	8 9.9	892
渡島	島	尻 別	69	12	5 7	8 2.6	5 5
		利 別	2,3 0 2	226	2,0 76	9 0.2	
		厚 沢 部	2,4 6 9	291	2,1 7 8	8 8.2	300
		八雲	7,617	1,539	6,078	7 9.8	
		(森)	8,5 7 7	2,1 5 9	6,4 1 8	7 4.8	
		(有川)	239	47	192	8 0.3	185
		(茂辺地)	4,096	364	3,7 3 2	9 1.1	3,7 1 4
		(亀川)	119	23	96	8 0.7	9 4
		知 内	1.3 4 4	174	1,1 70	8 7.1	548
		本 年 度	2 6,8 3 2	4,835	21,997	8 2.0	4,8 9 6
		前 年 度	1 1,9 3 8	1,293	1 0,6 4 0	8 9.2	5,3 3 6
		本 年 度	461,628	7 2,1 2 4	3 8 9,5 0 4	8 4.4	8 5,0 5 2
合言	+	前年度	241.114	2 5,1 3 8	215,976	8 9.6	1 5,2 9 5

数	放流尾数/	长杏椒	備考
計(千尾)	収容卵数(%)	放 机 种门目	/m ~
2 0,5 1 0	7 6.3	3.1 ~5.20	
8,5 3 7	8 6.8	3.1 2~4.29	
5 5	7 9.7	4.19	
2,0 1 4	8 7.5	3.11~4.30	
1,864	7 5,5	2.1 ~5.4	
5,9 9 5	7 8.7	3.26~5.31	
6,300	7 3.5	413~5.12	
185	7 7.4	3.20~4.30	
3,714	9 0.7	2.20~4.20	
9 4	7 9.0	3.20~4.30	
5 4 8	4 0.8	3.20~4.30	1月末日の台湾坊主による被害あり
2 0,7 6 9	7 7.4	2.1 ~512	
1 0,3 7 5	8 6.9	2.25~5.23	
3 6 1.5 7 1	6 8.6	2.1 ~6.30	
207,438	8 6.0	2.1 5~6.2 5	
	計(千尾) 20,510 8,537 55 2,014 1,864 5,995 6,300 185 3,714 94 548 20,769 10,375 361,571	計(千尾) / 収容卵数(%)  2 0,5 1 0 7 6.3  8,5 3 7 8 6.8  5 5 7 9.7  2,0 1 4 8 7.5  1,8 6 4 7 5,5  5,9 9 5 7 8.7  6,3 0 0 7 3.5  1,8 5 7 7.4  3,7 1 4 9 0.7  9 4 7 9.0  5 4 8 4 0.8  2 0,7 6 9 7 7.4  1 0,3 7 5 8 6.9  3 6 1.5 7 1 6 8.6	計(千尾)

第18表 さけ稚魚標識放流

魚	種	河川名	放 流 期 間		標		識
1	1,35	1777173	/JX (/)L 793 [FI]	尾数	部 位	8	的
3	け	羅白	45. 4. 28	158	左腹ピレ	小型群 体重0.65 g((	).55~0.95g)
						飼育効果の確	可
		"	45. 4. 28	106	右腹ピレ	大型群 体重1.50g(1	1.10~1.80g)
			1		,		
		幕 別	45. 4. 3	100	左腹ピレ	無給餌 体重 0.7 g 体量	是 4.3cm
			1 "	,	脂ビレ	同 上	
		"	45. 5. 2	100	右腹ビレ	給 餌 体重1.2 g 体	₹5.3cm
			-		脂ピレ		
		知 内	4 5.3.2 3~3.3 0	84	脂ピレ	回帰の確認	

### § 8 ます増殖事業

#### 1 捕獲採卵成績概要

#### () さくらます

本年度は20水系の22捕獲採卵場で5月22日から11月2日まで実施し,13,140 尾を捕獲した(最近5カ年平均9,426尾)。例年を上廻る昨年に次ぐ成績であつたが, オホーツク海区が昨年より4,015尾少なく,他の海区はともに良好な成績を示した。 採卵物については、雌親魚使用率が83.9%(昨年63.6%)と高率であつたため、雌

親魚数が昨年より少なかつたが、15,198千粒と好成績であつた。

### ○ からふとます

本年度は34水系の34捕獲採卵場で6月1日か511月20日まで実施し、102,889尾を捕獲した(最近5カ年平均49,511尾)。総体では計画数、例年量をはるかに越える成績であつた。最近は西歴偶数年はオホーック海豊漁、根室海区不漁、奇数年は逆の傾向が現われていたが、昨年に引続き、本年もこの傾向は変つている。すなわち、根室海区では昨年の49.3%に止まり、オホーック海区では昨年の2倍以上の豊漁であつた。

この結果、採卵数については昨年の約3倍の76.167千粒と戦後最高の好成績を示した。


### 事業計画と実績ならびに前年度との比較


#### 第1表 さくらます


×.	分	昭和44年度			昭和43年度	3年度 前年度との対比	
12	//	計画数	実 績	達成率%	実 績	增减。	
捕獲数	(尾)	13,900	1 3,1 4 0	9 4.5	1 5,5 9 6	△ 2,456	
採卵数	(千粒)	14459	15,198	1 0 5.1	11,592	3,606	
放流数	(千尾)	11,569	1 2,5 0 3	1 0 8.1	9,927	2,5 7 6	


#### 第2表 からふとます

X		昭和44年度			昭和43年度	前年度との対比	
	分十	計画数	実 績	達成率 %	実 績	増 滅 △	
捕獲数	(尾)	5 2,1 0 0	102,889	1 9 7.5	6 5,8 7 4	3 7,0 1 5	
採卵数	(千粒)	31,900	76,167	2 3 8.8	2 5,5 7 7	5 0,5 9 0	
放流数	(千尾)	25,540	6 4,5 5 6	25 2.8	21,469	4 3,0 8 7	









第3表 昭和44年度海区別さくらます事業成績

項		Acres de la constitución de la c	捕	獲	採	卵
海	捕	獲 数	(尾)	우 性比	♀ 親魚使用	同使用率
N B	7	\$	計	%	数(尾)	%
オホーツク海区	4,658	2,817	7,4 7 5	6 2.3	3,5 4 0	7 6.0
日本海区	939	303	1.242	7 5.6	853	9 0.8
根室海区	2,7 5 0	1,503	4260	6 4.6	2,603	9 4.4
襟裳以東海区						
襟裳以西海区	142	21	163	8 7.1	136	9 5.8
合 計	8,4 9 6	4,6 4 4	13,140	6 4.7	7,1 3 2	8 3.9
昭和43年度	1 0,3 0 4	5,292	1 5,5 9 6	6 6.1	6,5 5 8	6 3.6

第4表 昭和44年度支場別さくらます事業成績

		項		**************************************		捕	獲	採	卵
支			目	捕	獲数	(尾)	2性 比	早親魚使用	同使用率
	場			2	5	計	%	数(尾)	%
北	見	支	場	4264	2,600	6,864	6 2.1	3,1 6 5	7 4.2
根	室	支	場	2,7 5 7	1,503	4,260	6.4.7	2,603	9 4.4
+	勝	支	場						
天	塩	支	場	572	282	854	6 7.0	547	9 5.6
干	蔵	支	場	85	8 9	174	4 8.9	67	7 8.8
渡	島	支	場	818	170	988	8 2.8	750	9 1.7
台	ì	S	H	8,4 9 6	4,6 4 4	1 3,1 4 0	6 4.7	7,1 3 2	8 3.9

成	績			2 化 方	汝 流	成 續	
平均採卵数	採卵数	捕獲·採卵	収容卵数	ふ出尾数	ふ化率	放流数	II Made Balle
粒	千 粒	実施 期間	千粒	千尾	%	千尾	放流期間
1,800	6,3 6 9	522~1.030	5,806	5,2 4 6	9 0.4	5,158	1.1 ~410
2,4 3 0	1,5 0 9	7. 1~1020	4,081	3,786	9 2.8	2,961	328~613
2500	6,499	6. 1~1031	4.776	4,392	9 2.0	4,143	2. 1~331
2,400	327	7. 1~11. 2	327	293	8 9.6	241	522~6. 3
2,1 3 0	15,198	522~11. 2	1 4,9 9 0	1 3,7 1 7	9 1.5	1 2,5 0 3	1. 1~613
1,770	11.592	511~1020	11.580	1 0,4 5 7	9 0.3	9,9 2 7	1. 9~516

成	績		\$	化龙	流	成 續	
平均採卵数	採卵数	捕獲•採卵	収容卵数	ふ出尾数	ふ化率	放流数	
粒	千粒	実施期間	千粒	千粒	%	千尾	放流期間
1,8 5 0	5,8 4 7	522~1014	5,239	4,805	90.2	4,718	1. 1~410
2500	6,499	6. 1~1031	4,776	4,3 9 2	9 2.0	4.143	2. 1~331
1600	0.7.5	500 10 1	0.7.5	6.5			
1,600	875	526~10. 4	875	805	9 2.0	798	2. 1~613
2,3 4 0	157	7. 1~1020	667	618	9 2.7	286	328~5. 1
2,4 3 0	1,820	717~11. 2	3,3 4 3	3,0 9 7	9 2.6	2,5 5 8	5. 1~6. 3
2130	1 5,1 9 8	522~11. 2	14990	1 3,7 1 7	9 1.5	1 2,5 0 3	1. 1~613

第5表 昭和44年度 海区別からふとます事業成績

項			捕	獲	採 卵	3
海目	捕獲	菱 数	(尾)	2 性比	2 親魚使	同使用率
[X	9	8	計	%	用数(尾)	%
オホーツク海区	4 9,9 5 3	3 8,2 7 5	8 8,2 2 8	5 6.6	4 6,3 4 9	9 2.8
日本海区	73	50	123	5 9.3	42	5 7.5
根 室 海 区	5,222	7,819	1 3,0 4 1	4 0.0	4.962	9 5.0
襟裳以東海区	718	455	1,173	6 1.2	671	9 3.5
際篡以西海区	165	159	324	5 0.9	80	4 8.5
合 計	5 6,1 3 1	4 6,7 5 8	102,889	5 4.6	5 2,1 0 4	9 2.8
昭和 4 3 年度	2 1.7 7 6	4 4,0 9 8	6 5,8 7 4	3 3.1	18,482	8 4.9

							ŀ
第6表	昭和4	4	年度支場別からふと	ま	す	事業成績	

1		項				捕	獲	採明	3
支		\ \	_	捕 数	数 (	尾)	2 性比	2 親魚使	同使用率
	場		B	9	3	計	%	用数(尾)	%
北	見	支	場	4 1,5 3 0	3 0,2 0 2	71,732	5 7.9	3 9,4 8 4	9 5,1
根	室	支	鋆	5,2 2 2	7,819	1 3,0 4 1	4 0.0	4,962	9 5.0
+	勝	支	場	718	455	1.1 7 3	6 1.2	671	9 3.5
天	搶	支	場	8,4 9 6	8,1 2 3	16,619	5 1.1	6,907	8 1.3
Ŧ	拔	支	場	25	16	4 1	61.0	16	6 4.0
徙	爲	支	場	140	143	283	4 9.5	64	4 5.7
4	ì	į	it ]	5 6,1 3 1	4 6,7 5 8	102,889	5 4.6	5 2,1 0 4	9 2.8

成	績		.\$	化放	流 成	績	
平均採卵数	採卵数	捕獲·採卵	収容卵数	ふ出尾数	ふ化率	放流数	de se disam
粒	千粒	実施期間	千粒	千尾	%	千尾	放流期間
1,480	6 8,6 0 7	6.1 8~1 1.2 0	5 1,5 3 9	4 4.8 2 2	8 7.0	43,233	2.1 2~5
1,950	8 2	7.20~10.10	1 0,8 4 6	9,945	9 1.7	7,0 0 0	4.1 0~6
1,3 4 0	6,648	6. 1~1 0.3 1	9,055	8,3 2 9	9 2.0	7,631	2. 1~4
1,1 2 0	750	8. 1~10.15	750	648	8 6.4	615	4. 1~5
1,000	80	7. 6~1 0.1 0	3,967	3,3 9 5	8 5.6	6,077	3.20~5
1,4 6 0	7 6,1 6 7	6. 1~11.20	76,157	6 7,1 3 9	8 8.2	64,556	2. 1~6
1,3 8 0	25,577	5.15~10.20	2 5,5 7 7	2 2,0 6 9	8 6.3	21,469	2. 1~5

成	續			ふ 化 放	流 成	續	
平均採卵数	採卵数	捕獲・採卵	収容卵数	ふ出尾数	ふ化率	放流数	11 74- 11/18
粒	千粒	実施期間	干粒	干尾	%	千尾	放流期間
1.5 2 0	5 9,8 4 6	7.11~11.20	4 2,7 7 8	3 7,2 8 7	8 7.2	35,809	2.1 2~5.3
1,340	6,648	6. 1~10.31	9,055	8,329	9 2.0	7,631	2. 1~4.3
1,120	750	8. 1~1 0.1 5	750	648	8 6.4	615	4. 1~5.2
1.280	8,843	6.18~11. 6	1 6,4 5 7	14,659	8 9.1	14.424	4. 1~6.1
250	4	8.21~10.10	4.714	4249	9 0.1	4,122	4. 1~4.2
1,190	7 6	7. 6~10.10	2,4 0 3	1,967	8 1.9	1.955	3 20~5.2
1,460	76167	6. 1~11.20	7 6,1 5 7	67,139	8 8.2	6 4 5 5 6	2. 1~6.1

第7表 昭和44年度海区水系別さくらます親魚捕獲採卵成績表

海					所	管	-	捕	獲		数			使	用	筹
X	水	系	採卯	引場	事業	場	9	尾	合	尾	計	尾	우	尾	8	尾
	岩尾	別	岩月	毛 別	岩尾	别		122		5 3	1	75		121		23
才	斜	里	斜	里	斜	里		3,0 3 3	1	,980	5,0	13	2	162	(	93
ホ	渚	滑	渚	滑	渚	滑		683		400	1,0	83		622	1	25
1	與	部	興	部	/			412		154	5	66		253		48
ツク	幌	内	幌	内	幌	内		14		13		27		7		5
海	徳 志	别	徳	志別	徳志	5別		7		1		8		5		1
[X]	北見	晃別	北見	幌別	歌	登		387	,	216	6	03		370		92
	aut EV	1.44	本:	年度				4,658	, 2	817	7,4	75	3	,5 4 0	(	87
	粧 区	. aT	前台	年度				7,454	4	036	I 1,4	90	4	,212	1.3	337
	天	塩	中	J11	中	111		178	* *	65	2	43		172		38
В	石	狩	西	越	Ŧ	才		32		2.1		53		22		13
本海	"		音	江.	音	江		5 0		6 6	1	16		43		13
X	"		小	at				82		87	1	6 9		65		26
	尻	别	名	駶	尻	別		679		151	8	30		616		141
	海区	· =+	本	年度				939		303	1,2	42		853		205
	(#F 12		前	年度	-			638		198	8	36		621		163
	標	津	標	津	根	室		412		133	5	45		372		122
	"	,	3	1 練	中核	原津		632		299	9	31		604		209
根	"		小	計				1044		432	1,4	76		976		3 3 1
홡	当	幌	当	幌	計林	長別		115		110	2	25		104		73
海	春	别	春	別	,	"		70		32	1	02		5 1		20
X	床	丹	床	丹		"		79		3 8	1	17	*	77		3 6
Line	剪	別	西	別	虹	别		982		512	1.4	94	*	965		502
	矢 E	別	矢	臼 別	浜	中		128		188	3	16		9 7		5 4
	風	連	風	連		"		68		47	1	15		63		2 4
	게 볼	当別	別	当 賀	厚	床		271		144	4	15		270	1	143

	魚数	採卵数	增減卵数	仮収容卵数	早親魚	平均採卵数	実 施 期 間
	計尾	干粒	干粒	干粒	使用率%	粒	
	144	177		177	9 9.2	1,460	6. 1~9. 30
	2,8 5 5	4,279		4.279	7 1.3	1,980	5.23~9. 24
	747	956		956	9 1.1	1,5 4 0	5.2 2~1 0.1 3
	301	428		428	6 1.4	1,690	5.2 2~1 0.1 4
	12	7		7	5 0.0	1,000	8.2.1~9. 21
	6	8		8	7 1.4	1,680	6.18~9. 17
	462	514		514	9 5.6	1,3 9 0	5.26~10. 4
	4,5 2 7	6,369		6,369	7 6.0	1,8 0 0	5.2 2~1 0.3 0
	5,5 4 9	7,115	and the second second second second second	7,1 1 5	5 6.5	1,6 9 0	5.11~10.16
	210	353		353	9 6.6	2,0 5 0	7.20~9. 30
	3 5	62	△供試 8	5 4	6 8.8	2,800	9. 6~1 0.1 4
	56	91		91	8 6.0	2,1 2 0	8.21~10.20
	91	153	△供試 8	1 4 5	7 9.3	2350	8.21~10.20
	757	1.497		1,497	90.7	2430	7.17~10. 5
	1,058	2,003	△供試 8	1,995	9 0.8	2,3 5 0	7.17~10.20
	784	1,509	△供試 10	1,499	9 7.3	2430	7. 1~10.20
	494	702		702	90.2	1,890	6.21~10.31
	813	1.253		1,253	9 5.5	2,070	6.21~10.31
1	1.3 0 7	1,955		1,955	9 3.5	2,000	6.21~10.31
	177	232		232	9 0.4	2,230	6. 1~10.10
	71	90		90	7 2.8	1,760	6. 1~10.10.
	113	208		208	97.4	2,700	6 1~1 0.20
	1,467	3,355		3,3 5 5	98.2	3,480	6.21~10.20
	151	207		207	7 5.7	2,130	6.11~10. 8
	87	132	desir	132	9 2.6	2,100	6.1 5~9. 30
	413	320	The sec	320	9 9.6	1,180	6. 1~10.20
_			<b></b>				

-65

海	水系	採卵場	所 管	捕	獲	数	使	用親
区	小 示	TA: 913 - 372	事業場	♀ 尾	∂ 尾	計	♀ 尾	8 尾
根京	根室海区計	本年度		2,7 5 7	1,503	4,260	2,603	1,1 8 3
一海	100 IC BI	前年度		2,204	1,056	3,260	1,7 1 9	773
	仁雁別	仁雁別	静内	3	2	5	2	1
100	汐 泊	汐 泊	八雲	139	19	158	134	49
以西海	海区計	本年度		142	21	163	136	5 0
海区	四年 区 司	前年度		8	2	10	6	
-	合 計 :	平 年 度		8,4 9 6	4,6 4 4	1 3,1 4 0	7,1 3 2	2,4 2 5
		前年度		1 0,3 0 4	5,2 9 2	15,596	6,5 5 8	2,273

魚数計尾	採卵数干粒	増 减 卵 数 干粒	仮収容卵数 千粒	早親魚使用 率 %	平均採卵数粒	実施期間
3,7 8 6	6,4 9 9		6,499	94.4	2,500	6. 1~1 0.3 1
2,492	2,9 5 6		2,9 5 6	7 8.0	1,7 2 0	5.1 5~1 0.1 0
3	4		4	6 6.7	1,950	7. 1~1 0.1 0
183	327		3 2 3	9 6.4	2,410	9.20~11. 2
186	3	,	3 27	9 5.8	2,400	7. 1~11. 2
6	12		12	7 5.0	2,0 0 0	7. 1~9 30
9.5 5 7	15,198	△供試 8	15,190	8 3.9	2,130	5.22~11. 2
8,8 3 1	11,592	△供試 10	11,582	6 3.6	1,770	5.1 1~1 0.2 0

第8表 支場・事業場別さくらます親魚捕獲採卵成績表

	a.	業	+13		捕		獲	数		使	用	휭	魚	数	
乙場	23.3	米	-100	우	尾	8	尾	計	尾	오	尾	8	尾	計	尾
北	岩	尾	別	1	22		53	1	75		121		23	1	44
兒	斜		里	3,0	33	1	,980	5,0	13	2	,162		693	2,8	5 5
支	渚		滑	1,0	95		554	1,6	49		875		173	1,0	48
場	幌		内		14		13		27		7		5		12
計	本	年	度	4,2	64	2	2,600	6,8	6 4	3	,165		894	4,0	59
61	前	年	度	6,5	70	:	3,4 9 7	1 0,0	67	3	,4 4 3	1	,111	4,5	5 4
	根		室	4	12		133	5	45		372		122	4	94
根	中	標	津	6	32		297	9	31		604		209	8	313
室支	計	根	別	2	6 4		180	, 4	44		232		129	3	61
場	虹		别	9	82		512	1,4	94		965		502	1,4	67
	浜		中	1	96		235	4	31		160		78	2	238
	厚		床	2	71		144	4	15		270		143	4	13
計	本	年	度	2,7	57		1,503	4,2	60	2	2,603	1	.183	3,7	86
	前	年	度	2,2	04		1,056	3,2	60	1	,7 1 9		773	2,4	192
天	徳	志	別		7		1		8		5		1		6
天塩支場	歌		登	3	87		216	- 6	03		370		92	4	162
場	中		][]	1	78		6 5	2	43		172		38		210
	本	年	度	5	72		282	8	56		547		131	(	578
計	前	年	废	1,0	20		576	1,5	96		895		252	1,	142
7	千		才		3 2		21		5 3		22		13		3 5
才支場	音		江		50		6 6	. 1	16		43		13		56
場	静		内		3		2		5		2		1		3
計	本	年	度		8 5		8 9	1	7 4		67		27		9 4
n!	前	年	度	1	8 0	-	7 2	1	52		76	1	46		122
渡支	八		雲	1	39		19	1	5 8	7	134		49		183
島場	尻		别		7 9		151	8	330		616		141		757
	本	年	度	1	318		170	9	88		750		190		940
計	前	年	度	+	130		91		21		425		9 1		516
	本	年	度	-	196		4,6 4 4	1 3,1	40	,	7,1 3 2	2	2,4 2 5	9,	5 5 7
合計	前	年	度	-	304		5,292	15,5		<b></b>	6,5 5 8	-	2,273	<del> </del>	831

400 00 4V/t	横 址 阳 粉	ATT BY 25 SIN 1867	♀ 親魚使	平均採卵数	実施期間
採 卵 数 干粒	增减卵数千粒	仮収容卵数 千粒	用率 %	粒	关 //世 州 [刊]
177		177	99.2	1,460	6. 1 <b>~</b> 9. 30
4,279		4,279	7 1.3	1,980	5.23~9. 24
1,3 8 4		1.384	7 9.9	1,580	5.2 2~1 0.1 4
7		7	5 0.0	1,000	8.21~9. 21
5,8 4 7		5,847	7 4.2	1,850	5.2 2~1 0.1 4
6,078		6,0 7 8	5 2.4	1,770	5.1 1~1 0.1 6
702		702	90.2	1,890	6.21~10.31
1,253		1,253	9 5.5	2,070	6.21~10.31
5 3 0		530	8 7.9	2,280	6. 1~1 0.20
3,3 5 5		3,3 5 5	98.2	3,480	6.21~10.20
3 3 9		339	81.6	2120	6.11~10. 8
320		320	9 9.6	1,180	6. 1~10.20
6,499		6,499	9 4.4	2,500	6. 1~10.31
,2,9 5 6		2,9 5 6	7 8.0	1,7 2 0	5.15~10.10
8		8	7 1.4	1,6 8 0	6.18~9 17
514		514	9 5.6	1,390	5.26~10.4
353		353	9 6.6	2,0 5 0	7.20~9 30
875		875	9 5.6	1,600	5.26~10. 4
1,247		1,247	8 7.7	1,3 9 0	5.25~9 30
6 2	△供試 8	5 4	6 8.8	2,800	9. 6~10.14
91		91	8 6.0	2,1 20	8.21~10.20
4		4	6 6.7	1,950	7. 1~10.10
157	△供試 8	149	7 8.8	2,340	7. 1~10.20
182	△供試 10	172	9 5.0	2,3 9 0	7. 1~10.10
323		323	96.4	2,410	9.20~11. 2
1,497		1,497	90.7	2,430	7.17~10. 5
1,8 2 0		1,820	9 1.7	2,430	7.17~11. 2
1,1 29		1,1 2 9	9 8.8	2,6 6 0	8.21~10.20
15,198	△供試 8	15,190	83.9	2,1 3 0	5.22~11. 2
11,592	△供試 10	11,582	6 3.6	1,770	5.11~10.20

第9表 昭和44年度海区水系別からふとます親魚捕獲採卵成績表

海	水系	採卵場	所管	捕	獲	数	使 月	親 親
×	W 7K	17. 91 -202	事業場	9 尾	☆ 尾	計尾	9 尾	な 尾
	岩尾別	岩尾別	岩尾別	1 3,4 6 6	8,112	21,578	13,208	1881
オ	オアシベ	オアシベ	斜 里	396	166	562	319	51
ホ	斜 里	斜 里	"	8,8 2 2	5,437	1 4,2 5 9	8,280	1,933
1	藻 琴	藻  琴	藻 零	1,195	777	1,97 2	965	317
ッ	網走	網走	網走	815	419	1,234	778	243
2	常呂	常呂	北 見	5,837	4,5 3 5	1 0,3 7 2	5,558	1,153
海	湧 別	湧 別	源 別	4,6 1 4	5,164	9,778	4,3 5 4	779
×	渚 滑	渚 滑	渚 滑	3,7 4 4	*3,4 8 5	7,229	3,7 0 3	609
	興 部	興 部	"	6 47	436	1,083	628	122
	雄武	雄武	幌 内	439	377	816	381	121
	幌 内	幌 内	"	1,555	1,294	2,8 4 9	1,310	485
	徳志別	徳志別	徳志別	3,6 6 6	3,5 3 7	7,203	3,3 6 7	908
	北見幌別	北見幌別	歌登	1,438	2,0 9 5	3,5 3 3	1,366	3 2 6
	屯 別	屯 別	屯 別	2,4 2 2	1,962	4,384	1,605	581
	な 払	猿 払	"	897	479	1,376	5 2 7	186
	₩ EV 출동	本年度		4 9,9 5 3	3 8,2 7 5	8 8,2 2 8	4 6,3 4 9	9,6 9 5
	海区計	前年度		15,450	23,379	3 8,8 2 9	1 3,4 7 1	2,876
日	天 塩	中川	中川	7 0	45	115	42	17
本	小平藥	小平蘂	天塩	3	5	8	1	
海区	海区計	本年度		73	50	1 23	42	17
E.	(神区日)	前年度		180	131	311	117	36
根	サシルイ	サシルイ	羅 臼	115	84	199	80	43
室	春刈古丹	春刈古丹	"	189	133	3 2 2	146	91
海区	忠 類	忠 類	伊茶仁	552	1,288	1,840	466	149
	伊茶仁	伊茶仁	"	83	43	126	7 9	27
	標準	標準	"	2,199	2,3 7 3	4,5 7 2	2,1 3 1	672

魚数計尾	採 卵 数 干粒	増 滅 卵 数千粒	仮収容卵数 千粒	A 親魚使用率 %	平均採卵数 干粒	実施期間
1 5,0 8 9	20,558		20,558	98.1	1,560	8. 1~1 0.3 1
370	540		540	80.6	1,690	9. 5~10.25
10,213	1 3,6 5 7		1 3,6 5 7	93.9	1,650	7.11~11.11
1,282	1,588		1,588	8 0.8	1,6 5 0	9.15~10.30
1,0 2 1	954		954	9 5.5	1230	8.1 5~1 1. 5
6,7 1 1	7,476		7,476	9 5.2	1,350	8. 1~11.20
5,1 3 3	6,306		6,306	94.4	1,450	8. 1~11.20
4,31 2	5,485		5,485	98.9	1,480	8. 5~11. 6
750	895		895	9 7.1	1,430	8. 5~1 0.3 0
502	496		496	8 6.8	1,300	7.29~10.13
1,795	1,891		1,891	8 4.2	1,440	8. 1~11. 1
4,275	4,264		4,264	91.8	1,270	6.18~11. 6
				9 5.0	1,480	7.11~1 0.21
1,692	2,014		2,014	6 6.3	1,200	7.28~1 0.28
2,186	1,928		1,928			7.21~9.27
713	555		555	5.8.8	1,050	6.18~11.20
5 6,0 4 4	6 8,6 0 7		68,607	92.8	1.480	6.11~10.20
1 6,3 47	19,888		19,888		1,480	
5 9	8 2		8 2	6 0.0	1,950	7.20~9.30
		-		F 7 5	1050	9. 8~1 0.10
5 9	82		82	5 7.5	1,950	7.20~1 0.1 0
153	133	*	133	6 5.0	1,140	7. 1~9. 25
1 2 3	97		97	6 9.5	1,200	7.21~10.16
237	176		176	77.2	1,210	7.21~10.16
615			651	84.4	1,400	7. 1~10.20
106	111	0.	111	9 5.1	1,410	9.1 1~1 0.2 0
2,803	3,102		3,102	9 6.9	1.460	6.21~10.31

海	水	系	採身	P場	所	管		捕	獲		数	使	用	親
X					事	業場	우	尾	8	毛	計尾	♀尾	8	尾
根	当	幌	当	幌	計 7	長別		81	10	8	189	81		92
室	春	別	春	別		"		44	1	9	6 3	44		19
海	床	丹	床	丹		"	1	18	5	4	172	118		5 4
X	西	别	西	别	虹	別	1.4	7 4	3,19	5	4,6 6 9	1,461		883
	矢 臼	别	矢 E	3 別	浜	中		28	2	7	5 5	28		27
	風	連	風	連		"		37	5	8	9 5	30		11
	別当	賀	別当	首 賀	厚	床	3	02	43	7	739	298	:	316
	海区	計	本与	F 度			5,2	22	7,8 1	9	13,041	4,962	2,1	84
	144 123		前与	F 度			6,0	12	2 0,4 5	4	2 6,4 6 6	4,837	2,1	86
襟	釧	路	釧	路	釧	路	1	54	, 7	2	226	107		57
襟裳以東海区	+	勝	幕	别	幕	別	5	6 4	' 38	3	947	5 6 4	1	84
海区	海区	計	本句	臣废			7	18	4 5	5	1,173	671	2	241
	114 2	H.I	前句	医度				19	1	1	3 0	9		4
裢	仁 雁	别	仁 州	色 別	静	内		25	1	6	41	16		6
裳以	貫 気	別	質気	初	Л	雲	A	14		1	15			
襟裳以西海	遊楽	部	遊身	(部	,	,	1	26	14	2	268	6 4		29
K	海区	計	本句	度			1	6 5	15	9	324	80		3 5
	(MF 157)	ы.	前句	医腹			1	15	12	3	238	48		22
合			本年	度		ia.	5 6.1	31	4 6,7 5	8	102,889	52,104	1 2,1	72
D	p!		前年	∈ 废			21.7	76	44,09	8	6 5,8 7 4	1 8,4 8 2	5,1	24

	4	数				2 親魚使		
1	<u>魚</u> 言		採 卵 数	増 減 卵 数 干粒	仮収容卵数 千粒	用率 %	平均採卵数 干粒	実施期間
-		76				70		
1		173	100		100	100	1,240	6. 1~1 0.1 0
		63	60		60	100	1,360	6. 1~1 0.1 0
-		172	161		161	100	1,360	6. 1~1 0.1 0
		2,1 4 4	1.7 2 0		1.7 20	9 9.1	1,180	6.21~10.20
		5 5	47		47	100	1,680	6.1 1~1 0. 8
		41	3 7		37	81.0	1,230	6.1 5~9. 30
		614	386		3 8 6	9 8.6	1,300	6. 1~1 0.20
	. (	7,146	6,6 4 8		6,6 4 8	9 5.0	1,3 4 0	6. 1~1 0.3 1
		7,023	5,503		5,5 0 3	8 0.5	1,140	5.15~10.20
		164	9 2		92	6 9.5	860	8. 1~1 0.1 1
	L.	748	658		6 5 8	100	1,170	9.16~10.15
		912	750		750	9 3.5	1,120	8. 1~1 0.1 5
		13	13		13	4 7.4	1.440	7.21~9.28
		22	4		4	6 4.0	250	8.21~1 0.1 0.
								9.11~9. 30
		93	7 6		7 6	5 0.8	1,190	7. 6~1010
		115	80		80	4 8.5	1,000	7. 6~10.10
		7 0	40		40	41.7	830	7. 1~10. 9
	6	4,276	7 6,1 6 7		7 6,1 6 7	9 2.8	1,460	6. 1~11.20
	1	23,6 0 6	25,577		25,577	8 4.9	1,380	5.1 5~1 0.21
				1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L		L

表10表 支場・事業場別からふとます親魚捕獲採卵成績表

乙場	事業場		捕	蕧	数	使	用 親 魚	数
24/11	\$1 7c 7%		2 尾	1 0 尾	計 尾	早 尾	♂尾	計尾
	岩尾》	别	13,466	8,112	21,578	1 3,2 0 8	1,8 81	15,089
مالہ	斜!	里	9,218	5,6 0 3	1 4,8 21	8,5 9 9	1,984	1 0,5 8 3
北	藥	零	1,195	777	1,972	965	317	1,282
見	網方	走	815	419	1,234	778	243	1,0 21
ester.	北	兒	5,837	4,5 3 5	10,372	5,558	1,153	6,7 11
支	湧 )	别	4,6 1 4	5,164	9,778	4,3 5 4	779	5,1 3 3
块	渚	滑	4,3 9 1	3,921	8,312	4,3 3 1	7 3:1	5,0 6 2
	幌	内	1,9 9 4	1,671	3,6 6 5	1,6 91	606	2,2 9 7
	本年	度	41,530	30,202	,71,732	3 9,4 8 4	7,6 9 4	4 7,1 7 8
計	前年	度	11.112	17,823	28,935	1 0,27 5	2,133	1 2,4 0 8
	羅	E	304	217	521	2 2 6	134	360
根	伊茶		2,8 3 4	3,7 0 4	6,5 3 8	2,6 7 6	848	3,5 2 4
室	計根	别	2 4 3	181	424	243	165	408
支	虹	別	1.474	3,1 9 5	4,6 6 9	1,461	683	2,1 4 4
堤	浜	中	6 5	85	150	58	3 8	9 6
200	厚	床	302	437	739	298	316	614
1	本年	度	5,2 2 2	7,819	1 3,0 41	4,962	2,184	7,146
<b>新·</b>	前年	废	6,012	2 0,4 5 4	26,466	4,837	2,186	7,0 23
+	釧	路	154	7 2	426	107	57	16
勝	幕	别	564	383	9 4 7	564	184	7 4 8
	本年	废	718	455	1,173	671	241	91
計	前年	度	19	11	3 0	9	4	1
Program Statement (St. 1977)	徳志	別	3,666	3,5 3 7	7,203	3,367	908	4,27
天	歌	登	1,438	2,095	3,5 3 3	1,366	3 2 6	1,6 9
塩支		別	3,319		5,760	2,1 3 2		2,89
場場	1	Ш	7 0		115	42		5

-				2 親魚使	Tiu les on W.	
採	卵 数	增减卵数 干粒	仮収容卵数 千粒	用率 %	平均採卵数粒	実施 期間
	千粒 —————	1 414				0.7.7007
	25,558		2 0,5 5 8	98.1	1,560	8. 1~1 0.3 1
	1 4,1 9 7		14,177	9 3.3	1,6 5 0	7.11~11.11
	1,588		1,588	8.0.8	1,650	9.1 5~1 0.3 0
	954		954	9 5.5	1,230	8.15~11. 5
	7,476		7,476	9 5.2	1.3 5 0	8. 1~11.20
	6,306		6,3 0 6	9 4.4	1,4 5 0	8. 1~11.20
	6,380		6,3 8 0	9 8.6	1,470	8. 5~11. 6
	2,3 8 7		2,3 8 7	8 4.8	1,410	7.29~11. 1
	5 9,8 4 6		5 9,8 4 6	9 5.1	1,5 2 0	7.11~11.20
	1 5,3 5 4		1 5,3 5 4	9 2.5	1,490	6.1 1~1 0.2 0
	273		273	7 4.3	1,210	7.21~1 0.1 6
	3,864		3,864	9 4.4	1,440	6.21~1 0.31
	321		321	100	1,3 2 0	6. 1~1 0.1 0
	1,7 20		1,7 2 0	9 9.1	1,180	6.21~10.20
	84	1	84	8 9.2	1,450	6.1 1~1 0. 8
	386		386	9 8.6	1,300	6. 1~10.20
	6,6 4 8		6,6 48	9 5.0	1,3 40	6. 1~10.31
	5,5 0 3		5,503	8 0.5	1,140	5.15~10.20
	9 2		92	6 9.5	860	8. 1~1 0.1 1
	658		658	100	1,170	9.16~10.15
	750		750	9 3.5	1,1 20	8. 1~10.15
	13		13	47.4	1,440	7.21~9. 28
	4,264		4,264	91.8	1,27 0	6.18~11. 6
	2,014		2,014	9 5.0	1,480	7.11~1 0.21
1	2,483		2,483	6 4.2	1,160	7.21~10.28
	8 2		82	6 0.0	1,9 5 0	7.20~9. 30

		捕	獲	数	使	用親魚	数
支 場	事業 場	2 尾	3 尾	計尾	9 尾	↑ 尾	計尾
天塩支場	天 塩	3	5	8			
	本年度	8,4 9 6	8,1 23	1 6,6 1 9	6,907	2,0 18	8,9 2 5
āt	前年度	4,518	5,6 8 7	1 0,2 0 5	3,3 1 3	779	4,092
千才支場	静内	2 5	16	41	16	6	22
	本年度	25	16	41	16	6	2 2
計	前年度					1	given granten i restaure transport (* 14
液晶支場	八雲	140	143	283	6 4	29	93
	本年度	140	143	283	6 4	29	9 3
計	前年度	115	123	238	48	2.2	7 0
Α Δ1	本 年 度	5 6,1 3 1	4 6,7 5 8	10,2,889	52,104	1 2,1 7 2	6 4,27 6
合 計	前年度	21,776	44,098	6 5,87 4	18,482	5,1 2 9	23,606

採卵数干粒	増減卵数千粒	仮収容卵数 千粒	P 親魚使用率 %	平均採卵数	実施期間
					9. 8~10.10.
8,8 4 3		8,8 4 3	81.3	1,280	6.18~11. 6
4,667	The second secon	4,6 6 7	7 3.3	1,410	7. 1~10.10
4		4	6 4.0	250	8.21~10.10
4	Committee of the control of the control of	4	6 4.0	250	8.21~10.10
P. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.		- Victorial activity approximation of		,	
7.6		76	4 5.7	1,190	7. 6~10.10
7 6		76	45.7	1,190	7. 6~10.10
40		40	41.7	830	7. 1~10. 9
7 6,1 6 7		7 6,1 6 7	9 2.8	1,460	6. 1~11.20
25,577		25,577	8 4.9	1,380	5.1 5~1 0.2 0

## 2 ます卵の移殖

本年度のます卵移殖については、計画に基づき、さくらますについては資源不振地域への 部地域ならびに襟裳以西海区のからふとます資源の育成と増大、さらにオホーック、根室内 種卵移殖は発眼卵で行なうことを原則としているが、一部受精直後卵でも行なつた。発眼 これら種卵の移殖の状況については第11表~第15表に示したとおりである。

第11表 ます種卵の移殖

			15 5- Wi	增减	卵 数	仮収容卵数	受精直後
支	場	魚 種	採卵数	海産卵	供試卵	汉权谷列级	供給卵数
		さくらます	5,8 47			5,8 4 7	,
北	見	からふとます	59,846			5 9,8 4 6	2,407
		計	6 5,6 9 3			6 5,6 9 3	2,407
		さくらます	6,499	,		6,499	
根	室	からふとます	6.6 48			6,6 4 8	
		計	13,147			1 3,1 4 7	
		さくちます					-
+	朥	からふとます	750			750	
		計	750			7 5 0	
	.,	さくらます	875			875	
天	塩	からふとます	8,8 4 3			8,843	2
		計	9,7 1 8			9,7 1 8	
		さくらます	157	,		157	
干	莀	からふとます	4			4	
		青十	161			161	

移殖, 特に日本海のさくらます資源増大を目的とし、からふとますについてはオホーツク海区北 海区の交換移殖による豊凶是正を目的として行つた。

卵で移殖する場合, その卵子の履歴上の死卵(移殖前の死卵)を含めて移籍卵数として処理した。

単位:千粒

卵の移殖		発	眼卵の種	多 殖	最終
	発服卵の	道	内		収容卵数
受給卵数	供試卵数	供試卵数	受給卵数	本 州	
		518			5,3 2 9
		1 4,6 6 1			42,778
		15,179	*		48,107
		1,7 23			4,776
2,407		6 6 6 7 8			9,055
2,407		1,7 23			1 3,8 3 1
					750
					750
			7,6 1 4		875
			23,249		1 8,1 3 3
	•				1 9,0 0 8
			518		667
	10	,	4,7 2 0		4,7 1 4
	10				5,3 81

支場	魚 種	採卵数	増 减	卵 数	/E :hz #2 6n244	受精直後
2 4	X11. 1391	14. 90 %	海 産 卵	供試卵	仮収容卵数	供給卵数
	さくちます	1.8 2 0			1,820	
渡 岛	からふとます	76		-	76	
	音片	1,896			1896	
	さくらます	15,198			15,198	
計	からふとます	7 6,1 6 7			7 6,1 6 7	2,407
	計	91,365			91,365	2,407

卵の移殖		発	発眼卵の移殖		
	発眼卵の	道	內		最終収容卵数
受給卵数	供試卵数	供給卵数	受給卵数	本 州	W 47 71 8X
1 6			1,723	200	3,3 4 3
			2,327		2,403
				200	5,7 4 6
		2,2 4 1	2,241	200	1 4,9 9 0
2,407	10	14,661	14,661		7 6,1 5 7
2,4 0 7	10	16,902	16,902	200	91,147

第12表 さくらます 道内移殖

供;	給地	start to Do	i	受給地	移	殖卵の	内 訳	摘 要
支場名	事業場名	移殖年月日	支場名 事業場名		移籍卵数	移殖前死卵数	移植実卵数	11a) X
					干粒	千粒	千粒	
北 見	斜 里	441027	千歳	千 歳	518	16	502	斜里川道
根室	虹 別	11. 5	渡 島	尻 別	1,723	6 6	1,657	西别川産
計				,	2,241	82	2,1 5 9	-

第13表 さくちます 道外移殖

		事業場名	移殖年月日	受 紿 地	移籍卵数	殖 卵 の 移殖前死卵数	为 訳 移殖実卵数	摘 耍
					干粒	干粒	千粒	
A CHARLEST TO SEC.	震 島	尻 別	44.11.10	富山県庄川 ふ化場	200		200	尻別川産

第 1 4 表 か ら ふ と ま す 道 内 移 殖 ( 供 給 状 況 )

-								-												V. 00 /	
供				移列	由	三月	E	受	給	共	b	7	移	殖卵	0	)	内	訳			
支場	名事	業場	易名					支	場名事	樂	易名	移籍	卵数	移殖前	死卵	数	移殖	実	<b> </b>	備	考
												=	千粒		Ŧ	粒		=	F粒		
北	見岩	尾	別	44	.1	2.	. 9	天	塩中	1	111	4.1	06	į	22	4		3.8	82	岩尾別川産	
											,										
									1							.					
	斜		里		1	0.	3	根	室根	1	室	77	3 2					17	20		AND III.As
	:0.1		2372								35			1					3 2		斜里川產
	-	"			1	0.	୍ଷ		"	"		(7	8 2					7	8 2)	( 受精直後	卵) "
	İ	11			1	0.1	1		//	"		(8	93)					(8	93	ý	. "
	1	"			1	2.	5	F	歲干		歳	3.1	60		26	8		2.8	92		//
			4									(2.4	07)					2.4	0 7		
	小		計									3.1	6 0	1	26	8	1	2.8			
	北		兒		1	1.2	0	F	歲艄	ŀ	内	1.5	60			3				常呂川産	
		//			1	1.2	5	渡	島八		雲	2.3	27		3 1			2.0		"	
	小		計									3.8	87		39	3		3.4	94		
	網		走		1	2.	9	天	塩(:	增中	晃)	1.6	76		15		1			岩尾別川産	
	渚		滑		1	2.	9		// 中		][]	1.8	32		23		ŀ			興部川産	
4	<b>i</b>	H				THE REAL PROPERTY.		-		- Marcon		(2.4	07)	1						受精直後卵	
	-	H 1										14,6	61	1	L,2·6	0	į.			発 眼 卵	

第 15 表 か ら ふ と ま す 道 内 移 殖 ( 受 給 状 況 )

		受	給	-		移殖	年月	1 1	1	供	給	地	移	殖	卵	0	内	訳	1	繭	考
-	支持	易名	事	業均	易名				支	場名	事	<b></b> 模場名	移籍卵	效移列	直前列	E卵数	移列	直実卵炎	纹	/115	4
1													一 千米	立		千粒		干粒	Z		
	根	室	根		室	44.	1 0.	3	北	Ē	副斜	且	732	2)				(732			
							1 0.	8		<i>II.</i>		/	(782	2)				(782			
							1 0.	11		<b>"</b>		//	893	0				(893			
				計	-								(2.4 0 7	7)				(2.4 0 7	)		
	天	塩	中		Ш		1 2.	9	北	見	岩屑	<b> B B B B B B B B B </b>	4.106	5		224		3.882			
										*	1		-								
				#			/	,	ì	#	渚	滑	1.832	2		230		1.602			
			小		計				٠.,				5.938	3		454		5.484			
			( :	增够	晃)	* 1	1 2.	20		//	網	走	1.676	5		151		1,5 2 5			
		nor dentina		計									7,614			605		7,009			
1	Ŧ	蕨	干		歳	1	1 2.	5	北	見	斜	里	3.160			268		2.892			
			静		内	]	1.	20		*	北	見	1.560			83		1.477			
				計							1	*.	4.720	)		3 5 1		4.369			
	渡	島			雲	1	1.:	2 5	北	見	北	見	2.3 2 7	'		310		2.017	1		
				計								(2)	2.3 2 7			310		2.017			
	-	合		計						,			2.407				1	(2.407	)		
	1	ш		п									14.661	1	1.	266	1	3.395			
-		-	-					-	-	-	-		_ 0 '	2			-				

-83

# 3 ますふ化放流成績概要

#### 。さくらます

本年度は採卵数15,198千粒から供試卵8千粒、本州移殖200千粒を差引いた 14,990千粒について、これを18事業場(このうち民間ふ化施設4カ所)に収容して管 理を行ない、12,503千尾の稚魚を生産し放流した。この歩留りは83.4 %で、このう ち2,520千尾(20.2 %)は給餌稚魚である。

第16表 昭和44年度海区水系別さくらますふ化放流成績表

海	水	系	#	業	場	収容卵数	死卵数	ふ出尾紋	ふ化率		尾
区						(千粒)	仟粒)	千尾	1961	無給餌千尾	無餌仟尾
7	岩尾	别	岩	尾	別	177	5	172	9 7.2	170	
ホ	斜旦	里	斜		里	3.761	269	3.492	9 2.8	3.4 5 8	
1	渚	骨	渚		滑	1.384	248	1.1 3 6	8 2.1	1.085	
ツ	·NR P	内	妃		内	7	2	5	7 1.4	5	
2	北見附	引	歌		瓷	477	36	441	9 2.5	440	
海区	1		本	年	废	5.80 6	560	5.246	90.4	5.1 5 8	
12	海区	H	前	年	度	7.115	619	6.496	91.3	6.4 0 2	
	大	尺	大	沢	лi)	45	12	33	7 3.3	30	
B	天	瘟	中		Ш	353	22	331	9 3.8	328	
本	石	守	干		才	572	40	532	9 3.0		
海	"		音		江	91	8	83	91.2	83	
区	"		小		計	663	48	615	92.8	83	
	古	宇									200
	尻	91]	尻		别	3.020	213	2.807	92.9		2.3 2 0
			本	年	度	4.081	295	3.7 8 6.	9 2.8	441	2.5 2 0.
	海区	1	前	年	度	1.497	1,76	1.321	8 8.2	198	921
			A					\$	A		

#### 。 からふとます

本年度は採卵数76,167千粒から供試卵10千粒を差引いた76,157千粒について、 とれを26事業場(とのうち民間ふ化施設8カ所)に収容して管理を行ない、65,556 千尾の稚魚を生産し放流した。との歩留りは86.1%で、とのうち27,314千尾 (42.3%)は給餌稚魚である。

放流期間	備考 仮収容までの卵の動き・・・・・事業場単位 稚魚移殖放流・・・・・活動書き
4.1 ~4.1 0	作思小沙但双流。。。1古史福言
1.1 ~2.28	千才へ518千粒
2.8 ~2.1 3	興部分 428 千粒
2.1 ~2.28	
2.1 ~2.28	徳志別から8千粒、大沢川へ45千粒
1.1 ~4.1 0	
1.1 0~4.3 D	
4.1 ~5.1 0	歌登から45千粒
5.1 ~6.1 3	
	斜里から518千粒
3.28	
3.28	
5.1	(千才から200千尾移殖放流)
5.1 ~5.28	虹別から1.723千粒、富山県へ200千粒
3 28 ~6.1 3	
11 ~5.16	,
	4.1 ~4.1 0 1.1 ~2.28 2.8 ~2.1 3 2.1 ~2.2 8 2.1 ~2.2 8 1.1 ~4.1 0 1.1 0~4.3 0 1.1 0~4.3 0 1.1 ~5.1 0 5.1 ~6.1 3 3.2 8 5.1 5.1 ~5.2 8 8 28~6.1 3

海					- 2116	Lea	the object of the	死 卵 数	ふ出尾数	ふ化率	放	流 尾						
区	水		系	争	業	場	収容卵数 (千粒)	(千粒)	(千尾)	(%)	無給餌千月	無餌(千尾						
	伊	茶	仁	伊	茶	仁	1.955	129	1.826	9 3.4	1.666							
7tt	標		津	根		室	772	96	676	8 7.6								
根室	床		丹	床		丹)	5 3 0	6 2	4.68	8 8.3	464							
至海	西		别	虹		別	1.180	80	1,1 0 0	9 3.2	1.064							
区	矢	E	別	失	臼	別)	339	17	322	9 5.0	304							
	别	当	賀	厚		床					645							
	V	区		本	年	度	4.776	3 84	4.392	9 2.0	4.1 4 3							
	体		āT	前	年	度	2.9 5 6	327	2.6 2 9	8.8.9	2.4 0 6							
-intok	仁	雁	別	仁	雁	別)	4	1	3	7 5.0	3							
祭裳	遊	楽	部	八		雲	323	3 3	290	8.9.8	38							
襟裳以西海区	汐		泊					9			200							
海区	術	IX.	区計			本	本	本	本	本:	年	度	3 2 7	3 4'	293	8.9,6	241	
	(FGF		n1	前	年	度	12	1	11	9 1.7	9.983							
	^	**********	=1	本	年	度	1 4.9 9 0	1.273	13.717	9 1.5	9.006	2,5 2 0						
	合		計	前	年	度	11.580	1.1 2 3	1 0.4 5 7	9 0.3		921						

## さくらます卵子の採卵から収容までの動き

 採 卵 数
 15.198 千粒

 仮 収 容 卵 数
 15.198 千粒

 供 試 卵 数
 △ 8 ″

 本州移殖卵数
 △200 ″

 収 容 卵 数
 14.990 ″

		<u> </u>
数	放流期間	仮収容から収容までの卵の動き・・・・・・ 事業場単位
計(程)	双加 粉 [8]	備 考 稚魚移殖放流・・・・・・・・・・・・・・・・・括弧書き
1,666	3. 1~3.31	根室(標準, 31線分)から1,955千粒
	_	厚床から320千粒,虹別から452千粒
464	2.20~3.10	計根別(当帳,春別,床丹分)から530千粒
1,064	2. 1~2.25	尻別へ 1,7 2 3 千粒
304	3.15~3.25	浜中(矢臼別, 風連分)から339千粒
645	3.1 6~3.1 8	(根室から645千尾移殖放流)
4,143	2. 1~3.31	
2,406	2. 1~4.30	
3		
38	5.22	汐泊分323千粒
200	6. 3	(八雲から200千尾移殖放流)
241	522~6. 3	
0		
1 2,5 0 3	1. 1~6.13	
9,927	1. 9~5.16	

第17表 昭和44年度支。事業場別さくらますふ化放流成績表

	242.7	7表		1 H -I		場別さくらます					T.,	.,,
					収容 卵数	死 卵 数	出る	尾数	\$	化 率	放	流
支	場	事	業	場	(千粒)	千粒		千尾		%	無給	餌
北	見	岩	尾	别	177	5	-	172		97.2	170	
		斜		里	3,761	269		3,492		9 2.8	3,458	3
		潜		滑	1,3 8 4	248		1,1 3 6		8 2.1	1,085	
		咇		内	7	2		5		71.4	5	j
		本	年	废	5,239	5 2 4		4,805		90.2	4,7 1 8	
		前	年	废	6.078	515		5,5 6 3		91.5	5,496	
根	室	伊	楽	仁	1,955	129		1,826		93.4	1,6 6 6	,
		根		室	772	9 6		676		8 7.6	6 4 5	i
		床		刑	530	6 2		468		8 8.3	464	
		虹		别	1,180	8.0		1,1 0 0		9 3.2	1,064	ŀ
		矢	日	别	3 3 9	17	*	322		9 5.0	3 0 4	
		本	年	度	4,776	384		4,392		9 2.0	4,1 4 3	
		前	年	度	2,956	327	,	2,629		8 8.9	2,4 0 6	
天	塩	歌		登	477	3 6		441		9 2.5	440	)
		大	沢	11)	45	12		33		7 3.3	30	)
		中		Щ	353	22		331		9 3.8	3 28	
		本	年	废	875	70		805		9 2.0	798	
		前	年	度	1,247	115		1,132		9 0.8	1,1 0 4	
千	才	千		才	572	40		532		9 3.0		
		音		江	91	8		8 3		91.2	8.3	
		作	雁	别	4	1		3		7 5.0	3	}
		本	年	度	667	49		618		9 2.7	86	i
		前	年	度	172	17		155		9 0.1		
嬳	島	尻		别	3,020	213		2,807		9 2.9		
		八		雲	323	33		290		89.8	238	
		本	年	度	3,3 4 3	246		3,097		9 2.6	238	3
		前	年	度	1.1 2 7	149		978		8 6.8		
Δ	計	本	年	度	1 4,9 9 0	1273	1	0,717		9 1.5	9,9 8 3	3
合	計	前	年	度	11,580	1123	1	0,457		9 0.3	9,0 0 6	i
						_88_			1			

尾 数	는 는	放流尾数	+4 14 40 88	f## ==##.
給 餌 (千尾)	計 (千尾)	収容卵数	放 流 期 間	備考
(I PE)	170	9 6,0	4, 1~4.10	
	3,458	91.9	1. 1~2.28	
	1,0 85	7 8.4	2. 8~2.1 3	
	5	7 1.4	2. 1~2.28	
	4,718	8 8.5	1. 1~4.10	
	5,496	90.4	1.1 0 ~4.3 0	,
	1,666	8 5.2	3. 1~3.31	
	645	8 3.5	3. 1 <b>~</b> 3.1 8	
-	464	8 7.5	2.20~3.10	
	1,064	9 0.2	2. 1~2.25	
	304	89.7	3.1 5 <b>~</b> 3.2 5	
	4,1 4 3	86.7	2. 1~3.31	The state of the s
	2,406	81.4	2. 1~4.30	
	440	9 2.2	2. 1~2.28	~
	30	6 6.7	4.1 0~5.1 0	
	328	9 2.9	5. 1~6.13	
1	798	9 1.2	2. 1~6.13	
	1,104	8 8.5	1. 9~4.10	
200	200	3 5.0	5. 1	150千尾は飼育中
	83	9 1.2	3.2 8	
	3	7 5.0		発眼卵で埋没
200	286	4 2.9	3.2 8~5. 1	
141	141	8 2.0	4.3 0	
2,3 2 0	2,3 2 0	7 6.8	5. 1~5.28	
	238	7 3.7	5.2 2~6. 3	
2,3 2 0	2,5 5 8	7 6.5	5. 1~6. 3	
780	780	6 9.2	5.1 5~5.1 6	
2,5 2 0	1 2,5 0 3	8 3.4	1. 1~6.13	
921	9,9 2 7	8 5.7	1. 9~5.16	
		9.0		L

-89

第18表 昭和44年度海区水系別からふとますふ化放流成績表

海	水	系	事 業 場	収容卵数	死卵效	ふ出尾数	ふ化率	放	流尾
Ŋ.				干粒	千粒	干尾	%	無給餌(千月	是)給餌(千尾
	岩尾	別	岩尾別	8,093	529	7,5 6 4	9 3.5	7,4 5 0	
,	斜	里	斜 里	6,130	387	5,743	9 3.7	2,681	2,935
<i>x</i>	藻	零	藻 琴	3,0 6 8	282	2,7 8 6	9 0.8	2,700	
ホ	網	走	網走	4,150	387	3,7 6 3	9 0.7	3,690	
1	常	邑	北見	1,722	171	1,5 5 1	90.1	1,521	
ツ	"		(福山)	1,867	182	1,685	9 0.3	1,600	
2	"		小 計	3,589	353	3,2 3 6	9 0.2	3,1 2 1	
海	湧	別	湧 別	8,802	1,763	7,0 3 9	8 0.0	3,741	3,220
X.	渚	滑	渚 滑	4,5 4 8	620	3,928	86.4	3,180	
	與	部				ķ		720	13
	帨	内	幌 内	1,235	221	1,0 1 4	8 2.1	980	
	焳	武	(雄武)	3,163	949	2,214	7 0.0	1,391	
	徳志	别	徳 志 別	6278	912	5,366	8 5.5		5.300
	屯	別	屯 別	2,483	314	2,169	8 7.4		1,664
	猿	払							460
	海区	# <b>+</b>	本年度	51,539	6,717	4 4,8 2 2	8 7.0	2 9,6 5 4	1 3,5 7 9
	(## 12		前年度	1 6.6 3 0	2,206	1 4,4 2 4	8 6.7	5,785	8,4 0 0
-	増	幌	(增幌)	1,676	193	1,483	8 8.5		1,450
日	大	沢	(大沢川)	150	10	140	9 3.3	100	
本	天	塩	中川	5.870	369	5,501	9 3.7		5,300
海	小平	英							150
X	石	狩	千才	3,150	329	2,821	8 9.6		
	海区	÷+	本年度	10,846	901	9,945	91.7	100	6,900
	海区	. ñ l	前年度	133	10	123	9 2.5	123	
根室	春刈	5丹	(春刈古丹	510	61	449	88.0	5 5	
根室海区	標	津	根 室	6,420	495	5,925	92.3	428	4,990

数	+4 >4 #B BB	仮収容から収容までの卵の動き・・・・・・ - 事業場単位
計(千尾)	放流期間	備 考 稚魚移殖放流・・・・・・・・・・・・・・・・・ 括弧書き
7,4 5 0	420~520	中川~4,106千粒,湧別~2,007千粒,藻琴~1,480千粒 網走~4,872千粒
5,61,6	3. 1~430	千才へ3,160千粒、根室へ2407千粒、湧別へ2,500千粒
2,700	3. 1~4.30	岩尾別から 1.480 千粒
3,690	3.25~3.31	岩尾別から4,872千粒、増拠~1,676 千粒(岩尾別産)
1,521	3. 1 <b>~</b> 3.31	静內へ1,560千粒,八雲へ2,327千粒,福山へ1,867千粒
1,600	4.25 <b>~</b> 5. 7	北見から 1.8 6 7 千粒
3,1 2 1	3. 1 <b>~</b> 5. 7	
6,961	3. 1 <b>~</b> 5.2 0	岩尾別から2,007円粒、斜里から2,500円粒、構成へ2,011円粒(斜里産)
3,180	2.1 5~5.1 5	中川へ 1.832千粒
720	2.1 2~2.1 3	( 洛滑から 720 千尾移殖放流 )
980	3.1 0 <b>~</b> 5.3 0	雄武へ1,152 千粒
1,391	3. 1~4.30	幌内から 1,152 千粒,湧別から 2,011 千粒 ( 斜里産 )
5,300	4. 1~5.11	歌登から 2,014 干粒
1,6 6 4	4. 1~4.30	猿払分555千粒
460	4.28	(屯別から460千尾移殖放流)
. 43,233	2.1 2~5.3 0	
14,185	2. 1~5.20	
1,450	527~6.17	岩尾別から 1.676 千粒
100	4.10~5.31	中川から150千粒
5,3 0 0	5. 1~6.13	岩尾別,網走,渚滑から 5.870 千粒
150	5.1 5	(中川から150千尾移殖放流)
		斜里から 3160 千粒,岡山県へ10千粒
7,0 0 0	4.10~6.17	
123	4. 1~4.10	
5 5	3.20~3.25	羅日(サシルイ,春刈古丹分)から273千粒,伊茶仁(忠類分)から237千粒
5,418	3.20~4.30	斜里から 2,407千粒,伊茶仁(忠類,伊茶仁,標準分)から 3,627 千粒 厚床から 386 千粒

海	水 系	事業場	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ化率	放	流 尾
K	. AT	-51 × 160	千粒	干粒	千尾	%	無給餌(千尾)	)給餌(干尾)
	床 丹	(床丹)	321	38	283	8 8.2	278	
根一	西 別	虹 別	1,720	128	1,592	9 2.6	1497	
苺	矢 臼 別	(矢臼別)	84	.4	80	9 5.2	64	
海	別当賀	厚床					319	
X	V= (5/ ⊕1	本年度	9,0 5 5	726	8,329	9 2.0	2,641	4,9 9 0
	海区計	前年度	6,613	990	5,623	8 5.0	5,274	
襟	釧路	鶴 居	92	24	68	7 3.9	65	
宴以泉	十 勝	十 勝	658	78	580	8 8.1	550	
帰区	次: (2) 乗4	本年度	750	102	648	86.4	615	
i	海区計	前年度	13	2	11	8 4.6	11	
	仁雁别		4	3	, 1	2 5.0	1	
您	蜆 潘				+		400	
寒	幌 別						2,0 5 6	
以	元浦川	(元浦川)	1,560	133	1,427	91,5		
西	静内	(静内)				1 1 1	1,665	
海	遊樂部	八 雲	2,403	436	1,967	8 1.9	110	1.845
X	Max PDV (%)	本年度	3,9 6 7	572	3,395	8 5.6	4,232	1,845
	海区計	前年度	2,188	300	1,888	8 6.3	596	1,280
	A 31	本年度	76,157	9,018	6 7,1 3 9	8 8.2	37,242	2 7,3 1 4
	合 計	前年度	25,577	3,5 0 8	22,069	8 6.3	11,789	9,680

# からふとます卵子の採卵から収容までの動き

採 卵 数

7 6,1 6 7 千粒

仮収容卵数

76,167千粒

供 試 卵 数

△10千粒

収 容 卵 数

7 6,1 5 7 千粒

数	放流期間	仮収容から収容までの卵の動き・・・・・ 事業場単位 備 考 74.9.5 を呼ばれる
計尾		雅魚移殖放流。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
278	2.20~3.10	計根別(当幌,春別,床丹分)から321千粒
1,497	2. 1~2.25	
64	3.1 5~3.2 5	浜中(矢臼別, 風連分)から84千粒
319	3.16~3.18	(根室から319千尾移殖放流)
7,631	2. 1~4.30	
5,274	2. 1~5.31	
6.5	4. 1~4.20	釧路分92干粒
550	5. 1~525	幕別分 6 5 8 千粒
615	4. 1~5.25	- 1
11	420	
1		〈惺 邓
400	4.1 6	( 千才から 400 千尾移殖放流 )
2,056	4. 1~4.16	(千才から700千尾,元浦川から1,356千尾移殖放流)
		北見から 1.560 千粒
1,665	4.22~4.23	( 千才から 1,665 千尾移殖放流 )
1,955	3.20~520	北見から 2,3 2 7 干粒
6,077	3.20~520	
1,876	2.18~5.20	
6 4,5 5 6	2. 1~6.17	
21,469	2. 1~5.31	

第19表 昭和44年度支・事業場別からふとますふ化放流成績表

-	Tto.	on Mile Life	thy are an 44	死 60 米h	ふ出尾数	ふ化率	放	流 尾
支	場	事業 場	収容卵数 (千粒)	死卵数(千粒)	(程)	% %	無給餌(千尾)	維斯(形)
北	見	岩尾別	8,093	529	7,564	9 3.5	7,4 5 0	
		斜 里	6.1 3 0	387	5.743	9 3.7	2,681	2,935
		藻 琴	3,0 6 8	282	2,786	9 0.8	2,700	
		網走	4,1 5 0	387	3,7 6 3	9 0.7	3,690	
		北 見	1,722	171	1,551	9 0.1	1.521	
		(福山)	1,867	182	1,685	9 0.3	1,600	
		湧 別	8,802	1,763	7,039	8 0.0	3,741	3,220
		渚 滑	4,5 4 8	620	3,928	8 6.4	3,900	
		幌 内	1,235	221	1,014	8 2.1	980	
		(雄武)	3,163	949	2,214	7 0.0	1,391	
		本年度	42,778	5,491	37,287	8 7.2	29,654	6,155
		前年度	1 2,0 9 6	1,079	1.1,017	91.1	5,479	5,330
根	華	(春刈古丹)	510	61	449	8 8.0	55	
5.0		根 室	6,420	495	5,925	92.3	747	4,990
		(床丹)	321	38	283	88.2	278	
		虹別	1,720	128	1,592	9 2.6	1,497	
		(矢白別)	84	4	80	9 5 2	64	
		本年度	9,055	726	8,329	9 2.0	2,6 4 1	4,990
		前年度	6,613	990	5,623	8 5.0	5,274	,
+	勝	鶴 居	92	24	68	7 3.9	6.5	
		十 勝	658	78	580	8 8.1	550	
		本年度	750	102	648	8 6.4	615	
		前年度	13	2	11	8 4.6	11	
天	塩	徳志別	6278	912	5,3 6 6	8 5.5		5,300
		屯 別	2,483	314	2,169	8 7.4		2,1 2 4
		(増幌)	1,676	193	1,483	8 8.5		1,450
		(大沢11)	150	10	140	93.3	100	
		中川	5,870	369	5,5 0 1	9 3.7		5,4 5 0
		本年度	1 6,4 5 7	1,798	814,659	8 9.1	100	14,324
		前年度	4,667	1,1 37	3,530	7 5.6	429	3,0 7 0

数	放流尾数 /	放流期間	備考
計(程)	√ 収容卵数 8分		
7,4 5 0	9 2.0	4.20~5.20	
5,616	91.6	3. 1~4.30	
2,700	8 8.0	3. 1~4.30	
3,690	8 8.9	3.25~3.31	
1,521	8 8.3	3. 1~3.31	
1,600	8 5.7	4.25~5. 7	
6,961	7 9.1	3. 1 <b>~</b> 520	
3,900	8 5.8	2.1 2~5.15	
980	7 9.4	3.1 0~5.3 0	
1,391	4 4.0	3. 1~4.30	
35,809	83.7	2.1 2~5.3 0	
10,809	8 9.4	2. 1~520	
5.5	1 0.8	3.20~3.25	
5,737	8 9.4	320~430	20千尾は試験控除
278	8 6.6	2.20~3.10	
1.497	8 7.0	2. 1~2.25	
64	7 6.2	3.15~3.25	
7,631	8 4.3	2. 1~4.30	
5,274	. 7 9.8	2. 1~5.31	
65	7 0.7	4. 1~4.20	
550	8 3.6	5. 1~525	
615	8 2.0	4. 1~5.25	
11	8 4.6	420	
5,300	8 4.4	4. 1~5.11	,
2,124	8 5.5	4. 1~4.30	,
1,450	8 6.5	5.27~6.17	
100	6 6.7	4.10~5.31	4
5,450	7 2.2	5. 1~6.13	
1 4,4 2 4	7 9.5	4. 1~6.17	
3,499	7 5.0	2. 1~4.15	

		Ŧ			· ·				14.	- m
支	場	事	業	坦	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ化率	放放	危 尾
	-912	1 .3.	*	-902	( 刊粒 )	(刊粒)	(程)	%	無給餌(千尾)	給餌(電)
Ŧ	才	干		才	3,150	329	2,821	8 9.6	2,7 6 5	
		( )	元浦丿	11)	1,560	133	1.427	9 1.5	1,356	
		(1	二雁兒	别)	4	3	1	2 5.0		
		本	年	度	4,7 1 4	465	4,249	90.1	4,1 2 2	1 1 1
		前	年	度						
渡	島	八		雲	2,403	436	1,967	81.9	110	1,845
		本	年	度	2,403	436	1,967	8 1.9	110	1,845
		削	年	度	2,188	300	1,888	8 6.3	596	1,280
合	計	本	年	废	76157	9,0 1 8	6 7,1 3 9	8 8.2	37,242	27,314
		前	年	脡	25,577	3,5 0 8	22,069	8 6.3	11.789	9,680

数計(程)	放流尾数/火	放流期間	(権	考
2,765	8 7.8	4.16~423		
1,356	8 6.9	4. 1		
1	2 5.0			,
4,122	8 7.4	4. 1~4.23	-	
1,955	81.4	3.20~520		
1,955	8.1.4	3.20~520		
1,876	8 5.7	2.18~5.20		
64,556	8 4.8	2. 1~6.17		
21,469	8 3.9	2. 1~5.31		

-97-

第20表 ます稚魚標識放流

魚種	河川名	放流期間		標	識
点 住	例川石	从次们。分别时	尾 数	部 位	目 的
さくらます	尻 別	4 5.5	(千尾) 300	脂ピレ	河川生活期の分散 <b>・</b> 生残 り調査
からふとます	湧 別	45. 4.17 ~4.23 45. 3.17	126	左腹ビレ	後期放流群 (冷水ふ化群) 専期の把
	遊楽部	~3.23 45. 4.15 ~4.23 45. 3. 20		右腹ピレ 脂ピレ 左腹ピレ 脂ピレ	

# §9 ひめます増殖事業

## 1 ひめます捕獲採卵概況

本年度の支笏湖におけるひめます捕獲採卵事業は10月8日に開始し,11月28日に終了した。その結果14,588尾(うち雌7,337尾)を捕獲し,計画達成率72.9%であつた。また採卵は2,856千粒で計画の80.5%であり、捕疫,採卵とも昨年より736尾,168千粒多かつた。

第1表 昭和44年度ひめます親魚捕獲採卵成績表

水		系	採	ØB.	場	所管	抽	Ì	貓	Ē	数.			使月	FI F	朗 魚	数	
///		×1×	2/1	71-	92.	事業場	우	尾	8	尾	計	尾	우	尾	8	尾	計	尾
	data	Mar	ポロ	上,	+1	支笏湖	4,5 8	8 7	5,5	80	10,1	67	3	,299	8	29	4,1	28
支	笏	湖	湖		畔	"	2,7	50	1.6	71	4,4	21	2	,692	6	65	3,3	5 7
			本	年	度		7,3	37	7,2	51	1 4,5	88	5	991	1.4	94	7,4	85
合		計	前	年	脡		7,9	25	5,9	27	1 3,8	53	6	,317	1,0	58	7,3	75

採卵数干粒	増減卵数 千粒	仮収容卵数 千粒	♀ 親魚使 用率 %	平均採卵数粒	実施 期間
1,5 6 0		1,5 6 0	7 1.9	473	10. 8~11.28
1,296		1,296	9 7.9	481	10.19~11.28
2,856		2,856	8 1.7	477	10. 8~11.28
2,688		2,688	7 9.7	426	10. 8~11.27

## 2 ひめます種卵の移殖

## ○ 移殖ならびに分譲に伴なう種卵の移動

総 採 卵 数 2,856 干粒 分 譲 卵 数 750 "

上記の死卵数 28 "

移籍卵数 847 "

支笏湖事菜場

1,231 "

最終収容卵数

## 第2表 種卵の移殖(発眼卵),

供	給地	受給 地		給地		Ļ		移	殖	90	の	内	訳	摘	要
支場名	事業場名		支場名	4 業	易名	移籍	ion?	数	移殖	前列	卵数	移	殖実卵数		2.
							干米	Ż.			干粒		干粒	べに	さけ
千歲	支笏湖	4 4.1 2.2 3	根室	虹	别	8	4	7		1	6		8 3 1	生産用種	

## 第3表 種卵の分譲(発眼卵)

供;	給 地	分譲月日	受	給	先	分譲	摘	要
支場名	爭業場名	分談月口!	文	7FC3	,,,	卵数	)lej	~
干 歳	支笏湖	4 4.1 2.1 8	淡水区水	研日光支所		千粒 50	中禅寺湖放流用	
		45. 1. 9	福島県農村	林部		50	檜原湖, 秋元湖流	效流用
		1,10	福井県	"		100	九頭竜ダム放流月	Ħ
		1.13	青森県水	産商工部		100	十和田湖放流用	
		1.1 4	山梨県農	政部		100	西湖, 本栖湖放流	<b> 施用</b>
		1.21	北海道立	水産ふ化場		300	俱多楽湖, 洞爺湖	胡,阿寒湖放
		2. 2	北海道さ	け・ます振り	關金	50	流用   サケ・マスセン: 	9一用
i	at l					750		

## 3 ひめますふ化放流

採卵数2,856 干粒のうち死卵数を除いた2,812 干粒から虹別事業場へ831 干粒をべにさけ再生産事業用として移殖し、淡水区水研他6ケ所へ750 干粒を分譲し、残りの1231 干粒を支笏湖事業場で収容管理を行つた。2月中旬から浮出開始、3月9日浮出終了、その後4月28日まで全数を飼育し、4月29日1,122 干尾を支笏湖へ放流した。

第4表 昭和44年度ひめますふ化放流 成績表

	水	系	事業 場	収容卵数 (千粒)	死 卵 数 (干粒)	ふ出尾数 (千尾)		放 流 無給餌(千尾)	
1	支领	芴 湖	支笏湖	1,231	62	1,169	9 5.0		1,1 2 2

数計(刊程)	放流期間		備				:	考
1,122	4,29	虹別。	日光,	福井,	山梨,	道立ふ化場。	その他へ 1,6 25	千粒

# §10 さけ・ます親鸞蓄養成績

## 1) さけ

本年度は捕獲雌親魚 2 2 2,7 9 7 尾のうち再生産の為に即日 8.6 4 7尾(即日使用率 3.9 %)、 さらに蓄養して催熟使用した親魚 1 9 0,2 3 7尾(催熟率 8 9.4 %)、雌総使用親魚 1 9 8.8 8 4 尾(使用率 8 9.3 %)で、親魚使用率は昨年(8 5.6 %)を上廻る成績であった。

親魚の有効利用について、平均総利用率は向上が見られるが、蓄養池の環境条件の悪化、管理の不完全などから蓄養中へい死18,636尾(8.8%)、逃逸その他3,950尾(1.9%)がある。すなわち、打内蓄養中へい死埋汲と思われるもの2,382尾およびへい死6.826尾、北見幌別で施設の過重使用が原因と思われる窒息死 1,043 尾、西越第二のボンブ破損によるへい死176尾、静内、鵡川の活魚輸送中のへい死235尾などが挙げられる。

また、使用率向上のために環境の良い蓄養池に連載収容して効果を挙げ、好成績を得た。すなわ ち、西別から虹別、伊茶仁、羅臼事業場へ、千代田、幕別、東33号から札内の面川へ、天塩から ロクシナイ川へ夫々活魚輸送車で連載、蓄養して好成績を得た。

#### 2) さくらます

本年度は捕獲雌親魚 8.496尾のうち491尾(5.8%)を即日採卵に使用し、蓄養して催熟使用した親魚 6.640尾(催熟率 83.3%)、雌総使用親魚 7.131尾(使用率 83.9%)で、親魚使用率は昨年(63.6%)を大巾に上廻る成績であった。

環境条件の悪化、管理の不完全などから、蓄養中のへい死魚 1,289尾(16.2%)、逃逸その他 46尾(0.06%)がある。すなわち、斜里、興部では河川内の砂利採取工事による水質汚濁が原因と思われるもの、西越での蓄養中へい死魚などが挙げられる。

第1表	昭和4	4年度	さけ親魚	審養成績	(支場	事業場別)
-----	-----	-----	------	------	-----	-------

1	項		捕	XII	¥64.				早 亲	見	魚	の処	理			
採	/	目	7形	獲	数	試	即	日	採卵		N. Carlotte	Ē	i	<b>鉴</b>	蓄	赉
B	場場		ę	8	計	験控除	尾	数	即 日 使用率	要養	0.90	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	9	8
	vantta.go		尾	尾	尾	尾		尾	%		尾	尾	尾	%	尾	尾
岩	尾	別	1,694	3708	5,402		1,1	91	70.3		503		503	29.7	503	1,360
斜		理	10437	16171	26,608					10	0,437		10,437	100	10,437	6.185
藻		翠	849	1,115	1,964			4	0.5		845	3	842	992	842	320
網		走	23,866	40,806	64,672		1,3	35	5.6	22	2,531	11	22,520	94.4	22,520	€.784
西	網	走	83	94	177			83	100		,					

#### 3) からふとます

本年度は捕獲雌親魚 5 6.1 1 9尾の 5 5 1 7 6尾(0.0 3%)を即日採卵に使用し、蓄養して催熟使用した親魚 5 1,9 3 0尾(催熟率 9 3.7%)、雌総使用親魚 5 2,1 0 6尾(使用率 9 2.8%)で親魚使用率は昨年(8 4.9%)を上廻る好成績であった。

しかし、管理の不完全などから、蓄養中のへい死 2,9 3 1尾(5.3%)、逃逸その他 5 6 8尾(1.0%)がある。すなわち、蓄養中へい死の多いカ所はサシルイ、釧路、猿払、小平薬、遊棄部であり、盗難があったカ所は藻琴、春刈古丹、頓別であった。

#### 4) ひめます

例年とおり、捕獲場は湖畔とボロビナイの2カ所で行っており、ボロビナイからは活魚輸送を行って密養しているが、刺網のためその成績は若干悪い。

蓄		養	Þ	3		訳						総	使
数	-	蓄		鲞	9		親	魚				使	r
計	催 熟	催熟率	へい死	~ 1.		そ	の	ft	<u>tı</u>	そ	の他	用	用
p)	1住 末	准然性	14.90	死 率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	0	率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	· 尾	尾		%	尾	%
1863	502	99.8	1	0.2								1,693	999
16,622	9,429	90.3	1,008	9.7	,							9,429	90.3
1,162	798	94.8	44	5.2	:	0.4-						802	945
29,304	21,796	96.8	724	3.2	2							23,131	96.9
		- is -	,					2),2			ar Is	83	100

項	1.0					7	親	魚	0	) 処	理	. Single		
採	捕	獲	数	試	即	日	採卵		著	ř,	弃	ŧ	蓄	養
卵場	ę.	8	計	験控除	尾	数	即 日 使用率		蓄数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	우	8
	尾	尾	尾	尾		尾	%		尾	尾	尾	%	尾	尾
常呂	1,097	2,067	3,164					1,09	97		1,097	100,	1,097	627
ライトコロ	42	42	84					4	12		42	100	42	35
サロマヘジ	47	83	130			15	31.9	3	32	1	31	66.0	31	21
湧 別	20,223	31,715	51,938					20,22	23		20,223	100	20,223	5,384
渚  糈	2,507	4,023	6,530					2,50	)7		2507	100	2,507	1,136
興部	213	246	459					21	13		213	100	213	123
幌内	832	1,26 4	2,096					83	32		832	100	832	464
北見計	61890	101,334	163,224		2,6	28	4.2	59.26	62	15	59247	95.7	59,247	22,439
ルサ	85	119	204			21	24.7	6	64		64	100	64	86
羅臼	2,585	4,122	6.707		2,0	57	79.6	5.2	28	6	522	98.9	5 2 2	203
植 別	217	299	516			28	12.9	18	39	4	185	97.9	185	244
元崎無異	18	41	59			2	11.1	1	16		16	100	16	38
崎無異	175	317	492			20	11.4	15	55		155	100	155	204
蒸別	557	710	1,267		1	51	27.1	40	6		4 06	100	406	658
古多糠	45	59	104			3	6.7	4	12		42	100	42	51
忠 類	282	381	663			56	19.9	22	26		226	100	226	254
伊茶仁	3,722	5.825	9,547		3	05	8.2	3,41	17		3,417	100	3.417	2,916
標準	3208	5,578	8,786		3	27	10.2	2,88	81		2,881	100	2,881	2311
3 1 紡	18	24	42			4	22.2	1	14		14	100	14	8
当 幌	1,813	1,661	3,474		1	46	8.1	1,66	67	21	1,646	98.7	16 46	1,178
春別	171	88	259					17	71		171	100	171	88
床 丹	420	206	626					42	20		420	100	420	206
西别	64,907	89,349	154,256					64,90	07	304	64,603	99.5	64,603	24,200
矢臼別	12	14	26					] ]	12		12	100	12	7
風連	427	406	833					42	27		427	100	427	194
別当質	425	658	1,083					42	25		425	100	425	591
穂 香	87	15	102					8	87		87	100	87	15
根室計	79,174	109,872	189,046		3,1	20	3.9	760	54	335	75,719	99.6	75,719	33452
厚岸	744	1,265	2,009		T			74	44	1	744	100	744	289
釧路	21,698	23,430	45,128					21,69	98	11	21,687	99.9	21,687	8.087
阿寒	219	349	568					2	19		219	100	219	27
	1		1				-104			+	<b></b>			

蓄		養	内	1	Ī	沢					総	使
数		蓄	差	Ę.	P .	菜	見	魚			使	用
₩.	催熟	伊敦安	へい死	~ 1	7		0	他	3	その作		
計	催熟	催熟率	- 14.96	死 率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の <b>2</b>		率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	9		%
1,724	1,025	93.4	72	6.6							1,025	93.4
77	22	52.4	20	47.6							22	52.4
52	27	87.1	4	12.9							42	89.4
25,607	20,018	99.0	205	1.0							20,018	99.0
3,643	2,507	100		×							2,5 07	100
336	207	97.2	6	2.8							207	96.2
1,296	832	100									832	100
81,686	57,163	96.5	2,084	3.5							59,791	96,6
150	60	93.8	4	0.6	盗難						81	95.3
725	519	99.4	1	0.2	2				2	0.4		99.7
429	179	96.8	4	0.2		2			2	1.	207	95.4
54	16	100									18	100
359	146	94.2				9			9	5.	8 166	94.9
1,064	403	99.3	3	0.7							554	99.5
93	38	90.5	4	1.0							41	91.1
480	224	99.1	2	0.9							280	99.3
6.333	3,365	98.5	52	1,5							3,670	98.6
5,192	2,847	98.8	34	1.5							3,174	98.9
22	14	100								,	18	100
2,824	1,637	99.5	9	0.8					-		1,783	98.3
259	171	100									171	100
626	419	99.8	1	0.5		20					419	998
88803	61,762	95.6	2,841	11.7					100		61,762	95.2
19	11	91.7	1	8.3							11	91.7
621	387	90.6	40	9.4							387	90.6
1,016	417	98.1	8	1.9	盗難						417	98.1
102	37	42.5			50				50	57	5 37	42.5
109171	72,652	96.0	3,004	4.0	52	11			63	0.0	8 75.772	95.4
1,033	725	97.4	19	2.6	-						725	97.4
29,774	17,361	80.0	2,876	13.3	1,450				1,450	6.	7 17,361	85.7
246	. 185	8 4.5	34	15.5						91	185	84.5

項			Mr.			9	親	魚		の	理			
采	捕	獲	数	試	即	日	採卵		室	ř	羞	É	蓄	鲞
卵場	우	8	計	験控除	尾	数	即 日 使用率	200	蓄数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	\$	8
	尾	尾	尾	尾		尾	%		尾	尾	尾	%	尾	尾
茶 路	228	553	781					2	28		228	100	228	72
打 内	26.759	61,795	88,554					26,7	59	363	26,396	98.9	26,396	2,777
東33号	4,277	8439	12,716					4,2	77	52	4,225	98.8	4,225	29
利 別	35	58	93	1					34	2	32	91.4	32	14
幕 別	5,054	9105	14,159					50	54	34	5020	99.3	5.020	2,720
千代田	8,484	16.169	24,653	8				8,4	76	77	8,399	98.9	8399	2,369
歷 舟	519	1,152	1,671		1	55	29.9	3	64	206	158	30.4	158	67
太 尾	- 389	336	725			3	0.8	3	86	20	366	94.1	366	159
豐二 似	11	17	28						11	2	9	81.8	9	3
梨 古	-14	1	1				9	١.						
喜 留	7	11	18				*		7		7	100	7	10
十勝計	68.424	122,680	191,104	9	1	58	0.2	682	57	767	67.490	98.9	67,490	16.623
恵志 別	130	188	318					1	30		130	100	130	59
光 别	4,147	7883	12,030					4,1	47	31	4,116	99.3	4,116	1,373
負 別	399	516	915					3	99		399	100	399	403
Þ JII	355	423	778				ž ž	3	55		355	100	355	74
天 塩	620	822	1,442					6	20	21	599	96.6	599	86
下中川	201	179	380	1		6	3.0	1	95	2	193	99.0	193	146
小平藥	4	1	5						4		4	100	4	1
天塩計	1	10,012	15,868			6	0.1	5,8	50	54	5796	991	5.796	2142
西…! 越		1,674	3316		1	43	8.7	1,4	199		1,499	100	1,499	726
西越第2	236	341	577					2	36	4	232	98.2	232	
	o t. 1173	298	471		1			1	73	21	152	87.8	152	56
三雅 別	1	22	38		1				16	1	15	93.8	15	. 22
兇 別	88 38	154	242		li	8	9.1		80	3	77	96.3	77	27
	121		307			76	62.8		45		45	100	45	12
1	E 40:	1	136			14	35.0		26	*	26	100	26	23
	1.8922	1	1			88	9.5	8	334	12	822	98.6	822	246
- 1	7 61			i		18	29.5		43	5	38	88.4	38	25
1.00	318		1 1	3.			(· . · .	1.3	318	18	300	94.3	300	133
	224		1					1	224	7	217	96.9	217	44

蓄		養		I		訳						使
数		蓄	Ž	菱	9	3 2	朗	魚			総使	用
計	催熟	催熟率	へい死	1~ 1	7		の	,	他	その他	用	
				死 率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
300	175	76.8	53	23.2		マヤゴ	を中へい	755			175	76.8
29,173	17,188	6 5.1	6.826	25.9	2,382	(埋沙	を中へし と?	( مر	2,382	9.0	17,188	64.2
4,254	3.667	86.8	558	13.2							3,667	85.7
46	32	100									32	91.4
7,740	4,494	89.5	526	10.5							4,494	88.9
10,768	7,623	90.8	775	9.2			1		1	0.0	7,623	89.9
225	125	79.1	33	20.9							280	53.9
5 2 5	327	89.3	39	10.7							330	84.8
12	7	77.8	2	22.2							7	63.6
17	5	71.4	2	28.6							. 5	71.4
84,113	51,914	76.9	11,743	17.4	3.832		1		3,833	5.7	52,072	76.1
189	1 25	96.2	5	3.8							125	90.2
5,489	3.073	74.7	1,043	25.3							3,073	74.1
802	379	85.0	17	4.3		3			3	0.0	379	95.0
429	339	95.5	13	3.7		3			3	0.0	339	95.5
685	4 49	7 5.0	150	25.0							449	72.4
339	192	99.5				1			1	0.0	198	98.5
, 5			4	100								
7938	4,557	78.6	1,232	21.3		7			7	0.0	4,563	77.9
2,225	1,418	94.6	76	5.0			5		5	0.3	1,561	. 95.0
232	56	24.1	176	75.9	and a			4	3		56	23.7
208	120	78.9	12	7.9	15	5			20	13.2	120	69.4
37	14	93.3	1	6.7							14	87.5
104	72	93.5	5	6.5							80	90.9
57	44	97.8	1	2.2							120	99.2
49	23	88.5	3	11.5					800		37	92.5
1,068	679	82.6	123	15.0			20		20	2.4	767	83.2
63	34	89.5	4	10.5					1	0.3	52	85.2
433	294	98.0	5	1.7		1					294	923
261	115	53.0	102	47.0							115	51.3

\	項		44	vit-	Mir	試		2 親	魚	の	ュ 理			-
採	\		捕	獲	数	験	即日	採卵	蓄		養		蓄	養
明	場	目	우	8	計	控除	尾 数	即 日 使用率	要 蓄 数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	우	8
	-	4.	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	尾	尾	%	尾	尾
勇		払	80	117	197	,			80	40	40	50.0	40	15
白		老	86	122	208		75	87.2	11		11	100	11	4
敷		生	112	258	370		106	94.6	6	3	3	50.0	3	
干	歲	計	4,119	6431	10,550		528	12.8	3,591	114	3,477	96.8	3477	1,333
朱		太	23	50	73				23		23	100	23	48
冷		水	256	388	644		237	92.6	19		19	7.4	19	13
厚	沢	部	457	773	1230		26	5.7	431		431	94.3	431	241
長	万	部	9	33	42				9		9	100	9	13
遊	楽	部	539	480	1019		86	16.0	440	13	440	81.6	440	420
貫	戾	別	9	10	19				9	9				
茂	辺	地	1,718	2,559	4,277		1,713	99.7	ı	5				
亀		Щ	57	58	115		33	57.9	23	1	23	40.4	23	9
大		野	2	3	5				2		2	100	2	3
F	切	地	55	38	93		4	7.3	51		51	92.7	51	36
知		内	68	. 126	194		28	41.2	40		40	58.8	40	71
汐		泊	141	192	333		80	56.7	56	5	56	39.7	56	119
渡	島	計	3334	4,710	8,044		2,207	66.2	1,094	33	1,09 4	49.6	1,094	973
合		計	222,797	355,039	577,836	9	8,647	3.9	214,108	1,318	212,823	99.4	212,823	76,962
前	年	度	103,695	131,979	235,674	34	6,607	6.4	97,054	2,062	94,992	97.9	94,992	31,356

蓄		Ě	内	1		Ī	沢				-		総	使
数			蓄		養		2		親	魚			使	用
計	催熟	催熟率	へい死	^	١,١		£	の	ft		そ	の他	用	
j ji	THE TAX	1年火作中	4.96	死	率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の	率	数	率
尾	尾	%	尾		尾	尾	尾	尾	尾	尾		%	尾	%
55	36	90.0	4	10	0.0								36	45.0
15	11	100											86	100
3	3	100											109	97.3
4,810	2,919	83.9	512	14	1.8	15	6	25		46		1.3	3447	83.7
71	23	100											23	100
32	19	100											256	100
672	431	100											457	100
22	8	88.9	1	11	1.1								8	89.0
860	394	89.5	46	10	).5								480	89.0
													1,713	99.7
32	21	91.3	1	4	1.3		1			1		4.3	54	94.7
5	2	100											2	100
87	41	80.4	10	19	9.6						1.		45	81.8
111	38	95.0	2	Ę	5.0								66	97.0
175	55	98.2	1	1	1.8								135	95.7
2,067	1,032	94.3	61	5	5.6		1			1		0.1	3239	97.2
289,785	190237	89.4	18,636	8	8.8	3899	25	26		3,950		1.9	198,884	89.3
126348	82,187	86.5	12,577	13	3.2	91	33	56	48	228		0.3	88,794	85.6

.

1	項	ĺ	捕	獲	数			9	親	魚	0	0 処	理			
採	/	-	389	0处	200	試	即	日	採卵		蓄	ř	羞	E	蓄	養
引出	湯	目	2	8	計	験控除	尾	数	即 日 使用率	要養	蓄 数	1	蓄養数	蓄養率	우	8
			尾	尾	尾	尾		尾	%		尾	尾	尾	%	尾	尾
岩	尾	別	122	53	175		-			12	22		122	100	122	27
斜		里	3.033	1,980	5,013					3,03	33		3.033	100	3,033	1,980
渚		滑	683	400	1,083					68	33	3	680	99.6	680	127
興		骀	412	154	566					41	12		412	100	412	62
幌		内	14	13	27					1	14		14	100	14	13
北	見	計	4,264	2,6 00	6864					4,26	64	3	4,261	99.9	4,261	2209
3	1	線	632	299	931					63	32		632	100	632	299
標		津	412	133	545					41	12		412	100	412	133
当		幌	115	110	225					11	15	2	113	98.3	113	76
春		别	70	32	102			1		7	70		70	100	70	32
床		丹	79	38	117			1		7	9		79	100	79	38
西		別	982	512	1,494					98	32	8	974	99.2	974	496
矢	日	別	128	188	316			14	10.9	11	4		114	100	114	169
風		連	68	47	115			1		6	86	1	67	985	67	36
别	当	賀	271	144	415	1				27	1	And the same of th	271	100	271	144
根	室	計	2,757	1,503	4,260			14	10.9	2,74	13	11	2,732	99.6	2,732	1,423
徳	志	別	7	1	8						7		7	100	7	1
幌		别	387	216	603					38	37	4	383	99.0	383	95
中		Ш	178	65	243			1	0.6	17	77	9 4 8	177	100	177	63
天	塩	計	572	282	854			1	0.2	57	71	4	567	99.3	567	159
西		越	32	21	53					3	32	1	32	100	32	19
音		江	50	66	116					5	50	1	50	100	50	49
仁	雁	別	3	2	5						3		3	100	3	2
干	歳	計	85	89	174		•	İ		8	35		85	100	85	-70.
名		駒	679	151	830		4	42	65.1	23	37	10	227	33.4	227	106
汐		泊	139	19	158		1	34	24.5	10	)5	2	103	74.1	103	15
渡	島	計	818	170	988		4	76	58.2	34	12	12	330	40.3	330	121
合		計	8,496	4,644	13,140		4	91	5.8	8,00	)5	30	7,975	99.6	7,975	3,982
前	年	度	10,304	5292	15,596		38	89	3.8	9,91	15	517	9398	94.8	9398	4,066

蓄		養	Þ	3		Ē	尺							使
数			蓄		養		9	親	!	魚			総	
計	I'm th	(W 161) 547	21.75	^	١,	7	-	0	ft	t l	その	他	使用	用
Ē1	催熟	催熟率	へい死	死	率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	0 3	率	数	率
尾	尾	%	尾		%	尾	尾	尾	尾	尾		%	尾	%
1.49	121	99.2	1		0.8								121	99.2
5,013	2,162	71.3	871	2	3.7								2,162	71.3
80 7	622	91.5	26		3.8			32		32	4.7	7	622	91.1
474	253	61.4	159	3	8.6							1	253	61.4
27	7	50.0	7	5	0.0								7	50.0
6,470	3,165	74.3	1,064	2.	5.0			32		32	0.8	3	3165	742
931	604	95.6	28		4.4								604	95.6
545	372	90.3	40		9.7							1	372	90.3
189	104	90.4	9		8.0								104	90.4
102	51	72.9	19	2	7.1							-	51	72.9
117	77	97.5	2	2	2.5								77	97.5
1,470	9 65	98.3	9	(	0.9								965	98.3
283	83	64.8	31	2	7.2								97	758
103	63	92.6	4	,	6.0								63	92.6
415	270	99.6	1	(	0.4								270	99.6
4,155	2589	94.8	143		5.2								2,603	94.4
8	5	71.4	2	28	8.6								5	71.4
478	370	96.6	5		1.3		8			8	2.1	L	370	95.6
240	170	96.0	7	4	4.0								171	96.1
726	545	96.1	14		2.5		8			8	1.4	1	546	9 5.5
51	22	68.8	10	3	1.2								22	68.8
99	43	86.0	1	:	2.0	6				6	12.1		43	86.0
5	2	66.7	1	33	3.3								2	66.7
155	67	78.8	12	1	4.1	6				6	7.1	L	67	78.8
333	174	76.7	53	23	3.3								616	90.7
118	100	97.1	3	2	2.9								134	96.4
451	274	83.0	56	1	7.0								750	91.7
11,957	6,640	83.3	1289	1	6.2	6	8	32		46	0.0	)6	7,131	83.9
13,460	6,169	65.7	3,066	33	2.6	158	5			163	1.7	7	6558	63.6

項	L.I.	144	Mr.	el schillerina dell'id		4	親	魚	0	0 処	理			
梁	捕	獲	数	試	即	日	採卵		**	ř	考	Ě	蓄	養
卵目場	우	8	計	験控除	尾	数	即 日 使用率	要養	畜数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	2	8
	尾	尾	尾	尾		尾	%		尾	尾	尾	%	尾	尾
岩尾別	13,466	8,112	21578					13.4	66	189	13277	98.6	13.277	1,905
オクシベ	396	166	562					3	96	70	326	82.3	326	63
斜 里	8,822	5,437	14,259					8,8	22		8,822	100	8.822	2,054
蘂 琴	1,195	777	1972					1,1	95		1,195	100	1,195	372
網 走	815	419	1,234		-			8	15	5	810	99.4	810	292
常呂	5,837	4,535	10372		-			5,8	3 7	6	5.831	99.9	5,831	1.165
湧 別	4,614	5,164	9,778					4,6	14		4,614	100	4,614	803
渚 滑	3,744	3,485	7,229					3,7	44		3.744	100	3.744	61
興 部	647	436	1,083					, 6	347		647	100	647	16
雄 武	439	377	816					4	139	16	423	96.4	423	14:
幌 内	1,555	1,294	2849					15	55	46	1,509	97.0	1509	54
北見計	41,530	30,202	71,732	7 7 8 8 9				41,5	30	332	41,198	99.2	41,198	8.12
サシルイ	115	. 84	199		1	44.1		1	15		115	100	115	8
春刈古丹	189	133	322		}			1	189		189	100	189	13
忠 類		1288	1,8.40					5	552		552	100	552	15
伊茶仁	1 1		126						83		83	100	83	2
3 1 線	1	22	38				4		16		16	100	16	1
標準	1	2,351	4,534					2,	183		2,183	100	2,183	68
当 幌	1	108	189						81		81	100	81	9
春 別	1	1	63		1				44		44	100	44	1
床丹			172						118		118	100	118	5
西 別	ł	3182			-			1.	487	13	1,474	99.1	1,474	68
矢白別			1						28		28	100	28	2
風 連		58	i						37	1	36	97.3	36	- 3
別当賀	1	1	1						302		302	100	302	36
根室計	1	7,806						5.	235	14	5,221	99.7	5,221	237
釧路		8 72		1	1				154		154	100	154	7
幕 別	1		1	1					564		564	100	564	18
十勝計	1	455		1					718		718	100	718	25

蓄	-	蓌	Þ	3			訳						使
数		蓄	才	蹇		7	発	見	魚			総使	用
=1.	催熟	催熟率	へい死	^	11	7		の	他	1	その他	用	
計	惟然	准然学	1 4 90	死	率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾		%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	96
15,182	13208	99.5	69		0.5							13208	98.1
389	319	97.9	7		2.1				***************************************			319	80.6
10,876	8280	93.9	542		6.1	グケお仕			1			8,280	93.9
1,567	9 65	80.8	33		2.8	盗難 135	62			197	16.5	965	80.8
1102	778	96.0	23		2.8		9			9	1.1	778	95.5
6.996	5,558	95.3	273		4.7							5,558	95.2
5,417	4,354	94.4	243		5.3		17			17	0.4	4,35 4	94.4
4,355	3,703	98.9	41		1.1							3,703	98.9
816	628	97.1	19		2.9							628	97.1
564	381	90.1	42		9.9							381	86.8
2,056	1,310	86.8	199	1	3.2							1310	84.2
49,320	39.484	95.8	1,491		3.6	135	88			223	0.5	39,484	95.1
199	80	69.6	29	2	25.2	6				6	5.2	80	69.6
322	346	772	16		8.5	盗難 27				27	14.3	146	77.2
703	466	84.4	86	1	15.6							466	84.4
112	79	95.2	4		4.8							79	95.2
32	16	100										16	100
2,864	2,115	96.9	68		3.1						41	2,115	96.9
173	81	100										81	100
63	44	100										44	100
172	118	100				1 1						118	100
2,157	1,461	99.1	13		0.9							1,461	983
55	28	100										28	100
71	30	83.3	6		16.7							30	81.1
668	298	78.7	4		1.3		# 10 mm					298	98.7
7,591	4,962	95.0	226		4.3	33			B	33	0.6	4,962	94.8
226	107	69.5	47	-	30.5	1		-				107	69.5
7 48	564	100		# # * * *				***				564	100
974	671	93.5	47		6.5							671	93.5

項	4.5	y-tr-	Mer				親	魚	0	処 処	理			
採	捕	獲	数	試	則	日	採卵		著	F 9	強	ŧ.	蓄	養
卵場	우	8	計	験控除	尾	数	即 日 使用率	要養	蓄数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	우	8
	尾	尾	尾	尾		尾	%		尾	尾	尾	%	尾	尾
徳 志 別	3,666	3537	7,203			175	4.8	34	91	152	3339	9 5.6	3,339	915
幌 別	1,438	2,095	3,533		-			1,4	38		1,438	100	1,438	355
頓別	2,422	1,962	4,384					2,4	22		2,422	100	2,422	891
猿 払	897	479	1,376					8	97	1	896	99.9	896	343
中 川	70	45	115			1	1.4		69		69	100	69	42
小平蘂	3	5	8						3	1	2	66.7	2	2
天塩計	8.496	8,123	16,619		]	176	2.1	8.3	20	154	8,166	98.1	8,166	2,549
遊樂部	126	142	268					1	26		126	100	126	142
貫気 別	14	1	15						14	14		0		
渡島計	140	143	283				- 1	1	40	14	126	90.0	126	142
合 計	56119	46729	102848			176	0.0	55,9	43	514	55,429	992	55,429	13,439
前年度	21,776	44,098	68,874	108		3	0.0	21,0	665	652	21,013	97.0	21,013	10383

蓄		養	P	Ħ			訳					総	使
数		7	<b></b>	養		7		親	1	À		使	
計	催熟	催熟率	へい死	^	1.	,	E	0	f	也	その他	用	用
я	199. /XX	1年六年	14.90	死	率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾		%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	
4,254	3,192	95.6	147	4.	4							3.367	91.
1,793	1,366	95.0	72	5.	0							1366	95.0
3,313	1,605	6 <b>6</b> .3	580	23.	9	131			106	237	9.8	1,60 5	66.
1,239	527	58.8	304	33.	9		45		20	65	7.3	527	58.
112	59	85.5	2	2.	9		8			8		60	85.7
4		1	2	100								-	
10,715	6.749	82.6	1,107	13.	6	131	53	1	126	310		6925	81.5
268	64	50.8	60	47.	6		2	ĺ		2	1.6	64	50.7
268	64	50.8	60	47.6	6		2			2	1.6	64	45.
68,868	51,930	93.7	2,931	5.3	3	299	143		126	568	1.0	52,106	92.
31,396	18,485	88.0	2,322	11.	1	206				206	0.9	18,482	84.

第4表 昭和44年度ひめます親魚蓄養成績

項	44	XIE	W.L.			9	親	魚		の処	理			_
採	捕	獲	数	試	即	日	採卵		757	<b></b>	差	姕	蓄	養
卵場	ę	8	計	験控除	尾	数	即 日 使用率	要發	蓄数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	우	8
	尾	尾	尾	尾		尾	%		尾	尾	尾	%	尾	尾
湖畔	2,750	1,671	4,421			2	0.0	2,7	748		2,748	100	2,748	1,226
ポサピナイ	4,587	5,580	10,167			1	0.0	4,5	586	1,097	3,489	76.1	3,489	1,409
計	7,337	7251	14588			3	0.0	72	334	1,097	6237	8 5.0	6,237	2,635
前年度	7,925	5.927	13,852			26	0.3	7,8	399	1320	6,579	83.3	6,579	1,681

蓄	差	麼	内			訳							883 800	使
数		蓄		養		7		親	魚		٨		使	用
=1.	(iii ahi	(Mildely that	A 1 . W	^	41	7	7	0	作	b	その	D他	用	,713
計	催熟	催熟率	へい死	死	率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	0	率	数	率
尾	尾	%	尾		%	尾	尾	尾	尾	尾		%	尾	%
3974	2,690	97.9	18		0.6		27	5	8	40	1.	5	2,692	97.9
4,898	3.298	94.5	99		2.8		48	21	23	92	2.	6	3,299	71.9
8,872	5.988	96.0	117		1.9		75	26	31	132	2	1	5,991	81.7
8,260	6,291	95.6	110		1.7		143	16	19	178	2.	7	6317	79.7

# § 11 べにさけ生産事業

#### 1 目的と背景

北海道は我国におけるべにさけ(Oncorhynchusnenka)の南限にあたる。これは網走川 水源のチミケップ湖、阿寒川上流の阿寒湖に陸封型べにさけ即ちひめます(アイヌ語でカバチエップ)が生息することでも知られる。

現在、支笏湖では70数年前に阿寒湖から移殖されたひめます及びエトロフ島から移入したべにさけ卵によつて(第1表)とれの資源維持増大を計りつつ、全国湖沼への移殖供給湖として、その果している役割は大きく評価されている。

(第1表)	支笏湖のひめます増殖経過
-------	--------------

移殖	年度	ě	種	別	移入卵	故	種卵產	地	備	考
1894	明治27	7	ひめ	ます	150,00	0 粒	阿寒	湖		
1895	/ 28	3	,	r	172,00	0	#			
1896	/ 29	9 .	,,	,	376,00	0	"			
1920	大正 9	9	~ K	さけ	100,00	0	千 歲	)11	千歳ふ化場	
1925	" 1	4		,	100,00	0	エトロ	フ	ウルモベツふ化	場
1926	昭和ラ	ũ		,	0 0,0 0 8	0	"		_	
1926	"	11		y	2 0,0 0	0	千 歲	)11	千歳ふ化場	
1927	"	2		y	7 9 9,0 0	0	エトロ	フ・	ウルゼベッふ化	場
1928	"	3	ひめ	ます	400,00	0	洞爺	湖		,
1932	,,	7	,	W	200,00	0	阿寒	湖		
1932	"	u	べん	さけ	1 2 0,0 0	0	エトロ	フ	ルベッふ化場	
1933	"	8	,	*	200,00	0	//		ウルモベツふ仕	2場

べにさけは上流域に御沼のある河川にそ上し、御沼又はその注入河川で産卵ふ化して、湖沼に1~3年間生活してから降海する習性をもつている。従つて、べにさけの増殖にはそれに適合した河川が必要となつてくる。しかし、不幸にして北海道には、充分にそれを満足せしめるものがない。そのため淡水生活期を人工的に管理して降海幼魚に育成し、これを降海させることによつてべにさけの習性を満足せしめることが可能であろうと考えられる。

更にもう一つの問題点は、戦後エトロフ島を失つた現在では、残念ながら国内での降海性べにさけ 種卵の入手は不可能となつている。そのため支笏湖のひめます(陸封型べにさけ)を降海型に選 元することで本来的なべにさけの漁業資源を造成できると考えられた。

このように、ひめます幼魚を降海させて、べにさけとしての回帰を試みる実験については古くからカナダで成功した例がある。(Foster 1936)。また本邦でも、1960年(昭和35年)秋に採卵したひめます卵を根室支場虹別事業場に移殖し、浮上後6ヶ月間給餌して1961年(町和36年)8月に78,470尾を西別川へ(放流)したところ、1965年(昭和40年)秋にべにさけとして西別川で6尾、その沿岸で14尾の回帰が確認されて、べにさけ生産の可能性に対する見とおしが得られたので、1965年以降(採卵年度で、翌年1月発眼卵で移殖)毎年西別川に移殖することとした。

こうした国で行なうべにさけ生産事業を支援する意味から、日本鮭鱒資源保護協会では純正べにさけ卵を用いて、積極的な増殖を進めることとし、1968年(昭和43年)から5カ年継続して、アラスカ産べにさけ卵を移入することとした。アラスカ産のべにさけを指定したのは、アラスカがべにさけの主要な産卵場であることは言うまでもないが、1967年(昭和42年)に、C・H・ミーチャムおよびW・H・ノーレンバーグの両氏が北海道に訪れた際に道東の一漁業者(故奥谷悠一氏)がべにさけ卵20万粒の移入を要請したところ快諾された。これが後日に日本鮭鱒資源保護協会が受入れに当つての手続き一切を行うこととなり、種卵供給先をアラスカと決定された。

また、日本鮭鱒資源保護協会では長沢技官および関係者をアラスカに派遣して、現地視察、移殖 卵の適合性の検討と、輸送状況調査および本計画のPRと協力要請を目的としたもので、有意義な 結果を得られた。

これらのことについて現在までの概要は第2表のとおり。

(第2表) 44年度までのべにさけ生産事業概要

実施年			T			
生產	1965	1966	1967	1968	1969	備考
年級	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	
	1 1月採卵	1月移殖	3月放流	回帰確認な	回帰	放流魚体平均FL12.0cm
	支笏湖	虹 別	西別川最上	L	(4年魚)	BW 1 8.2 %
	50,000粒	3月より飼	流 14,000	,	3尾	放流総重量250kg
4 1		育	尾(全数標			標識部位 脂ビレ、右腹ビ
			識)			v.
						回帰親魚(4年魚)FL
		-				50cm, BW 2.1 kg
		11月採卵	1月移殖	5月 B群放	B群のみ回	A群放流魚体平均FL 8,1
		支笏湖	9月A群放	流		cm, BW 3.3 8
:		916,500	流	西別川下流	以上	放流総重量640kg
		粒	北湧水池	108000		B群放流魚体平均F L1 6.5
	Ψ.		193,000	, 尾		cm, BW3 6.0 8
4 2			尾	(全数標識)		放流総重量 4,2 0 0 kg
1			(5万尾に			回帰親魚(3年魚)
		×	標識)			FI.40 CML BW
						1 kを 標識に
					7	回帰確認沿岸200 よりB
						尾以上、西別川群のみ
						177尾
			11月採卵	4月 A群放	5月 B群放	A群放流魚体平均F L 4.2
j			支笏湖	流、西別川		cm B W 0. 4 5 3
			1,135,0 0 0	最上流	下流	放流総重量360kg
1		-	12月移殖	799,000	146,000	B群放流魚体平均F L1 5.4
4 3				尾	尾	cm B W 3 7. 3 8
				その他飼育	(100尾	放流総重量 5,4 5 0 kg
					P. Tag)	
				8月採卵		
		4.8		9月移殖		
				アラスカ	飼育	~
				144,000		2
				粒		10005
4 4		1		11月採卵		1,970年(45)5月放流
				12月移殖	· -	
				支笏湖	飼 育	
				1,813,000粒		
		<del></del>				

実施年 生産 年級	1965	1966	1967	1968	1969	備	考
4 5	t.				7~8月採 9月ラフの00 119月月 12月月 1000 10~11 月 10~11 月 10~11 月 1000 10~11 月 1000 10~11 月 1000 1000	1970年度 1971年5月 (アラスカ産、 識)	月 放流 予定

#### 2 43年級群の放流概況

この年級群は第2表に見られる通りA・Bの2群に分けて放流が行なわれた。

A 翻 $\pm$  4 3 年 4 月 に さけ 同様 1 ケ月 程の給餌を行なつたのみで西別川の上流(ふ化場構内) へ Fry で放流された。

B群については、更に飼育を継続し、翌年の春、即ち44年度初頭にSmolt で西別川下流へ輸送して放流した。その概要は次の通りである。

- (1) 放流期間 44・5・24~5・30
- (2) 放流尾数 1 4 6,000尾(5,446kg)
- (3) 放流魚体 BW 3 7.3 g (17.9~73.4 g) FL 15.4 cm (12.6~19.0 cm)
- (4) 放流河川 西別川
- (5) 放流方法 輸送放流
- (6) 放流地点 14線捕獲場下留の下流
- (7) 輸送方法 鉄バイプ・フレーム付ズツク水槽 (4.0 × 1.0 × 0.9 4 m)、酸素補給装置一式 装備した 4 トン積トラツク使用
- (8) 輸送距離 56 km (所要時間80~90分)

#### (9) 標 識 背びれ前部にプラスチツクタツグを取付け

(10) へい死 輸送中770尾がへい死した。これは放流数に含まず。

放流1カ月半前に当る44年4月15日に200尾の標本を抽出して行なつた魚体測定数値は 第3表に示した。

第3表 200尾の標本による魚体測定値(周年飼育群)

44年4月15日測定

	フォーク	ウ・レング	ス(F. L)		体	1	į	(B.W.)
範	囲	尾数	平均標準偏差	範	選	尾	数	平均標準偏差
10.1~	1 1.0	2		14.1~	20.0	1	4	
1 1.1~	12.0	9		20.1~	26.0	3	3	
1 2.1~	1 3.0	5 1	$\overline{F} = 1 \ 3.6 \ 1 \ cm$	26.1~	3 2.0	6	9	W= 3 1.4 2 8
13.1~	14.0	6 9	SFL = 1.0 9 cm	3 2.1~₄	38.0	4	7	SBW = 8.1 6 %
14.1~	15.0	. 55		38.1~	44.0	2	6	
1 5.1~	16.0	1 0		4 4.1~	5 0.0		5	
16.1~	17.0	4		5 0.1~	5 6.0		4	
				5 6.1~	6 2.0		2	
=	it	200		ž	it	20	0	

また、この群の放流後の降海後の動向については第4表のとおりで、これによると6月中旬頃に は多数が沿岸に出現し、6月下旬には外洋に去つたものと考えられる。

第4表 43年級群Smoltの放流後の動行

月旬	放 流 群 の 動 向 概 要	水 温
5月下旬	幼魚146,000尾を放流(河口まで7㎞の地点)	1 0.0 ℃
6月上旬	西別川河口部で曳網を行なつたところ多数(1回約500尾)の放流 幼魚を確認し、これらを再放流した。	1 2.0
6月中旬	床丹沿岸及び走古丹沿岸の定置網に多数乗網した旨、漁業者からの報告を受けた。 とれら乗網魚の一部は再放流された。	床 丹11.8 走古丹10.0
6月下旬	床丹、走古丹沿岸からの乗網報告なく離岸したものと考えられる。	床 丹17.2 走古丹10.0

-122-

#### 放流幼稚魚の河川内における保護

西別川へ放流された幼稚魚についてはひめます種卵から生産されたということから、これら放 流幼稚魚の河川滞留期間をひめますという解釈のもとに河川遊漁者によつて釣獲されることが前 年度事業に係る放流群において聞き込み調査並びに追跡調査で指摘された。このため遊漁者に対 して本事業の主旨説明と保護協力方依頼のためにポスターなどによる協力を呼びかけてきた。

本年度は道と協議の結果、べにさけ生産事業において生産されたひめます幼稚魚は放流時点からべにます(べにさけ)という解釈で扱うことになり、北海道内水面漁業調整規則第22条のべにますの適用を受けることになった。

#### 3 44年級群の採卵・飼育・放流経過

#### (1) 支 笏 湖 産

4 4年度事業用ひめます種卵の移殖は 4 3年12月26日に行ない、27日に虹別事業場へ収容した。移殖卵数は 1,8 1 3,2 0 0 粒でとの卵子の履歴は第3表のとおりである。千才〜虹別間の運搬は自動車便によつて行なつた。

この卵子のふ出月日は1月12日~1月31日であつた。

(第3表) べにさけ還元用ひめます卵の移殖前陸

你沒有类担		移	殖	卵の	内 訳	ï	
収容事業場	採卵月日	採卵数	発眼月日	死卵数	生卵数	移殖卵数	採卵場名
	1 9 6 8 1 0.2 2	粒 132,000	1 1.2 3	粒 5,000	粒 127,000	粒 7 6,0 0 0	ポロピナイ
	1 0.2 5	2 2 80 0 0	1 1.2 7	1 2,5 0 0	215,500	215,500	"
支笏湖	1 0.2 5	1 5 9,0 0 0	1 1.2 7	5,900	153100	153,100	湖畔
事 薬 場	1 0.2 8	3 1 2,0 0 0	1 1.3 0	2 0,0 0 0	292,000	292,000	ポロピナイ
	1 0.3 0	366000	1 2. 2	21,000	3 4 5,0 0 0	3 4 5,0 0 0	湖畔
	小計	1,1 9 7,0 0 0		6 4,4 0 0	1,1 3 2,6 0 0	1,0 8 1,5 0 0	
	1 1. 1	360,000	1 2. 3	17,200	3 4 2,8 0 0	3 4 2,8 0 0	ポロピナイ
	1 1. 3	279000	1 2. 5	1 0,2 0 0	268800	268800	湖 畔
千 歳	1 1. 5	3 1 2,0 0 0	1 2. 7	1 6,5 0 0	295,500	1 2 0,0 0 0	ポロピナイ
事業場	小 計	9 5 1,0 0 0		4 3,9 0 0	907,100	7 3 1,6 0 0	į.
合	計	2,1 4 8,0 0 0		108300	2,0 3 9,7 0 0	1,8 1 3,2 0 0	7

-123-

#### ① 飼育経過

この群は3月3日から給餌を開始し、ふ化槽での飼育期間は前年度同様に進行したが、しかし、5月21日~6月24日までの約1ケ月間の収容に当てた中央湧水池内設置の金網生簑(39個設置)における飼育期間中に多数の斃死魚が発生した。

この経過について述べると、収容日から11日目後の6月8日頃から金網生資設置場所の中央部付近の生資から斃死が多く見られ、数日後には多数の斃死魚が出るに至つた。当時は1日約15,000~20,000尾位の斃死があり、こうした状態が連日続いたため6月24日、生資内での飼育を中止して全数を中央湧水池全面へ放養したところ斃死はとまつた。

この多数斃死の原因は金網生簀の過密設置に伴なう池水の循環が停滞したことによるものと考 えられる。

この群の給餌は昭和44年3月3日から開始し、昭和45年5月8日に終了し、通算431日で、飼育成績は第4表のとおりである。

この間の総投餌料は29,388k&歩留り834,000/1,676,900=49.7%、給餌開始時の平均魚体フオークレングス2.7cm、魚体重0.1%、終了時のフォークレングス15.4cm、魚体重38.9%となつている。

食司	育 期	目	飼育	計 量	浮上	魚体	給餌量	餌料	水温(%	2)
年月	日~日	日数	尾 数	重量	体長	体重	阿田田風	PTAT	低~高	平均
44. 3	3~31	28	1,6 7 6,9 0 0	k & 1 6 7.7	cm 2.7	0.1	k8 170	粉	9.6~ 9.9	9.8
4	1~30	3 0	1,6 3 3,3 0 0	2 7 7.6	3.1	0.2	165		9.6~1 0.1	1 0.0
5	1~31	3 1	1,6 2 5,3 0 0	7 1 5.0	3.9	0.5	430		9.0~ 9.8	9.5
. 6	1~30	30	1,619,700	1,604	4.5	1.0	656		9.8~1 0.2	9.9
7	1~31	31	1,201,900	1,803	5.3	1.5	1,3 9 5	16.2	9.8~1 0.0	9.9
8	1~31	31	1,108,400	2,993	6.4	2.7	1,360	No. 2 No. 3	9.8~1 0.1	1 0.0
9	1~30	30	1,080,000	6,3 7 0	8.1	5.9	1,5 3 4	16. 3 16. 4	9.8~1 0.2	1 0.0
10	1~31	31	1,059,700	1 1,7 6 0	9.9	1 1.1	2,300	70. 4 C	9.0~1 0.0	9.3
11	1~30	30	1,0 4 4,7 0 0	1 6,7 2 0	1 1.1	1 6.0	2,440	No. 4	9.0~ 9.3	9.1
12	1~31	3 1	1,0 4 4,5 0 0	21,830	1 2.3	2 0.9	3,220	No. 4 No. 5	9.1~ 9.3	9.2
45. 1	1~31	3 1	1,039,800	27,450	1 3.4	26.4	2,950	1	8.9~ 9.1	9.0
2	1~28	28	1,034,700	28,140	1 3.9	2 7.2	3,6 4 0	16.5 p	8.8~ 9.0	9.0
3	1~31	3 1	1,0 2 9,7 0 0	3 0,9 9 4	1 4.4	3 0.1	4,3 4 0	"	8.9~ 9.2	9.0
4	1~30	30	1,0 2 9,2 0 0	3 3,3 4 6	1 4.6	3 2.4	3,630	"	9.6~ 9.9	9.8
. 5	1~ 8	8	1,0 2 8,7 0 0	4 0,0 1 6	1 5.4	3 8.9	1,1 5 8	"	9.7~ 9.9	9.8
		431					29,388		8.8~1 0.2	

#### ② 飼育中のへい死原因

- i 3月中のへい死43,600尾は餌付時期の減耗で、臍のう未吸収のもの、および餌を取れない虚弱なものが脱落した。
- ii 4月、5月は極めて順調な状態で、へい死は微々たるものである。これらは最初の餌付時に 餌を取れなかつた虚弱体質のものであつた。
- iii 6月のへい死4 1 7,800 尾は5月までぶ化槽で飼育していたものを、屋外の幼魚池に生簀39個を設置し、これに移収したところ6月8日頃から中央部の生簀にへい死が目立ち、以後増加の傾向を示し、1日15,000~20,000尾のへい死を見た。これらのへい死魚は特に大型で、その時点まで極めて健康であつたものが多かつた。

種々調査の結果、大量の生質を設置したため水の環流が行なわれずに停滞したため多少それ に関連したため二次的な障害も見られたが、6月24日に生質を撤去し、池一面に放養したと ころへい死は急激に減少した。

- iii 7月のへい死9 3,5 0 0 尾は 6月の生簀飼育中に疲へいしたものが回復に致らずにへい死したものである。
- V 8月中のへい死28,400尾は主に排水口魚止スクリーンに付着したもので、魚体は小型の ものが多く、虚弱魚と思われ、特に明瞭な魚病現象ではない。

рн	DO	水量	飼育	斃死尾数	放	i	流	数	放流	魚体	1尾当	126 = 11.	Atta -ty.
- 11	(RB	€/分	面積	死70尺数	尾	数	重	畳	体 長	体 重	增重量	增重比	備考
7.2	10	18	42	尾 43,600		尾		kg	cm	д	0.07	1.7 0	
			"	8,0 0 0							0.27	2.6 0	4
7.2			"	5,6 0 0							0.5 5	2.3 0	1 20
"			"	4 1 7,8 0 0							0.5 1	1.50	
"		-	"	9 3,5 0 0							1.20	1.8 0	
"	10	1,	087.7	2 8,4 0 0							J.2 0	2.18	
"	"	1	"	2 0,3 0 0							5.20	1.88	
"	"		"	1 5,0 0 0							4.90	1.44	
"	"		"	200							4.90	i.30	
"	"		"	4,7 0 0			*				5.5 0	1.26	-
"	"		"	5,1 0 0							0.8.0	1.03	
"	"		"	5,000	-						0.29	1.10	
"	"		"	500							2.3 0	* 1.08	
"	"		"	500							6.50	1.20	へい死取揚時
//	"		"	470									9 0 7
7.2	1.0			8 4 2,9 0 0	8 3 4,0	00	3 2,9	3 1,0	1 5.6	3 9.3	3 9.2	3 9 3.0	不明193,323

#### ③ 放 流

放流はアラスカ産と一緒に無標識で西別川へ放流した。

5月1日現在数1,028,300尾取場実数838,907尾へい死魚907尾行方不明189,393尾放 流数834,000尾

#### 2 アラスカ産

#### 種卵の移殖並びにふ化

本事業に新たに加わつたアラスカ産べにさけ種卵はアメリカ、アラスカ州のベア・レイクにそ上した親魚から採卵された(採卵月日、43年8月9日)170,000粒に係るもので、これらは一旦、現地の立体式ふ化室に収容され発眼卵146,000粒として、ダンボール製卵子運搬箱2個に収納され、9月18日に発送、日本(羽田空港)へは9月19日到着した。北海道(千歳空港)へは同日の20時30分に到着し、これを受取り直ちに千歳支場第2ふ化室アトキンス式 ふ化槽に収容して後9月26日に試験卵2,000粒を残し、144,000粒を汽車輸送して虹別事業場へ収容した。この種卵は日鮭協が購入し、当場へ寄贈されたものである。

この卵子に係るふ化状況については千歳支場ふ化室収容中に早期る出卵が発見され、このふ出 稚魚は数分で運動不活発となり斃死していくため、卵膜硬化の目的と消毒を兼ねて過マンガン酸 加里1/4万溶液滴下法を30分間行なつた。虹別事業場へ収容して後も、なお、異常ふ出が続い いたため10月5日、更に第2回目の過マンガン酸加里の滴下を行なつたが、本格的なふ出が開 始したため以後は中止した。ふ出は10月9日~10月21日で上述の状態のためふ化成績は極 めて不振であつた。(本誌昭和42.43年度、P27~29参照)

ふ化成績の概要は第5表の通り。

第5表 べにさけ種卵の履歴

種卵	種卵生産地アラ	スカ・ベアレーク
の	採卵月日昭和	143年8月9日
生産	発 眼 月 日	
	移殖月日昭和	143年9月18日(アラスカ発)
種	移 籍 卵 数 17	0,000粒
卵	死 卵 数 2	4,000粒(14.1%)
移	移 殖 卵 数 14	6,000粒
殖	仮 収 容 月 日 昭和	143年9月19日(千才事業場)
	内2	千粒は試験卵として千才事業場で管理
収	移殖月日昭和	143年9月26日
容か	移 殖 卵 数 14	4,000粒
ら浮	死 卵 数	5,760粒
上	収容生卵数 13	8, 2 4 0 粒
収容から浮上までの	死 卵 数 7	4,7 4 0 粒
成績	浮出尾数 6	3,500尾(ふ化率 4 4.1 %)
成績		3,500尾(ふ化率 4 4.1 %) 0,100尾

#### 飼育経過

本年度事業から、収容した全数について周年飼育することになり、今まで周年飼育群に当てていた中央試験池をアラスカ産べにさけ飼育池とし、また、中央湧水池を周年飼育池として整備し、これを支笏湖産ひめますの飼育池に当てることで事業を進めた。

との群の給餌開始は昭和43年12月1日で、終了は45年4月8日、通算524日間で、飼育 成績は第6表のとおりである。

この間の総投餌料 3,6 2 0.2 kg 、歩留り 5 3,0 0 0 / 6 0,1 0 0 = 8 8.2 %、給餌開始時の平均魚体フォークレングス 2.6 cm、魚体重 0.2 %、終了時のフォークレングス 1 5.6 cm、魚体重 3 9.2 %となつている。

第6表 昭和43年アラスカ産べにさけの飼育成績

餇	育 期	間	飼育	量	浮上	魚体	4人。班 园	餌料	水温	(°C )	DI
年月	日~日	日数	尾 数	重量	体長	体重	給餌量	114 科	低~高	平均	PH
4 3.1 2	1~31	3 1	6 0,1 0 0	k & 1 2.0	cm 2.6	0.2	k & 4.0	ş.t	8.8~ 9.2	9.0	7.2
44. 1	1~31	3 1	5 8,6 0 0	1 3.5	2.8	0.23	4.5		8.6~ 9.2	9.0	"
2	1~28	28	5 8 1 5 0	1 5.6	2.8	0.27	8.7		8.8~ 9.0	8.9	"
3	1~31	31	5 7,8 7 0	2 4.8	4.1	0.43	3 7.0	.70	8.8~ 9.0	8.9	"
4	1~30	30	5 7,6 7 0	6 3.4	5.1	1.1	36		9.3~1 0.2	9.7	"
5	1~31	31	5 7,5 2 0	8 0.5	5.3	1.4	50		9.3~1 0.2	9.7	"
6	1~30	3.0	5 7,4 0 0	1 0 3.3	6.0	1.8	60		9.5~1 0.3	9.8	"
7	1~31	31	5 7,2 0 0	1 5 4.6	6.5	2.7	7 1		9.5~1 0.2	9.8	"
8	1~31	31	5 7,1 7 0	2629	7.7	4.6	122	16.3 c	9.8~1 0.2	10	"
9	1~30	30	5 6,7 4 0	444	9.1	7.8	200	No. 4	9.0~1 0.1	9.9	"
10	1~31	31	5 6,8 8 0	666	1 0.6	1 1.7	309	"	9.0~1 0.0	9.3	"
11	1~30	30	5 6,8 2 0	995	1 1.7	1 7.5	301	"	9.0~ 9.3	9.1	"
12	1~31	31	5 6;7 6 0	1,192	1 2.5	2 1.0	369		9.1~ 9.3	9.2	"
45. 1	1~31	31	5 6,7 0 0	1,4 2 9	1 2.9	25.2	442	16.5 p	8.9~ 9.1	9.0	,,
2	1~28	28	5 6,6 4 0	1,5 7 0	1 4.1	27.7	440	"	8.8~ 9.0	9.0	#
3	1~31	31	5 6,5 8 0	1,7 1 0	1 4.8	3 0.3	531	, "	8.9~ 9.2	9.0	,,
4	1~30	30	5 6,5 2 0	1,893	1 4.9	3 3.5	571	"	9.6~ 9.9	9.8	. #
5	1~ 8	8	5 6,4 6 0	2,2 1 3	1 5.6	3 9.2	64	. ,	9.7~ 9.9	9.8	//
計	!	5 2 4	alst si	E I	, .		3,6 2 0.2	102.4	8.6~1 0.3		7.2

#### 放 流

アラスカ産べにさけ(1968・8・9採卵)支笏湖産べにさけ(1968・10・22~1・5採卵)は1970・5・14~5・27まで14日間に亘り西別川へ放流したが、放流に先立つて行方不明魚があり、これらの内容については次のように考えられる。

- ① 5月9日~12日にかけて断続的な集中降雨があり、このため飼育池水門(注水)が決壊して 約10万尾が構内各水路に逃逸した。
- ② 集魚取場時に混入していたかわます、あめますによる食害約7万尾・
- ③ ふくろう、たか、からす、とびなどによる鳥害と考えられるもの約2万尾

DO	水量	飼育	斃 死	放资	<b>范</b> 数	放流	魚体	1尾当	増重比	備考
(ppm)	化/分	面積	尾 数	尾 数	重量	体長	体重	增重量	垣里几	
		$m^2$			k 8	ст	8	8		2.000
9.8	68		1,500					0.03	1.20	47 - L K
10	"	16	450		- 6			0.04	1.1 3	5 - 4 - 9
"	"	"	280	Į.	1 - 1			0.16	1.6 0	
"	"	"	200	_			_ =	0.6 7	2.5 0	
"	"	"	150					0.3	1.30	
"	"		120					0.4	1.3 0	
"	"	,	120	-,-				0.9	1.50	2 1 - 1
"	"	"	110	-				1.9	1.70	= -
"	"	"	230					1.1	1.2 3	
#	"	".	60					3.9	1.50	,
"	"	.//	60		-			5.8	1.50	
#	"	"	60	*				3.5	1.20	
//	"	- <i>#</i>	60					4.2	1.20	W = 1
"	"	3 4 6	6.0					2.5	1.10	
"		"	60					2.6	1.10	
#		"	60					3.2	1.1 0	
"		1,0 8 7.7	60	,				5.7	1.1 7	
"		"	3 0					4.2	1.09	へい死:取場氏 57
9.8~10			7,100	5 3,0 0 0	2,284.3		4 3.1	4 2.9	2 1 4.5	不明 3,3 0 3

状況観察およびサンプリング調査(かわます、あめますなど)によつて、以上のように減耗した ものと推定される。

5月1日現在数56,360尾取場実数53,057尾へい死魚57尾行方不明3,300尾放流数53,000尾

#### 4 41・42年級群の回帰状況

本年度の回帰期待魚としては42年3月に放流した群(14,000尾)が4年魚として、また、べにさけ生産事業の第1年目で生産して稚魚で42年9月に放流した192,800尾、ならびに周年飼育して幼魚で43年5月に放流した108,000尾がそれぞれ3年魚として西別川沿岸域および西別川へ回帰することが期待されていたところ、5月下旬頃から根室海区沿岸定置網にべにさけが漁獲されていることが報告され、調査したところ漁獲魚の標識から、べにさけ生産事業で生産して西別川へ放流した幼魚がべにさけ成魚となつて回帰したものであることを確認している。

この回帰べにさけの沿岸漁獲状況及西別川へのそ上状況は第7表に表示したとおりである。これらの回帰魚が漁獲された状況を図示すれば第1図のとおりである。

本年回帰が予想されるのは前述の通り 4 1年級群と 4 2年級群の A・B群であるが、現実に回帰が見られたのは 4 2年級群の B群が圧倒的に多く、 4 1年級群の 4年魚は僅かに 4尾であつた。そして 4 2年級群の A群は全く 1尾も確認されなかつた。この様に回帰数に差があるのは放流の方法にその要因がひそんでいるものと考えられる。

今年回帰を確認した尾数は沿岸で漁獲されたもの118尾、河川にそ上して捕獲されたもの223尾に達し、未報告、未確認を合せると400尾位にはなつているものと考えられる。回帰した各年級及放流群の識別は標識と年令、魚体によつて明瞭に区別ができた。

# (1) 沿 岸 漁 獲 沿岸で最初に漁獲報告があつたのは5月下旬で遂時その数を増し7月下旬にピークが見られ 8月には急激に減少し、9月には全く漁獲が無くなつている。漁獲範囲は釧路の昆布森から羅

<b>第7表 ベルさけの旬別沿岸漁獲数(1969</b>		9	6	9	(1	けの旬別沿岸漁獲数	べにさけの	第7表
------------------------------	--	---	---	---	----	-----------	-------	-----

月	旬	尾 数	漁 獲 地 区	備	考
5	F	3	走古丹	内 4 年 魚 2	
6	上	2	走古丹	3年魚	
	中	4	走古丹	"	
	下	6	走古丹、別海、野付	"	
7	上	1 7	走古丹、别海、野付	"	
	中	2 8	野付、標準		
	下	4 3	野付、標準、昆布森	,	
8	上	8	羅白、風連	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	中	1	野付	"	
	下	6	漂津	"	
i	+	1 1 8	羅 白 ~ 釧 路 沿 岸		


臼にかけての沿岸であるが、量的には西別川河口を中心に左右40kmの範囲が多かつた。とのことは西別川への回帰を示すものと考えられる。旬別の沿岸における漁獲尾数は第7表に示した通りである。


亦、今回見られたべにさけのうち標準、野付方面で漁獲されたものが標準漁協の市場に集荷されたり売りされたが、そのうち20尾の測定値は第8表のとおりである。

第8表 西別産べにさけの魚体 (支笏湖産ひめますの還元改良型) 1969年回帰群(沿岸)

標本	全長	F 長	体 長	頭長	体 重	年令	備	考
番号	cm	cm	cm	cm	k8	13		
1	4 2. 5	3 9. 5	3 7. 5	8. 0	0.6	3	脂ビレ、左腹ビレ欠	
2	4 6. 0	4 3.0	4 1.0	8. 5	1.0	3	"	-
3	4 4. 5	4 3. 0	4 0. 0	9.,0	0. 8	3	"	
4	4 2.0	4 0.0	3 8.0	8. 5	0. 7	3	"	
5	4 6.0	4 4.0	4 1.0	9. 5	1.0	3	n n	
6	4 2.0	4 0. 5	3 8. 0	9. 0	0. 7	; 3	,	
7	4 4. 0	4 2.0	3 9. 0	7. 5	0.8	3	"	110
8	4 2.5	4 0. 5	3 8.0	8.0	0.8	3	,,,	
9 .	4 6. 0	4 4.0	4 0.0	8. 0	1.0	3	,,	
10	4 6.0	4 2.0	4 0. 0	9. 0	0.8	3		
11	4 5.0	4 3.0	4 0.0	1 0.0	0.8	. 3		
12	4 5. 0	4 4.0	3 9. 0	8. 5	0.8	3	,,	
13	4 3.0	4 0. 5	3 8. 5	8.0	0.6	3	# 144 PA	1.5
14	4 8. 0	4 5. 0	4 2.0	1 0.0	0.8	3	//	
ì 5	5 0.0	4 7. 0	3 6.0	1 0.0	1. 2	3	" The state of the state of	
16	5 5. 0	5 1. 5	4 9.0	1 0. 1	1.5	3	# / In	
17	4 8. 5	4 7. 0	4 4. 5	9. 5	0.8	3	"	
18	4 9. 0	4 7. 8	4 5. 8	9. 8	1. 0	3	,	w. P
19	4 9. 0	4 7. 0	4 4. 7	9. 6	0.8	3		
20	4 4. 0	4 3. 0	4 1. 5	8. 5	1.0	3		

以上標準漁協市場で測定(7月中)





#### (2) 河 川 (西別川)

河川では西別川にのみそ上が見られ、他の隣接河川には全くそ上がなかつた。このことは母川 回帰性が極めて強いことを示しているものと考えられる。

西別川は水源より河口まで約90kmあり、ふ化場はその最上流の水源に位置する。一方親魚の捕獲場は河口より約10km上流の地点にあり、ふ化場から約80km下流に位置する。この補獲場は西別川本流を二重の柵で仕切り、上流の柵に捕獲槽が取付けられ、これに入つた親魚が捕獲される仕掛けとなつている。そして未熟のものは再び河川内に戻されるが、下流に設置されている柵によつてそれより下へ降下することは不可能となつている。従つて、天然の蓄養池ともなつている。この捕獲場では毎年5月からさくらますの捕獲をもつて開始されるのでべにさけの捕獲は最初から掌握することができる。

西別川で最初に補獲されたのは、沿岸で最初に漁獲が見られてから約1ヶ月を経た6月26日であつた。以後、断続的に補獲があり、8月中旬にピークを見ている。捕獲期間中の西別川の水温は別表の通り最高19.0℃から最低6.0℃の範囲にあつた。

第9表 べにさけそ上期間中の西別川の水温

(A·M 10.00)

月 旬	平均	最高~最低	備	考
6月下旬	1 5.4	1 6.5~14.0	1969年	
7月上旬	1 3.4	1 6. 0 ~ 1 2. 0		
中 旬	1 5.7	1 9. 5~ 1 3.0		
下 旬	1 6. 5	1 8. 5 ~ 1 5. 0		
8月上旬	1 5.3	1 5. 6~1 4. 0		
中 旬	1 4.3	1 6.0 $\sim$ 1 3.0		
下 旬	1 4.2	1 6.0 ~ 1 3.0		
9月上旬	1 3. 6	1 7. 0 ~ 1 3. 0		
中旬	1 4.5	1 5.0 ~ 1 2.0		
下 旬	1 0. 5	1 2.0 ~ 7.5		
10月上旬	8. 3	9: 5 ~ 6.0		

これらの西別川そ上べにさけは沿岸で漁獲されているものと全く同型のもので、 標識も明瞭であった。

体色は8月中旬頃までは少少青味がかつた銀色で未だ第二次性徴が現われず、性比の区別は困難であつた。これらのそ上親魚は河川内で成熟するか否かについては、多くの疑問があつたので、初期の一部を調査のために取掲げたほか、8月20日までに捕獲されたものは、これより上流の虹別ふ化場構内にある湧水池へ輸送され成熟まで蓄養を行ない、採卵の実現に挑戦することとなった。これらが運ばれた湧水池中は、彼等が2年前に淡水生活を過した池である。水温は常時10℃である。8月20日以降は、河川内(二重止)で成熟させ採卵が可能かどうかをテストするために一旦捕獲したものを標識(ブラスチック・タグ)を附して再び河川へ戻した。それらの尾数は91尾に達し、10月4日まで捕獲が続いた。

これらのべにさけは少少第二次性象が現われ、性別が明瞭となつた。 8月20日以降の性比は 91尾中含が67、早は24尾であつた。この様に含が圧倒的に多く見られたのはこの年級群は 本年が3年目に当り、通常さけに見られる様に、若令の場合含が多く回帰するのと似た現象であるのか、発生時点から含が多く出現したためか、現在のところ明らかでない。これは明年の4年 魚、又、放流幼魚の性比を調査することで明らかとなろう。

今回、西別川に回帰したべにさけのうちにからふとますによく見られるネットマークが認められたものがあつた。このことは流網操業区域を回遊して来たことが想像される。そ上期及沿岸漁 獲期が、当地方におけるさくらますとからふとますの中間的期間に入つていることなど、今年回 帰した群は近海回遊と考えられる。

西別川で捕獲した記録は別表の通りである。これらの大部分は 4 2年級群であるが、僅かに 2 尾のみ 4 1年級群 (4年魚)が確認された。

第10表 西別川べにさけ捕獲実績

19	69	捕	獲	数	蓄養数	二重止内	調	査	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
月	日	8	우	計	(活魚輸送)	還元	取	揚	
6	26			13				3	銀毛のため性別不能
7	3			3				3	
	7			1				1	
	10			2				2	
	11			1				1	ネツトマーク 1 尾あり
	18			8 7	8 5			2	浅プナ1尾
	21 26			11	10		1	1	水生菌附着せるものあり
	28			5	4			1	MCLESTON CO.
	30			6	4			2	
8	2			3	3				腹にトツカリ傷あるもの1尾
	4			7	7				
	- 5			6	6				
	10			18	15			3	
	12			5	5				
	14			10	10				
	15			10	10		1		
	17			6	4			2	
	20			8	7			1	
	22	4	1	5		5			本日以降、河川内 2重留に還元したもの
	25	3		3		3	1		については再捕が確認されず、その後の
	26	5	4	9		9			動態は不明
	29	2		2	-	2			
9	1		3	3		3			
	4	5	1	6		6 5			
	5	2	3	5		4			
	6	3	1	4 2		2			
	7	1 1	1 2	3		3			Circle Control
	8	3	1	4		4			
	10	2	1	3		3			
	11	4	- ^	4		4			At an analysis of the state of
	12	6	2	8		8			British Arman San Carlo
	13	4	4	8		8			
	14	2		2		2			
	15	7		7		7			
	16	2	1	3		,3			9
	17	1	1	2		2			
	20	4		4		4			
	21		1	1		1			A Company Res
10	2	2		2		2			
	.4	1		1		1	1		
				223	98	91			

### 5 45年級群の採卵及ふ化概況

### (1) 支笏湖産

昭和44年10月25日から11月1日までに採卵したひめます発眠卵830,500粒を12月23日移殖、24日虹別事業場に収容し、昭和45年3月1日から餌付けを開始した。

### 移殖 経 過

移殖卵の履歴は第15表のとおり。

第11表 昭和44年度支笏湖産ひめます卵の履歴

採卵月日	採卵数	発眼前死卵数	移殖卵数	採 卵 場
10 • 25	24,700粒	200粒	2 4,5 0 0 粒	湖畔
10.29	1 9 8,0 0 0	3,800	1 9 4,2 0 0	я
10 . 25	1 5 6,0 0 0	3,200	1 5 2, 8 0 0	ポロピナイ
10.29	3 1 2,0 0 0	6,000	3 0 6,0 0 0	"
11. 1	1 5 6, 1 0 0	3,100	1 5 3,0 0 0	,
合 計	8 4 6, 8 0 0	1 6,3 0 0	8 3 0,5 0 0	

支笏湖事業場から虹 別事業場までの輸送の経過については第16表のとおり

第12表 輸 送 の 経 過

	出 発		到		着		備		考	
場	所	日	時	場	所	日	時	упз		
支笏	湔	23. 11:	00	千歲	左場			官用車、	卵温 7. 2~7. 3℃	
千	蔵	13:	00	本	場	1	4:30	官用車		
本	場	21:	30	札幌	駅			タクシー	、卵温 4.4℃	
札	幌	22:	25	紃	路	24.	9:31	鉄道(夜	行普通)	,
釽	路	10:	06	磦	茶	1	1:20	" (	" )	
標	茶	12:	30	虹.	別		13:00	官用車		

虹別事業場到着時の卵温3.8℃、ふ化用水温9.1℃

### ふ化経過

卵子収容から飼育を開始するまでのふ化成績については、第17表のとおり。

第13表 昭和44年支笏湖産ひめますのふ化成績

採卵	発 服	& 出	収容卵数	死卵数	多出数	%	備考
44	4 4	45	粒	粒	尾		
10.25	11.29	1 • 4	24,500	2,200	175,100	98.8	第1ふ化室収容
, ,	"	"	1 5 2,8 0 0	j .			
10.29	12 • 3	1 . 8	194,200	5,100	495,100	98.9	
"	"	"	306,000	1}			
11. 1	12. 6	1 · 12	153,000	900	1 5 1,6 0 0	9 9.1	
合		+	830,500	8,700	8 2 1,8 0 0	9 9.0	

### (2) アラスカ産

日本鮭鱒資源保護協会から寄贈されたアラスカ産べにさけ卵は9月6日、千歳空港で受領した。 この卵の履歴は次のとおり。

第14表 昭和44年アラスカ産べにさけ卵の履歴

採卵月日	剪	数	備		考
44.7.25	3 5,	000粒	1008° F	(積算温度	)
8 · 1	7 2,	,000	8 2 9	( "	)
8 . 3	4 8,	0 0 0	6 5 2	( "	)
計	1 5 5	0 0 0			

発送から千歳空港までの経路は次のとおり。

発送元 Alaska Department of Fish Game

経 路 Anchorage International Air Port North West Orient Airline(NWL) 羽田国際空港(16:10着)

羽田空港から虹別事業場までの輸送経過は次のとおり。

第15表輸送の経過

		-1	1111							
1		出 発			到	着		備	考	
	場	所	日	時	場	所	日	時	Vis	~
	羽田	空港	6日 1	9:55	千歳	空港		21:10	日本航空525便	-
					江	別		22:15	乗用車(空港~江別)	
	江	別	2	2:52	釧	路	7日	9:41	鉄 道	
	釧	路	1	0:03	標	茶		11:25	鉄 道	
-					虹別	事業場		12:00	官用車使用(標茶~如	[別]

### 千歳空港における卵子状況

空港には予定より35分遅れ21時10分到着した。各輸送箱毎の点検結果、異状がなかつた。 最上段に入れた氷は充分残つていた。1段目の卵温は9℃、最下段は14℃で5℃の差があつ

破損した卵盆1枚については別に取替えて卵を入れ替えた。また、各箱の氷は補充した。

### 輸送経過

鉄道は札幌駅から積込む計画をたてたが、空港到着時刻の遅れから、江別駅に変更した。 列車内で処置した事項は次のとおり。

- ① 卵の状況検査
- ② 卵温の測定
- ③ 氷の補充
- ④ 底にたまつた触水の処理

輸送中の卵温、室内温度との測定結果は次のとおり。

第16表輸送中の測温結果

月日	時 刻	外気温度	車内温度	卵 温	備考
		℃	°C	°C	
9 . 7	01:00		2 5. 5		スチームは極く僅か。
	02:00			1 段 目 1 2.0	卵子異常なし。
	06:15		2 8. 0		
	06:30			次のとおり	上段、下段に温度差があるので、順 序変更

採 卵 月 日	1 段 目	3 段 目	5 段 目
7. 2 5	1 3.0 ℃	1 7. 0 ℃	1 8. 0 ℃
8. 1	1 3.0	1 7. 0	1 8. 0
8.8	1 1.0	1 4.0	1 6.0

月日時刻	外気温度	車内温度	卵 温		備	考	
	°C	°C	٠,	rc			
08:00	1 6.0	2 3.0			各箱の氷袖充		
12:00					虹別事業場到着		

卵子の収容は12時45分に完了し、アトキンスを化盆42枚に収容したが、収容前の卵温は 次のとおり。

第17表 収 容 時 の 卵 温

1 段 目	2 段 目	3 段 目	4 段 目	5 段 目
1 4 °C	1 3 ℃	1 3 ℃	1 3 ℃	18℃

#### 収容後の卵数実測結果は次のとおり。

採卵月日	輸送卵数	死 卵 数	収 容 卵 数
7 . 2 5	3 9,0 0 0	2 0 0	3 8,8 0 0
8 • 1	7 7, 0 0 0	2 0 0	7 6, 8 0 0
8 • 8	5 3, 0 0 0	100	5 2,9 0 0
승 計	1 6 9,0 0 0	5 0 0	1 6 8, 5 0 0

### ふ化経過

卵子収容から飼育開始までのふ化成績概要は次のとおり。

移 殖 卵 数 169,000粒 死 卵 数 500粒 収 容 卵 数 168,500粒 死 卵 数 14,000粒 ふ 出 尾 数 154,500尾 44・9・17~10・12

浮 上 数 152,500尾 44 \* 10 \* 18~

### 飼育経過

飼育は11月1日から餌付けを開始した。全数を第1な化室の2間槽10本を使用し、水量は1カラン当り27ℓ/mmとした。給餌開始1週間は餌付用ル1クランブルを水で溶いて少量づつ1日3回投与したが、摂餌状況は非常によく、その後1日4~5回投餌し、徐々に給餌量を増加した。12月中旬、な化槽を14本、3月には28本に増加した。

飼育成績は第19表のとおり。

第19表 昭和44年アラスカ産べにさけ飼育成績

	餇	育期間	1	飼育		量	浮上魚体		給餌量	餌料	水温(℃)		PH
年月	1	日~日	日数	尾	数	重量	体長	体重	和評里	B4 4千	低~高	平均	III
44.1		1~30	30	1 5 2,	500	k % 28.8	cm 2.6	9 0.16	k 8. 5	<i>№</i> . 1 с	9.0~9.3	9.1	7. 2
1	2	1~31	31	1 4 8,	900	3 2.7	2.98	0.22	18	#	9.0~9.1	9.0	"
45.	1	1~31	31	1 4 5,	800	7 1.4	3.7	0.49	37	"	8.7~9.0	8.8	"
	2	1~28	28	142,	500	99.7	3.7	0.7	40	<i>№</i> . 2 c	8.7~8.8	8.7	"
	3	1~31	31	142,	400	132	4.5 6	0.93	90	%, 3 с	8.9~9.2	9.0	"

DO	水量	与否不结	斃 死	現	在	数	放流	魚体	1尾当	增重比
(ppm)	2/分	飼育面積	尾数	尾	数	重量	体長	体重	增重量	石里儿
1 0	2 7	2 K槽 1 0本	3,600	148	3,900	k & 32.7	cm 3.0	0.22	0.07	1.47
"	"	14本	3,100	145	0 0 8,5	71.4	3.7	0.4 9	0.27	2.22
"	"	"	3,300	142	2,5 0 0	9 9.7	3.7	0.7	0.21	1.40
//	"	"	100	142	2,4 0 0	132	4.5 6	0.93	0.23	1.3 2
"	"	2 8本	130	142	2,270	292	3.83	2.05	1.1 2	2.20

### (3) 西别川産

前述 § V-2に報告した通り、西別川へは223尾がそ上を確認され、このうち98尾を虹別 あ化場の湧水池へ運ばれた。これらは成熟するまで蓄養された。これらは9月上旬頃より少々黒ずんで、銀色は消失し、尾柄部より赤珠を帯び、日数を増す毎に頭部へと進行し、10月10日頃には、頭部と各鰭を残して赤色に染り、沿岸及河川内で捕獲した時の魚体とは全く変つてしまった。又、3の成熟体型はからふとますのそれと極めて類似していた。

第二次性徴が明瞭となつてから、選別池へ移収し、更に成熟が進行した。 は雌雄別の生贄に収容して採卵適期を待つた。

最初の採卵は10月20日に行なつたが、1尾のみで他は未だ完熱の状態ではなかつた。その後3日を経て10月24日に7尾の採卵を実施し、最終採卵は11月1日となつた。かくして26,900粒の採卵を得たが、これは戦後初のべにさけの採卵となり、我国さけ・ます増殖史上に歴然と残る記録となつた。

採卵実績は下表の通りである。

第20表 44年度西別産べにさけ採卵成績

40 00 0	使	Lera	rin	W.C.			
採卵月日	۶	8	計	採	卵	数	
1969 10.20	1	1	2		9	0 0	粒
10.24	7	5	1 2	1	2, 4	0 0	
10.27	6	4	1 0		8, 3	0 0	
11. 1	4	2	6		5, 4	0 0	
討	1 8	1 2	3 0	2	7, 0	0 0	

亦、蓄養以来2ヶ月以上を要したわけであるが、この間の斃死及雌雄別は下表蓄養成績の通りであり、性比のアンバランスのため蓄養数の割には採卵成績が振わなかつた。

第21表 44年度べにさけ蓄養成績

菩	蓍 養 数			死	数	1	吏 用 親	魚	CASE .	_t/_
9	8	計	우	8	数	우 중	計	備	45	
2 2	7 6	9 8	4	2	6	1 8	1 2	3 0		

今回の採卵によれば、♀1尾当りの平均採卵数は1,500粒となったが、斃死魚の魚体測定の結果は以下であった。

第22表 卵数調查表

調查月日	FL	BL	$\mathrm{HL}_{\mathit{cm}}$	BW k &	GW <sub>g</sub>	孕卵数	備考
7 . 2 1	4 0.4	3 7. 7	8.0	0.75	20.5	2.0 6 1	孕卵数内訳大1546、小515
10.14	44.0	41.5	10.5	1.00	38.5	2,202	未熟

上表のうち7月21日に測定したものは未熟で卵巣重量は催かに20gにしか達しておらず卵粒も大小があり、大粒のものが1,546粒、小粒のものが515粒を算えた。これらのうち小粒のものは成熟進行と共に胎内へ吸収消失してしまうものと考えられ、40cm程度の魚体では1,500粒が平均採卵数になるであろうと試算されていた。

今回回帰したべにさけから以上の通り 2 7,0 0 0 粒の卵を得たが、これらのふ化成績は下表の通りで 2 5,5 0 0 尾のふ出稚魚を生産した。これはひめますを改良して創り出した、いわば純国産のべにさけ稚魚の最初のものであり、国産第1年級群として昭和47年の春に放流されるべく、目下飼育中である。

第23表 国産べにさけのふ化成績

採	卵	発	眼	S	出	収容卵数	死卵数	ふ出数	96	備	考
44				4.5		粒	粒	尾			
10.	20	11.	28	1.5	~1.15	900	50	850	9 4.4	第1ふ化	室に収容
10.	24	12.	1	1.9	~1.19	12,400	700	11,750	9 4.4	}	
10.	27	12.	4	1.12	~1.22	8,300	. 500	7,800	94.0		
11.	1	12.	9	1.16	~1.26	5,400	250	5,1 5 0	95.4		
	合			E C	H	27,000	1,500	25,500	9 4.4		

## § 12 ますのすけ増殖事業

### 1 種卵の移殖経過

ますのすけ種卵は前年度に引続き日本鮭鱒資源保護協会が米国ワシントン州(ワシントン州立 大学)から購入して水産庁北海道さけ・ますふ化場および北海道庁へ寄贈されたもので、昭和 42年から4カ年の計画で進められている。

本年度は 100 万粒を当場に寄贈する予定であつたが、次のとおり 3 回に亘り 448,000 粒の受入れであつた。

第 1 回 11月20日 日本航空501便 千歳着 8:35 5ケース

第1回目および第2回目は11月22日に、第3回目は11月28日に営業車により天塩支場中川事業場まで輸送して収容した。空港到着時の卵子の状況は第1表のとおり。

第1表 到着時の卵子の状況

事	項	第 1 回	第 2 回	第 3	3 0	備	考
受領	時間	11/20 8:50	11/22 10:55	11/26	9:35	第1回目の分	は輸送の関係
箱	数	5 ケー ス	5 ケー ス			上次回分と積	合せのため千
卵	数	約25万粒	約25万粒			歳支場第二ふん	化室に収容。
卵	温	6.0 ℃	上 4.0 °C 下 6.0 °C	-	4.0°C 7.0°C		
卵の	状況		好であるが、卵数 色のものが相当数			第3回目の分に	
箱の	状態	袋で覆い、外傷	ルの上をビニール はないが内部発泡 その他破損があつ		,		
刘	k	80%程度残				A	

11月22日および11月28日に夫々輸送して、天塩支場中川事業場に収容するまでの経過については第2表のとおり。

多化室に仮収容後、第1回目の分は運搬箱(5万粒)4個、第3回目の分は運搬箱(7万粒) 4個に詰め直して輸送した。

第2表 ますのすけ卵の輸送経過

事	文件	項	201	第 1. 2 回		第	3	回		
輸	送	車	営業車	(マイクロバス)	営業車	(プルー・	ベー	۲°)		
荷	積	み	座席に	各1個宛						
千	歳	発	11:	1 5	10:35					
途	中経	過	Held.	室温 13.0~18.0℃	11:00	岩見沢	室	温 16.0℃	卵温 4.8	$^{\circ}$
,				スチーム、窓の開	12:50	深川	室	温 15.7℃	卵温 5.1	°C
				閉で調節	14:00	旭川	室	温 15.5℃	卵温 5.1	$^{\circ}$
			11:	3 0 旭川 氷約 1/2	15:45	名 寄	室	温 16.3℃	卵温 5.5	$^{\circ}$
					16:25	美深	室	温 16.2℃	卵温 5.7	°C
到		着	18:	3 0 中川	18:35	中川			卵温 6.0	C

### 2 種卵の収容

中川事業場に到着後の卵子収容経過は第3表のとおり。

第3表 ますのすけ卵の収容経過

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
項目	第 1 回	第 2 回	第 3 回
収容時間	18:40~19:30		18:35~19:00
卵 温	5. 0 ℃	上段 5.4℃ 下段 8.2℃	6.0℃
氷	残約1/4	残約1/3	
ふ 化 水 温	6.	7 ℃	7. 5 ℃
卵 径	7. 4 ~	- 7. 6 mm	7. 6~8.3 mm
移 殖 卵 数	1 4 9,0 0 0 粒	158,000粒	141,000粒
死 卵 斂	4,300粒	4,600粒	4,980粒
%	2. 9 %	2.9 %	3. 5 %
卵数計算法	卵数計算器を使用して重	重計算法によって算出(容	重量計算法
	積法でも僅少差)		総 体 68.6k&
	総 重 量 163.3 k	尹 (209粒=65.1分)	卵箱重量 23.5 kg
	卵箱重量 67.7 k	8 (測定8回)	103粒=338
1 /	正蛛卵重量 9 5.6 k		$1\ 0\ 3 \times \frac{4\ 5.1}{3\ 3}$

### 3 ふ 化 経 過

11月22日および11月28日の2回に亘り、448,000粒の発展卵子の移殖を受け、中川事業場ふ化室(ふ化用水は動力場水)に収容した。ふ出は12月17日から同月27日で終了し、第二養魚池(屋根型日獲付)に収容した。浮上は2月15日までに、429,120尾が浮上を終了した。

これらのふ化経過は第4表のとおり。

第4表 ますのすけ卵のふ化成績

移	殖	\$ 出	浮	上	移殖卵数	死 卵 数	収容卵数	浮上数
	/22. /28	1 7~ 2/2 7	~2,	/15	448,000	13,880	粒 434,120	粒 4 2 9,1 2 0

### 4 飼育

飼育は浮上後2月16日から6月26日までの131日間実施した。(3月中に1週間、血便症状があつて給餌を中止した)放流前の平均魚体は体長6.31cm、体重2.53をの幼魚407,700尾を生産した。

給餌方法は、最初2~3日の餌付け時は粉末餌料を水で練つて置餌の方法を行い、その後前半 は置餌、後半は撤布方法により1.2トンを給餌した。

飼育期間中の水温は  $4.0 \sim 12.1 \, \text{C}$  (平均  $5.1 \, \text{C}$ )、 PH 7.3、 DO  $9.2.1 \, \text{%}$ 、水量  $3.0.0 \, \ell$  /mm、 飼育面積  $7.0.3 \, \text{m}^2$ であつた。これらの飼育成績は第5表のとおり。

第5表 ますのすけ飼育成績

餇	育期	間	飼	育	量	浮上	魚体	4A ET SU.	frar stol	水温	(℃)	DII
期	間	日数	尾	数	重量	体長	体重	給餌量	餌料	低~高	平均	PH
2.1 6~	~3.24	3 7	421	,100	k & 156	cm 3.65	0.37	k & 130	粉	3.9~ 4.5	4.2	7. 3
3.25	<b>-</b> 4.8	15	415	,400	228	4.0	0.55	180	No. 1	4.5~ 5.0	4.7	//
4.9 ~	~5.12	34	413	3,300	239	4.2	0.58	460	"	4.2~ 5.0	4.8	#
5.13	-6.26	45	410	,200	548	5.6	1.34	430	"	4.5~12.1	7. 2	"
ĺ	計	131						1,200		3.9~12.1	5.1	7.3

DO	水量	飼育面積	宛死尾数	放流数		数	放流	魚体	1尾当	Life office Lie
(mqq)	化/分	四月 旧加		尾	数	重量	体長	体重	增重量	增重比
		$m^2$	尾			k&	ст	8	8	
	300	70.3	5,700				4.0	0.55	0.18	1.5
	"	"	2,100				4.2	0.58	0.03 ·	1.05
	"	,,	3,100				5.6	1.3 4	0.7 6	2.31
	"	//	2,5 0 0				6.3	2.53	1.19	1.89
			1 3,4 0 0	A. O. O. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.				-	2.16	

飼育期間中適宜魚体測定を行なつた。その成績は第6表のとおり。

第6表 魚体 測 定 表

	体 長(F.L.	) cm	体		重 8
測定年月日	範囲	平均	範	囲	平均
44.2.16	3. 3 6~3. 9 8	3 • 6 5	0.21~	0. 5 2	0 • 3 7
3 · 2 4	3.4 ~ 4.5	3 • 99	0.4 ~	0.75	0 • 5 5
4 • 8	3.3 7~4.6 6	4 • 2 1	0.4 ~	0.81	0 • 58
5 • 1 2	4.28~7.18	5 • 5 9	0.5 ~	3. 3 5	1 • 34
6 • 2 6	5. 1 3 ~ 7. 3 1	6 • 31	0.62~	3.4 0	2 • 53

### 5 放 流

ますのすけ稚魚の放流は 6月27日午後1時パンケナイ川より放流したが、このうち約37% に当る151,000尾に放流後の回遊ならびに回帰確認のため脂びれ、左腹びれ切除の標識を付けた。

第1回目から天塩川に放流した結果のとりまとめは第7表のとおり。

第7表 ますのすけ放流成績

		41 70 70 1864	平均	魚体		標	識	
No.	放流年月日	放流尾数	F. L.	B. W.	尾	数	部	位
1	4 3. 7. 1 5	4 1 0,7 2 9	6. 9	4. 9	1 5	8,000	脂びれ 右腹びれ	
2	4 4. 6. 16~	6 7 5,0 9 8	6.54	2.87	1 5	5,000	右腹びれ 脂びれ	
3	4 5. 6. 2 7	4 0 7, 7 0 0	6. 3 1	2.53	1 5	1,400	脂びれ 左腹びれ	
合	音	1,493,527			4 6	4,4 0 0		

## §13 交配種增殖事業

### 1 捕獲採卵成績概要

本年度の交配種の捕獲数は湧別川で43尾(前年展幌内川、湧別川、渚滑川、常呂川の4カ所で88尾)10千粒を採卵した。

第1表 昭和44年度交配親魚捕獲採卵成績表

水系	採卵	in tel	所	轄	捕	獲	数	使	用親無	数	採卵	増減	仮収容	使早	平均	cts 46 440 Hb
小不	1水タ	J -200	事	業場	우	8	計	우	8	計	数	卵数	仮収容卵数	用親	平均採卵数	実施期間
					尾	尾	尾	尾	尾	尾	千粒	千粒	千粒	96	粒	
湧別	湧	别	湧	别	12	31	43	5	6	11	10		10	41.7	2,000	1 0.1 1~1 1.2 0
合計	本年	F度			12	31	43	5	6	11	10		10	41.7	2,000	1 0.1 1~1 1.2 0
तिसी	前年	上度			57	31	88	37	5	42	60		60	64.9	1,620	7.29~10.20

### 2 ふ化成績概要

本年度は前年度同様に新らたな交配種( $F_1$ )をつくらず、河川そ上の1代雑種 $F_1$ 間の交配による2代雑種10千粒を生産し、発服後千歳支場に移殖した。

第2表 昭和44年度交配種ふ化成績表

水	系	事業	場	収容卵	数	死 卵 数	発眼卵数	備	考
				Ŧ	粒	千粒	千粒		
湧	别	湧	別	1	0	6	4	12月10日千歳支場	一移殖
合	計	本 年	匮	1	0	6	4		
	1 tq	前年	度	6	0	3 9	2 1		

輸送による死卵は皆無であつたが、千蔵支場に収容後、12月14日からふ出を開始した。しかし、このふ出時に卵からの脱出不完全でへい死するもの、奇形魚でへい死するものが多かつた。1月16日から3月31日までの間に卵および稚魚でへい死した数は2,687粒(尾)であつた。また、雑種2代の本年度の受精率は約36%であつた。

なお生残稚魚 1,3 2 3 尾については、現在海水および淡水中の成長度合いを比較検討するために 飼育中である。

## § 14 河口通過稚魚觀測事業

### 1 実施方針

本事業は昭和37年度から継続して実施しており、本年度は前年度の方針同様に簡易標識によるトラップ効率の調査、稚魚の降河生態を考慮した観測体制の整備、観側業務、報告様式を統一して観側精度を高める一方、本事業の改善を目的とした降下稚魚の生態および流下昆虫量の調査と出水状況、河川水温の日周変化を中心にした河川性状調査を本事業に併行して実施する。

実施河川は前年度と同じく当幌川、ヌップク川、遊楽部川の3カ川とする。

### 2 実 施 概 要

### (1) 観測対象稚漁の放流状況

第1表 観測河川の稚魚放流状況

支場	易名	河川名	放流場所	放 流 期 間	放流尾数	摘 要
				月。 日	尾	
根	室	当幌川	計根別事業場	4.11~5,31	7,936,000	
+	勝	ヌツブク川	十勝事業場	4.20~7.2	7, 9 8 3, 0 0 0	
渡	島	遊冷郊川	八雲事業場	3.2 6 ~ 5.3 1	5,9 9 5,0 0 0	さけ
	<u> </u>	是来的们	八女母来物	3.20~5.20	1,955,000	からふとます

### (2) 観測河川の気象状況 (旬別)

第2表 当 幌 川

	旬別 4 月				5 月			6 月			7 月			
項	目		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
炱	温	.C		6.9	8.9	16.2	14.7	15.6	14.9	13.8	17.3	4.		
水	温	.C		4.3	5.4	11.1	11.4	12.5	12.4	12.6	13.3			
水	深	ст		130.0	144.0	136.0	139.0	139.0	136.0	134.0	139.0			
Ш	τh	m		1 7.0	17.0	17.0	17.0	17.0	1 7.0	17.0	17.0			
流迅	Em,	/分							*					
流量	[m³/	分											1	

ng ng 1988 in Taga 1994 - 1998

### 第3表 ヌップク川

旬別	T	4 月			5 月			6 月		7 月		
1					0 /1			0 /3			7 73	
項目	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
気 温 'C		5.1	11.5	16.7	18.4	20.9	21.1	20.6	21.5	19.2	22.2	
水 温 °C		5.7	6.7	7. 7	10.3	10.9	10.3	11.7	12.8	11.9	13.3	
水深cm		13.2	18.8	15.7	13.0	9.7	7.6	6.4	5.9	5.5	5.5	
)11 rf3 m		14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	142	14.2	14.2	14.2	
流速加/分		35.9	52.3	42.9	35.6	27.4	24.3	18.9	16.1	14.0	14.0	
流量加3/分		70.0	1 40.0	98.4	64.7	38.3	26.3	17.3	13.6	11.2	11.1	


第4表 遊樂部川

旬別	旬別 3 月			4 月				5 月			6 月		
項目	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
気 温 °C				4.2	6.3	10.8	11.7	13.7	17.2	20.7	18.7		
水 温 ·C				7.0	7.2	9.2	9.8	11.8	14.7	16.5	17.4		
水 深 cm				56.5	78.7	84.0	69.6	67.5	54.8	39.9	34.2		
川巾加				84	118	120	120	110	100	60	52		
流速 加/秒				0.728	0.996	1.170	1.072	0.907	0.707	0.482	0.309		
流量m/分				1,974	3,333	4,077	3,084	2,806	1,752	920	502		

第5表 河口通過稚魚觀測状況

支場名	河 川 名	観測期間		トラップ基数、規模およ
义物名	(流下距離)	(乗網期間)	トラツブ設置場所	び 設 置 方 法
根室	当 滉 川 (40.0 km)	4.1 0~6.3 0 (4.1 1~6.2 7)	当帳捕獲場 計根別事業場より 4 0 Km	基数 2基 規模 口径 1.6×0.8 m 網目 6×6 mm 4×4 mm
	,			基数3基
				規 模 口径 0.5×1.0 m
_L	ヌップク川	4. 1~7.1 5	十勝事業場より下	網目 4 × 4 ππ
十勝	(17.6 Km)	(4.20~7.15)	流 9 Kmの愛国橋下	方 法 固定式(トラップ末端
				から水路をもうけ網生
			\$	質に連結
				基 数 4基 普通3基
				增水1基
渡 島	遊楽部川(20.0 ㎏)	4. 1~6.19 (4. 1~6.19)	遊楽部捕獲場 八雲事業場より18 Km河口まで2 Km	規模 口径 1×0.5 m 0.5×0.5 m 長さ 8 m 8 m 網目 6×6 mm 4×4 mm
				方法 固 定 式

支場名	河	川名	観測方法	推定総通過数	放 流 数	推定通過率%
根 室	当	幌 川	隔日(2日)24時間観測	1,818,000尾	7,936,000尾	2 4.8
十 勝	ヌッ	プクリ	連 24時間観測	5,012,500尾	7,983,000尾	6 2.7
渡島	遊	楽 部 川	隔日(1日) 15時間観測	3,578,500尾 1,163,100尾	5,995,000尾1,955,000尾	5 9.7 5 9.5



#### (3) 結果および考察

本年度も前年度と同様に各河川毎にトラップ効率(実採捕尾数/標識放流尾数/河川断面積/トラップ断面積)調査のための簡易標識放流(尾びれなどのカット)を期間中3回実施して観測 精度の向上をはかつた。

この結果、当幌川では前期 0.33、中期 0.79、後期 0.72 と前年度 (0.28, 0.96, 0.48) に比較して安定した結果が得られた。また、ヌップク川では 0.581、0.73、1.15、遊楽部川では 0.12、0.04、0.04 が得られ前年度とほぼ同様の結果が得られた。これらの結果、観測各河川における観測方法は安定し、ほぼ確立されたものと考えられる。

本年度は各場とも後期採卵卵子の収容、ふ化用水温の低下、飼育の強化などから放流時期の遅れの傾向となつたが、各河川とも通過率が向上したことは飼育事業の効果、放流適期の検討など 今後の放流事業体制整備の示唆が得られた。

#### ○ 当 幌 川

当幌川は41年度から本事業を実施したが、初年度は計根別事業場下流18kmの地点で観測したため、河口までの間(22km)の減耗が問題となり、2年度以降は現在地点に移設した。本年度は計根別事業場に収容したさけ14,352千粒について2月20日から5月23日までの93日間に5,000kgの飼料を与え、平均体長5.3cm、平均体重1.36gの稚魚を4月1日から5月31日までの間に7,936千尾の稚魚放流に対して観測を行ない24.8%の通過率を示した。この結果は前年度(18.4%)を上廻る成績であつた。

本河川の観測目的は飼育強化ならびに放流時期を調査することによつて、通過率の変化状況 を調べ河川内の減耗を防止する方法を確立することにあり、下記のとおり飼育強化、および放 流時期を4月下旬~5月上旬に設定することが効果的であると判断される。

华	废	降河距離	放流期間	(主群)	放流 稚魚 体重(g)		通過率	通過盛期
		Km			範 囲	平均	96	
S 4	1 1	1 8	2.10~3.17	3月上旬	0.3 ~ 0.5	0.39	5 0. 5	3月下旬
S 4	1 2	4 0	2.2 0 ~ 4.1 0	N	0.40~0.45	0.42	4.8	4月下旬
8 4	1 3	4 0	3.1 0 ~ 5.1 6	3月下旬	0.33~2.00	0. 3 8	1 8.4	5月下旬
8 4	14	4 0	4. 1~5.21	4月中旬	0.65~2.33	1.3 4	2 4.8	5月中旬

#### 0 ヌップク川

本川は41年度から実施したが稚魚放流尾数の算定困難(施設の老朽のため)通過率算定が不確定なため、42年度は休止し、43年度から再開したが、河川増水のため稚魚を流失したため、本年度はこれの対策を講じて実施した。本年度は十勝事業場に収容した13,662千粒について4月1日から6月2日までの63日間に3,490 kgの飼料を与え、平均体長4.70 cm平均体重0.73 gの稚魚を4月20日から6月3日までの間に7,983千尾の稚魚放流に対して観測を行ない62.7 %の通過率を示した。41、42年度の通過率との差異については放流時期、放流尾数の算定方法、害魚駆除効果の影響と考えられる。

放流時期については年々遅くなつており、これに伴い河川内滯留期間が短縮されており、本 年度の結果を対比すれば放流時期を逸しており、5月上旬~5月下旬が放流時期と判断される。

年 度	放流期間	(主群)	放流稚魚体重	( g )	通過率	通過盛期
	*		範 囲	平均	%	
S 4 1	3.15~4.28	4 月中旬			5 2.7	5月上旬
S 4 3	4. 7~6. 5	5 月中旬	0.33~1.38	0.93	5 9.6	5月下旬
S 4 4	4.20~6. 2	6月上旬	0.36~1.50	0.7 3	6 2.7	6月上旬

#### 0 遊樂部川

本川では昭和37年度から本事業が計画実施され、当初は河川内における稚魚の滅耗機構、滅耗率、稚魚通過観測方法の確立、通過率と回帰率との関係などを解明する目的で開始され、すでに前2項は解明されたが、本年度はこれらに加えて噴火湾海域のさけ、ます資源増大の一環として通過率と回帰率との関係を解明するために実施した。

本年度八雲亭業場にさけ7,617千粒、からふとます2,403千粒を下容し、2月10日から5月31日までの111日間に2,920 Kgの餌料を与え、さけの平均体長4.5cm、平均体重0.7g、からふとますの平均体長48cm、平均体重0.52gを示し、放流数さけ5,995千尾、(3月26日~5月31日)、からふとます1,955千尾(3月20日~5月20日)に対して観測の結果、その通過率はさけ59.7%、からふとます59.5%であつた。

本年度は特に飼育強化と放流時期の遅れなどが前年と異つた。回帰率との関係については次年度以降の回帰状況を分析しなければならない。

### (3) 結果および考察

本年度も前年度と同様に各河川毎にトラップ効率(実採捕尾数/標識放流尾数/河川断面積/トラップ断面積)調査のための簡易標識放流(尾びれなどのカット)を期間中3回実施して観測 精度の向上をはかつた。

この結果、当幌川では前期 0.3 3、中期 0.7 9、後期 0.7 2 と前年度 ( 0.2 8、 0.9 6、0.4 8) に比較して安定した結果が得られた。また、ヌップク川では 0.5 8 1 、 0.7 3 、 1.1 5 、遊楽部川では 0.1 2 、 0.0 4 、 0.0 4 が得られ前年度とほぼ同様の結果が得られた。これらの結果、観測各河川における観測方法は安定し、ほぼ確立されたものと考えられる。

本年度は各場とも後期採卵卵子の収容、ふ化用水温の低下、飼育の強化などから放流時期の遅れの傾向となつたが、各河川とも通過率が向上したことは飼育事業の効果、放流 適期の検討など 今後の放流事業体制整備の示唆が得られた。

### ○ 当 幌 川

当幌川は41年度から本事業を実施したが、初年度は計根別事業場下流18kmの地点で観測したため、河口までの間(22km)の減耗が問題となり、2年度以降は現在地点に移設した。本年度は計根別事業場に収容したさけ14,352千粒について2月20日から5月23日までの93日間に5,000kgの飼料を与え、平均体長5.3cm、平均体重1.36gの稚魚を4月1日から5月31日までの間に7,936千尾の稚魚放流に対して観測を行ない24.8%の通過率を示した。この結果は前年度(18.4%)を上廻る成績であつた。

本河川の観測目的は飼育強化ならびに放流時期を調査することによって、通過率の変化状況 を調べ河川内の減耗を防止する方法を確立することにあり、下記のとおり飼育強化、および放 流時期を4月下旬~5月上旬に設定することが効果的であると判断される。

年	废	降河距離	放流期間	(主群)	E群) 放流 稚魚 体重(g)			通過盛期
		Km			範 囲	平均	96	
S 4	1	1 8	2.10~3.17	3月上旬	0.3 ~ 0.5	0.39	5 0. 5	3月下旬
S 4	2	4 0	2.2 0 ~ 4.1 0	"	0.40~0.45	0.42	4.8	4月下旬
S 4	3	4 0	3.1 0 ~ 5.1 6	3月下旬	0.33~2.00	0. 3 8	1 8.4	5月下旬
S 4	4	4 0	4. 1 ~ 5. 2 1	4 月中旬	0.65~2.33	1.3 4	2 4.8	5 月中旬

0 ヌップク川

本川は41年度から実施したが稚魚放流尾数の算定困難(施設の老朽のため)通過率算定が不確定なため、42年度は休止し、43年度から再開したが、河川増水のため稚魚を流失したため、本年度はこれの対策を講じて実施した。本年度は十勝事業場に収容した13,662千粒について4月1日から6月2日までの63日間に3,490 Kgの飼料を与え、平均体長4.70cm平均体重0.73gの稚魚を4月20日から6月3日までの間に7,983千尾の稚魚放流に対して想測を行ない627分の通過率を示した。41、42年度の通過率との差異については放流時期、放流尾数の算定方法、客魚駆除効果の影響と考えられる。

放流時期については年々遅くなつており、これに伴い河川内滞留期間が短縮されており、本 年度の結果を対比すれば放流時期を逸しており、5月上旬~5月下旬が放流時期と判断される。

年 度	放流期間	(主群)	放流稚魚体重(g)			通過率	通過盛期
	F		範	囲	平均	%	
S 4 1	3.15~4.28	4 月中旬				5 2.7	5月上旬
S 4 3	4. 7~6. 5	5 月中旬	0.33~	1.38	0.93	5 9.6	5月下旬
S 4 4	4.2 0 ~ 6. 2	6月上旬	0.36~	1.50	0.7 3	6 2.7	6月上旬

### ○ 遊 楽 部 川

本川では昭和37年度から本事業が計画実施され、当初は河川内における稚魚の滅耗機構、滅耗率、稚魚通過観測方法の確立、通過率と回帰率との関係などを解明する目的で開始され、すでに前2項は解明されたが、本年度はこれらに加えて噴火湾海域のさけ・ます資源増大の一環として通過率と回帰率との関係を解明するために実施した。

本年度八雲事業場にさけ7,617千粒、からふとます2,403千粒を下容し、2月10日か55月31日までの111日間に2,920 Kgの餌料を与え、さけの平均体長4.5cm、平均体重0.7g、からふとますの平均体長48cm、平均体重0.52gを示し、放流数さけ5,995千尾、(3月26日~5月31日)、からふとます1,955千尾(3月20日~5月20日)に対して観測の結果、その通過率はさけ59.7%、からふとます59.5%であつた。

本年度は特に飼育強化と放流時期の遅れなどが前年と異つた。回帰率との関係については次年度以降の回帰状況を分析しなければならない。

## § 15 降河稚魚保護事業

### 1 実施方針

本年度の降下稚魚保獲事業は次の事項について重点的に行ない、放流稚魚の安全降河とその生き残り量の増大に努める。

#### (1) 稚魚の輸送放流

放流 稚魚のかんがい 薄迷入防止ならびにその他の障害回避のため、これらの問題のある河川 については 稚魚を 適当な 地点まで輸送放流して降河 稚魚の減耗を防ぐ。また積極的には 適地、 適正量放流を目的とする分散放流についても実施し、降海稚魚量の増大に努める。

(2) 害鳥、害魚の防駆除、河川清掃、水路整備、河川バトロール

#### イ、害鳥、害魚の防駆除

過去の実施結果から判断して害魚による放流稚魚の食害はアメマス、イワナ、ニジマス、 ウグイの生息する河川に集中しているので、これら河川について重点的に実施する。実施の 範囲は放流水路、支川とする。

害鳥については放流稚魚が密集する個所に網を張るとか、威かく物を設置して、その飛来、 侵入を防ぐ。また、地元の猟友会の協力により駆除も行なう。

#### 口、河 川 清 掃

特に水草などの繁茂の激しい放流水路を有する個所について重点的に行なう。

### ハ、水 路 整 備

稚魚の放流水路の不整備なもののうち、土俵などの簡単な工作によって解決出来るもの について行ない、稚魚の降下を容易にする。

#### ニ 河川パトロール

稚魚放流直前の河川性状を把握して、適正な放流を行ない稚魚の安全降河を計る。

#### (3) 弘 報

主要河川に降河稚魚保護を目的としたPR用の立看板を立て、沿岸住民などへのPRをする。 また前年度同様のチランを作成して、沿川住民、関係機関、団体などえ配付してそのPRを行なう。

### 2 実 施 結 果

### (1) 稚魚の輸送放流

本年度、さけ稚魚については21事業場から35水系の適地点へ33,332千尾を輸送放流して、取水口への迷入防止、降海障害回避に努めた他、稚魚を良好な河川に分散放流してその生残り率の向上に努めた。また、さくらます稚魚については5事業場から6水系に、からふとます稚魚は2事業場から5水系に、交配種稚魚は1事業場から1水系に夫々輸送放流を実施した。その実施概要は第4表のとおりである。

#### (2) 害魚の駆除

本年度は8事業場、8水系において、稚魚放流に先立ち、その降下水路中で、ウライ、曳網、刺網などを使用して害魚の駆除を行なうとともに、それらに捕食されているさけ・ます稚魚の食害調査を行なつた。これらの結果については第5表のとおりである。

### (3) 害鳥の防駆除

本年度は古刺網を使用して害鳥の飛来を防止し、猟友会員に委託して威嚇による防除、さら には散弾銃を使用して積極的な駆除を行ない、大きな効果を挙げた。その実施概要は第6表の とおりである。

#### (4) 河 川 清 掃

本年度は3支場、4事業場(タワラマップ川、湧別川、幌内川、頓別川)で、河川の清掃を 行ない、稚魚の降下障害物の除去を行なつた。

### (5) 河川パトロール

前年度から実施したもので、17水系について、河川環境ならびに稚魚の降下状況の観察を 行なうとともに、突発的な障害排除を行なつた。その実施概要は第7表のとおりである。

#### (6) 弘 報 活 動

各地域の特性に合つた保護対策を推進するための弘報として全場的にPR用立看板、ポスターを掲示し、チラシを作成し関係機関、団体、ならびに沿川住民に配布してその徹底に努めた。

第1表 さけ稚魚輸送放流結果

支	場	事 業	熄	輸	送放	流場所	放流 期間	輸立	<b>差放流</b>	<b>数</b>		輸
~		-34 N	-823	水	系	放流点	22 PIL 793 1-1	輸送尾数	へい死	放流尾数	車	别
								千尾	千尾	千尾		
北	見	斜	里	オク	シベ	協和橋	5. 6~5. 7	440		440	官	1 t
		網	走	藥	琴	稲富	4.21~4.22	550		550	"	"
				網ラ	走 湖	白羽川湖畔	3.2 5 ~ 4.2 7	1 0,30 3		1 0,3 0 3	#	#
				濤 社	弗 湖	平和橋	4.21~4.22	2,0 70		2,0 70	営	" 3. 5 t
				能且	取 湖	鱒取川	4.23~4.25	3,650		3,6 5 0	官営	1 t 3.5 t
		北	見	佐呂	間湖	ライトコロサロマヘン	4.28~4.30	2,1 9 9		2,199	官》	1 t
		,		常	呂	端野大橋	5. 1	200		200	官	1 t
		湧	别	佐呂	間湖	芭露川	5,20~5.22	2,0 0 0	2	1,998	官	2 t
		渚	滑	渚	滑	ウツツ川 (8線沢)	2.20~4.24	3,693		3,693	"	//
						(13線沢)	5.16~5.17	1,051		1,051	"	"
				興	部		5. 4 ~ 5. 7	1,4 30		1,4 3 0	"	4 t
		計				4		27,586	2	27,584		
根	室	伊茶	仁	植	别	上流 2 Km	6. 1	1,000	1	999	民、	大
				標	津	5 線	6.10~6.11	16,300	20	1 6,2 8 0	官民、	大、小アルバ台
		計根	别	春	别		5.1 9 ~ 5.2 0	1,600		1,600	民、	小
				床	丹		5.21~5.23	2,3 0 0		2,3 0 0	"	#
		虹	别	別当	当 賀	別当賀橋 上流 1 Km	4. 6~5.16	2,5 0 0	20	2,4 8 0	民、	小アルジ合
				穂	香	河口上流 1 Km	5.1 6	500	10	490	"	"
				薰	別	河口上流 1 Km	5.1 7~5.1 8	2,0 0 0	7	1,993	民、	大
		浜	中	別当	当賀	厚 床	4.1 1~4.2 0	805	5	800	民、	小
		(忠为	<b>(</b> )	忠	類	河口上流 3 Km	5.2 9	1,842		1,842	"	"
		根	室	標	津	タワラマツ プ合点下	5.2 0 ~ 6.1 6	586	1	585	官、民、	小アルミ合
		計						2 9,4 3 3	6 4	2 9,3 6 9		

			12*1			
送 方 法	1	回当	の輸送状況		放流時の	輸送目的
タンク	輸送距離	酸素消費	水量・水温	輸送尾数	河川状況	100 KG 1413
	Km		बं	千尾	.c	:
150×90×80 190×100×100	2 6.0	酸素、氷	0.7 t 2~5°C	4.5 6.5	8.2~7.5	分散放流
150×90×80	2 4.0	" "	0.7 t	275	* 3	還元放流
150×90×80	8.0 9.0		0.7 t	286		混護防止
150×90×80 200×140×100	2 3.5	" "	0. 7 t 1. 7 t	250 310	4.8	分散放流
150×90×80 200×140×100	1 8.7	" "	0.7 t 1.7 t	200 280	2.8	"
150×90×80 190×100×100	5 2.0 6 2.6	" "	0.75 t 1.0 t	250 300	1 0.0~4.2	資源造成
1 90×1 00×1 00	1 3.0	# #	1.0 t	200	6.5	障害回避
200×140×100	2 50	11 11	1.5 t 7.5°C	200	1 5.3~1 20	資源造成
1 80×9 0×8 0	8.0		0.9 t	250	0.9	
180×90×80	5.0		0.9 t	250	7.0~8.0	. "
180×90×80 140×90×80	3 2.0	" "	0.9 t 0.7 t	250 200		還元放流
			6.0 °C	500	8.0	分散放流
			4.0 ~ 8.0 °C	500	1 5.0	"
			5.0 ~9.0°C	400	1 3.0	"
	-	,	2.5 ~ 9.0°C	400	1 3.0	"
			4.0 ~ 1 0.0 °C	300	1 0.0	. "
	-		5.0 ~ 6.0 °C	250	1 1.0	
			4.0 ~ 5.0 °C	1,0 0 0	9.0	"
	n		6.0 °C	400	1 0.0	還元放流
			9.0 ~ 1 0.0 °C	450	1 1.5	迷入防止
			4.0 ~ 6.0 °C	300	9.0	障害回避
						\

支場	事業場	輸送放	流場所	放流 期間	輸	送放流	<b>笔数</b>	輸
2.30	3- X 1/3	水系	放流点	22 5.4 7571-3	輸送尾数	へい死	放流尾歡	車 別
-					千尾	千尾	千尾	
十勝	劉 路	釧路	下鲐別	3.26~5.10	1 4,5 1,8	28	1 4,4 9 0	民、2.5 t
1.5	太田	新川	河口上流	6. 2	3 9 1	1	390	民、大
	太田	藻散布沼 無 名 川	河口上流3 际	6. 3	428	3	425	民、大
	計		- Tun		1 5,3 3 7	3 2	1 5,30 5	) e
天塩	頓 別	猿 払	新浅茅野	4.2 8	460		460	民、2 t 官、1 t
	天 塩	天 塩	事業場傍	5. 2 8 ~ 6. 2	1,1 20		1,1 20	官、1 t
	. "	,,	,,	5. 2 8 ~ 6. 2	6,306		6,306	# #
	計			,	7,886		7,886	
千歲	千 歳	石 狩	事業場下 流 4 Km	4.21~4.27	2,931		2,931	官、1 t
-		沙流	河口上流 6 Km	4. 7	1,000		1,0 0 0	民、3 t
		余 市	河口上流 10 Km	5.14~5.15	2,0 0 0		2,0 0 0	民
,		勇 払	ウトナイ湖	5. 8	962		962	官、1 t
	音 江	石 狩	音が足える堤	3.2 8	233		233	官、1.5 t
4	敷 生	敷 生	鉄橋下	3.2~4.23	1,1 7 9		1,179	
		白 老	ウヨロ河口 上流 2.3	" ~ "	400		400	
		敷生	メップ河口 上流 1 Km	" ~ "	300		300	
		白 老	捕獲場	" ~ "	600		600	
	計				9,605		9,6 0 5	*
渡島	茂辺地	汐 泊	0.2 km	4.1 0	304		304	民、大
	八雲	"	支流	6.3	200		200	" "
	計				504		504	
合	計				3 3,3 3 2		3 3,3 0 0	

送 方 法		1回当	りの輸送状況		放流時の	輸送目的
タンク	輸送距離	酸素消費	水量・水温	输送尾数	河川状況	和及日的
	Km			千尾	.c	
270×150×80	1 1.5		1.5 t 6.2~7.4°O	270 450	5.0~6.6	
170×140×80	4 5.0	-	1.3 t 7.8~5.4°C	391	1 0.6	
170×140×80	6 0.0	_	1.3 t 10.2~4.6°C	428	1 3.0	
90×80×50 140×90×80 150×100×47	2 5.0	雪20 Kg	0.55 t 0.6~4.8°C 0.65 t 1.2~5.3°C	2 60 2 0 0	4.2	還元放流
150×100×47	3.3	氷	0.65t 5.7~7.7°C	189 252	9.8~1 9.5	迷入防止
ポリバケツ 45ℓ	3.3	"	35ℓ 4.6~7.7°C	110 248	"	"
1 t	4.0		8.2~8.5°C	200	5.0~6.5	h
	6 8.1		4.2~6.0°C	500	4.7	
100×100×100	1 1 6.0	-	4.0~6.5°C	1,0 0 0	8.9	
"	2 4.0		8.1 ∼9.0°C	500	1 1.0	
,,	3.0		42~4.5°C	120	5.6	
				*		
	,					
•		*				
	3.0.0		1.5 t	152	1-	
	1 0 0.0		1.6 t	200		

第2表 さくらます稚魚輸送放流結果

支場	事 業 場	輸送放	流場所	地 冰	輸力	<b>送放流</b> 属	三数	櫛
义物	争未物	水系	放流点	放流時間	輸送尾数	へい死	放流尾数	車 別
					千尾	千尾	千尾	
北見	渚  稩	渚滑	ウツツ川 8 線 沢	2. 8.~2. 9	765		765	営、2 t
		與 部		2.1 2~2.1 3	320		320	# , 4 t
	āt	ļ	,		1,0 8 5		1,0 8 5	
限室	根 室	別当質	捕獲場	3.1 6 ~ 3.1 8	970	6	964	官、1 t
千威	千 蕨	古 宇	河口上流 8 Km	5. 1	200		200	民、3 t
	音 江	石 狩	音に入れた。	3.28	83		83	民、1.5 t
	計	-		ş	1,2 5 3	6	1,247	
渡岛	尻 別	尻 別	下賀老		500		500	官、1 t
			上目名	,	440		440	,,
			貝ガラ沢		400	-	400	<b>"</b>
			田下		300		300	,
			郡 界 沢		130		1 30	<b>"</b>
			三之助	-	50		50	"
	計	-			1,8 2 0		1,8 2 0	
合	計				4,1 5 8	6	4,1 5 2	

送 方 法		1 回 坐	りの輸	该送状況	100	放流時の	輸送目的
9 × 1	輸送距離	酸素消費	水量	・水温	輸送尾数	河川状況	THIZ DAY
7	Km	*			千尾	, O	
180×90×80	8.0		0.9 t		2,50	0.7	有
180×90×80 140×90×80	3 2.0	酸素、氷	0.9 t 0.7 t		250	0.9	還元放流
						-	
	5 2.4		1.7 t 2.0 t	5.6 ~3.2°C 5.2 ~2.8°C	320 330	0.7~1.2°C	
	1 6 8.0			4.0~8.5°C	200	1 0.0°C	
100×100×100	3.0		* 65	4.2~4.5C	83	5.6	:
	1 5.0	·	1.4 t		250	F .	
	1 2.0		"		220		
	1 0.0		"		200		>
	1 0.0	,	"		150		
	1 1.0		0.8 t		130		44.
	7.0		0.7 t		50		vb
*			100	7. W. 165	,		
		- 200					-W. U.

第3表 からふとます稚魚輸送放流結果

	Wer	W 48	į į	輸送放	流場所	放流期間	輸送	<b></b> 放流尾	数		輸
支場	争	業 場	水	系			輸送尾数	へい死	放流尾数	車	别
							千尾	千尾	千尾		
北見	渚	滑	渚	滑	ウツツ川 8 線 沢	2.15~2.22	1,075		1,0 75	営、	2.0 t
			渚	滑	ウツツ川	~5.15			2,105		
			興	部		2.12~2.13	720		720	",	4.0 t
		計					1,795		(3,900)		
千蔵	千	歳	幌	別	支 流	4.1 4	700		700	トラン	ック
			幌	満	河口より 1 km	4.1 6	400		400		トラツ 2 t
			静	内	第2捕獲場 (河口より	4.22~4.23	1,6 6 5		1,6 6 5	官	
		計			7 km )		2,765		2,765		
合	Land of the land	計					4,5 6 0		6,665		

			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		WYOU MY -	輸送目的
ク輸送	送距離	酸素消費	水量・水温	輸送尾数	河川状況	州 区 日 口 ゾ
	Km			千尾	.C	
	8.0		0.9 t	250		
		酸素、氷			発眼卵埋没	
	3 2.0		0.9 t 0.7 t	250 200		還元放流
1	7 5.0		4.1 ~ 8.9 °C	700 (タンク4個)	9.0	
00 1	7 9.0		3. 8 ∼ 8. 6 °C	400 (タンク3個)	8. 7	
1	1 8.8		3.6 ~ 7.7 °C	800 (タンク4個)	8. 2	
	000 1	8.0 3 2.0	夕     輸送距離     酸素消費       Km     8.0       酸素、氷       32.0       175.0       179.0	Km 8.0 0.9 t 酸素、氷 3 2.0 0.9 t 0.7 t 1 7 5.0 4.1 ~ 8.9 °C 3.8 ~ 8.6 °C	ク     輸送距離     酸素消費     水量・水温     輸送尾数       Km     50     0.9 t     250       250     0.9 t     250       0.7 t     250       175.0     4.1 ~ 8.9 °C     200       175.0     4.1 ~ 8.9 °C     200       175.0     3.8 ~ 8.6 °C     200       175.0     3.8 ~ 8.6 °C     200       1188     3.6 ~ 7.7 °C     800	ク     輸送距離     酸素消費     水量・水温     輸送尾数     河川状況       Km     千尾     *C       8.0     0.9 t     250       酸素、氷     発眼卵埋没       32.0     0.9 t     250       0.7 t     250       250     200       4.1 ~ 8.9 °C     (タンタ4値)     9.0       3 8 ~ 8.6 °C     (タンタ3値)     8.7       1188     3 6 ~ 7.7 °C     800     8.0

1回当りの輸送状況

放流時の

送 方 法

第4表 交配植稚魚輸送放流状況

支場	事業場	輸送放流場所		放流期間	輸送	輸			
	2 30 4 7 30	水 系	放流点	72X VIU 773 174	輸送尾数	へい死	放流尾数	車	别
					千尾	千尾	千尾		
根室	羅 臼	サルシイ	橋下	3.2 7	280		280	民、	1 t

送 方 法		1 回当り	の輸送方法		放流時の	輸送目的
9 2 1	輸送距離	酸素消費	水量・水温	輸送尾数	河川状況	村 乙 口口
	Km			千尾	.C	
	1 1.7			280	3.8°C	

第5表 害魚麻除ならびにさけ・ます稚魚食害結果表

			1 = 2	採取期間		採	取	場	所	4:37	取	漁	EI	
支	場	事業	場	(実施日数)	水	系	区		間	採	权	<b>SHI</b>	具	
		-				,								
北	見	斜	里	3.3~428	エト	ンピ	合流点~	~事業	場	曳網(1	0 m×	2 m	網目3	cm)
1	lbs	*												
根	室	伊莽	仁	4.1~6.30	伊莽	(仁	河口上流	危 1 Kn	まで	刺網、多	七網			
		当	幌	4.1~5.1 0	当	幌	河口上的	尼3 Km	1	釣り				
								(8)		d				
								5						
		虹	別	4.1~5.31	西	別	事業場が	から下	流200m	上りウラ	イ			
+	勝	幕	別	5.1~5.12	旧道	会 別	事業場が	から幕	別川合流点	刺網6 杉	て、 ドウ	2個		
		+	勝	3.26~6.30	ヌツ	ブク	事業場 た	から変	国橋	刺網1枚	く、ドウ	1個		
									1					
天	塩	徳志	別	4.1~5.1 4	徳は	: 別	放流	水	路	ウライ(	害魚そ	上防	止)	
渡	島	八	雲	3.10~3.30	セイミ	マシ	事業場が	いら合	流点	ウライ、	タモ絲	3		
									-					

採	取	魚	捕食	されて	いたさけ・	ます稚魚	fair -tr
魚 種	尾 数	体長範囲	魚	種	尾 数	体長範囲	備考
	尾	F·L cm			尾	ст	
いわな	163	4. 0~2 9.0			367	2 60	
にじます	102	1 5.0 ~ 5 7.0			184		
あめます	1				2	<i>a</i> .	v
どじょう	1	1 3.8	La .		0		
いわな	63						
あめます	40						
おしよろ こま	47						
いとう	7				0		
あめます	36	<			0	· ·	
いわな	18				0		
にじます	8				NEX		
あめます	5						
かじか	10						
うぐい	1,774	1 2.0 ~ 2 6.0	3	け	1,637	4.7 ~ 6.0	
うぐい	1,5 2 2	8.0 ~ 3 8.0	8	け	602	3.3 ~ 5.4	
にじます	19	1 9.0 ~ 4 7.0	5 4	l,	8	2.6~3.8	
かじか	172	4.0 ~ 1 8.0					
うぐい	10	5.5 ~ 1 0.5			S. g. part	r., 42.	4 * y
とじょう	7	1 4.5 ~1 5.8					
とじょう	9	1 1.3~1 5.2	からふと	ます	2	3. 1	
かじか	3	9.4~1 0.3	?		3	3.2 ~ 3.3	** ***

第6表 害鳥の防・駆除ならびにさけ、ます稚魚食害結果表

支	場	事業場	実施 期間	実 施 区 域	実 施 内 容
北	見	岩尾別		浮遊池、飼育池、放流水路	害鳥の飛来防止
	Î	斜 里	1 2.1 ~ 5.37	<b>稚魚池、ニトンビ川</b>	"
		網走	5.16~6.15	網走湖口上流 1.5 kmの間お	鳥獣捕獲許可を受けて、地元猟友会の
				よび能取御鱒取川河口左右	協力により、積極的駆除。
				500mの間	-
				*	4
		北兒	5.20~6.15	常呂川、ライトコロ川およ	同上
		10 70		びサロマベツ川	,
根	室	羅白	5.1 ~ 6.1 0	事業場から河口までの経臼	稚魚降下期間中、河川内ではかもなど
				וון	河口部ではかもめの食害状態の観察を
					主体に調査
+	勝		3. 2 8 ~ 6.7	旧途別川、面川、ヌツブク	狩猟者6名に委託し、積極的な駆除と
				川、十勝川河口部	威嚇
天	塩	徳志別	2.1 0 ~ 3.7	放流水路、本流	放流水路では飛来防止、本流では猟銃
				*	による積極的駆除
					i .II -
		※ 登	2.2 7~4.2 6	飼育池、放流水路、バンケ	構内では飛来防止、河川では猟銃によ
				ナイ川	る積極的駆除
		頓 別	3.22~4.10	ウソタン川	狩猟者(3名)による積極的駆除
		中川	2.23~5.20	天塩川、パンケナイ川	狩猟許可による積極的駆除

			딒	F	鳥	の	Æ	X	除				
54	猟	组		- 区	余	喜 鳥		捕	食	稚	魚	備	考
37	214	<del>**</del>	種	Í	類	羽		種	類	戶	星		
古東	月網6	nn 🗏	世	きせ	1,	-	-						
			か	わがら	っす						÷		
古	刺	網	か		P		-			1		ベルも併月	した。
散	弾	銃	は	C	ろ	1 - 1 -	9						
			<	ろが	P		5						
			す	ずが	₺		2						
			ょ	しが	\$		5						
			か	るが	\$		2						
同		上	は	じ	ろ		4 8						
散	弾	銃	ま	が	\$		3 4	さ	け		5 1		
			は	Ľ	ろ		1 5	7	•		?		
			か	るが	P		8						
			あ	Ļ	3		2	9)					
古	刺	網	ま	が	P			さけ・	ます	1	0 0		
散	弾	銃	あ	<b>,</b> ,	3	4							
			は	Ľ	ろ								
古	刺	網	カッオ	つから	す								-
散	弾	銃	か		\$								
散	弹	銃	ŧ	が	Ь		6	さけ・	ます	5	0 0		l.
			あ	١,	8		2						
散	弾	銃	か		6					1 .			

第7表 河川パトロール結果表

		T		パトロール期間		~:	トロール区は	#
支	場	事業	場	(回数)	水	系	区	域
北	見	斜	里	3.28~6.8	斜	里	事業場から斜里川河口	まで
		網	走	4.1 ~ 6.1 0 (15)	瀬筍	走	網走湖と河口までの網	走川
		北	見	4.1 ~ 6.1 0 (12)	常	出	常呂川およびライトコ	n)
根	室	ÍC.	別	4.1 5~5.7 (15)	西	別	事業場から 西別(66	Km )
		根	室	2.4 ~ 3.3 0 ( 2 3 )	タワラ	テマツブ	事業場から合流点まで	
+	勝	太	田	4.24~5.30	尾	幌	事業場から河口までの川	ホマカイ川と尾幌川
		釧	路	6.1 ~ 6.3 0	釧	路	事業場から河口まで	,
		幕	別	4.1 4 ~ 4.2 4	旧並	愈 別	事業場から猿別川合流)	点まで
		札	内	5.1~5.13)	+	勝	事業場から千代田えんり 勝川	是までの面川と十
天	塩	徳 志	別		徳元	志 別	事業場から河口までと河	可口附近の沿岸

### パトロール状況および結果

稚魚降下期間中、エトンビ川を主体に稚魚の降下状況および河川水温調査を行なつた。エトンビ川では全川稚魚の遊泳が認められたが、捕獲場附近では砂利採取の影響で見られず、本流斜里川でも砂利採取による濁水の影響がある。

稚魚降下期間中、特に網走湖を主体に降下状況(ワカサギとの混獲)調査を行なつた。

稚魚降下期間中、常呂川水系およびライトコロ川、常呂沿岸の稚魚降下と水温など調査を行つた。

稚魚降下期間中、稚魚の降下状況および水温調査を行なつた。物理的な障害物は特に認められなかつた。4月中旬までの上流域水温は10°C、下流域は6°C。4月下旬には上流域が上昇して13°C前後を示した。5月に入つて水がやや濁り、水量も増し、水温は上下流を通じて8°C前後を示した。稚魚は4月下旬まで上流~中流間に小群を各所で認められたが、5月以降は見られなかつた。

稚魚放流前および降下期間中、放流水路保全のため定期的に巡視した。この川は市街の中心部を流れているため廃棄物の投棄が多い。期間中投棄者に対する注意(5件)、子供の稚魚すくいに対する指導(2件)を行つた。河川水温は2月上旬で6°C、中流12°C、下流9°Cを示し、合流点附近は氷結していた。程魚は3月20日に放流したものが3月23日には全川(約2½)に亘り確認された。

稚魚降下期間中、稚魚の降下状況および障害物除去のためパトロールを行なつた。5月6日尾幌川河口附近に白魚の張待網があり、撤去方を漁協に連絡した。4月中は降河稚魚は見られず、5月からパトロール員を雇い巡視した。5月9日以降は増水のため流速が早く濁りのため稚魚は認められないが、沿岸の暖流部に小群遊が見られ、13日から23日までは全川に亘り原調に降下をつづけ、25日以降はほとんど河口附近に見られる様になり、降過は顧調に終つた。

稚魚降下の障害調査、稚魚降河状況調査を行なつた。弟子屈では稚魚放流期と増水期が一致したので順調に降河した。南弟子、磯分内附近でも主群の降下が認められ、標茶町五十石附近でも同様であつた。河川状況は例年に見られない降雪があつたため、増水期の水量も多く、稚魚はこの期間(5月11日頃)に大量降海したものと思う。

また、事業場附近は例年毒性アルミニウム化合物が含有されていたが、本年度はこれが半減し、稚魚降下に支障がないと認められたので、前期増水期に、輸送残数9,600千尾(放流全数24,000千尾)を自然放流したが、障害なく降海した。さらに捕獲場附近では例年より多くの稚魚降下が認められた。

稚魚の降下状況調査と障害物の除去を行なつた。期間中流木、洗木などの除去、ならびに流路に支障がある砂丘の除去も行なつた。増水期は4月中旬頃にあり、これに前後して稚魚は順調に降下し、4月下旬頃の減水とともに河口附近に移動した。さらに3月中旬頃、東15号橋附近では天然産卵稚魚の群遊が見られた。

稚魚の降下状況調査と障害物の除去を行なつた。 5月6日から8日までは本流が増水し濁りもあるため、稚魚は面川に滞留するのが見られた。(水温は本流  $7.0 \sim 7.2$  C、面川  $1.0.6 \sim 1$  1.0 C)9日から滅水を始め、10日には千代田えん堤下で多数の群遊が認められた。(河水温 8.0 C)13日には本川増水して水温も低下し(6.4 C)上流域に稚魚は見られなかつた。

放流水路から下流および本流ならびに河口附近の沿岸での稚魚の降下、降海状況を観察した。巡廻は 1日1回行なつた。本年は例年にない積雪多量のために放流水路の融雪が遅れたが、4月中旬頃から稚 魚の降下が増大し、下旬には本流および沿岸の浅瀬、山白漁港など到るところに稚魚の群遊が見られた。

		-t- Mr. 111	パトロール区域			パ	トロール区域
支	場	事業場	(回数)	水		系	区域
		歌 別	3.1 4~5.28	姥		別	事業場から河口までとバンケナイ川、エ ダコマナイ川
		頓 別	4.1 ~ 4.3 0	頓	,	别	事業場から河口までとヌルイ川、ウソタ ン川
		中 川	5.10~5.25	天	,	塩	事業場から下流のパンケナイ川および天 塩川本流
千	鼓	千 歲	4.22~5.1	千		歲	事業場から 祝梅川合流点までの千歳川
		敷 生		白		老	事業場から河口まで
			(4)	敷		生	事業場から河口までとメップ川、ウョロ 川
渡	息	八	4.3~7.3	遊	樂	部	事業場から砂蘭部川合流点までのセイヨ ウベツ川、遊楽部川

#### パトロール状況および結果

稚魚降下状況および気象状況に応じて随時パトロールするとともに、水温、透明度の観測を行なった。本年は3月下旬頃まで幌別川中流部の結氷が続き4月下旬よりパンケナイ川合流点附近に多数の稚魚の遊泳が見られ、5月中旬には河口での姿が見られた当初予想された融雪、降雨も少なく極めて気象条件が良い事から順調に降下したものと思う。

4月1日から随時バトロールを実施し、河川環境に応じて稚魚を放流し、河川内の遊泳群には追跡 して餌料の投与を行つた。4月下旬には放流水路の積雪が殆んど融けてヌルイ川合流点附近に降下稚 魚が見受けられ、下旬は本流の水量が少々多かつたが稚魚の降下には支障がなく、ウソタン川各所に も稚魚の群泳が見られた。

稚魚の降下状況調査とともに害魚駆除も行なつた。 初期には、支流パンケナイ川に多数の 稚魚が見られたが、本流では増水のために確認できなかつた。 25日以降は2、3日おきにパトロールを行なった。 6月4日放流水路と支流合流点下でうぐいが認められたのでこれを捕獲(約40尾)した。 さらに1週間後にも約500尾を駆除した。 これらのうぐいは 稚魚を捕食していた。

稚魚の流下状況調査ならびに障害物除去を行つた。各所の流木除去を行ない、捕獲場附近で稚魚を すくつている小学生に注意を与えた。 4月下旬には放流路下部、旧浄水場跡に群泳が見られ、西越捕 獲場附近では降下稚魚群が認められたが、祝梅川では認められなかつた。

稚魚の流下状況調査、障害物調査を行なつたが、河川状況が良好で、稚魚の被害は認められなかつた。

降河稚魚の動勢を観察し、その安全降下を図る目的で前年度と同様にバトロールを行なつた。初期は稚魚群は例年より若干少なかつたが、中期から後期にかけて魚体も大型となり、強健な稚魚が多数認められた。また、流木その他稚魚の降下に支障となる障害物を除去して完全な稚魚の降海につとめた。放流稚魚は4月上旬、放流地附近に群遊が見られ、その後順次セイヨウベツ橋、大関、立岩橋附近に拡がり、10日頃から比較的高温となり、河水も増加した。5月下旬から6月上旬にかけては各所で稚魚群の流下が見られ、6月中旬では稚魚の群遊も僅少となり、7月3日には放流水路、セイヨウベツ橋附近とも魚影が見られず、殆んど稚魚は降海したものと思われる。

## § 16 稚魚飼育事業

### 1 本年度稚魚飼育事業の実施方針

#### (1) 目 的

人工
ふ化事業によって生産放流された稚魚は、放流後降海するまでに餌料の不足、その他 河川環境の悪化などによって生育がはまばれ相当数が減耗すると考えられる。したがって事 業の効果を一層向上させるためには、稚魚に一定期間給餌して健康な稚魚とし、降河以降の 減耗を少なくし、さらには河川内、沿岸域の生育環境が整つた時期への放流調整を行ない、 回帰効果の向上をはかる。

#### (2) 本年度の課題

この飼育事業は8年目を迎えたが、逐年計画量も増大しており、本年度も飼育尾数、飼育 カ所数、増重倍率などの計画目標の違成をはかる。

また、放流稚魚のうち、給餌、無給餌の沿岸回帰量を比較した場合、遅楽部川の例で給餌したものは1.3 倍の効果があることが判明した。しかし全道的にはこの回帰率は大きな年変動があり、この変動要因の一つとして稚、幼魚の生育期における河川内の自然環境、海況の変化が考えられる。したがつて、健全な稚魚の育成強化、河川・沿岸域の環境条件に適した時期に放流する、いわゆる放流期調整、ならびに日本海区、襟裳以西海区における飼育強化の3点について本年度の課題として実施する。

### 2 当初飼育計画

本年度の増殖計画は、採卵数 6 1 6,4 0 9 千粒、放流尾数 4 9 1,3 0 9 千尾を見込み、当初飼育計画は飼育放流率 5 7.4 %に当る 2 8 2,3 0 0 千尾の飼育を計画した。その内容は第 1 表のとおりである。

第1表 飼育計画表

支 場	飼	育	場	飼	育	尾	数	支	場	飼	育	Se.,	場	飼	育	月	7	数
						7	一尾					S.	y o	10			Ŧ	尾
	岩	尾	别		2	2,00	0 (			徳	志		别			6, 5	0	0
	斜		里		9	, 0 0	0	天	塩	歌			登			4,0	0	0
北 見	網		走		4	,00	0	(5	カ所)	頓			别	11		4, 0	0	0
(6カ所)	北		見		4	,00	0			中			Ш			2,3	0	0
	湧		别		2 1	,00	0			天	*		塩			9, 0	0	0
	幌		内		4	,00	0	-			計	-	•		2	5, 8	0	0
		計			4 4	,00	0			静			内			5, 0	0	0
	羅		自		6	, 0 0	0	千	荿	激			生	1000	1	2, 0	0	0
	伊	茶	仁		2 2	,00	0	(4	カ所)	千			葳			6, 5	0	0
根室	中	標	津		7	, 0 0	0			支	笏		湖			1,0		
(5カ所)	計	根	别		8	,00	0				計					4, 5		1
*	虹		別		5 1	,00	0	-		利			別		_	2, 5		
		計			9 4	,00	0			八		-	雲			8, 0		
	太		田		6	,00	0	渡 (4	島カ所)	厚	沢		部			1, 5		
	釧		路		6	,00	0			尻			别			4, 0		. 1
十 勝	鶴		居		9	,00	0				計		1			6,0		
(6カ所)	幕		別		2 6	,00	0											
	礼	3	内		3 0	,0 0	0					-						
	+		勝		1 1	,00	0	合	計		307	所		2		2, 3	0	0
		計				, 0 0							M. 4.					

## 3 飼育事業の経過概要

さけ稚魚飼育事業について、本年度を含む過去5カ年(昭和40~44年度についてみると、 平均を上廻つたにも拘らず、飼育放流率は低下した。しかし飼育の実数は年々増加しており、 ・その他の魚種を含めて計画の3億尾を達成した。

第2表 昭和40~44年の5カ年間における飼育実績(さけ)

		4 0 年度	7.		4 1 年度	4		4 2 年度	
支場	実 施 事業場 (A)	放流尾数 (B)	飼育 放流率 (C)	A	В	С	A	В	С
		千尾	%		千尾	96		千尾	96
北 見	2	1 9,3 5 7	2.2.3	5	3 1,4 5 9	5 6.8	4	3 8,3 0 5	4 3.8
16 56	9 (1)	8 6,9 6 8		8	5 5,4 0 6		7 (1)	87,543	
根室	1	1 9,9 9 9	1 0.3	4	4 5,2 1 3	4 0.2	5 (1)	47,012	3 5.5
似 主	1 1 (3)	194,435		1 5 (6)	1 1 2,4 5 3		1 2 (5)	1 3 2,3 3 1	
十 勝	5	6 5,7 7 1	3 5.5	7	5 8,1 7 1	90.2	6	9 3,6 0 3	6 6.1
ו ו	1 0 (3)	185,185		7	6 4,4 7 6		9 (3)	1 4 1,5 4 4	
天 塩	1 .	5,8 2 0	2 2.8	4	1 0,4 3 3	9 2.7	4	1 5,1 7 8	6 4.1
人加	5	2 5,5 7 4		4	1 1,2 5 5		5 (1)	2 3,6 8 9	
千 歳	1	8,5 4 7	2 5.0	6 (3)	8,5 8 8	6.3.2	3	1 0,0 7 7	3 2.9
ASX.	8(1)	3 4,1 2 5		9 (4)	1 3,5 9 0		8 (4)	3 0,6 5 0	
渡島	1	1,780	7.7	3	3,628	2 4.4	7	6,986	3 6.8
0久 苘	8(3)	2 2,9 9 0		7 (3)	1 4,8 5 6		6 (3)	18,972	
計	1 1	121,274	2 2.1	2 9 (3)	157,492	5 7.9	2 4 (1)	211,161	4 8.6
βl	5 1 (11)	5 4 9,2 7 7		5 0 (13)	272,036		4 7 (17)	4 3 4,7 2 9	

註 年度は、親魚捕獲、採卵の実施年で、翌年の稚魚放流終了(6月頃)までを云う。

( ) 内数字は民間仮収容場数を示す。

放流尾数欄の上段は飼育放流尾数、下段は総放流数。

飼育放流率=飼育放流尾数/総放流尾数

	4 3 年度			4 4 年度		5 ケ年	平均(40~	44)
A	В	С	A	В	О	実 施事業場	放流 尾数	飼 育 放流率
	千尾	%		千尾	%		千尾	%
5	3 0,6 5 0	9 5.6	6	4 4,5 5 6	4 9.9		3 2,8 6 5	4 6.8
7	3 2,0 4 9		8	8 9,3 1 5			7 0,2 5 6	
6	7 4,20 8	9 4.1	6 (1)	9 8,8 5 2	9 1.9		5 7,0 5 7	4 5.6
9 (2)	78,878		7 (4)	107,524			1 2 5,1 2 4	
7	6 1,0 5 8	9 5.3	6 (1)	7 9,4 5 1	7 9.0	-	7 1,6 1 1	6 4.4
9 (2)	64,056	. 1 7	7 (5)	100,630			111,178	11
6 (1)	1 3,0 2 8	9 6.2	5 (3)	2 2,8 2 3	1 0 0.0		1 3,4 5 6	6 9.4
8 (3)	1 3,5 4 3	1	5 (3)	2 2,8 2 3			1 9,3 7 7	-
3	7,645	8 9.6	3	14,964	7 3.0		9,9 6 4	4.6.4
7 (3)	8,5 3 7		4 (3)	20,510			2 1,4 82	
3	5,0 3 9	4 8.6	3	9,5 7 3	4 6.1		5,4 0 1	3 0.7
7 (3)	1 0,3 7 5		5 (4)	20,769			17,592	-
3 0 (1)	191,628	9 2.4	2 9 (5)	270,219	7 4.7		1 9 0,3 5 5	5 2.2
1 7 (13)	207,438		3 6 (19)	361,571			365,010	

## 4 事業実施結果

本年度の実施方針に基づき、技術的には当場の事業実施要領により実施した。実施個所・餌料 その他の概要は夫々以下に述べるとおりである。

### (1) 実施個所

さけその他魚種について当初30 カ所を予定したが、1 カ所滅の29 カ所となり、その内訳は第 $3\sim7$ 表のとおりである。

第3表 さけ飼育成績

支場	事業場	餌	料	給	餌	飼育	量 量	浮上	魚体	斃死
又物	争来物	給餌量	種類	期間	日数	尾 数	重量	体長	体重	尾数
		Kg		月日~月日		千尾	Kg	cm	g	千尾
北見	岩尾別	700	乾	3. 1~5.20	81	2,000	600	3.4 0	0.3 0	1 :
	斜 里	7,510	"	3. 1~5.30	91	1 3,0 0 0	3,6 4 0	3.2 8	0.28	40
	網走	1,400	"	3.20~5.30	72	* 7,3 0 9	2,229	3.3 5	0.30	5
	北 見	700	"	3.20~4.27	3 9	4,000	1,200	3,30	0.30	5
	湧 別	4,100	"	3.1 0~5.20	72	1 4,3 3 6	4,4 4 5	3.5 3	0.31	5
	幌 内	480	"	3.10~5.20	72	4,487	1,4 3 6	3.0 0	0.3 2	:
	計	1 4,8 9 0		3. 1~5.30		4 5,1 3 2	1 3,5 5 0	3.3 1	0.30	57
根室	羅 臼	2,800	乾	1.20~5.30	131	4,039	1,211	3.1 0	0.30	11:
	伊茶仁	8,089	"	5. 4~6.1 4	42	27,500	9,505	3.5 0	0.35	31
	中標津	3,0 0 0	//	2.18~6. 6	78	9,000	2,7 5 0	3.3 0	0.30	2,70
	計根別	5,000	11	2.20~5.23	93	11,860	4,5 2 5	3.5 0	0.3 7	24
	虹 別	2 2,3 0 0	"	3. 1~4.30	61	4 5,8 1 9	14,662	3.3 0	0.32	795
	厚 床	530	"	4.20~5.10	41	1,790	555	3.2 0	0.31	63
	(穂香)	300	"	2.2 5~4.3 0	6.5	424	131	3.20	0.31	4
	計	4 2,0 1 9		1.20~6.14		100,432	3 3,3 3 9	3.3 2	0.33	1,580
十勝	釧路	6,400	乾	3.16~5.10	56	15,000	5,400	3.10	0.3 6	7.5
	鶴 居	4,0 7 0	"	3.1 1~5.2 0	71	1 0,3 4 0	3,205	3.2 4	0.31	40
-	幕 別	6,030	"	3.1 0~5.1 0	50	21,950	8,177	3.60	0.3 7	21
	礼内	8,800	"	2.11~5.20	98	1 5,0 0 0	5,700	3.6 0	0.38	750
	十 勝	3,4 9 0	"	4. 1~6. 2	63	10,829	4,1 1 5	3.6 0	0.37	246
	大 樹	1,690	"	3. 2~430	41	4,014	1,750	3.86	0.44	114
	(広尾)	1,5 1 0	"	3.1 0~4.2 0	41	3,841	1,651	3.80	0.4 3	81
	計	31,990		2.1 1~6. 2		80,974	29,998	3.5 5	0.3 7	1,523

放	量	放流:	魚体	歩	増重	成士	是度	水	温	РН	DO	-V 191	飼育
尾 数	重量	体長	体重	留	上上	体長	体重	低~高	平均	PH	טע	水量	面積
尾	Kg	cm	g	%	倍	倍	倍	.C	.C		ppm	见/分	7702
1,988	1,391	4.50	0.70	9 9.4	2.3	1.3	2.3	3.0~ 8.0	5.7	7.2		1,500	1,800
1 2,600	1 8,9 0 0	6.3 0	1.5 0	9 6.9	5.2	1.9	5.4	7.4~ 8.0	7.9	7.3		1,800	910
7,253	3,4 9 6	3.97	0.48	9 9.2	1.6	1.2	1.6	5.7~1 3.0	8.3			300	603
3,950	1,502	3.70	0.38	98.8	1.3	1.1	1.3	5.0~ 8.0	5.7	6.6	8.4	680	569
1 4,2 8 0	15,993	5.26	1.12	9 9.6	3.6	1.5	3.6	4.0~ 8.8	6.9	6.5	7~9	4,500	821
4,485	2,3 4 6	4.10	0.52	9 9.9	1.6	1.4	1.6	6.0~ 7.5	6.6			1,0 00	320
4 4,5 5 6	4 3,6 28	4.64	0.98	9 8.7	3.2	1.4	3.3						
3,926	5,725	5.1 0	1.50	9 7.2	4.7	1.6	5.0	5.4 11.0	8.7	7.9	9.6	1,200	771
27,189	1 9,9 2 7	4.77	0.73	9 8.9	2.1	1.4	2.3	5.0~1 7.0	1 0.1			4,800	1,637
8,7 3 0	5,3 7 0	4.4 0	0.61	9 7.0	1.9	1.3	1.9	2.8~1 5.0		6.6 ~7.2	9.0~	1,600	738
11,836	16,291	5.30	1.36	9 9.8	3.6	1.5	3.6	5.0~ 9.5				220	330
4 5,0 2 4	3 0,6 1-7	4.3 0	0.68	9 8.3	2.1	1.3	2.1	8.9~ 9.9	9.4	7.2		10,000	
1,727	1,002	4.0 0	0.5 8	9 6.5	1.8	1.3	1.9	5.5~1 0.0	7.6	7.1	9.5	400	130
420	312	4.50	0.74	9 9.1	2.4	1.4	2.4	7.4~ 9.5	8.5	6.8	9.4	80	18
98,852	7 9,2 4 4	4.6 2	0.80	9 8.4	2.4	1.4	2.4						
14,925	9,5 52	4.50	0.6 4	9 9.5	1.8	1.5	1.8	6.0~ 9.0	7.5		- 1	400	1,603
10,300	1 0,1 9 7	5.00	0.9 9	9 9.6	3.2	1.5	3.2	4.5~ 9.9	7.7	7.0		20 0 0	787
21,733	28,010	5.30	1.28	9 9.0	3.4	1.5	3.5	3.5~ 9.5	7.1	7.1		6,0 0 0	3,700
14,250	1 6,2 4 5	5.50	1.3 5	9 5.0	2.9	1.5	3.5	44~12.8	9.3	6.8 ~7.2	5.0 ~ 1 0.5		3,640
10,583	7,736	4.70	0.7 3	97.7	1.9	1.3	1.9	1.5~1 0.0	6.8	1.5		4,435	1,3 8 6
3,900	2,503	4.50	0.64	97.2	1.4	1.2	1.5	62~ 7.8	5.1			389	135
3,760	3,0 0 8	4.90	0.80	97.9	1.8	1.3	1.8	6.8~ 8.0	7.0				333
79,451	7 7,2 5 1	4.91	0.97	9 8.1	2.6	1.4	2.7	~	1				

	- N/ I -	餌	料	給	餌	飼 育	量	浮上魚	魚体	斃 死
支場	事 業 場	給餌量	種類	期日	日数	尾 数	重量	体長	体重	尾 数
		Kg		月日~月日		千尾	Kg	cm	g	千尾
天塩	徳 志 別	1,400	乾	2.2 0~5.1 0	80	4,066	1,0 5 7	3.30	0.26	6 6
	歌 登	1,1 80	"	2.20~5.18	85	3,191	970	3.2 2	0.30	3 8
	頓 別	1,240	"	2. 1~4.3 0	89	4,903	1,5 6 5	3.10	0.32	15
	中 川	1,2 60	"	2. 6~6.1 3	138	1,3 9 2	420	3.75	0.30	12
	天 塩	503	"	5. 8~6. 3	27	7,605	2,3 9 6	3.3 6	0.32	73
	(増毛)	420	"	5. 8~6. 9	33	990	297	3.20	0.30	10
	(增幌)	60	"	4.21~6. 9	50	4 6 0	143	3.10	0.3 1	10
	(時前)	60	"	5.1 1~6. 9	30	450	140	3.10	0.31	10
	計	6,1 2 3		2. 1~6.13		23,057	6,988	3.2 7	0.30	234
千歲	千歲	546	乾	3. 9~5.13	66	7,074	1,869	3.21	0.26	181
	静内	1,5 5 0	"	1, 6~5. 4	119	5,636	1,4 65	3.70	0.26	4 4
	敷 生	1,0 50	"	1.20~4.21	92	2,5 3 0	959	3.40	0.3 5	5 1
	計	3,1 4 6		1. 6~5.13		15,240	4,2 9 3	3.1 0	0.28	276
渡島	八雲	2,1 90	乾	3.2 1~5.3 1	72	6,0 7 0	2,553	3.4.0	0.42	7 5
	利 別	1,0 5 0	"	3. 1~4.30	61	2,0 5 5	698	3.30	0.3 4	41
	厚沢部	1,050	"	2. 1~4.3 0	89	1,820	554	3.40	0.31	256
	計	4,2 90		2. 1~5.31		9,9 4 5	3,805	3.3 7	0.38	3 7 2
合	計	102,458		2. 1~6.1 4	11	274,780	91,973	3.43	0.33	4,5 6 1

第4表 さくらます飼育	<b></b> 放	
-------------	-----------	--

	THE	· 사다 - 十旦	餌	料	給	- arl	餌	Í	同『	Ť	量	浮上:	魚体	斃 死
支場	事	業場	給餌料	種類	期	間	日数	尾	数	重	量	体長	体寬	尾数
		2 1 1 1	Kg	1.5	月日	~月日		ii j. l-	千尾	n. 18	Kg	cm	g	千尾
渡島	尻	別	2,220	乾	2. 1	~5.23	117		2,667	1 0	827	3.1 3	0.3 1	3 4 7
千歲	千	蔵	172	乾	3. 1	~4.30	61		505	7 4	111	3.0 0	0.22	155
合		計	2,3 9 2		2.	1~5.2 3			3,1 72	71 7 1	938			502

放	充 量	放流	魚体	法	增重	成長	度	水	温	PH	DO	水量	飼育
尾 数	重量	体長	体重	留	里比	体長	体重	低~高	平均	РН	DO	小里	面積
千尾	Kg	ст	g	%	倍	倍	倍	,C	.C	-	PPm	2/3	$m^{s}$
4,000	5,200	5.40	1.30	98.4	4.9	1.6	5.0	5.2~ 9.0	6.1	6.8	8.0~ 1 0.0	700	231
3,1 5 3	3,5 94	5.4 6	1.14	98.8	3.7	1.7	3.8	1.4~ 7.5	5.4	5.8	9.9	700	194
4,888	5,2 4 9	4.30	1.0 5	99.7	3.4	1.4	3.3	4.6~ 7.0	5.5	1		800	326
1,3 80	3,505	5.72	2.54	9 9.1	8.3	1.5	8.5	3.2~10.0	4.9	7.3	9.2	1,200	100
7,532	3,239	3.67	0.43	9 9.0	1.4	1.1	1.3	1.2~16.5	5.3	6.6	3.0~	630	660
980	441	3.56	0.45	9 9.0	1.5	1.1	1.5	1.5~10.5	2.8	6.0 ~6.2		200	146
450	216	3.80	0.48	97.8	1.5	1.2	1.6	4.0~ 9.0	7.3			200	79
440	2 73	4.3 0	0.62	9 7. 8	2.0	1.4	2.0	4.0~ 8.0	6.2			200	52
22,823	21,717	4.53	0.95	9 9.0	3.1	1.4	3.2						
6,893	2,831	3.61	0.39	97.4	1.5	1.1	1.5	3.0~ 8.2		6.7		1,350	594
5,5 9 2	2,533	4.10	0.45	99.2	1.7	1.5	1.7	3.0~1 4.9				620	766
2,4 7 9	4,030	5.90	1.50	97.9	4.2	1.7	4.3					400	178
14,964	9,394	4.54	0.63	98.2	2.2	1.4	2.3	6.8~ 9.7	8.8	8.0			
5,995	4,167	4.50	0.70	98.8	1.6	1.3	1.7	3.0~ 9.0	6.7	7.2		300	568
2,0 1 4	1,792	4.60	0.90	98.0	2.6	1.4	2.6	8.2~11.3	9.5			400	215
1,5 6 4	2,489	5.79	1.59	8 5.9	4.5	1.7	5.1						1 81
9,5 7-3	8,4 4 8	4.96	0.88	9 6.3	2.2	1.4	2.3						
270,219	239,682	4.83	0.88	98.3	2.6	1.4	2.7						

放	量量	放流	魚体	歩	增重比	成县	腹	水	温	PH	DO	水量	飼育
尾 数	重量	体長	体重	留	土	体長	体重	低~高	平均	ın	DO	小鱼	面積
千尾	Kg	ст	g	96	倍	倍	倍	.C	.C		PPm	见份	7N2
2,320	1,554	4.40	0.67	8 7.0	1.9	1.4	2.2	3.0~9.4	6.2	7.4	11.3	3,000	490
200	116	3.90	0.58	-	_	1.3	2.6	8.0~8.2	8.1	6.7		3 70	3 4
(残り15	1 0 千尾は引	続き食	同育 )						1				
2,520	1,670												

第5表 からふとます飼育成績

			T	餌	料	給		糾	Ü	育	:	量	浮上/	魚体	斃 死
支場	事	業 場	1	給餌料	種類	期	間	日数	尾	数	重	量	体長	体重。	尾数
			1	Kg		月日·	~月日			千尾		Кд	cm	g	千尾
北見	斜	里		490	乾	2. 1	~2.28	28	3	3,000		630	3.3 9	0.2 1	6 5
	湧	別	1	750	"	2. 1	~2.28	28	3	3,2 3 2		711	3.4 9	0.22	12
		計	1	1,240		2. 1	~2.28		(	5,2 3 2		1,3 4 1	3.4 4	0.22	77
根室	根	室		1,2-70	乾	2. 1	~4.30	89		5,0 5 0	,	1,2 6 2	2.70	0.25	40
天塩	徳	志別	]	1,000	乾	2.20	~5.10	80		5,324		1,0 6 5	3.2 0	0.2 0	24
	頓	<del>ال</del> ا	j	440	"	2. 1	~4.30	89	2	2,169		4 8 6	2.90	0.2 2	4 5
	中	JI	1	1,000	"	3.2 5	~6.1 3	101		5,496		1,430	2.7 7	0.26	4 6
	(	増幌)	1	200	"	4.11	~6. 9	60		1,4 83		297	2.90	0.20	3 3
		計	1	2,640	乾	2. 1	~6.13		1	4,4 72		3,2 7 8	2.94	0.23	148
渡島	八	46	24	730	乾	2.10	~5.20	100		1,852		519	3.17	0.28	7
合	-	計		5,880	乾	2. 1	~6.1 3		2	7,606		6,400	3.0 6	0.23	272

## 第6表 ますのすけ飼育成績

-1-154	_	- tide - List	餌	料	給		餌	飼	育	Ĩ	量	浮上	魚体	斃 死
支場	爭	菜 場	給餌量	種類	期	間	日数	尾	数	重	量	体長	体重	尾数
			Kg		月日~	月日			千尾		Kg	cm	g	千尾
天塩	中	Ш	1,200	乾	2.1 6	~6.2 6	131		421		154	3.66	0.3.7	13

## 第7表 交配種飼育成績

	支場 事 業 場		餌	料	給		餌	飼	育	-	道	浮上	魚体	斃死	
支場	事	菜	場	給餌量	種類	期	間	日数	尾	数	重	量	体長	体重	尾数
				Кд		月日	~月日			千尾		Kg	ст	g	千尾
根室	羅		自	120	乾	2.20	~3.2 6	44		546		169	_	0.31	83

								4%				- 40 PE	3
放闭	危 量	放流	魚体	歩	増	成士	退	水	温	РН	no	-t- 484	飼育
尾数	重量	体長	体重	留	増重比	体長	体重	低~高	平均	rn	DO	水量	面積
干尾	Kg	ст	g	%	倍	倍	倍	.C	.C		ppm	见/分	$m^3$
2,935	3,551	5.68	1.21	97.8	5.6	1.7	5.7	7.4~8.0	7.9	7.3		1,800	814
3,220	966	3.6 7	0.30	99.6	1.4	1.1	1.4	5.9~6.0	5.9	6.3		1,000	186
6,155	4,517	4.67	0.73	98.7	3.4	1.4	3.3						
4,990	2,999	4.20	0.60	98.8	2.4	1.6	2.4	2.9~8.7	5.3	6.9	10.2	420	432
											."	* j., ;	
5,300	4,003	5.20	0.97	99.5	3.8	1.6	4.9	1.8~9.0	3.6 ~6.1	7.0	10.0~	1 500	3 60
2,1 24	1,920	4.90	0.90	97.9	3.9	1.7	4.1	4.6~7.0	5.5	6.4	9.0~	800	163
5,4 50	6,759	5.0 0	1.24	9 9.2	4.7	1.8	4.8	3.7~1 0.0	5.6	7.3	9.2	1,200	300
1,450	580	3.60	0.40	97.8	1.9	1.2	2.0	4.0~9.0	7.3			200	79
14,324	13,262	4.4 0	0.93	98.9	4.0	1.5	4.0						
1,845	959	4.77	0.52	99.6	1.8	1.5	1.9	6.0~9.5	7. 8	8.0			173
27,314	21,737	4.63	0.79	98.9	3.4	1.5	3.4						

飼育	水量	200	THE	温	水	度	成長	増	歩	t 魚体	放流	6 量	放
面積	小里	DO	PH	平均	低~高	体重	体長	重比	留	体重	体長	重量	尾 数
$m^2$	见分	ppm		.C	o, C	倍	倍	倍	%	g	cm	Kg	千尾
90	600		7.3	5.1	4.0~1 2.1	6.9	1.7	6.7	9 6.8	2.5 3	6.31	1,032	408

放流	造量		放流	魚体	歩	増	成县	度	水	温	DII	DO	. J. 159	飼育
尾数	重	量	体長	体重	留	重比	体長	体重	低一高	平均	PH	DO	水量	面積
千尾		Kg	cm	g	%	倍	倍	倍	.c	.C		ppm	业分	$m^2$
463	23	87		0.62	84.8	1.7		2.0	5.0~14.0	9.0				

#### (2) 館 米

飼育事業を開始した当初は、稚魚の生理、生態面を考慮して生配合餌料を使用したが、稚魚の生理機構および飼育事業の合理化の観点から乾燥配合餌料に統一して既存の養鱒餌料を一部改良して使用した。

本年度はさらに粒形としてA号(0.1 mm以下)、B号(0.5~1.0 mm)、C号(1.0~1.5 mm) の3種に区分する一方、餌料中のビタミン含有量の最低基準量を定めて餌料品質の改善により飼育成績の向上を図つたが、粒形区分による沈降速度の急速化の低減、添加ビタミンの変性防止などの対策が今後検討されなければならない。

第8表 昭和44年度使用餌料成分

品質・形状	乾 燥 配 合 餌 料
粒 形	餌 付 用 (A号) 0.1 %以下
	前 期 用 (B号) 0.5~1.0 %
	後 期 用 (C号) 1.0~1.5 %。
成 分	粗蛋白 48.0~54.0%以上
	粗脂肪 4.0~ 7.0% //
	粗 繊 維 0.2~ 1.5%以下
	粗灰分 10.0~13.0% //
	水 分 7.0~10.0% //
配合原料	ホワイト、フイツシユミール、肝粉、血粉、酵母、脱脂粉乳、小麦粉、
	アルフアー澱粉、混合ミネラル、混合ビタミン、その他微量添加物
ビタミン含量	V.A 4,400IU ナイアジン 450mg
(1kg 中の含有量)	B <sub>1</sub> 30mg パントテン酸 200 m
	B <sub>2</sub> 90″ パラアミン安息香酸 200″
	E 180" = "J > 4,000"
	B <sub>6</sub> 30" イノシトール 600"
	B <sub>12</sub> 0.05" ピオチン 25"
	K <sub>3</sub> 20" 葉 酸 10"
	D 1,000IU
	C 1,000mg

#### (3) 各場別の実施結果

各場別の飼育環境ならびに魚種別の実施結果は第4表~第7表のとおりであるが、各支場別の 飼育概要は次のとおりである。

#### ◎北見支場

(さけ)

さけ卵を収容した8事業場のうち6事業場(前年度に幌内を増加)において、45,132千尾に給餌を行なつた。これから、全放流尾数の半数に当る44,556千尾(49.9%)を給餌放流した。

飼育中のへい死尾数は全飼育尾数に対して1.3%であり、ほぼ順調に実施された。前年までへい死率の高かつた北見、網走両事業場においては、へい死の原因となつている水量不足による水質悪化を防止するため、無理をせずに、また給餌方法を検討するなど、慎重な飼育管理を行なった結果、良好な成績を得た。

増重比は例年とおり諸条件の良い斜里、 湧別両事業場でそれぞれ 5.3 6 %、 3.6 1 %と極めて 高い率を示した。

(からふとます)

斜里、湧別両事業場でそれぞれ浮上稚魚の約半数に対して実施した。給餌稚魚放流尾数は量的には前年度より上廻つたが、収容卵数が多かつたため、比率においては全放流数の17.2%と前年度(49.3%)を大きく下廻つた。

両事業場ともからふとますの飼育は本年度初めてであるため諸条件の差により飼育稚魚の成長に大きな差を生じた。給餌期間は両場とも28日間であるが、増重比は斜里で5.76%、湧別が1.36%となつた。これはからふとますの場合、餌に馴れにくい。斜里においてはさけ稚魚と混在在して摂餌し、湧別においてもさけ稚魚と混在したものが良い成長を示した。

#### ◎ 根室 支場

本年度の飼育尾数は昭和37年度伊茶仁事業場で給餌放流を開始して以来最大量であつた。本年度は7カ所の事業場で100,432千尾を1月21日から6月14日までの期間に夫々飼育され、この間44,720kgの餌料を給餌し、これによつて約47トンの増重量となり、増重比は2.4を示し、総生産放流量は98,852千尾(約81トン)となつた。

虹別事業場では全道でも初めての大型完全自動給餌機を取り付け、給餌能率化が向上した。 伊茶仁事業場では5月9日から5月12日の間に断続的な降雨によつて飼育池の一部がはんらん し、給餌終了前に約500万尾を放流した。

厚床事業場では、浜中、虹別事業場から輸送放流後に地元漁民の手で給餌が行なわれた。

### ◎ 十 勝 支 場

本年度の飼育事業は浮上尾数102,951尾のうち77,283尾(75%)の稚魚を対照に乾燥配合餌料31,990kgを2月11日から6月2日まで約4カ月間、太田を除き6事業場で実施した。

給餌期間中1,564千尾のへい死があり、歩留り97.9%(前年度99.0%)で、75,691 千尾を飼育放流し、飼育計画に対し87.8%の達成率であつた。また体長成長率は1,405倍、 体重成長率2.514倍と前年度に比較してほぼ同様な成長を示し、計画目標(増重比2.0)を上 廻つた。

給餌開始は前年度同様に稚魚が $80\sim90$  %浮上した頃から水位を高め給餌が容易にできるように努めた。また、放流稚魚の健全強化を高めるために養魚池から放流河川の連絡部に仮設の給餌場所を造り、水深 $50\sim100$  cmに保つて給餌効果を一層高めた。水量は各場毎に違いがあるが $389\sim600$  化分、水温は $1.5\sim12.8$  %の範囲であつた。

#### ◎ 天塩支場

本年度さけは 4 カ所、さけ + から s とます 3 カ所、さけ + から s とます + ますのすけ 1 カ所で 給餌飼育を実施した。本年度は管内全般に亘り例年にない積雪に見舞われ、このため水温が低下し(前年度より平均 1 で低下)摂餌状況が悪かつた。

徳志別事業場の給餌方法は前年度同様、散布を主体とし、給餌回数を多くしたが、餌料による 池の汚染があつた。稚魚の積雪被害、酸素不足による機能障害によるへい死が多かつた。歌登事 業場では直接散布給餌を行ない、水梁、底質などの環境を充分管理した結果、良好な成績が得ら れた。頓別事業場では日中は散布給餌、夕方は給餌盆による置餌を併用したが、水温が低く(前 年度より1℃)成績も前年度より若干下廻つた。

中川事業場では養魚池から粗堀池に移して前年度同様に吊餌、散布を併用したが、成長も同様で良好な成績ではなかつた。天塩事業場では収容期の遅れと水温の低下によつて成長も悪かつた。ますのすけ稚魚の飼育は中川事業場で2月中旬から開始し、散布と置餌を併用したが、3月上旬に稚魚の摂餌状態が悪く1週間給餌を中止し、再び給餌を行なつた。

#### ◎ 千 歳 支 場

さけについては敷生を除いて千歳、静内とも前年度とも成績が下廻つたが、特に千歳については河川水の混入による水温の低下、ひれ腐れ病による摂餌不足、餌料沈降速度が早いなどの原因で、成績が低下したものと考えられる。千歳事業場におけるさくらますについては、水温を考慮してふ化槽に移して飼育したが、ここにもひれ腐れ病が発生してへい死が多くなつたので給餌量を減じ"ダイメント"を投与し、へい死の減少をはかつた。

#### ◎ 渡 島 支 場

渡島支場管内の飼育事業はさけ、からふとます、さくらますの3魚種について、4事業場で 14,464千尾の稚魚に乾燥配合餌料7,120kgを2月1日から5月31日までの間に給餌を 行ない歩留り95.0%で、13,737千尾を飼育放流した。

# § 17 昭和44年度調査研究結果

本年度の調査研究は現在の悪化しつつある繁殖環境の下において 有効な再生産補充をいかに確保するかを目的として、さけ・ます親 魚、稚魚の生理・生態、資源変動要因の解析、環境障害の実態に関 する研究を進めてきた。

そして研究域を稚魚については河川から沿岸域に、親魚について は北海道から本州へと拡大した。

これらの研究の今迄に得られた結果の概要を取りまとめた。

### 調査研究項目

I 增殖基礎調査	187
1. さけ・ます稚魚の生理生態に関する調査	187
(1) さけ・ます稚魚に関する調査データーの総括ならびに補足試験	187
(2) 新規育成河川における、さけ稚魚の生態に関する調査	
(余市川におけるさけ稚魚の生態調査)	187
(3) 河川の餌料条件に関する基礎調査	187
(4) 放流稚魚の保護に関する調査	
(5) 餌料組成の改善に関する調査(餌料中のビタミンCのボーラログラフ的定制	量法)…189
(6) さけ・ます類異種交配に関する調査	198
2. さけ・ます親魚の生理、生態に関する調査	200
(1) さけ・ます親魚の産卵生態に関する調査	200
(2) さけ親魚のエネルギーに関する調査	201
(3) さけ親魚の蓄養条件に関する調査(札内蓄養池環境条件の検討)	222
3. さけ、ます資源動態ならびに生物統計調査	225
(1) 稚魚の標識放流試験	225
(2) 標識親魚の回帰実態調査	226
(3) 漁獲物組成調査	
4. 環境条件ならびにその保全に関する調査	231
(1) 河川の住状に関する調査	231
(2) さけ・ます人工ふ化用水に関する調査	231
(3) 有機廃水と環境に関する調査	231
(4) 有機廃水と水産生物に関する調査	
(5) 釧絡川のアルミニウムについて	
(6) 溶存窒素によるふ化稚魚のへい死とその除去について	233
(7) 札内事業場養魚池におけるふ化稚魚の特異行動について	
(44年度札内事業場における飼育稚魚のへい死について)	240
5. 魚病ならびに水生菌に関する調査	244
(1) 魚病に関する調査	244
(2) 水生菌の防除に関する調査	244
6. 閉鎖水域におけるさけ属の資源変動に関する研究(支笏湖ーひめます)	245
Ⅱ 沿岸水域調査	248
1. あきさけ親魚の標識放流試験	248
2. 噴火湾沿岸におけるさけ・ます稚魚の生態調査	254
Ⅲ 他研究機関との共同研究	259
1. 遊楽部川のさけ・ます生産力に関する研究	259
2. さけ・ますおよび河川水中の特殊極微量元素の研究	259

## I 增殖基礎調查

### 1 さけ。ます稚魚の生理生態に関する調査

## (1) さけ・ます稚魚に関する調査データーの総括ならびに補足試験

さけ・ます資源は、その稚魚期の生き残り度合いに大きく左右されると云われている。従って、 人工な化事業を高度化するためには稚魚の生理、生態を知り、それに適応する管理が必要である。そ のため、それぞれの成長段階における種々の環境条件との関係、あるいは餌料との関係などについて、 調査研究を長年に亘って行なってきている。それらの調査結果は現在取りまとめ中であり後日報告する。

## (2) 新規育成河川における、さけ稚魚の生態に関する調査

余市川におけるさけ稚魚の生態調査

石狩沿岸域のさけ資源の回復を目的にして、余市川に放流したさけ稚魚の生態に関する調査は昨年 に引続いて行なわれその結果は下記の通りである。

千歳ふ化場でふ化、飼育したさけ稚魚50万尾を陸上輸送して、4月3日~6日の間、余市川大江 地区に放流した。

放流稚魚の主群は昨年同様、4月上旬~下旬の間の雪解けの増水時に降海し、4月中旬以降、余市 湾の沿岸域に姿を現わし、忍路、塩谷万面には4月下旬~5月の中旬に回遊したことが確認された。

河川内の滯留は昨年と若干異なり、6月中旬には殆んど降海したことが明らかにされた。

沿岸域での混獲に関して、今年は天候不順の影響によるものか、こなごの接岸は例年に比べて遅れまたその魚獲量も少なかったため、稚魚の混獲も極めて少なかった。

昨年の結果と併せ、余市川に放流したさけ稚魚は、余市湾ー忍路-塩谷-祝津の沿岸域を生育場と し、6月中~下旬までには10cm前後に生長して沖合生活に移ることが明らかとなった。

## (3) 河川の餌料条件に関する基礎調査

降海期における稚魚の生長、生残りに関係する餌料条件について各支場単位で代表的河川の流下昆虫量を調査した。

その結果、調査方法にも今後改善の余地があるが、河川の性状(底質、濁度)によって流下昆虫量に差のあることが知られ、一般に清澄で砂礫質の河川では多く泥質、湿質の河川では極めて少ないことがうかがわれた。

流下昆虫の種の大部分はユスリカ昆虫で、他の種は比較的少ない。このことは底生生物の生態の 反映と考えられるべきであろう。調査河川、調査方法は今後充分検討の必要がある。

### (4) 放流稚魚の保護に関する調査

河川は放流された稚魚が海へ出るために必要な健康を維持する環境でなければならない。特にその水質環境が降下中の稚魚にどのような影響を与えているかを知ることは、増殖の手段ならびに保 護対策を検討するうえで重要な問題である。

本調査は、石狩川の環境が稚魚に与える影響について知るため、生理・生態的な面について調査 ( 稚魚の群行動、摂餌行動、血液生理など ) を実施しようとするものであるが、本年はその予備調査 として石狩川本流における放流期の稚魚の外観についての観察を行なった。

この調査では 放流 後 の 稚魚 を 追跡 採取 する予定であったが、増水などの危険が生じたため、 江別(石狩川と千才川の合流点)まで自動車輸送し、その後は漁船(5トン)を使用して両側にウォ ギ用魚籠を 2 個つなぎ、その中にさけ稚魚 2 0 0 尾づつ入れ、江別から石狩川河口まで流れと同じ 速度で流下し、この間の稚魚の状態を観察した。その結果は第1表のとおりである。

第1表	追跡調査結果			4 4	. 5.	20	晴
and the second second second	The state of the s	ALC: A STANLE MADE OF THE PERSON NAMED OF TAXABLE PARTY.	the same printed the same of the same of the same	and the Parket	And and the second of the second		
	1 11 25	6 hr					

-10	. 213	+ 2	`	为日的1000ELW17							-	1. 0. 2	0 113	
覾	測	地	点	出発点から距離	出発点かり経過時	うの間	水	温	気	温	РН	透視度	稚魚の別	態
				km	時	分		°C		°C		cm		
江	别	大	橋					11.7	}	14.2	6,5	4.0	良	好
石	狩	大	橋	4.3	1:4	0		10.5		14.4	6.6	3.5	,,,	
札浴	召線	鉄棉	下	12.8	3:1	0		10.6		14.0	6.5	3.5	"	
石	狩	河		24.8	4:2	0		10.7		14.3	6.5	4.7	へい死4	8尾

石狩河口部での稚魚のへい死は、札沼線鉄橋下から河口までの間、相当波浪が高く、この波にた たかれてへい死したものと思われる。

また、この調査と併行して河川水による稚魚の影響をみるため、江別大橋下および石狩渡船場に、さけ稚魚をそれぞれ200尾づつを入れた魚籠を2週間に亘って浸漬してその状況をみた。これと対照するため千歳支場構内の千歳川にも同じ魚籠を設置して比較した。その結果は第2表のとおりである。 第2表 河川水による稚魚の影響調査

設置場所	稚魚数	7日後の滅耗数	14E	後の	)减末	毛数	備	考
江 別 大 橋	200	0	增	水	逃	逸		 
石狩渡船場	200	0				10		
支場構内	200	0				2	対	照

石狩渡船場および対照(支場構内千歳川)の稚魚のへい死は、魚籠の目が鎧目になっているため、 浮遊生物が入らず、餌不足によるへい死と考えられる。この結果は、江別より石狩までの間を2時間40分の輸送中の稚魚の表面的な観察結果で本質的な影響調査は、稚魚の生態的群行動および生 理面における血液性状等の調査より検討されなければならないと考える。

### (5) 餌料組成の改善に関する調査(餌料中のビタミンCのポーラログラフ的定量法)

さけ稚魚を飼育するためには、まずその中に含まれるビタミン類の分析が必要である。この場合、 餌料中のビタミンは多種多様なためその定量が非常に困難である。

しかし、人工餌料に含まれるビタミン類はほとんど合成ビタミン剤の添加に依存している。そしてこの合成ビタミンの多くはボーログラフ波を示すことが知られ、定量に利用されている。したがって、ボーラログラフ分析法は一般に迅速に行うことが出来る利点のあることから、本法による餌料中ビタミンの定量の可否については、現場的な分析法の開発のために強い興味が持たれた。特にビタミンCについては果汁のような天然物中のものの定量法としても、ホーラログラフ法が利用されている。

したがって、餌料中のビタミンを迅速に定量することを目的として、餌料中のビタミンO(以下アスコルビン酸=AsAとして表わす)のボーラログラフによる定量法を検討したので以下にその概要を報告する。

#### I 装置および万法

### 1. 装 置

柳本製P8-D型ベン記録式ポーラログラフを使用し、参照電極には硫酸水銀[]電極を用い、 試料中の溶存豫素は窒素ガスで除去した。


測定は水銀柱の高さを一定に保って250の恒温槽下で行い、滴下電極の毛管特性は純水中 OV (vs.S.C.E)加電圧時m=1,819 mg/sec  $\zeta=3,871$  sec であった。なお加電圧は見掛けの電位に硫酸水銀(I)電極の飽和甘汞電極に対する電位を+0.4 V として補正して表わした。

### 2. 試料の調製および万法


AsA溶液;市販のAsA結晶を3%のメタリン酸に20mg%になるよう溶解した。

支持電解質; PH4.50、4.90、5.74の1M酢酸緩衝液およびPH5.58、5.90、6.80、7.72、の1/3M燐酸緩衝液をそのまま用いた。

試薬;すべて特級試薬を用いた。



**第1図** アスコルビン酸の波形に及ぼす餌料蛋白質の影響



第2図 アスコルビン酸の波形に対する蛋白質農度の影響

操作法;電解瓶に緩衝液を2ccとって除酸素し、これに試料2ccを加えて再び除酸素し、 負から正の方向に加電しボーラログラフを記録した。

### Ⅱ 結果および考察

### 1. 餌料成分のボーラログラフ波形におよぼす影響

PH4.50の1 M酢酸緩衝液を用いた場合のA s A の液形を第1 図に示した。この結果抽出液にA s A を溶解させたものは極めて明瞭な波形が得られた。

しかしながら、餌料成分の入った試料液では負電位から0電位までの加電圧時の残余電流が 直線的に減少し、波形が著しく流れ、半波電位が①側に移動した。また限界電流の発生が保持 される加電圧範囲は極めて減少した。このため波高の測定が困難となった。

したがって、波高は第1図に示したように、交点法によって限界電流発生個所の半波電位点を求め、この点の電流値と加電圧0 における電流値との差とした。なお、以後の測定ではすべて0 を基底電圧とした。


次に波形に対する餌料成分の影響は、第1図に示したように試料液中の餌料成分を2倍に稀 駅することよりかなり改善された。また、この程度の稀釈では半波電位に対する影響は認めら れなかった。

#### 2. 餌料成分の濃度と波高との関係

抽出時における餌料の稀釈率の相違がA s A の波高に対してどのように影響するかを知るため、抽出液量が餌料に対して 2 0 倍および 4 0 倍の試料液についてA s A の波高を求め第 3 図 に示した。

すなわち、A®A濃度と波高との関係は試料液中の餌料成分の濃度に関係なく同一直線上に 回帰した。したがって、餌料成分の濃度がこの程度の範囲では、波高は餌料成分の影響を受け ないものと考えられる。


しかしながら、波形は第2図に示したとおり餌料成分が多いと著しく流れ、AsAが低濃度になると波高測定のための作図が困難である。また反面、餌料の稀釈率を増加させると、AsAを実際分析する場合に、検出精度を低下させる恐れがある。 なお、稚魚用の養魚餌料中のAsA含量は一般に200個%前後とされている。この場合、その1/10量が定量出来れば餌料貯




AsA 濃度

蔵時における品質管理面での分析法としては有効と 考えられる。したがって抽出液量については、波形 が比較的良好であり、また定量限界が第4図に示し たように餌料中のAsA含量として20mg%まで可 能と考えられた抽出液量(餌の量に対して40倍量)

> 試料液中の餌料成分濃度とAsA の波高 との関係



第4図 各種農度のA<sub>S</sub>Aのポーラログラム (抽出 液量:餌量の40倍)




第5図 pHの異なる緩衝液中におけるAsAのポーラログラム


-194-

なお、第2図および第4図に示したように、装置の感度を上げても波形が流れるため、この 方法による定量感度の増加は現状では期待出来ないことが推察される。

#### 3. 緩衝液のPHの影響

AsAの波形、波高ならびに半波電位などに緩衝液のPHがどのように影響するかを知るため、AsA1.25 mg%の試料液について各種PHの緩衝液を用いた場合のボーラログラフを記録し、第5図、第6図および第7図に示した。





第7図 PHと波高との関係 (AsA1.25 mg%)

すなわち、その結果は梶田(1970)らの報告とは 異なり、かなりの酸性域において2段目の酸化波が現わ れた。また燐酸緩衝液ではPHが酸性(PH5.58 5.90)のときAsAの酸化波が消失した。(第5図)


また半波電位(2段波のある場合はその1段波)は梶田らの結果と同様に、PHの増加とともに直線的に極少し、PH5.74の酢酸緩衝液における半波電位はPH6.8の燐酸緩衝液におけるそれと同じであった。しかし、酸性の燐酸緩衝液中で酸化波がみられなかったため、PHと半波電位との関係は不連続な線となった。(第6図)

次に波高とPHとの関係については、半波電位でみられたと同様に不連続ではあるが、波高はPHの増加につれてほぼ直線的に振少し、感度を上げた場合にそれが著しかった。

以上の結果から、ボーラログラフによるAsAの定量 にあたってはPHの変動に充分留意しなければならない ことが推察される。なお、波形ならびに半波電位などに 対するPHの影響が梶田らと異なった原因については、 緩衝液の組成が異なることなどによることが考えられる。


### 4. 燐酸緩衝液を用いた場合の第2段について


一般にAsAの波形はアルカリ性において2段の2電子酸化波を現わすことが知られているが、今回の実験ではかなりの酸性域において第2段目の酸化波が生じた。したがって、これがAsAに起因する酸化波なのかどうかを知るため、PH6.8の燐酸緩衝液を用い、種々濃度のAsA試料液のポーラログラフを種々の感度で記録しー195—




すなわち、第2段目の波高は第8図に示したとおり AsA の濃度に対して無関係か、逆に濃 度の減少に対して波高が増加する傾向すらみられた。なお、この波は装置の感度と高い相関関 係がみられた。

したがって、今回の実験における第2段目の酸化波は、前項で述べたとおり、AsA とは無 関係なもので、実験中常に同一濃度であった緩衝液あるいは抽出液中のなにかに起因したもの と考えられる。





なお、燐酸緩衝液における第1段目の波高については、 第9回に示したように、装置の感度を上げた状態では酢 酸緩衝液におけるよりも ASA の低濃度の液の場合に分 離性能が浸れているようにみうけられる。また ASA 濃 度と波高については、第8図に示したように各感度とも AsA が 0.7 5 mg%以下では原点を通る直線で表わされ -196-



-197-

以上の結果、人工餌料中のAsAについては、餌料中の蛋白質に妨害されるが、品種管理程度の定量はポーラログラフ法により可能と考えられる。またAsAを抽出液に溶かした場合の波形は極めて良いため、試料液より蛋白質を除去することができれば迅速にかなりの精度でAsAの定量が期待できそうである。

#### Ⅲ 要約

- 1. 人工餌料中のAsAを迅速に定量するための方法としてボーラログラフによる分析を試みた。
- 2. AsAのボーラログラフは餌料中の蛋白質により、波形の流れ、半波電位の正方向への移動がみられた。また、波形は蛋白質濃度を稀釈することにより改善されるが、半波電位の移動は 生になかった。
- 3. 餌料成分のAsA波高に対する影響はみられなかった。
- 4. As Aの波高および半波電位は緩衝液のPHに著しく影響され、それらの関係はほぼ直線的であった。
- 5. 燐酸緩衝液では P H 5.58 および P H 5.90 では酸化波が生じなかった。
- 6. 今回のボーラログラフでは酢酸緩衝液ではPH4.90から、燐酸緩衝液ではPH7.4以上で 2段目の酢化波がみられたが、これは緩衝液または抽出液に起因するものと考えられる。
- 7. 分析のための緩衝液のPHは、As Aが低濃度で装置の感度を上げる必要の生じた場合には、 波形の解析上、PH 6.8 の燐酸緩衝液がややすぐれていた。しかし、As Aが高濃度の場合に は、PH 4.5 の緩衝液での波形がすぐれていた。
- 8. ボーラログラフによるAsAの定量法は、餌料中のAsAの管理的な精度では、迅速性から みてかなり有効な手段になることが考えられる。また、適当な万法で除蛋白が出来れば生体中 のかなり微量なAsAも分析可能なことが示唆された。

### (6) さけ・ます類異種交配に関する調査

昭和 4 2 年秋、湧別川に溯上した"さけ""からふとます"産卵魚から、からふとます(P)×さけ (3 組合せ交配魚を作成、昭和 4 3 年 4 月に稚魚を湧別川に放流した。

その結果、44年秋に産卵成魚として回帰して来たのでその概要について報告する。

沿岸分布範囲と溯上河川: 4 4年度からふとます(字)×さけ(含)組合せ成魚は、東は斜里から湧別沿岸までの沿岸定置で再捕され、とくに常呂沿岸の111尾、次いで湧別沿岸で62尾が発見されており、稚魚放流河川附近沿岸に集中する傾向がある。また、そ上河川は東は常呂川(2尾)、湧別川(46尾)、徳志別川(2尾)、猿払川(1尾)までの間で、再捕数からみれば圧倒的に湧別川

-198-

が多いことが明らかになった。

この組合せ魚群も、43年の逆組合せ(さけ(タ)×からぶとます(ℰ))と同様母川を中心として来遊、 そ上することが分る。徳志別、猿払川にもそ上再捕されている事実からこれら地域沿岸にも幾らか 回遊しているものと思われる。

そ上河川範囲については43年、44年度ともに類似傾向にあると言える。

沿岸来遊、河川溯上時期; 交配魚が最初に沿岸で再補されたのは43年、44年ともに8月中旬頃で、最も多く発見されるのは9月上、中旬であった。湧別川の河川そ上は43年度は9月下旬~10月下旬で、ビークは10月上旬になっているのに対し、44年度は10月上旬~下旬となり、そのビークは10月中旬であった。

43年度より44年度の万が最盛期が1旬位遅れたのは、今年度この沿岸への"さけ"・"から ふとます"来遊が例年より遅れていることと平行的な関係があるようで、交配組合せによる相違に よるものでなく、むしろ天候、海況変化などの環境要因に大きく支配された結果と思われる。一般 に交配魚の河川内漁獲は"からふとます"と"さけ"の中間域にピークがあるが、44年度は"か らふとます"の漁期が長びいたため、交配魚のピークと重複してしまった。

産卵成魚の再捕数; 脂びれ、左腹びれ標識再捕魚総計225尾(沿岸174尾、河川51尾)であった。河川内再捕数中湧別川で発見された割合は90.2%である。

再捕魚について; 沿岸魚 1 1 1 尾による測定範囲、平均は体重  $1.0 \sim 3.2$  kg (1.9 kg)、フォーク・レングス 4  $8.0 \sim 6$  1.0 cm (54.74 cm) で、4 3 年度 5 け(2)×からふとます(3)組合せ成魚 より小さい値を示した。

表現形質は一般に"さけ"・"からふとます"との中間形で変異の幅が広いが、部分的に側線鱗数は総てさけ型、腹びれ基部の副鱗形で鱗相、頭部の形態は個体により、さけ或はからふとますのいづれかに類似する。

次に鱗面に表現される生長輪数は、1年目形成数の平均は31.6本、2年目13.25本を示し、43年度魚の輪数と大きな差がなかった。

再捕魚の年令は96%が2年生で成熟し、3年生と思われるもの3.6%であったが、後者については体長より考えて、さらに検討する必要がある。

### 国後海峡における交配種放流試験

根室海区西別川にそ上する "さけ"と "からふとます"の捕獲期間が或程度重複することから、現在まで 実施してきた交配種の実験的放流試験で得られた知見を基にして、受精率、成長が良い。さけ(早)×からふとます(6)組合せを事業的に拡大した場合、成魚としての回遊経路・沿岸来遊、そ上河川分布、飼育河川、あるいは放流河川への回帰割合、密度、生態などを確認するため、西別川そ上魚から交配卵599,000粒を作り、発眼期まで虹別事業場に収容、発眼期後羅臼事業場に移殖、放流までの稚魚管理を行い、45年3月27日に280,000尾(脂びれ標識209,000尾、無

標識71,000尾)をサシルイ川の橋下に放流した。

この交配魚造成に使用した"さけ"と"からふとます"の魚体測定は次のとおりである。

	さ け (위)	からふとます(お)
項目	範 囲 (平均)	範 囲 (平均)
体 重	1.9~ 5.0kg( 3.17)	0.8~ 2.2kg( 1.27)
全 長	60.0~81.0cm(70.95)	44.5~59,0cm(52.55)
フォーク	58.0~79.0cm(68.93)	43.0~60.5cm(51.05)
頭長	12.5~17.5cm(14.63)	10.5~16.5cm(12.77)

受精後24時間の交配卵300粒による受精率よ97.0%で、極めて好成績を示し、8~16細胞まで進行していた。

卵径は7~8mmで平均7.5mmであった。

稚魚飼育中に約180,000尾の不明魚が出たが、恐らく羅臼川に逃逸したものと思われるので、 との不明魚をのぞいた卵から稚魚放流までの滅耗は35.06%にとどまった。

次に飼育中の稚魚にはパールマークのあるもの(さけ型と呼称)及びパールマークの皆無の(ます型)ものが出現した。1月30日及び放流後の雑魚標本の測定を次に示す。

## 飼育稚魚の体重、体長範囲 (45年1月30日標本)

			体重範囲 (平 均)	フォーク レングス (平 均)
3	け	型	0.38~0.499(0.4)	33~37mm(34.4)
主	す	型	0.38~0.46 (0.38)	30~35 (32.9)

## 放流後1ヵ月の稚魚 (45年4月27日)

			1	体	重	(平	均)			フォーレング	ーク	( -	Ŧ	均)	
3	け	型	0.	7	~	1.6	(1.3	9	)	4 3 mm	~ 6	0.5	(	5 0.9	)
京	す	型	0.	5	~	2.2	( 0.8	6	)	3 9.5	<b>~</b> 6	1.0	(	4 5.0	)

前表から"さけ型"の方が"ます型"稚魚より生長がよく、索餌も旺盛であった。また"さけ型"の内、大形魚個体には鱗の原基(鱗核)が発現していたが、生長輪はまだ形成されていなかった。サシルイ川に放流後約1ヶ月経過したにもかかわらず、かなりの稚魚群が河川河口部に残留し、大形魚は深みに、小形魚は浅瀬に群泳しているのが観察された。

## 2 さけ・ます親魚の生理、生態に関する調査

(1) さけ。ます親魚の産卵生態に関する調査

自然産卵における産卵機構と環境との関係を明らかにし、適正なふ化管理の方策の確立を目的に

計画、実験も準備されたが、実験過程における事故により、その目的を充分達することが出来なかった。

なお、さけの産卵は自然界においては湧水の滲出が必要条件であることは明白であるが、その水 温条件、滲出の物理条件、含有ガス条件などが、その選択の指標になるのか今後の実験にまたねば ならない。

### (2) さけ親魚のエネルギーに関する調査

前年度に引き続いて天塩川、静内川にそ上した親魚の蓄養限界を調査した。また襟裳以西海区幌 泉沖に来遊した親魚のエネルギー特性より、これら来遊群のそ上地域の推定を試み、併せて青森県 大畑沿岸に来遊した親魚のエネルギー特性を検討した。

- I 卵巣の増成、完熟状態からみた来遊親魚の生理特性について
- 1. 幌泉沖来遊群の特性(第1図)
- (1) 当地区に来遊する魚のうち初期の群では、測定した魚 3尾のうち1尾は、卵巣が体重に対して18.9%と大きな値を示したように、卵巣増成期を経て完熟期に入りつつあることが考えられた。この魚については幌泉沿岸に極めて近い場所で産卵することが予想される。

しかし、卵巣が体重比で11.6 および12.9%で示された未熟魚については卵巣増成期直前のものと考えられ、かなり速くまで回遊するか、完熟するまで相当長期に亘って沖待ちする魚と考えられる。このように沖待ちすることが考えられた魚は、標識放流の結果、門別町富川(沙流川河口)で10月15日に完熟状態(卵巣の体重比21.5%)で捕獲され、また1尾は静内川で10月17日に同じく完熱状態(18.9%)で補獲された。このときの卵巣発育状態は、静内川における初期群の蓄養実験結果における完熟魚の卵巣発育状態(19.4±1.4%)と同程度であった。また、この卵巣発育状態は、例年十勝川そ上群とは幾分異なるものと考えられる。(完熟時の卵巣が小さい。)

いづれにしても幌泉沿岸に来遊する初期群には成熟度合が極めて異なる2群の混在することが知られた。

(2) 10月21日に補獲された盛漁期における魚の卵巣発育状態は第 図に示したように体重 比で15.8±2.1%を示した。このことから、この時期に来遊する群は未熟なものから卵巣 の著しく発育したものまで、いろいろの成熟段階にあることが推察できる。

なお、この時期には十勝沿岸が終漁期であるため、この時期に来遊したほとんどの魚は、 卵巣の発育度合からみても日高西部の相当遠くまで分散することも予想される。

(3) 11月15日に捕獲された群の卵巣は、体重比で12.3±1.2%を示し、前の時期に比べて たらがなく、時期が遅いのにも拘らず発育が遅れていた。

この結果、幌泉沿岸に来遊した後期群は相当遠くまで回遊することが予想され、その到達

区域は相当分散しないことが推察される。また、その到達地域は盛漁期の魚よりも遠くに至ることが推定される。

なお、来遊時期と卵巣の発育程度との関係について、1968年の同時期の魚では体重比で14.0±2.6%といろいろな成熟状態のものが含まれたように、年により異なることが考えられる。

#### 2. 大畑沿岸来遊群の特性

- (1) 10月22日および27日に捕獲された魚の卵巣は、標本数が極めて少ない(2尾)ため 想像の域を出ないが、前者の卵巣は体重に対して13.2%および14.5%と発育が遅れてい たため、この時に来遊した魚は遠くまで回遊するか、あるいはそ上までの間沿岸に滞留する ことが考えられる。また、27日に来遊した魚は卵巣の発育が20.3%および17.0%と進 んでいたために相当短かい日時でそ上河川の沿岸に回遊するものと考えられる。またこのよ 5な魚群の標識放流では、かなり良い再補効率が期待されることが推察される。
- (2) 盛漁期(11月22日)の魚の卵巣は体重比で16.4±2.1%を示し、幌泉の盛漁期群と同じ傾向を示した。したがってこの時期に回遊する魚のそ上河川はかなり均等に分散することも考えられる。また同時にかなり遠くまで回遊するものも混在することが推察される。


#### 3. 静内川そ上親魚の卵巣発育特性

1969年9月16日から18日の間静内浦獲場(河口附近)で得られた魚を実験的に蓄養して卵巣の発育状態を調べた。その結果は第1図に示したとおり、開始時に体重比で13.5%  $\pm 1.4\%$ の卵巣が10日後に16.4  $\pm 1.8\%$ と約21.5  $\pm 0.4\%$ 増加した。また7日後には 3/5が完熟し、その卵巣の体重比は19.4  $\pm 1.4\%$ であった。すなわち17日後に60%が 完熱した。との実験群における卵巣の体重比のバラッキは、先の幌泉における盛漁期のものと 同様に大きいことが認められた。

10月7日より行なった第2回目の実験では、実験開始時に2/8が完熟魚(卵体重比18.9%、21.4%)で、そのうち1尾は9月25日に幌泉沖で標識後放流されたものであった。 これらの結果を図上から推定すると、9月18日初漁期にそ上する親魚は2.5~4週間の間に 完熟状態になることが推察される。

次に、10月17日に蓄養した未熟親魚は10日後に、完熟直前のものを含めると全数が完熟状態に達し、その卵巣の体重比は22.7±1.6%を示した。なおこの項に捕獲される親魚はほぼ即日採卵の可能なものとなり、1968年の後期群の卵巣の大きさ(完熟魚22.3±1.2%、未熟魚20.7±2.1%)と同一状態であった。

以上の結果から、静内川にそ上する親魚にはそ上時期によって明らかに抱卵数の相違が見られ、漁期の進行につれて増加することが推察される。



また1969年の初期群については、川の大きさの割り合いに比して推定成熟日数が長すぎると考えられるため、単位体重当りの抱卵数の少ない別系統の魚が迷入したものか、あるいは 静内川を上群には2つの形質の異なる魚があって、初期群については従来捕獲されておらず、 天然産卵によって資源の維持がはかられてきたことも考えられる。

なお、1968年の調査結果では十勝川そ上群の卵巣重量は体重比で23.6±1.4%であった。従って静内川のそ上主群の卵巣は十勝川のものと同程度か、いくらか小さいものが多く混在することが推察される。

#### 4. 天塩川そ上魚の卵巣発育特性

天塩川そ上魚の成熟状態については9月25日に捕獲された盛漁期の魚を用いて実験的に調べた。

実験開始時の卵巣発育状態は、発育が異常に阻害されたと思われる魚(卵巣の体重比8.0%)を除くと、体重に対して13.2±0.4%であった。また26日後に生存していた魚のそれは、放卵中のもので同じく11.5%、放卵開始時と思われるもの17.6%および完熟状態のもので17.1%であった。また、へい死魚の5ち1尾は完熟状態(19.9%)で、蓄養開始後17日であった。

なお、完熟状態の実験魚を測定したと同時期における中川捕獲場での完熟魚の卵巣重量は体重に対して $19.6\pm1.3\%$ を示し、また同時に河川で捕獲された未熟魚は18.2および16.3%であった。

これらの結果から、天塩川におけるそ上盛期の魚は、静内川にそ上する初期の群と同様に 2.5 ~ 4週間で完熟し、また後期群では抱卵量の増加することも考えられる。そして、天塩川そ上群の抱卵量は静内群の抱卵量より少なく、19 b 8年に行なわれた調査での石狩川そ上群のものと同じ傾向にあることが判る。

なお、石狩川そ上群は、1968年の調査で、完熟時の卵巣重量からみて、単位体重当りの 抱卵量が非常に少ない群(卵体重比10.1±1.0%)、それよりいくらか多い群(同じく15 %前後)および20%前後の3つの群に分けられるが、最も抱卵量の多い魚は千蔵川西越捕獲 場のものであった。また、石狩川河口で捕獲されたものはすべて抱卵量の少ないものであった。 このことから、石狩捕獲場で捕獲されている魚は、千歳川に回帰するものとは別のものと考え られる。

# 5. 卵巣の発育程度からみた河川の特異性について

1968年に行なった結果から考察すると、大平洋側および日本海側にそれぞれそ上する魚 について次の相違点が推察された。 すなわち、石狩川および静内川にそ上する魚には、前者では河口捕獲魚(1968年終漁期の魚)、後者では初期の群にそれぞれ見られた先に述べた現象を除けば、静内川および十勝川などの大平洋側にそ上する魚は、完熟期の卵巣が天塩川や千歳川などの日本海川にそ上するものよりも大きいことが推察される。そして根室海区の標準川にそ上する魚の卵巣の大きさは日本海側のものと似ていることが知られた。

なお、鹿部沖で標識放流された魚は、そのうちの1尾が遊楽部川にそ上したが、その卵巣重量は体重に対して20.5%と日本海側のものに似ていた。この値については本州の河川にそ上する魚の卵巣重量とともに今後検討を要する。

#### Ⅱ 肝臓ならびに内臓の大きさからみた特性

# 1. 幌泉沖および大畑沿岸来遊群について

これら沿岸地域を回遊中の親魚の肝臓重量は、第2図に示したとおり来遊時期の進みに対して変化が認められないほどに極めてゆるやかに減少することが観察された。また大畑沿岸来遊群は、幌泉沖来遊群よりもいくらか小さいことが知られた。

これらのことから、沿岸回遊時には摂餌も行なわれ、その結果沿岸域を回遊中の魚の肝臓はほとんど栄養源として利用されないことが推察される。この傾向については、腸その他の全内臓物量についても同様のことが知られた。


#### 2. 蓄養実験魚の特性について

河川にそ上した魚の肝臓ならびにその他の内臓物重量は、天塩川ではいづれる完熟時に著しく減少した。この傾向は1964年以降1968年までの十分川産の魚ならびに1968年の千歳川産の魚を用いた実験においてみられた。この結果、河川内における親魚の肝臓および内臓物重量の成熟に伴なう減少は、エネルギー補給のための一般的な現象と考える。

しかしながら、静内川捕獲魚の実験では特異な現象が観察された。すなわち、肝臓は成熟に伴なって肥大する傾向がみられ、特に完熟時に著しい。また全内臓物については、肝臓以外の内臓物重量の減少よりも完熟時の肝臓肥大が極めて著しいため、その重量は一時減少するが再び増加する傾向がみられた。

これらの実験魚における肝臓の体重比の増加については、捕獲盛期に得られた即日採卵可能 魚の肝臓が著しく小さいこと、またこの群の蓄養後の卵巣が即日彩卵魚のそれよりも大きかっ たことなどから、蓄養によって肥大したことも考えられる。この現象については、天塩川の実 験で屋根付きの稚魚他に収容して安静に保たれたが、静内での実験ではふ化室内にビニール 布を使用した仮りの蓄養池に収容し、常時人の出入があって安静が保たれなかったなどのこと





から蓄養条件に相違の生じたことが推察される。

なお、肝臓の肥大については、以下に述べる体成分、卵巣成分などとも関連して興味ある問題が提起され、蓄養にともなう一種の過労現象とも考えられるが、今後の研究に待たねばならないものと考えられる。

# Ⅲ 一般成分の変化からみた親魚の特性について

1. 幌泉・大畑地区来遊群の魚肉一般成分の変化

幌泉沖に来遊した親魚の成分組成については、第1表に示したように水分、蛋白質および脂質ともに来遊時期に対してほとんど変化が認められなかった。

しかし、大畑地区に来遊した魚の魚肉成分組成は、盛漁期に僅かな水分の放少と蛋白質および脂質の増加がみられた。

第1表 幌泉・大畑に来遊したさけ魚肉成分と来遊時期との関係


	場所	幌	泉	沖	大	畑	神
時	期	蛋白質	脂質	水分	蛋白質	脂質	水分
初	漁期	22.5±0.2	1.3±0.6	75.2±0.7	21.9±0.3	0.7±0.4	75.8±0.8
盛	"	22.1±0.7	1.1±0.3	75.2±0.4	23.1±1.0	0.7±0.4	74.8±1.0
終	"	22.0±0.4	1.1±0.4	75.3±0.7	20.3	0.9	77.7

この結果、魚肉の一般組成と共に述べた成熟程度との関係については、幌泉魚ではほとんど 認められない。しかし、大畑魚については、盛漁期の魚が最も未熟な状態にあることが推察される。


- 2. 静内川・天塩川そ上魚の魚肉一般成分の変化
- (1) 蛋白質含有率は1964年の結果と同様に、天塩川、静内川いずれの魚を用いた実験でも 成熟にしたがって誤少する傾向がみられた。このことから、そ上親魚のエネルギーは明らか に体蛋白質の利用によりまかなわれていることを意味するものと考えられる。

この場合、肝臓の肥大が生じた静内川そ上群を用いた実験では、第3図に示したとおり天塩川そ上魚を用いた実験よりも蓄養にともなう蛋白質の概少が著しいことが認められた。この原因については、肝臓の肥大現象で考えられたように魚の安静をさまたげるような悪い環境条件にあったためと考えられる。この現象については1968年に行った十勝川および千歳川そ上魚での実験でもみられた。すなわち、十勝川そ上魚では事業規模で蓄養された魚の





-208-



蛋白質含量が実験的に隔離した魚のそれよりも著しく少なかった。同様に事業的規模の池で 産卵行動を行なりまで蓄養した千歳川そ上魚の蛋白質含量は、先に述べた実験的に隔離され たものより核少が著しかった。しかしながら、この場合にはへい死魚以外では肝臓の肥大し たものは認められなかった。

(2) 水分含有率の変化は、1964年の結果では完熟時から放卵時にかけて著しく増加するととが知られている。1969年の実験においては、第4図に示したように蛋白質におけると同様環境の悪かった静内川そ上魚では、未熟時に76.2±1.0%であった魚群が18日後の完熟時には77.6±0.9%まで増加した。しかしながら、天塩川そ上魚を用いた実験では、蓄養開始時の水分含量が75.9%および75.7%であった未熟魚が、26日後では放卵したものを除くと76.4%および76.2%であった。なお同時に測定した中川採卵場の完熟魚の水分は75.5±0.6%が得られ、極めて良い環境状態におかれていたことがうかがわれた。以上の結果から環境条件が悪い場合には、魚肉中の水分増加が促進されることが考えられ

(3) 脂質含有率の変化については、1964年の実験では河川そ上時に減少傾向を示したものが蓄養時再び増加する傾向が認められた。(蓄養時の脂質含有率の増加については、絶対量は減少するが、それ以上に体重が減少するためと考えられる。)この完熟時における増加現象は1968年および1969年の実験においても測定された。そしてとの現象は、内臓物重量の変化などにみられたように、環境が悪かったとは思われた場合に著しい傾向のあることが知られた。これは環境が悪い場合、1964年の実験において考えられたと同様に、魚体の消耗が激しくて体重の減少が脂質の消費を上廻ったためと考えられる。

以上の結果、完熟時の魚体成分の組成については、環境条件に著しく左右され、エネルギー消費の著しい場所では蛋白質含量の減少、水分ならびに脂質含量の増加することが知られた。

#### 3. 卵巣の一般成分組成の変化

# (1) 成熟にともなう変化

る。

魚肉一般成分組成は、前項で述べたように環境条件に著しく支配されることが知られた。 そこで、このような環境下が次期世代の基となる卵にどのような影響を与えているかを知る ために卵巣一般成分の組成の変化を調べた。その結果は第2表に示したとおり、実験場所に より著しい相違が認められた。

-210-

#### 第2表 卵巣一般成分の成熟に伴なう変化

		静产	月 (悪い条	<u>(件)</u> ※	天 塩 (良い条件) ※※				
		開始時	1 1日後	18日後※		16~17日後 26日後			
水	分	5 5.7±0.9	$57.9 \pm 0.9$	59.7±1.1	54.6±0.3	58.8 56.2±0.5 (死 魚) (57.5±0.2)			
蛋白	白質	28.6±0.8	27.8±0.5	26.8±0.4	28.6±0.6	26.7 27.8±0.2 (死 魚) (27.7±0.7)			
脂	質	7.3±0.8	$6.8 \pm 0.9$	6.3±0.8	8.8±0.5	6.6 8.1±0.2 (死 魚) (7.2±0.7)			

(内の数字は同時期に事業用蓄養池の完熟魚について測定したもの。

※ そ上時 ※※ 完熟時

すなわち、卵巣の一般成分の成熟に伴なう変化については水分の増加、および蛋白質、脂質の減少が認められた。との変化は成分からみた一種の成熟現象 と 考えられる。 そして この現象は実験場所によって著しく異なり、特に水分の変化に顕著に現われる。

したがって、完熟時の卵巣の成分は環境条件の影響を著しく受けることが推察される。この現象は人工ふ化における親魚の蓄養にあたって重要な問題を提起するものと考えられる。

(2) 沿岸来遊時における卵巣一般成分組成の変化

幌泉沖ならびに大畑沖に接岸してきた魚の卵巣成分は、来遊時期との間に第3表に示した 関係がみられた。

第3表 沿岸回遊時におけるさけ親魚の卵巣卵一般成分

	1	幌	泉 沖	1	大	畑	冲
		初漁期	盛漁期	終漁期	初漁期	盛漁期	終漁期
	1969	10. 2, 6	10.21	1 1.1 5	10.24,27	11.22	12. 1 7
水	分	54.74±1.55	55.71±0.37	5376±0.56	53.75±0.50	52.28±0.72	53.14
蛋	白質	29.21±1.43	28.65±0.74	2885±0.81	28.83±0.57	29.73±0.78	29.41
脂	質	6.99±0.43	7.32±0.82	8.4 1±0.83	7.58±0.68	8.95±0.70	8.14

水分含量について、幌泉沖来遊群では終漁期に、大畑沖来遊群では盛漁期にそれぞれ最も少なかった。

また、脂質含量は上に述べた場所および時期に最も大きな値を示した。

これら各成分の変化にみられた傾向は、卵巣の重量変化にみられた傾向と一致した。したがって、卵巣成分の変化が前項に述べたとおり卵の成熟によるものとすれば、成熟現象は魚 -211肉成分や内臓諸器官の重量変化の前に、まず卵巣の増成と成分変化、特に水分の増加という内的な面に現われることが推察される。そして1969年に沿岸に来遊したさけ親魚の成熟状態は、卵巣の大きさからみた結果とは違って、卵巣の内面現象からみれば、大畑沖に来遊した盛漁期の魚が最も未熟な状態であったことが推察される。しかし、卵巣の大きさ、場所、時期ならびに標識放流試験による再捕までの期間などを考慮すれば、大畑沖に来遊した盛漁期の魚は、特異な群であったことも考えられる。いづれにしても、これら魚群および幌泉における終漁期の魚群より得られる卵については、その後の動向に強い興味がもたれる。

## IV 卵巣の発育と魚肉ならびに卵巣の一般成分組織との関係

#### 1. 成熟度と魚肉の一般成分

卵巣の体重比と水分含量との間には、極めて特異なものを除けば、幌泉沖来遊群では極めて ゆるやかな勾配で正の相関関係が認められた。この関係は大畑の魚においても見られ、その勾 配は幌泉の場合よりも大きい。

これらのことから、沿岸来遊時における各種成分含量、内臓諸器官重量の時期的な関係から 推定出来なかった卵巣の成熟現象が、各群の中で除々に行なわれていることが推察される。

この魚肉水分含量と卵巣重量との間にみられた成熟現象は、血清蛋白質量その他から特異な 状態のものが混在していたことを考慮すれば、脂質についてもそれぞれ来遊時期別に、幌泉お よび大畑沖来遊群とも負の相関関係として認められる。この関係は、幌泉沖、大畑沖来遊群と もに盛漁期の魚では著しい。

なお、蛋白質について、幌泉群では脂質におけると同様な傾向を示したが、大畑沖来遊群は 無関係か、逆の関係が認められた。

したがって、この魚肉一般成分含量と卵巣の発育程度との関係が先に述べた沿岸来遊群における魚肉蛋白質ならびに脂質の含量を分散させた原因と考えられる。なお、幌泉沖における盛漁期群の魚では、蛋白質含量が卵巣の発育程度に対して無関係であるか、先に述べた関係と逆の場合もうかがわれる。この結果、幌泉における終期来遊群および大畑沖来遊群は卵巣の増成と同時に体エネルギーの蓄積も行なっていることが推察され、このような魚は卵巣の大きさから推察されたとおり北海道の河川にそ上する魚とは異なり、かなり遠くまで回遊し、また卵自体にも相違が生じるものと推察される。

以上述べた成熟現象はそ上魚を用いた蓄養実験で特に著しく現われた。すなわち、静内における実験では第 図に示したとおりそ上(実験)開始時に卵巣の発育程度に対してほとんど無関係と考えられた魚肉中の各成分含量は、完熟時に強い相関関係を示した。このことから、魚

体に蓄積されたエネルギーは、卵巣増成の盛期に、急速に卵巣へ移行する。したがって卵巣増成の初期における卵巣増成のためのエネルギーは、摂餌されたエネルギーによって補充される ことが推察される。

なお、静内川そ上魚では、先に述べた完熟時の卵巣重量からそ上時期の違いによって単位重 量当りの抱卵量が異って群の違いが推察されたが、また完熟時の卵巣重量と魚肉成分(蛋白質、 水分)とが強い相関を有することから、静内川盛漁期群のように単位体重当りの抱卵量の多い魚 は、卵巣増成期に体成分が卵巣に移行し易い魚とも考えられる。この結果は卵巣の成分含量と 卵巣重量との関係にも認められた。

また完熟時に魚肉中に水分が多く、蛋白質の少ない魚は抱卵量の少ない魚といえそうである。 なお、脂質含量と卵巣の発育程度との関係については、未熟時には無関係か正の相関を示し、 成熟時にはそれぞれ測定群別に正の相関を示した。(第5図)。このことは、先に述べたとお り魚肉中の脂質減少に比べて体重の減少が激しかったためと考えられる。

しかし、天塩川そ上魚による実験では内臓諸器官重量の変化や魚肉各成分の変化でみられたように、卵巣の大きさと魚肉成分含量特に水分と脂質含量との間に特異な関係が認められた。 すなわち、蛋白質含量については、全般的にみた場合卵巣の大きいものほど減少するが、完熟 時にその傾向が消失し、その含量は静内における実験魚に比べて大きな値を示した。(第5図)

また、水分および脂質の含量は卵巣の大きさに対してそれぞれ減少および増加する静内における実験魚とは著しく異なる傾向を示した。


これらのことから、天塩川そ上魚の実験では、他形質での関係で得られたと同様に、環境が 良くて完熟時のエネルギー消費が少なかったことに起因していることも考えられる。また、卵 巣重量に対する脂質含量の増加は、静内川そ上魚にみられた増加の原因とは異なることが考え られる。

したがって、天塩川そ上魚については、完熟時の卵巣重量から推察されたように、卵巣の発育に伴なってみられた体脂質の増加ならびに特異な水分の減少傾向から、大平洋側にそ上する魚とは異なる群とも考えられる。そしてこれら両群には、卵巣の増成に対する体成分の転換能力に違いのあることも考えられる。

なお、放卵魚は各成分とも十勝川における天然産卵魚と同様な値を示し、著しい保持エネルギーの消失が認められた。このため産卵行動時には環境条件の如何にかかわらず多くのエネルギーを消費することが推察される。


#### 2. 成熟度と卵巣一般成分


河川そ上魚の卵巣卵の水分および脂質は、静内・天塩両河川へのそ上魚とも、卵巣の大きさ





# 卵巣一般成分との関係





-216-

に対してそれぞれ正および負の相関関係を示し、特に水分における関係が顕著であった。

蛋白質含量における上に述べた関係は、全般的にみた場合負の相関関係にあることがうかが われた。しかしながら、そ上開始時には正の相関を示した。このことは、そ上開始直前までは、 魚肉蛋白質含量における関係から体エネルギーの蓄積が推察されたように、卵巣においても増 成と同時にエネルギーの蓄積の行なわれていることが想像される。

この卵巣におけるエネルギーの蓄積は、第6図に示したとおり、沿岸来遊時に急速に行なわれていることがうかがわれる。すなわち、幌泉沖ならびに大畑沖に来遊した魚の卵巣の蛋白質 含量と卵巣重量との関係は、魚肉におけると同様来遊時期別にみた場合それぞれ正の相関を示した。またこのことから、漁期の違いによって群の異なることがうかがわれる。

なお、水分含量と卵巣重量との関係は、魚肉蛋白質含量における関係でみられたように、幌泉沖来遊群と大畑沖来遊群との間に著しい相違が認められた。すなわち、これらの関係は幌泉沖群で正の相関が認められ、大畑沖群では無関係であった。これらのことから、幌泉沖来遊群の卵巣重量の増加は蛋白質の蓄積以外に水分の増加によっておこなわれていることが考えられる。また大畑沖来遊群では、魚体に対しての卵巣の大きさが総て幌泉沖の終漁期のものより大きいのに、卵巣の増重は主に蛋白質の蓄積により行なわれていることがうかがわれる。このことは、大畑沖来遊群の卵巣は、その後水分の増加が高まって完熟時に大型の卵を形成するか、あるいは栄養源の豊富な卵をもつ魚群なのか今後に興味ある問題を提起するものと考えられる。以上、未熟卵に認められた卵巣重量と卵巣の各成分との関係は、完熟卵では消失し、水分の著しい増加と蛋白質の減少が認められた。このことから、完熱期の卵は卵巣の大きさに関係なく、一定の成分値を示すことが知られた。

また、先に述べたように静内そ上魚の卵巣が、そ上時期の推移につれて大きくなった原因について次のことが考えられる。すなわち、卵巣の大きかった魚群は体蛋白質量の減少が著しかったことから、このような魚群は卵巣の増重が著しくて、そのために体蛋白質の消費され易い魚であったことも考えられる。このことは、体蛋白質の減少が著しかった終漁期群で卵巣が最も大きく、また卵巣の蛋白質も他の完熟卵より多かったことからも推察された。

なお、卵巣の成熟現象については、卵巣卵の一般成分の組成変化から次の3つの段階を経る ことが推察される。

すなわち、卵巣増量の初期で、卵巣中の蛋白質が増加してエネルギーの蓄積の行なわれる時期=前報での成熟準備期に相当。次いで、卵巣増重の後期に入り、同じくエネルギーの蓄積が行なわれると同時に、水分増加により卵の増重が急速に行なわれる時期=同じく卵巣増成期に相当。最後に、卵巣の増重に対して成分上の変化がなく一定の値を示す時期=同じく成熟期に

相等。

# 要

- 1. 北海道日高地区幌泉および青森県大畑の沿岸に来遊した魚の卵巣、その他の内臓重量の体重比 およびその分散医合から、これら魚群の完熟時期およびその後の回遊先を検討した。また、静内 川、天塩川、十勝川、石狩川および標津川にそ上した魚の完熟期の卵巣重量から、そ上魚の地域 性を検討した。
- 2. 1969年幌泉に来遊した群は
- (イ) 初漁期にはこの地域から極めて離れた場所まで回遊するか、あるいは沖待ちすると思われる 魚と、近くの川にそ上しそうな群が混在する。
- (ロ) 最漁期の魚は、日高以西の広範囲な地域に分散してそ上する。
- (一) 終漁期の魚は、この地域来遊群の中で最も未熟な状態で、かなり遠万の特定地域に集中的に そ上する。

ととが予想される。

- 3. 同じく大畑に来遊した群は
- (イ) 来遊初期には、幌泉の初期群と同様に、沿岸に滞留するか遠くまで回遊するものと、短時日 にそ上開始するものとが混在する。
- (ロ) 盛漁期の魚は、幌泉の盛漁期群と同様に、地域的にかなり分散する。 ことが推察された。
- 4. 静内川にそ上する親魚の卵重の体重比は、そ上時期の遅いものほど増加する。そ上初期の魚については単位体重当りの抱卵量が少ない別系統の群が送入したことも考えられる。一般的にみてこの川にそ上する魚は単位体重当りの抱卵量が十勝川のものと同程度か幾らか少なく、十勝川の群と同系統と考えられる。
- 5. 天塩川のそ上盛期の魚は、静内の魚と同様に 2.5~4 週間で完熟し、卵巣の体重比は終漁期に やム増加する。またこの卵巣の体重比は静内川そ上魚より小さく、1968年の石狩川そ上群と 同傾向であった。
- 6. 石狩川そ上群には、1968年の調査では完熟時の卵巣重量から3つの型がみられ、千歳川上 流西越捕獲場での魚が最も卵巣の大きい型のものであった。
- 7. 1968年および1969年にそ上した親魚の完熟時の卵巣重量の体重比から、太平洋側にそ 上する魚の単位体重当り抱卵量は日本海側にそ上するものより多く、また根室海区標津川の魚の

単位体重当りの抱卵量は日本海側のものと似ていた。

- 8. 肝臓およびその他の内臓は、河川では一般にエネルギー源として利用されているが、沿岸回遊時にはほとんど利用されないことが知られた。このことから、そ上直前まで摂餌していることが推察される。(1969年実例2尾)。
- 9. そ上魚の肝臓は、生活環境が悪いと肥大することがうかがわれた。
- 10. 魚肉一般成分の分析から沿岸回遊時ならびにそ上時の体エネルギーの動向を検討した。
  - (1) 幌泉沖来遊魚の一般成分組成は、来遊時期に関係なくほぼ一定であった。
  - (ロ) 大畑沖来遊魚では盛漁期に蛋白質、脂質が最も多く、成分的にとの時の魚が最も未熟な状態と考えられた。
  - (ハ) そ上魚では生活環境が悪いと、体蛋白質の消費が助長され、また水分の増加することが5かがわれた。
- 11. 卵巣の一般成分を測定し、成熟現象を卵巣の成分組成の変化から検討した。
  - (4) 成熟につれて一般に水分の増加、蛋白質の減少が認められた。特に安静が保たれ難い環境では水分の増加が著しいことが推察される。
  - (中) 沿岸来遊時の成分組成は安定した値を示した。また成熟現象は、魚肉成分や諸器官重量の変化として現われ前に、卵巣の増重特に水分の増加現象として沿岸来遊時にも生じることが推察された。
  - (\*) 卵巣の一般成分からみた沿岸来遊時の成熟程度は、大畑沖における盛漁期の魚が最も未熟な 状態と考えられた。しかし、その他の諸現象を考慮すると別の特異な群とも考えられる。
- 12. 卵巣の体重比と魚肉一般成分組成との関係から、成熟現象に対する体成分の役割を検討した。
  - (1) 一般に卵巣の体重比は魚肉一般成分と相関関係にあることが認められた。
  - (ロ) 幌泉における終漁期群では、卵巣の増重と同時に体エネルギーの蓄積が行なわれていること がうかがわれる。この現象は20~頃に示したことと一致する。
  - (ハ) 卵巣の体重比と魚肉一般成分との関係は河川そ上後明確に認められるため、 魚体 に 蓄積されたエネルギーは、卵巣増重の盛期(卵巣増成期)に急速に移行することが考えられる。
  - (二) 天塩川そ上魚ではこれらの関係が静内川そ上魚と著しく異なり、5 および7項に示したと同様に群の相違が推察された。また環境の違いが起因して体エネルギーの消費が抑制されることも考えられた。
  - (ホ) 群の違いによって卵巣への体成分の移行能力に違いのあることが推察された。
- 13. 卵巣の一般成分組成と卵巣の体重比との関係から、卵巣の成熟現象を化学的な内面現象から検討した。

- (1) 一般に卵巣の増重につれて水分は増加し、脂質ならびに蛋白質は減少した。
- (ロ) そ上開始時には、体蛋白質の蓄積がみられたと同様に、卵巣において蛋白質の蓄積がみられた。これは沿岸来游時に急速に行なわれることが推察される。
- (ハ) 捕獲場所が同じであっても、時期の違いによってこれらの関係が異なるため、来遊時期によって群の異なることが考えられた。
- (=) 大畑沖来遊群は、卵巣成分が幌泉沖のものよりエネルギー的に高いレベルにあるため、11. の(一)頃に示したとおり栄養源の豊富な卵を持つか、大形の卵を形成することがうかがわれた。
- (ホ) 卵巣の成熟段階が、重量変化から表わされたと同様に(昭和40年度さけ・ます増殖事業に関する調査報告)、それに対応する3つの化学的な内面現象のあることが知られた。

#### (3) さけ親魚の蓄養条件に関する調査

## 札内蓄養池環境条件の検討

前年度に引続き、札内蓄養池の環境条件を、溶存酸素の面から検討した。

調査は44年10月7日午後3時から開始した。調査時の蓄養状況は次の通りである。

蓄養池 No.	8	8	計	捕獲場名
Ⅰ及Ⅱ	5 9 7	7 7 0	1,3 6 7	幕 別
III	1,9 1 8	-9	1,927	東33号
ÍV	1,871	289	2,160	千代田
計	4,386	1,068	5,454	

#### 10月6日現在

この数字はへい死魚の取揚、採卵選別作業等の関係で総数及び池間の移動がある。I及びII号池の幕別補獲魚は他の2浦獲場に比べて、成熟が進んでてる。又採卵作業上の理由で8が多く蓄養されている。

落養施設は43年度殆んと同じであるが、メム川の水量は前年に比し著しく減少している。

メム川の水量は札内川の条件により変動があるが、近年札内川河床の低下により水量は減少の傾向にある。調査時の水量は流速計の故障により測定出来なかったが、水門通過のさいの水位等からみて43年同時期の約半量程度と考えられた。即ち43年は水門通過量が34.7 ton/mmであるから、その半量17.4 ton/mmブラス滲透水というととで18 ton ~20 ton 位と推定した。

前年度の調査の結果から札内蓄養池の蓄養能力は用水量、溶存酸素量に規制される要素が強いことが知られている。特に蓄養池上流部に原因は明らかでないが、溶存酸素量が低下する現象が度々見られている。とのようなことから溶存酸素量の検討を行った。

結果は表及び図に示したとおりである。


この結果によれば懸念された蓄養池左岸の溶存酸素の減少は前年ほど著しくはないが、その傾向は認められる。 I 号池通過後の被少は著しくないが、これは蓄養尾数が1,367尾と少なく、又幕別の比較的成熟の進んだ親魚であることによると考えられる。 II、IV号池通過後は約7.5 ppmに低下する。 O、Dの養魚池通過水は著しい過飽和状態で、前年と同じ傾向であるが、この池は水量が非常に少く、蓄態尾数に影響を及ぼすほどのものではない。 調査を行った時刻は、昼間としては、魚が安静な時間であるから、選別作業時は、朝夕等魚の動きの烈しい時等にはこの2倍位の酸素消費が考えられるから、この場合蓄養尾数の増大の巾は余り望めない。 正確な水量の測定結果がないので、約20 ton/mmとして概算すると安静な状態で約6,000尾増収容の計算になるが、最大酸素消費の条件を考えると、約3,000尾増と考えられる。更に上流部の蓄養魚の最大酸素消費の場合を考えると、1,000尾~2,000尾増が根度と考えられる。従って調査時点に於ける札内蓄養池の条件では、安全な蓄養尾数は6,000尾~7,000尾となる。 この数字は前述の通り、極めて大さっぱな推測値であるが、前年度の蓄強状況と対比して考えても、安全度を考慮すれば、用水の循環異気装置の強化等がないかぎり、これを越えることは危険と考える。

-222-

第 1 表 測 定 表

測定場所	才 海 %	溶存酸素	溶存酸素
即足物所	水温℃	飽和度%	量 (ppm)
A	11.30	9 4.2	9.98
В	"	9 6.0	1 0. 1 7
C	1 0.3	1 1 6.0	1 2.5 8
D	1 0.8	1 2 8.0	1 3.7 2
1	9. 5	9 5. 0	1 0.5 0
2	"	9 8. 2	1 0.8 6
3	"	9 5. 5	1 0.5 6
4	1 0.0	9 6.7	1 0.5 5
5	9. 7	9 7.8	1 0.7 5
6	9.6	9 9.7	1 0.9 9
7	9.8	8 6.5	9.4 7
8	9. 7	8 5. 2	9.37
9	#	8 8.0	9.68
10	9.9	8 4. 6	9.26
1 1	1 0.6	9 2.0	9.90
1 2	1 0.7	1 0 7.0	1 1.5 0
1 3	1 0.8	9 3.5	1 0.0 2
1 4	1 1.2	101.1	1 0. 7 3
1 5	1 0.7	1 1 6.0	1 2. 4 7
1 6	9.8	6 7.1	7.3 6
17	9. 9	7 0.0	7.66
18	1 0. 2	7 0.5	7.66
19	1 0.5	7 6.0	8. 2

#### 註) 昭和44年10月7日午後3時測定



# 3 さけ・ます資源動態並びに生物統計調査

# (1) 稚魚の標識放流試験(マーキング)

当初の計画通り、夫々の目的にそって魚種別、河川別に標識放流を行なった。

施	魚体大	魚体小	給 解 群	無給餌群	無給餌群	約 解 報		:•	早期放流	後期放流	無給餌群	% 算 群	飼育 4ヶ月		
目的	魚体の大小にある回帰	効果の確認	人口給解による回帰効	果の確認	T.		回帰効果の確認	移殖効果の確認	が活る。日本語の知経	人のにより 11 - 47 793 / July 15 / Jul	人工給餌による回帰	効果の確認	回角件		回海体
標識部位	左陵	右腹	脂左腹」	脂 右腹	脂 左腹	脂右腹	盟	罷	<b>七</b> 覆	左腹	脂 左腹	脂布腹	<b>七</b> 腹		盟
蘇霧尾数	10万尾	1 0	1 5	1 5	1 0	1 0	S	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 5.5		2 0
放流年月	1970.3	И,	1969.4	**	1970.3	1970.4	1969.4	1970.3	1970.3	1970.4	1970.3	1970.4	1969.6		1970.3
宣三	羅田三三	×	游樂部川	*	幕 別 川	*	幌 満 川	知内川	湧 別 川	"	游樂部川	*	天焰川	76	サンドイ川
魚種	\$	k		21	ii.	"	**	u	からふとます		bi	er.	ますのすけ		交 配 種

# (2) 標識親魚の回帰実態調査

本年回帰した標識魚は次のとおりであった。

#### ① 歴舟川放流の回帰魚(さけ)

1967年春、移殖効果を確認するため歴舟川産のさけ稚魚50万尾(脂、右胸)、網走川より卵による移殖稚魚50万尾(脂、右腹)を4月13日~5月18日の間に標識を付し歴舟川より放流した。そして、それらの魚群は3年魚としてえりも以東沿岸、歴舟川に多くの回帰がみられ、これらの地域で1,220尾の再捕報告があった。

それらの再捕魚のうち、標識部位の組合せが一致するものは下記の通りであった。

再捕	月日	9月	9	10	10	10	11	11	11	1 2	1 2	54
		中旬	下	上	中	下	上	中	下	上	中	計
歴舟産と思われるもの	沿岸	2	3	4	3 7	8 1	102	5 1				280
脂、右胸	河川				5	8	18		1 2	3 9	4 7	129
加入一个门间	小計	2	3		4 2	8 9	,1 2 0	5 1	1 2	3 9	47	409
網走川より	沿岸		1	1	16	70	97	28				213
移殖と思われるもの	河川				4	2 7	5 0	6	16	1 6	9	128
脂、右腹	小計		1	1	20	9 7	147	3 4	16	16	9	3 4 1

以上の結果より次のことが推測される。

- a 回帰性が強く、卵を移殖し放流された場合は、放流河川に回帰することが確められた。
- b 地場採卵による稚魚の放流は卵移殖による稚魚の放流より、その回帰効率においては約 1.2倍の効果があることが認められた。

なお、この結果は3年魚だけの結果であるので、回帰時期、体生長、回遊分布等については 次年度の結果を得て詳細に報告する。

# ② 湧別川放流の回帰魚(からふとます)

1968年春、からふとますの放流適期を把握するため、湧別川より湧水管理群(2月放流)19万尾、河川水管理群(4月下旬~5月上旬放流)20万尾を放流した。

そして、その魚群は本年 2年魚として回帰し、740尾の再補がみられ、そのうち標識部位の組合せが完全一致するものは634尾であり、次の通り推測される。

即ち、634尾の再捕の5ち、536尾は河川水管理群であり、98尾は湧水管理群である。 湧水管理群に対する河川水管理群の回帰効果は5.5倍を示し、放流時期が回帰量に非常に 大きく影響することが認められ放流時の環境要因についての検討が必要であることを示唆している。

# (3) 漁獲物組成調査

# あきさけ年令組成

#### I北海道域

0 河川域

海区	河	)11	名	4	年 令	組	成	(%)	標不数	備考
名	,,,			2	3	4	5	6	N 7 80	l ma
オ	幌	别	Ш	1.4	9 4.9	3.7			4 3 3	西側域の3年魚
ホート	幌	内	jll	0.6	9 5.0	3.3	1.1		181	の比率は非常に 高く、また湧別
ック	常	呂	)1)		5 8.2	3 9. 1	2.7	x	184	川、網走川の3年群も非常に多
海	勇	别	)1]	0.8	8 8.1	1 1.1			3 4 8	く回帰した。常日川はやや少か
区	網	走	][[		7 8.3	2 0.9	0.8		230	った。この海区の 回帰主性は3年魚 であった。
	耀		JII	,	1 2.1	8 0. 6	7.3		9 8	蒸別川、伊茶仁
根	薫	别	)![		8 4.8	1 2.0	3. 2		250	川、標津川、別
室	伊	茶仁	: ][[	0.5	9 7.1	2.4			3 8 1	は3年魚が主群であり、4年魚
32.	標	津	][[	2.3	6 2.3	3 4.3	1. I	,	4 4 0	の回帰量は非常に少かった。風
海	西	别	Ш		2 0.0	7 1.3	8.7		185	蓮川、羅臼川は 3年魚は少かっ
区	風	莲	)11	0.8	1 9, 6	5 7. 5	21.3	0.8	240	た。西別川は3年魚、4年魚と
	别	当了	E /11		8 0.6	1 5. 9	3.5		113	もに回帰量は多かった。
	穂	香	JII	2.5	4 5. 0	5 2.5			4 0	
えり	別規	<b></b> 聚辺4	-///		9 2.6	7.4			5 4	十勝川、釧路川 の主群は4年魚
当以	釧	路	Ж	1.1	4 0.7	5 7.6	0.6		631	であり、3年魚
東海	+	勝	Ш	1.0	3 2.9	6 3.2	2.9		204	も多くの回帰が みられた。別寒 コケ川 豚魚川
区	歷	舟	111		8 8.0	1 0.7	1.3		7 5	辺牛川、歴舟川 の主群は3年魚 であった。
日	天	塩	)11	1.6	2 7. 2	4 1.6	2 9. 6		257	天塩川は4年魚 が主群であるが、
本	石	狩	][]	1.8	8 7.1	1 1.1	1.	,	164	他の河川は3年魚が主群であった。

(尾数100尾以下、4拾5入)

海	利 別 川	4.0	8 4.1	1 0.4	1.5		202	特に厚沢部川は 3年魚が多く回
区	厚沢部川	.0.4	9 5. 7	3. 9			230	帰した。
え以	静 内 川	4 5. 4	1 2.4	4 0.4	1.8		394	静内川の2年魚 が著しく多く、
えりも区以西海区	遊樂部川	1.6	2 8.8	6 4. 3	5. 3		5 4 9	遊楽部川は平均年令組成である
0	沿岸域	Ż						
根	羅白沿岸		1 3.9	7 9. 5	6.6		4 1 1	
室	根室沿岸		6 1.4	3 6.4	2. 2		4 4	
20	大樹、広尾 沿岸		27.2	6 7.7	5. 1		195	
も以東	釧路沿岸	1.4	3 7.1	5 9.8	1.7		861	* .
東	十勝沿岸	0.9	3 8.9	5 8.5	1.5	0.2	5 3 5	
え以り、	八雲沿岸		1 8. 2	8 0.0	1.8		5 5	
多西	,							

# 日本 州 域

1.0									
海区	3m7 111 A	年	令	組	成	(%)	- * *	/sts	考
海区名	河川名	2	3	4	5	6	標本数	備	与
	織笠川	3 1. 1	2 9.5	3 2.0	7.4		1.22		
	津軽石川	0.3	2 8.4	6 5. 6	5. 7		296	. *	
太	木槌川	1 0.5	3 7. 2	5 0.2	1.6		191		1,
平	大 川	1 0.2	1 2.3	7 1.4	6.1		98		
洋	泉田川	4 0. 2	3 4.8	1 8.5	6.5		9 2		
海	新田川	3 0.0	5 0.0	2 0.0			10		
区	那河川	6 0.6	3 8.0	1.4			7 1		
	利根川支流							~	
	鬼怒川	2 7. 5	7 2.5						
В	雄物川	3. 1	7 5. 9	1 8.0	2.4	0, 6	294		
本	月 光 川	1 9.0	5 2.4	2 8.6			2 1		
海	三面川	1 2.0	6 5.0	7.7	1 5. 3		117		
区	信濃川支流								
	魚野川	1 7.1	6 0.0	1 7.2	5.7		3 5		

海区	地 区	名	沿	岸	備考	河川内	河川+沿岸	河川沿岸
名	AB 12	40	漁	獲 数	Ntd ~2	捕獲数	合 計	河川
日	稚内 天塩	地区		5,000	推定值	2,600	7,600	%
本	石狩 浜益	地区	1	7,000	推定値、例年に比し不漁の模様	4,400	1 1,400	
海	道 南 地	区	不	明	僅少のようである。	1,900	1,900	
区	小	代.	1	2.000	従って推定値	8,900	20,900	
*	斜里 網走	地区	90	0,200	並漁を若干上廻る程度、網走地 区好海	98,800	999,000	
ホート	常呂 湧別	地区	25	4,800	区好漁 好漁、特に常呂地区、湧別川の 回帰魚多	55,300	310,100	
ック	紋別興部雄武	地区	7.	5,500	一部推定值、好漁	9,100	84,600	_
海	枝幸 屯別	地区	9	0,500	豊漁、幌別川の回帰群が多かっ たためか?	13,300	103,800	
区	· /\	計	1,3 2	1,000		176,500	1,497,500	
根	羅臼 標準	地区	58	5,800	経臼地区豊漁、標津地区不漁、 伊茶仁、標津川の回帰魚少のため	28,400	614,200	
室	野付 別海	地区	33	2,100	両地区ともに豊漁、西別川の回	158,600	490,700	
海	湾中 根室			1,300	でや不漁、別当賀、風蓮川の回	2,000	83,300	
区	小	計	1	9.200	帰群少 豊漁		1,188,200	
	厚岸、以東			1,100	並漁上、別寒辺牛川の魚群少、	2,000	83,100	
えり	白糠釧路昻布桑		1	2,500	十勝川系間引 並漁、釧路地区不振、統計もれか	46,500	249,000	
\$	大津 厚内			5,600	豊漁、十勝川の回帰魚多	140,200	595,800	
以東	庶野広尾大樹			8,100	豊漁、十勝川系の回遊多し	2,400	240,500	
海区	小	計		7,300	十勝川系回帰魚多し		1,168,400	
	日高地		1	0,500	好漁、東側程良好、十勝川系回	4,900	215,400	
えり					遊、この地区の回帰魚少			
\$	胆 振 地	X		7,300		1,300	8,600	
以西	噴火湾均	也区	2	8,900	好漁、特に遊楽部川周辺の八雲、 長万部好	1,100	30,000	
海区	道 南 地	区	- 2	1,800	豊漁	0	21,800	
-	津軽海峡	地区	1	4,000	やや不漁、茂辺地川系魚群の回帰少	5,000	19,000	
	小	計	28	2,500	並漁、との海区で回帰魚少	12,300	294,800	
	全道台	計	3,59	2,000	全道的にやや豊漁	577,800	4,169,800	
備	2. 今年度は- 川、薫別川、 3. 今年度のE	一般に 標準) 回帰量の	3年魚 !!、十	が多い。 勝川で	川群は、十勝川、西別川、網走川	瀬著であ	、幌別川で	あり、
考	少なかったを 学の河川群で			仁川、	原津川、風蓮川、別当賀川、えり	6以四海	区の日局、	胆饭石
			-					

# 昭和44年度北海道沿岸からふとます漁獲量

(北海道系と推定されるもの)

												4 !		
海区名		地		Z		2	1	沿流		岸数	備 考	河川内捕獲数	沿岸+河川	溯上率
	斜	里	`	網	走	地	X	50	8,9	00尾	最近にない豊漁、斜里川、 岩尾別川の魚群多し	39,600	5 4 8,5 0 0	7.2
オーホー	常	呂	,	湧	别	地	区	7	4,9(	00	豊漁	20,100	95,000	21,2
1	紋	则、	興	部、	雄	武地	区	3	1,9	00	やや好漁、一部推定値	12,000	43,900	27,3
9	枝	幸	,	屯	别	地	区	6	5,0	00	好漁、 一部推定値	16,500	81,500	20.2
2		小				āt		68	0,7	00	一般に豊漁である	88,200	768,900	11.5
	耀	日	`	標	津	地	区	14	1,9	00	やや好漁	7,100	149,000	4.7
根	野	付	`	别	海	地	区	2	4,3	00	不漁	5,100	29,400	17.3
edar.	根	産	,	湾	甲	地	区	1	1,60	00	不漁	900	12,500	7.2
室		小				計		17	7,8	00	やや不漁	13,100	190,900	6.8
日本		小				計			2,0 (	00	推定値、来遊量少し	200	2,200	9.1
えりる東				,,					5,0	00	一部推定値、来遊量少し	1,100	6,100	18.0
タリカ西				"				1	5,0	00	一部推定値、主として遊楽 部川の魚群	300	15,300	2.0
		全	i	Ä	合	計	f	88	0,5	00		102,900	983,400	10.5

- 1. この統計資料は、一部未調査の地区もあるので最終的なものでない。
- 2. 今年度は、オホーツク海区が豊漁年、根室海区が不漁年の年に当る。
- 3. からふとますは、42年頃より全道的には増加傾向にあり、また、不漁年、豊漁年の差が僅少になりつつある傾向を示している。

特に、オホーツク海区において顕著である。

- 4. 増加傾向にある河川は岩尾別川、針里川、常呂川、湧別川、渚滑川、徳志別川、屯別川、幌別川、標準川である。
- 5. この魚種の不振地域である。日本、えりも以東、えりも以西海区のうち、えりも以西海区が 15.000尾の漁獲があったのは、その大半は遊楽部川の回帰魚とみられる。

遊楽部川には、数年前より継続して、西別川、斜里川、岩尾別川より150~200万尾の 移殖を行っており、その効果の現われとみることが出来る。

# 4 環境条件並びにその保全に関する調査

# (1) 河川の性状に関する調査

さけ、ますの再生産河川の性状を調査して、さけ、ます増殖保護施策の基礎資料を得ることを 目的に次の項目について調査を行なった。

- 1 理化学的性状として河川の規模ならびに変遷、発達の状況(流程、流量、底質)、流域の一般的地形、地質、降雨・雪量、融雪期、流域の開発、産業、河川利用度合(農、工、鉱、都市関係)、さけ・ますのそ上・降海時の障害、水質、汚染度合。
- ロ 生物学的性状として生息魚類ならびに生産量、底生生物、沿川流域相など。 これらの取りまとめた資料は道内主要87河川におよび、現在整理中であり、近く別途に印刷 の予定である。

# 2) さけ。ます人工ふ化用水に関する調査

さけ・ます類のふ化条件は魚種によって相違することが知られている。近年の河川環境の変化 によって、人工ふ化用水もいろいろ変化がみられるので、ふか用水の再調査を行ない、次期のさ け・ます資源増大再生産計画におりる基礎資料とする。

これらの調査は現在使用中のふ化用水および、未利用のふ化用水について、取水状況、水温、水量および水質 ( PH、DO、硬度、 $NH_3-N$ 、Fe、Ca、 $P_2O_5$ 、SS) について調査を行なった。

これらの資料は現在整理中であり、近く別途印刷の予定である。

#### (3) 有機廃水と環境に関する調査

調査河川は天塩川である。

本川は昭和43年7月に増水に伴うさけ・ます類のそ上親魚のみならず、どじょう等の河川魚類の大量へい死を招いた事故があり、この原因を求明すべく調査を経続中である。本川は夏に渇水するという河川の特殊条件があり、川沿いに散在する人為的な汚染源 — 都市下水、製紙工場、澱粉工場等 — の水質変化に与えるfactorを考慮しつつ調査中でもある。

水質の面からは水の動きを、底質の面からは増水時に於ける河川汚濁に対する影響の度合いを 化学的にとらえていく。

# (4) 有機廃水と水産生物に関する調査

ビート、澱粉廃水が底生生物に与える影響度合の基礎試験

有機廃水の流入によって河川の水産生物にどのような影響を与えるかを明らかにするため、澱

粉、ビート、KPバルブ廃水の底生生物への直接的な影響について実験を行なった。

その結果ピート廃水(活性汚泥処理)、澱粉廃水のCOD6~50ppm の範囲ではO2の変化も小さく、底生生物に対しても何んら直接的な障害をもたらさないことが明らかにされた。しかし、薬液処理のピート廃水、KPバルブ廃水では若干、底生生物の嫌忌行動を起す徴候がうかがわれた。このことはピート廃水(薬注)のPH(アルカリ性)とKPバルブ廃水の刺穀物質がその原因と考えられる。従って、現在の処理方法、及び排水量のピート、澱粉廃水では底生生物に直接的な影響は殆んど無視される。むしろ、廃水流入後の環境変化(水綿の発生、O2の減少、窒化物の発生)が底生生物に大きな影響をもたらするのと考えられ、それら変化過程との関係が検討されるべきであろう。

#### (5) 釧路川のアルミニウムについて

昭和43年3月に発見された釧路川におけるさけ稚魚のへい死については、昭和43年9月の 調査およびその後の実験から川湯の温泉水に含まれるアルミニウムイオンの鰓呼吸に対する障害 に起因することが明らかにされた。

しかしながら上述のアルミニウムイオンの障害については近年急に流出されるようになって発生したとは考え難い。したがってとの障害については過去に常時起っていたものか明らかでない。 このため、昭和45年4月に再調査し、昭和44年4月に行なった郵送試料による分析データをも考慮して釧路事業場放流稚魚が釧路川資源にどのような影響を与えていたかを検討した。

その結果昭和44年度の実験から得られた現象では、郵送試水であることを考慮しても、屈斜路湖から美留和川までの支流の水量および湖内や河川内における湧水ならびにアルカリ性温泉水などの湧出量に変動があったことも考えられるように、 モノアルミニウムイオンの溶存量に変動が推察された。またその量は前年度よりいくらか少なかった。

次に昭和45年4月の調査では美留和川が釧路川へ合流する前後のモノアルミニウムイオン量は0.17ppmおよび0.04ppmと前年同時期の値(同じく0.59ppmおよび0.17ppm)および昭和43年9月の調査時における値(同じく0.95ppmおよび0.27ppm)に対して著しく少なかった。

また、合流直後の河川内に生資を設置して行なったさけ稚魚の生存試験では、24時間後にな お2/3以上が生存していた。また弟子屈市街地内の釧路川本流では稚魚の遊泳するのが認めら れた。

このように今年モノアルミニウムイオンが少なかった原因については、本年は例年になく積雪があり、これが3月から急に解け土壌のアルカリ分をともなって河川に流入し溶存するモノアル

ミニウムを無毒性のポリアルミニウムイオンや沈澱性のアルミニウム化合物に変化させたためと 考えられる。

以上述べたように、過去における釧路事業場放流稚魚の資源上の効果については降雨量、融雪速度など気象条件に著しく影響されてきたことが推察される。

なお釧路事業場における稚魚の放流については、放流前にあらかじめアルミニウムイオンの答 存量を測定することにより適切な放流方法を選択することが可能と考えられる。

#### (6) 溶存緊素によるふ化稚魚のへい死とその除去について

昭和42年から中川事業場において発生したさけ稚魚のへい死は、昭和43年6月に行なった 調査から、ふ化用水に多量に含まれた窒素ガスによることが知られ、この現象は引続き昭和43 年度においてもみられた。また、このへい死はさけ稚魚にのみ特異的に発生することが知られた。 したがって、このふ化場の運営については、まず類専用の事業形態をとることも考えられる。

しかしながら、上に述べたへい死は昭和44年度にはほとんど認められなかった。この結果、 中川事業場のふ化用水に含まれる窒素ガスの含量は著しく変動することが考えられた。

したがって、昭和43年6月から昭和45年3月までの調査結果から、中川事業場ふ化用水に含まれる溶存窒素の動態を明らかにし、先に述べた中川事業場の事業形態のあり方を検討するとともに、溶存窒素の除去法を検討した。

#### I 中川事業場ふ化用水の窒素含量について

当事薬場におけるふ化用水の溶存窒素量は、第1表に示したとおり最後の異常へい死が発生 した直後の昭和44年1月13日に最高の値を示したが、1月30日以降急激に感少した。

この水質条件は、僅かではあるが、9月に一時的に悪化したけれども、現在までほぼ安定した 状態にあることが推察される。またこのふ化用水に含まれる窒素ガス量は、先の報告でも述べ たとおり、パンケナイ川の答存窒素量とも関連していることが推察される。なお、川水および ふ化用水量(機械揚水)は、昭和42年および昭和43年に少なく、昭和44年度は増加して いた。

これらのことから、当事業場のふ化用水に含まれる窒素ガス量は、ふ化場の設置場所に極限 されたものでなく、降水量とも関連したかなり広範囲な地域的問題に起因することが考えられ る。

以上の結果から、昭和44年の窒素ガスによる稚魚のへい死はほとんど生じなかったことが 推察される。また当事業場今後のあり方については、降水量などの気象条件を含めた総合調査 のもとに、運用されなければならないものと考えられる。


第1表 中川事業場ふ化用水および川水の溶存ガス飽和度

ガス量	68	窒 素 69	飽和	度 %	70	68	酸素	飽和	度 %	0
用水別	6.6	0.0	1.30	9.4	3.20	6. 6	1.1 3	1.30	9.4	3.20
川水	120.6	124.7	114.6		1 1 1.9	8 6.0	106.7	103.0		101.0
(パンケナイ川)	(16.0)	(0.6)	(0.45)		(0.4)					
瀑気前	128.1	1 3 4.0		1 2 4.9	113.1	64.0	55.8		41.8	66.3
第1ポンプ	(7.2)	(8.2)		(10.0)	(5.8)					
第1ホンノ	1 27.4		114.4	1 1 8.9	113.1	8 4.0		83.2	73.5	82.6
12	(7.2)		(7.6)	( )	(5.8)					
Sen em SE		1 31.5	111.6				94.0	7 4.3		
暴気前 第2ポンプ		(5.1)	(4.4)							
	1223	1 2 5.8	117,3		1 1 4.4	9 8.0	105.4	103.3		95.7
#後	(7.8)	(5.1)	(4.3)		(2.8)					
ふ化室排水路		128.7			111.7	98.2			85.3	96.6
		(0.8)		(9.7)	(5.8)					
1号池中央部		122.5				89.8				
3,0		(7.5)								
2号池排水部		1 2 5.9	114.4		113.0		103.6	95.8		83.9
- 5 Jul 14 H		(5.0)	(3.9)		(3.8)					

()内の数字は水温(℃) ※ ふ化室親槽の水、他は分配槽の水 ※※ ふ化槽 2段目の排水部

すの子形のものは、コークス形のものと同じ大きさの外筒に、棚間隔 20 cmになるようにす

第 1 図 気瀑実験に用いた各種装置




なお上記モデルの基準流速は39ℓ/mmが計算された。

空気拡散形の気湿装置は、一般に水の滞留時間が10~30分必要とされている。したがってこの装置はコークス盆棚形やすの子形のものに比べ、建築費ならびに維持費が高い。このため、この方法による実験は、極めて小さなモデル(内径4.2㎝、高さ39㎝のガラスシリンダー)を用いて行なった。

なお昭和44年1月の調査時、砂利層に用水を通過させたふ化槽で、雑魚のへい死が抑制されたと思われた現象がみられたため、砂利層に気爆水を通過させ、通過前後の溶存ガス量を測定してその効果を検討した。この時の流速は上水の緩速ろ過速度に準じた。


これら気爆装置による爆気効果を第2図に示した。すなわち、窒素の除去効果については、 階段状におかれたふ化槽中を漸次流下させた自然状態のものとの間に差異が認められなかった。 この現象については、実験が用水の窒素含量の少ない時点で行われたため、高含有量時におけ る効果とは異なることが考えられることを考慮しなければならない。

第2図 コークス盆棚式および木製すの子式



-236-

第 3 図 各種気爆装置による 漫気効果



※ 貯水槽より配管されたものを蛇口にバケッで静かに受けた。

※※ 第1図に示したシリンダーに通気し毎分154<sup>cc</sup> で水を環流させた。

※※※ 同上容器を用い止水状で1時間通気した。

しかしながら、酸素の溶入については、自然式に比べ強制気濃式のものに著しい効果が認め られた。したがってふ化用水を機械揚水に依存する場合には、これら気濃装置による濃気は用 水の高度利用の面で重要な手段と考えられる。

なお、コークス盆棚形およびすの子形の瀑気効果については、いずれも同様の効果が期待出来るが、水量が多くなるにしたがい酸素の溶入が増加する傾向がすの子形のものでみられた。 これは、装置の構造上、水量の増加に伴い飛沫が生じ、過飽和状態を効進させたものと考えられる。そしてとの現象を除けば、注水量と瀑気効果との間には、与えられた条件内では特別な関係は認められなかった。

また、中川および千歳両事業場における通気実験から、強制 農気時における窒素と酸素の安 定溶解度は、前者がほぼ110%前後、後者は前者よりやや低い値で平衡状態になることが推 祭される。

砂利層に用水を通過させた場合の効果については、次のことが明らかにされた。

すなわち、昭和44年1月30日の実験でも測定されたとおり、今回の2回の実験において、 瀑気により過飽和状態になった溶存酸素は、いずれも100%ラインまで減少した。しかし窒素の減少はみられなかった。これは砂利層の通過により酸素が消費されたことと、砂利層の通過速度が極めて遅いため、強制瀑気により生じた過飽和な酸素が自然に放出されたことも考えられる。

したがって、砂利層を通過させる効果としては、気爆装置を用いた場合に生じる過飽和な酸素の害を除く意味で有効と考えられる。

なおこの問題については、多量に窒素が含まれた場合の効果が明らかでないため、今後の研究に待たねばならない。

なお、空気拡散法については、この実験では滞留時間約3分で窒素量は安定し、酸素も過飽 和に達した。この現象については通気前の窒素の濃度にも左右されることが考えられる。した がってこの問題についても、今後の研究に待たなければならないものと考えられる。

#### 要

- 1. 昭和42年から中川事業場に発生したさけ稚魚のへい死は、昭和43年6月に行った調査から あ化用水に含まれる窒素ガスによることが知られた。しかし、昭和44年度には上記へい死はほ とんど認められず、窒素ガス含量の減少が推測されたが、この現象は実測値と一致した。したが って窒素ガス含量は著しく変動することが推察された。またこの原因については、降水量にも関 連してかなり広範囲な地域的問題に起因することが考えられる。
- 2. 窒素ガスの除去については、コークス盆棚形瀑気法、同じくすの子形法ならびに空気拡散形法 の効率を検討した。
- 3. 酸素はいずれの形式の瀑気法でも簡単に過飽和状態に達した。しかし窒素ガスは通気法により 溶存飽和度約111%前後で安定し、且つ実験時の源水に含まれる窒素量が減少していたため、 上記装置による窒素ガスの除去効果については明らかにすることが出来なかった。

# (7) 札内事業場養魚池におけるふ化稚魚の特異行動について

(44年度札内事業場における飼育魚のへい死について)

札内事業場において、ふ化用水の減少により飼育稚魚がへい死し、ふ化事業に著しい障害を及ぼす事例が発生した。このため、その間の事業実体からへい死原因を明らかにした。

なお調査時点において、偶然メム川仮設養魚池の浮上直前の稚魚にガス病の症状をみとめたの でガス分析を行ない、十勝地方特有の気象条件が喝水時の飼育に極めて重大な問題を提起した。

#### I 事業状況

#### (1) 昭和44年度収容量

本年度は用水の減少を考慮し、2号池に15,000千尾およびメム川に仮収容池を増設し、5,800千尾の稚魚を収容した。

- (2) 滅水時における水量稚魚の水況および応急処置
- ① 仮設地における稚魚収容時の用水は自噴 0.5 ton以外はすべて川底よりの透湧水に頼り、その水量は約 2 1 ton /minが測定されていた。
- ② 2号池における稚魚収容時の最低水量はメム川よりの水量 0.8 ton/minおよび自噴水 0.5 ton/min の計 1.3 ton であったよお稚魚の発育につれ水量の不足が懸念されたが1月26日よりボンブを運転して水を再使用した。その性能は1.3 ton/minであった。2月18日以後はふ化室の導水が停止されため水の利用がよくなりこの時点での水の利用状況を第1図に示した。第1図 2月18日以後の用水使用法



註) 自噴水と川水の 混合後の動向につ いては比例計算に よった。

なお循環の水はボンプの不調から使用不能になることが度度あり、このためボンプ停止時 に収容魚に異常が発見された。

第1表に各養魚池における供給水量を第2表にポンプ停止時ならびに調査時における稚魚 の状態を表示した。また第3表に2月28日および調査時における溶存ガス量を表示した。

第1表 用水の供給量

F	B B	収容最終卵のふ化 経 過 日 数	川水の供給量 ton / min	自噴水量	循環水	湧	水	計
2	1.26	1 8	0.8	0.5	1.3			2.6
号	2.8	3 1	0.8	0.5	"			2.6
池	2.18	4 1	1.14	0.86	"			3.3
化出	2.28	5 1	1.1 4	0.86	"			3.3
仮	2.18以前	?	0	0.5		2.	1	2.6
仮設池	〃 以後	?	0.46	0.14		2.	1	2.7

第2表 ボンプ停止時における稚魚の状態

											,,	.,.		*/(31																		
197	70.		8	В	ì	2	号	池	;	卵	黄	吸	収	6	0	%	位	0	\$	0	下	流	部	^	集	台	L	`	浮	遊	池	^
	,,			_						流	出	す	る	\$	0	ති	ŋ	o														
										卵	黄	が	突	起	L	て	^	١,	死	す	る	6	0	出	現	o						
2	月	1	8	日	1	仮	設	池	;	突	起	症	状	を	呈	す	る	\$	0	出	現	0										
										浮	上	開	始	0	稚	魚	から	^	ι,	死	L	始	め	る	0							
						2	号	池	;	稚	魚	流	下	L	て	14	٤	ん	٤٠	.3,	٤	め	5	れ	T.C	4.	0					
3	月		8	日	1	反	設	池	;	湧	水	部	M	浮	上	集	台	L	`	横	臥	状	態	٥								
										ガ	ス	病	0	症	状	を	呈	て	`	卵	巣	部	VC	白	点	を	認	め	る	0		
(	調	査	時	)						浮	出	`	直	前	直	後	0	卵	お	ょ	U	稚	魚	Ø	多	数	0	^	()	死	を	認
		,								め	る	0																				

第3表 札内事業場養魚池の溶存ガス量および水温

	1013570000000000000000000000000000000000	- III 13 /	335 44 54 0 7	7 1 1 1 1 1			
月日	場所	水温	溶 存	酸素	遊離炭酸	溶 存	窒 素
	.,,	°C	cc/L	%	CO₂ cc∕L	cc/L	%
1970 2/18	2号池排水部	5. 8	3.7	4 5			
->	仮設池 "	5.0	2.8	3 4			
3 /8	ふ 化 用 源 水 メ ム 川 ダ ム	3.5 5	7.8	8 4.6	^.	1 8.1	1 0 5.6
	ホーリング水	1 5. 9	0.26	3.7	. I	2 2.4	1 6 6.8
	メム川仮設池 湧 水 部	7.7	8.8	1 0 4.7	8.23	1 9.1	1 2 1.5
	メム川仮設池 排 水 部	7. 6	6. 4	7 6. 6	1 2.4 9	1 8.8	1 1 9.4

再使用1.3 ton

## II 稚魚の異常行動ならびにへい死原因の推定

#### ① 酸素量供給量の影響

先にのべたポンプ停止時における稚魚の異常流下およびへい死は自噴水が無酸素状態であったから、注水量の不足、すなわち酸素欠乏による現象とみられ、へい死は窒素死によることが推測される。したがって第1表に示した時期でのポンプ停止時における供給酸素量と必要酸素から検討した。

すなわち、必要酸素は主として川水およびポンプによる循環水により供給されているか、 ポンプが停止した場合の単位当りの水量および供給酸素量を第4表に示した。

第4表 注水量と酸素の収支

E 0		注水	< 1	값	註	1	供	合	<b></b>	量	7	£ 2	必要酸素量	不足酸素量
月 E	1	cc/15/	iin	cc/K	9/	iin	(1)cg	K	Anii	(2)c	×	g/hin	註 3	(2)に対して
1.26	;	5 3	3	2	1 4	1	0.	8	1	0.	9	2	1.0~1.4	0.08~0.48
2.8		5 3	3	2	1 4		0.	8	1	0.	9	2	1.3~1.7	0.38~0.78
2.1 8	}	7 6	0	3	0 4	1	1.	1	5	1.	3	1	1.4~1.8	0.09~0.49

註 供給酸素量(1)は溶存酸素の安全限界を4 cc/L とした場合、

同じく(2)は3.5 cc/L とした場合。

- (2)1尾の重量 0.259 とした。
- (3)各時期の必要酸素量は発生速度が千才のものの1/2 として千才における実験データから求めた。

この結果溶存酸素の安全限界を3.5 cc/Lとしても全期間を通じてかなりの酸素が不足する ことが推察される。この場合必要酸素量の基礎としては収容最終卵の発生状態に合せたこと、 および魚体の増重などを考慮した場合には著しく酸素の不足が考えられる。この現象は第4 表にも示されるとおり2月8日において最も著しかったことが考えられ、これが異常な稚魚 の流下およびへい死をもたらしたものと考えられる。

#### ② 容存溶素の影響

3月8日の調査時に仮設養魚池においては注水部へ異常に稚魚が集合し、また臍のう突起症状ならびに卵黄に白点のある稚魚が観察された。との現象の1部は2月上旬においても発見されていたものである。このためガス分析を行ったところ溶存窒素量が異常に多いことが判明した。また自噴水は極めて異常なほど高濃度の窒素を含むことが知られた。このため仮設養魚池注水部では川水との混合割合から計算すると19.1 cc/L が計算され測定値と一致した。

以上の結果メム川仮設池における窒素落存量は自噴水の窒素含量に著しく左右されている

ことが知られた。そしてこの測定時における値は、中川事業場で起きたと同様に、ガス病を 起させるに充分なものと考えられる。

またこの頃のメム川の水温は極めて著しい日変化を示し、3月11日における水温は午前中の4時間に約3.5 $^\circ$ から8 $^\circ$ まで上昇した。

したがってとの水温上昇が窒素溶存量にどのような影響を与えるかを知るためメム川ふ化 用水の窒素ガス畳の温度上昇にともなう飽和度の変化を計算し第5表に示した。

第5表 メム川のような室素絶対量の水の温度上昇と飽和度との関係

温度℃	3.5 5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
メム川源水 18.1	105.6	107.5	109.8	112.2	114.6	117.0
混 合 後19.1		11 3.5	115.9	118.4	1 2 0.9	123,5

この結果メム川の水はそれ自体かなり高濃度の窒素ガスを含むことが知られる。しかしながら水温上昇に関係した飽和量の増加はこのことによる拡散がなくてもまだガス病を起させるほどまでにはなっていないことが推察される。

以上の結果、仮設池においてガス病を発生させた最も大きな原因は自噴水の注入による窒素ガスの絶対量の増加と水温の上昇によるものと考えられる。

1. 養魚池におけるふ化稚魚の異常な流下現象は、ふ化用水が著しく減少したため供給酸素量が不足し、稚魚が苦悶症状を呈して浮上し、水の流れにしたがって養魚池外に流出したものと考えられた。

この現象については供給酸素量と酸素消費量との関係から推算、予想されるため、別表に発生 の各ステージにおける稚魚の酸素消費量を表示する。

- 2. メム川仮設池注水部における稚魚の異常遊泳は、注水部において飽和度で121.5%の溶存窒素が測定されたことから、窒素ガスによるものと考えられた。なお稚魚の中には臍の5突端部近くに気胞様の球体を有するものも認められた。
- 3. メム川における窒素ガス病の発生原因については、窒素ガスがメム川の汚水自体にかなり高濃 腰に含まれているうえに用水にボーリング水を併用しているためこれに含まれる高濃度の窒素ガ ス(飽和度で166.8%)が飼育水の窒素含量の絶対量を高め、また十勝地万特有の気象条件に より河水温が短時間に上昇し相対的に飽和度が急激に上昇したことなどに起因したものと考えられる。 追一記

水温8℃におけるふ化稚魚の各発生時期における酸素消費量を以下に表示する。

採卵後の日収	5 9	63	69	82	96	100	110
O <sub>2</sub> 消 費 量 cc/kg BW/min	0.26~	0.5~1.0	0.9~1.1	1.4~1.8	2.1~2.9	2.3~2.8	4.0~3.8
備考	ふ化直前	ふ化99%					卵黄吸収 80~90%

# 5 魚病ならびに水生菌に関する調査

#### (1) 魚病に関する調査

親魚、稚魚に発生する細菌その他微生物に超因する魚病は、その発生被害の度合によっては、 人工ふ化事業の成績を低下させる危険性があるので、平常からその対策について基礎的研究を行ない、不時の発生に対処している。本年は支笏御事業場のひめますに発生したせっそう病について調査研究を行なったが、その結果については現在整理中であり、後日詳細報告の予定である。

#### (2) 水生菌の防除に関する調査

卵に発生する水生菌は、マラカイト・グリーン消毒によってその発生および成長を防除している。しかし、死卵の混入が多い場合には消毒効果が低下するので、より効果的な防除方法を考案

すべく、殺菌灯による効果を試験した。その効果については、現在とりまとめ中である。

# 6 閉鎖水域におけるさけ属の資源変動に関する研究(支笏湖一ひめます)

#### I 本湖に対する放流稚魚の全数標識放流の実施

人工ふ化放流と天然産卵による稚魚の生産量との比較を行なうために、本年度の本制に対する放流稚魚は総て発眼卵の時点で千歳支場に運び、ふ出稚魚を支場で飼育し、標識をほどとして、直接支笏湖の放流個所に連んで放流した。その結果の回収は昭和45年夏~49年の予定である。

放 流	時	期	放 流	個	所	放	流	尾	数	ひれ	切除部位
4 4.	6.	7	ಗ್ 🗆	ピナ	1	1	11	4,4 (	0 (	両腹	びれ
//	#	1 4	元		ili.	1	8	6,9 (	0 (	u	"
#	,	2 6		#			8	1,5 (	0 (	"	"
//		2 3	湖畔	養魚	池	2	2 0	1,1 (	0 (	右腹	びれ、あぶらびれ

尚、湖畔養魚池収容のものは約150,000尾を10月1日増水のために放流したが、 9月初旬から被患の細菌性の病気が治っていなかった。

#### II 6~8月の試験用特別採捕の結果

#### 1) 定置網採捕

支 湖に於ける定置網は6月6日より実施し、7月20日に終了した。その結果得た漁 猿状況は次の通りである。

(表1) シシャモナイ定置網魚獲状況

	操棄日数	4年魚(尾)	5 年魚 (尾)	計
6 月 初 旬	4	0	5	5
/ 中旬	10	19	803	8 2 2
"下旬	10	373	3,644	4,017
7 月 初 旬	10	1,108	5, 6 2 1	6,729
"中旬	10	117	850	967
"下旬		0	0	0
St.	4 4	1,617	1 0,9 2 3	1 2,5 4 0
%		1 2.9 %	8 7.1 %	100%

即ち、漁獲尾数12,540尾中、4年魚13%、5年魚が87%を占め、前年に比較して 魚獲尾数で28%にすぎず、4年魚が特に少なかった。

# 2) 試験刺網採捕

# 1. 6~8月の刺網試験採捕

6月6日~8月31日までの間延日数85日にわたって実施した。その結果の要約は、 次の表2に示す通りである。

(表2) 6~8月のシシャモナイ地区特別採捕結果

	_	6 月	7 月	8 月	āt	%
操業	日数	2 4	3 1	3 0	8 5	-
操業総	泛反部	800	504	3 4 6	1,650	-
尾数	4年	1 2 2	256	271	6 4 9	1.3
"	5年	1 2, 5 3 2	26,960	11,289	5 0,7 8 1	9 8.7
g	計	1 2, 6 5 4	27,216	11,560	5 1,4 3 0	1 0 0.0
尾反	4年	0.1	0.5	0.8	0.4	_
	5年	1 5. 7	5 3.5	3 2.6	3 0.8	
	計	1 5.8	5 4.0	3 3.4	3 1. 2	-

これを前年に比較してみると次の通りである。

年	次	使用 反数	漁 獲 尾 数	尾数反	漁	獲魚	の年の	、組 成	
					3	4	5	6	7 (年令)
4	0	2,118	45,517	21.5	0.2	7.8	8 9.4	2.5	0.2
4	1	2,072	56,973	27.4	-	9 6.3	2.2	1.5	-
4	2	1,601	62,548	39.1		62.8	3 7.2	-	-
4	3	741	30,338	40.9		24.3	75.7		
4	4	1,650	51,430	31.2	-	1.3	9 8.7	-	

# 3) 昭和45年1~3月の採捕調査

昭和45年の漁獲状況の予測のため、主として3月に採捕調査を行なったが、その結果、 反当りの採捕尾数は17.5尾、採捕魚226尾の年令組成は、4年魚15.9%、5年魚 84.1%で、本年の採捕魚も、5年魚が主であることが確められた。

#### Ⅲ 採卵用捕獲親魚の捕獲状況

各地区の捕獲場に於ける親魚捕獲状況は次の通りである。

	٩	8	total	使用早親魚数
湖畔	2, 1 5 0	1, 6 7 1	4, 4 2 1	2, 6 9 2
ボロピナイ	4, 5 8 7	5, 5 8 0	1 0, 1 6 7	3, 2 9 9
計	7, 3 3 7	7, 2 5 1	1 4, 4 8 8	5, 9 9 1

尚、本年の産卵魚群の年令組成の結果は、まだ終っていないが、一部抜取り調査の結果では、 大部分が5年魚で、4年魚と6年魚の占める割合は極めて低い状態である。

# IV 湖沼条件の調査結果

本年の餌料生物の発生状況は春3月のダフニャの量は不足で、本年の補充群の生き残り率が 低下することが予測されるが、夏季の餌料発生状況は例年と大差はなかった。

# Ⅱ 沿岸水域調查

# 1 あきさけ親魚の標識放流試験(中間報告)

[えりも以西海区一幌泉沿岸放流]

北海道に来遊するあきさけ魚群は略々400万尾であるが、それらの魚群の大半は道東、道北地区に来遊しえりも以西海区は、約30万尾と10%にもみたない。

しかし、えりも以西海区における再生産の実態からみて30万尾の来遊は過大と考えられ、どこかの魚群が混遊しているものと推定されていた。特に、えりも以西海区の70~80%を漁獲している日高沿岸に来遊する群はこの地区での再生産量との関連では他地区の回帰魚群を大量に間引きしているものと考えられる。今回はそれらの魚群は何処において再生産される魚群かを見極め、今後の再生産を有効に行なわしめるための資料を得、それをもってこの海区の資源の増大と沿岸さけ漁業の安定を図ることを意図として行なったものである。

#### (1) 標識 放流

#### ① 放 流 点

えりも以西海区沿岸に来遊する魚群はえりも岬の東側より来遊し、西へ移動しつつ母川に 回帰するものとの想定からえりも岬に近い幌泉沿岸の沖合4,000m地点より放流した。

#### ② 供試魚及び標識

供試魚は幌泉港近くに設置しているさけ定置網 2~4ヶ続(岩間、山形、佐藤、大石の各氏の定置網)の乗網魚を用いた。

標識はさけ定置網乗網魚を視泉港まで水槽に入れて運搬し幌泉港にて麻酔(麻酔薬MS 222 の15.000分の1溶液)をかけ、背びれの前側筋肉部に標識票(ボタン付スパゲティ・タッグ)を付し、覚醒後生管に収用し沖合へ運搬し放流した。

#### ③ 標識放流尾数及び放流時期

標識放流は下表の通り、この地区の漁期を初期、盛期、終期の3期に分け、合計524尾行なった。

期	别	放	流	月	日		放流	尾	数
470	ten	4 4		9.	2 :	5		7	8
初	明	"	1	0.	6	ô	1	2.	-
盛	期	"	1	0.	2 1	L	2	2	2
終	期	"	1	1.	1 5	5	1	0	2
計							5	2	4

-248-

#### (2) 再捕状況の概要

再捕地点については別図に示した通りである。

#### ① 初 期 群

初期の再捕数は126尾であり、再捕率は63.0%であった。そのうち、えりも以西海区で再捕されたものは74尾(58.7%)であり、その大部分(71尾)は日高、胆振地区であり、以南地区では僅かに噴火湾地区で2尾、上磯地区で1尾の再捕にとどまった。またえりも以東海区では52尾と41.6%を占めており、十勝川周辺での再捕が多かった。そして、十勝川で5尾、釧路川で2尾の再捕があった。

例年、この地区で漁獲される魚群の体色は銀毛が多く、ぶな化の魚は少い傾向にあるが、本年は例年と異なりぶな化が多く混合していた。このことは産卵期の早いえりも以東海区系の魚群が例年より非常に多くこの地区まで回遊したものであり、日高沿岸域で再構されたもののうち、その一部はえりも以東海区に回遊することも考えられるので初期群の50%程度はえりも以東海区系の魚群と推測される。


#### ② 盛 期 群


盛期群の再捕数は82尾(再捕率36.9%)であった。この魚群は初期群に比べえりも以 東海区での再捕は8尾と少なく、その大半の74尾は西側域において再捕された。そのうち 日高地区で51尾と極めて多かったが胆振地区は少なく僅か3尾しか再捕がなかった。また、 北海道の道南部及び本州域でも再捕された。即ち、鹿部沿岸5尾、茂辺地川3尾、噴火湾3 尾、八戸沿岸2尾、久慈沿岸1尾、宮古沿岸で再捕された。とのことは日高沿岸において噴 火湾系、茂辺地川系、本州系の魚群を多く漁獲しているものと推測される。

#### ③ 終期群

終期群は32尾の再捕(再捕率31.4%)があったが、えりも以東海区での再捕はみられず、すべてが西側域であった。即ち静内以西の北海道域では静内川2尾、敷生川1尾と僅か3尾であったが、本州域では7尾(岩手県種市沿岸1尾、宮古沿岸2尾、木槌川2尾、釜石沿岸1尾、酒田沿岸1尾)の再捕があった。このことはこの時期に日高沿岸域を通過する魚群には本州系が多く含まれているものとみなすことが出来る。

以上が再捕の概要であるが、要約すれば幌泉沿岸を回遊する初期群は主としてえりも以東海区と えりも以西海区の回帰魚である。また、盛期群と終期群は主としてえりも以西海区と本州域の回 帰魚であり、終期群に比較的多く本州系魚群が含まれている傾向がみられた。そして、初期一盛 期一終期を通じて、放流点に地理的に近接している日高西部、胆振沿岸域における再捕が比較的





少なかったのは、この地区の再生産資源が小さいことに起因するものと推察される。

従って、日高東部沿岸域に漁獲される魚群は胆振、日高系もさることながら、噴火湾、道南及 び本州系魚群とえりも以東の十勝川、釧路川系と広域な範囲で再生産されている魚群であること が知られた。

# [本州域膏森県大畑沿岸放流]

昨年度(昭 4 3)に鹿部沿岸より標識放流した結果本州系の魚群が北海道沿岸域を回遊し、それぞれの母川に回帰することが知られたが、本州域沿岸に接岸する魚群の回遊状況を更に詳しく知るために本州の最北端の下北半島大畑沿岸より標識放流を計画した。

#### (1) 標 識 放 流

① 放流点

本州、青森県の津軽海峡に面した大畑沿岸の沖合4,000加地点

② 供試魚及び標識

供試魚は大畑沿岸に設置されている定置網乗網魚を買上げ、船上において麻酔→標識→覚醒 後、生箕で沖合へ運搬し放流した。標識票はカフスボタン付スバゲテイ・タッグを使用した。

③ 標識放流尾数及び放流時期

期	別	放 流 月 日	放流尾数
初	期	4 4.1 0.2 2~27	6 7 尾
盛	期	4 4.1 1.1 9~22	8 8 尾
終	期	4 4.1 2.1 7~2 2	3 8 尾
ā	t		193尾

標識は上表の通り、この地区の漁期を初期、盛期、後期に分け、合計193尾放流した。

# (2) 再 捕

再捕状況については別図に示した。

① 初期群の再捕数は28尾であり、再捕率は41.8%であった。そして、放流点に近い津軽海峡に面した本州沿岸で7尾、陸奥湾で3尾、青森県の太平洋沿岸で8尾(奥入瀬川1尾)、岩手県で5尾の再捕がみられた。また、北海道の茂辺地川、知内川で夫ペ1尾、胆振、日高沿岸で2尾の再捕があった。そして、特徴的なのは奥入瀬川に注ぐ三沢沿岸と岩手県の久慈川沿岸と陸奥湾の湾口部で比較的再捕があったことである。また、日本海側では1尾の再捕もなかった。

#### ② 盛 期 群

盛期群の再捕数は34尾で再捕率は38.6%であった。

その再捕状況は北海道沿岸河川域では1尾の再捕もみられず、すべて本州域であった。そして主として太平洋側であるが日本海側の男鹿半島で3尾の再捕がみられた。

太平洋側の再補は放流点付近6尾、青森県10尾(1尾は小川湖内)、岩手県は15の再補があり、津軽石川2尾、宮古沿岸3尾とこの地区が最も多く、津軽石川の南に位置する山田川、大槌川、片岸川等に夫々1尾乃至2尾の再補がみられた。また、岩手県の久慈沿岸でも3尾の再補があった。

# ③ 終期群

終期群は3尾の再捕よりなく、再捕率は7.9%と極めて悪く、沿岸におけるさけ親魚の標識 試験の5ちでは最低を記録した。この原因については詳かでないが、捕獲場の事業の中止或い は天然繁殖河川へのそ上等種々考えられるが検討を要する問題である。そして、再捕された3 居は放流点で1尾、青森県の老部川沿岸で1尾、久慈沿岸で1尾であった。


以上が、この調査の再補結果であるが、大畑沿岸に接岸する魚群は、主として太平洋側に回遊するが、初期群については北海道系の魚群も若干回遊するが青森県の奥入瀬川の魚群と陸奥湾或いは岩手県の久慈川の魚群とも考えられる。また、盛期群は主として津軽石川をはじめ、それ以南の各河川の魚群と若干の日本海側系(秋田県、山形県)の魚群が混在していることが知られた。しかしながら現在のところ、沿岸部の漁獲状況、並びに河川補獲状況資料の分析を行なっていないので、後日検討の上、より詳細に報告したい。


## 2. 噴火湾沿岸におけるさけ、ます稚魚の生態調査

噴火湾のさけ・ます資源の増大を目的として合理的放流事業並びに保護施策の確立のためのさけ ・ます稚魚の生態調査は昨年に引続いて行なわれた。その結果は下記の通りである。

調査区域は遊楽部河口を中心にし、長万部町静狩地区より八雲町茂無部地区の区間、そして沖合 約2,000~3,000mの区域に調査定点20~25ヶ点を設け、稚魚の分布状況、発育環境条件 の調査を4月中旬から6月下旬の間、4回行なった。

その結果、遊楽部川より放流された雑魚は5月初旬には河口付近の波打際(水深5m以浅)に分布することが明らかにされ、5月中旬~6月初旬には長万部、落部の両方面に分布回遊すると共に沖合2~3,000mにも分散し、6月下旬には全て外洋生活に移行したことが明らかにされた。







食性については河川内と同様に雑食性であるが、主として他魚種の幼稚魚(ギンボ、コナゴ等)の 捕食が目立つ、次いで甲殻類(アミ、ウミノミ類)の捕食が示された。

稚魚の分布物度、滅耗度合については今後の調査にまたなければならない。

# 1 他研究機関との共同研究

## 1 遊楽部川のさけ・ます生産力に関する研究

遊楽部川における食物連鎖の最終生物であるさけ・ますの生産構造を明らかにするため、とくに 1年間河川生活を送るさくらます(Oncorhynchus masou)の生産を軸として調査が計画 された。

調査域はさくらます幼魚(やまべ)の生活の最適地である遊楽部川上流の一支流キソンペタヌ川の約6kmの区間を選び人工を化した稚魚にひれの切断による標識を施して、1968年5月16日に研究水域の上流域に4,078尾、中流域に1,799尾を放流した。

放流した標識魚を目印にして、毎月定期的に定点採集を行なった。その結果、5月~12月の間において標識魚は放流初期の分散が示されたが、その後、生長の推移、季節の変化による移動はほとんど認められず、夏季の生長期には定着したその場で過ごし、また移動する場合もそれ程大きくないことが明らかにされた。

生長は6月~9月に著しく、放流時3.0 m前後のaのが10月中旬には9.0~16.cmと放流時の体長の3~5倍に生長することが知られた。また体重の増加は体長10cm前後から著しく、体長と体重との関係式は

$$W(g) = 1.559 \times 10^{-2} L 2.959$$

で示された。

食性が場所や時期によって変化することが予測されるが、一部分析の結果では底生生物の摂餌が 主で、陸上昆虫が若干含まれるに過ぎない。摂餌された底生生物はカゲロウ類、ユスリカ類が主体 をしめていた。

1970年版はさくらます効魚に対する収容力を知るために摂餌行動を主にした個体観察と摂餌量と餌料生物についてのより禁しい定量的観察を行なう計画である。

#### 2 さけ。ますおよび河川水中の特殊極微量元素の研究

今までの研究では、シロザケの肝臓、えらなど、特殊極微量元素を蓄積するであろうと想像される器官を選んで放射化分析を行なってきたが、今後はこれら系統群の識別のための指標となるべき 微量元素を蓄積する器官、部位を見出すことと、試料の採取が簡単でかつさけ・ます系統群識別に 役立つ特殊極微量元素の中性子放射化分析法の確立が必要である。

# § 18 資料の刊行

1969年度(昭和44年度)の北海道沿岸河川域へのあきさけ来遊予報、並びに1968年度(昭和43年度)の来遊状況について 昭和44年8月

- o 魚と卵 129~131 昭和44年7月~昭和45年3月
- o &化場所研究報告 23号 昭和45年3月