
昭和47年度


事 業 成 績 書

水 産 庁 北海道さけ·ますふ化場

羅臼事業場

昭和 4 7年1 0月竣功 総工事費 4,610万円 建物面積 900,0M² 平家鉄骨造り片屋根






収 容 能 力 1,920万粒 増収型ふ化槽 48本

養 魚 池 · 飼 育 池

室内養魚池 2 2 5, 0 M 2

屋外 " 715,2 M2


" 飼育池 5 1 5,0 M 2







幌内事業場

昭和47年11月竣功 総工事費 3,025万円 建物面積 573,70M² 鉄骨1部木造平家建








 養
 魚

 室
 内
 5 7 3,00 M²

 屋
 外 7 1 4,70 M²



湧別事業場第2ふ化室

昭和47年11月竣功

総工事費 4,681万円

建物面積 990,0 M2

鉄骨平家建



増収型ふ化槽

4 8 本

ボックス型

96個





10



養魚池屋内 5 1 2,0 M² 飼育池屋外 3 5 0,0 M²

刊行のことば

昭和47年度の事業結果を報告します。

本年度は、「さけ・ます資源増大再生産計画」(前期5ヶ年計画)の2年目に当りますが、回帰群は一番放流の少なかつた43年放流のものでありました関係上、その結果については尠からず危惧いたしておりましたが、幸いにして46年度と同様に予想を上回り、戦後最高を記録した前年度(765万尾)に次ぐ豊漁を記録したのであります。

申すまでもなく、さけ・ます資源を維持し増大をはかるためには、その再生産 事業を質、量の両面に亘つて向上拡大してゆかなければなりません。中でも再生 産に必要な種卵の確保が第一に重要な課題でありますが、親魚来遊量が多かつた にもかかわらず河川内を上率は、8.8パーセントにまで低下しましたため採卵実 績は計画数を大きく下回つたのであります。

今後、事業計画の目標を達成するためには漁獲と再生産に関する管理体制の確立をはかり官民一体となつて有効なる増殖事業を推進することが、不可欠の要件でありますので関係各方面の一層のご協力をおねがい致します。

当場といたしましても総合的なさけ・ます資源増大のためより一層の努力を傾 注する所存であります。

昭和49年2月

水産庁北海道さけ・ますふ化場場 長 五十嵐 重四郎

水産庁北海道さけ・ますふ化場事業成績書 日 次

																			_
		本	書	F	の	見	方	**********											1
8	1.	25	け・	ま	す捕	1獲	事業実	施体制		*****									3
	2.	2	け・	ま	する	5化	放流実	施体制											5
	3.	2	17	ま	す均	曽殖-	事業経	費								1 A 1 C C C C A 1			8
	4.	11	海道	当さ	(+.	ま	すふ化	場の現員	1										9
	5.	11	洋	21+	• 17	ます!	漁業	**: *** * * * * * * * * *						cerese fits				1	0
	6.	90	は	. ‡	す井	善殖.	事業成	績総括			*****	0) = 4 + 0 >		* : * : * * : * *				1	2
	7.	20	ミナ	曾列	直事美	業		(F 4768 T				F # 18 18 (F F # 18				de.	1	9
		1	31	ナの	沿岸	岸来:	遊概況	******		****	*****							1	9
		2	沿旨	声漁	業と	:再	生産用	親魚の研	隺存	R		*****			.7757.11		x (1966 - 1	2	1
		3	31	ナ 種	別の) 移.	殖							. TELEVISION	******			3	8
		4	31	ナよ	化左	文流,	成績概	要										4	4
	8.	큠	すり	 角殖	[事]	岸	E								*		V e. l. e. e. e	6	3
		1	捕獲	隻捋	好相	既要	10 m + 10 m + 10 m											6	3
		2	まっ	す種	i ABO) 移	殖									1 (P) P) P (P) P		8	4
		3	ŧ -	to	\$1	匕放	流成績	概要			********		8.8.23° 1.4.2°					8	8
	9.	7	いめ ;	ます	增列	直事	業	na e e e e e e e e e e e e e e e e e e e										10	2
1	. 0.	2	はけ	· ±	す業	見魚	蓄養成											10	4
1	1.	^	1= 3	31	生產	崔事	業										4 7 5 4 7	1 2	4
1	2.	9	< 1	うま	す生	上産	事業			******			A CARLES		**** (**)			13	1
1	3.	'n	JПі	通過	稚魚	魚観	測事業		A 5 8 4 1									13	3
1	4.	K	下雨	隹魚	、保護	隻 事	業		00.00			*****						13	9
1	. 5.	利	焦魚館	司育	事業				****		******	\$1414. A. A. R. M.		**************************************				16	0
]	6.		胡查品	开穷	結手	果				*****		<i>.</i>						1 7	5
1	17	20	s kil z	D.III	一年	20.00											***	9.4	. 0

本 書 の 見 方

1. さけ・ます増殖事業の実施体制と経過概要

昭和27年,農林省所管水産庁北海道さけ・ますふ化場が設立されて、さけ・ますの人工ふ化放流を行なうとととなったが、このうち親魚の捕獲事業は北海道立水産ふ化場に委託した。しかし、昭和41年以降は道立水産ふ化場に代って北海道さけ・ます増殖事業協会に委託し今日に至っている。

2. 主 要 魚 種

創設当時から人工&化放流事業を実施している魚種は3種類(さけ,さくらます,からふとます)と、支笏湖のひめます増殖事業を行なつてきた。このほかに、昭和35年からアメリカ産マスノスケの移殖放流事業を継続実施中であり、昭和40年度からはベニサケ生産事業を実施し、これに加えて昭和43年からアラスカ産ベニサケ卵を移入してベニサケ資源の造成をはかつている。さらにこのほかに、さけ・からふとますの支配種の増殖試験も行なつている。

3. 計画年度と成績

単年度計画は、国の会計年度区分(4月~翌年3月)によつて計画を立てるが、この成績書は親 魚の捕獲、採卵、卵管理、稚魚飼育、放流、降海稚魚の保護までの一環した成績を取まとめしてい るので、翌会計年度の4~6月頃までの成績を扱つている。

4. 主な用語の意味

[沿岸来遊量] さけ・ます漁業は、再生産のための河川内親魚の捕獲(特別採捕)を除いて、 遠洋、近海、沿岸の3つに大別出来る。このうち、沿岸漁獲量と河川内捕獲数を合せて沿岸来遊量 としている。

【年級群】 さけ・ますの産卵のための回帰は主に $2\sim 5$ 年にわたつている。これらは産卵年から起算しての回帰年数であり、(発生年ではない。)或年の 2年魚、翌年の 3年魚、翌々年の 4年 魚さらにその翌年の 5年魚は同一年級群である。

[河川そ上率] 河川そ上数(捕獲数)÷沿岸来遊量で表わしている。沿岸のさけ・ます資源を維持するためには14.2%以上が必要である。

〔移殖と移籍〕 採卵された河川以外に種卵を移すことを移殖というが、これは採卵直後のこと

もあり、発眼後の場合もあり、死卵数も含めて移籍卵数という。

5. 海区別と支場担当区域

全道海域を 5 海区に分け、その境界はそれぞれ、知床岬、宗谷岬、白神岬、納沙布岬、襟裳岬で区分している。

支場の担当区域は、下記区分の海面に流入する河川を包含する流域としている。

北見支場 宗谷·網走支庁界~知床岬

根室支場 知床岬~根室・釧路支庁界

十勝支場 根室・釧路支庁界~襟裳岬

天塩支場 宗谷・網走支庁界~雄冬岬

千歳支場 雄冬岬~神威岬、および襟裳岬~地球岬

渡島支場 地球岬~神威岬



§ 1 さけ・ます捕獲事業実施体制

昭和47年度のさけ・ます捕獲採卵事業は,道内88河川,95捕獲場(さけ48カ所,さけ十ます37カ所,ます9カ所,ひめます1カ所)で実施した。このうち国が直接実施した捕獲場は4カ所(下中川,薫別,遊楽部および支笏湖),民間団体に委託して実施した捕獲場91カ所で,この詳細については,第1表のとおりで,支場別に整理したものが,第2表である。

O 3 H

◎ さけ・べにさけ

○ さくらます

o からふとます

(姫) ひめます

◎ さくらます・からふとます

第1表 昭和47年度さけ・ます捕獲採卵事業実施体制

海		捕獲	所 管		実施			海				捕	獲	所		管	_	施区		_
	水 系			-	11	ま	-		水		系				2114	Len	3	-	ま	-
区		採卵場	事業場	上国	民	国	民	区				採り		事	業	場	国	民	玉	B
	ルシャ	ルシャ	岩尾另	ij	0		0		小	平	蘂	1/1/2	平 蘂	天		塩		0		-
	岩尾別	岩尾別	//		0		0	本	暑	寒	別	暑 5	寒 別		//			0		
	奥 蘂 別	奥蘂別	斜 具	1	0		0	7	信		砂	信	砂		//					0
オ	斜 里	斜 里	"		0		0	海	石		狩	西	越	千		歳		0		C
-	藻 琴	藻 琴	藻 3	弄	0		0		支	笏	湖	支	穷 湖	支	笏	湖			姬	1
ホ	網 走	網走	網対	Ē	0		0	区	余		市	余	币	千		歳		0		ľ
-	//	西網 走	"		0				尻		別	名	駒	尻		别				C
1	能取湖	能取湖	"		0				朱		太	朱	太		//			0		C
.,	常呂	常呂	北 見	2	0		0		利		別	冷	水	利		别		0		
	ライトコロ	ライトコロ	"		0				厚	沢	部	厚	尺部	厚	沢	部		0		
ク	佐呂間別	佐呂間別	"		0			計		1 4			1 5			7	1	9	2	8
	湧 別	湧 別	湧 另	IJ	0		0		ル		サ	IV	サ	羅		白		0		
海	渚 滑	渚 滑	渚	肾	0		0		サゼ	ノル	1	サシ	ルイ		//					0
ヌ	藻與部	藻與部	"		0		0		羅		日	羅	臼		//		*	0		
	幌 内	幌 内	· P	9	0		0		春〉	세건	刊	春メ	古丹		//					(
	雄 武	雄 武	"				0	根	植		別	植	别		//			0		
	徳志別	徳志別	徳志気	11	0		0		元山	奇無	兵異	元峪	所無異		//			0		
	北見幌別	北見幌別	歌 3	差	0		0	室	崎	無	異	崎	無 異		//			0		
	頓 別	頓 別	頓易		0		0	里	薫		别	燕	別	薫		別	0			
	猿払	猿 払	//				0		古	多	糠	古	多糠	伊	茶	仁		0		
	知来別	知来別	//				0	海	忠		類	忠	類		//			0		0
計	2 0	2 1	11	1	1 8	3	1 7		伊	茶	仁	伊	茶仁		//			0		0
	ホロナイ	船泊	天 均		+	T	0	1	標		津	標	津	根		室		0		0
	増 幌	増 幌		11	10		0	区				3 1	線	中	標	津		0		
	天塩	天塩	"				0		当		幌	当	幌	計			1	0		(
日	// //	下中川	,,	0	.	0			春		別	春	別	-	//			0		(
Н	遠 別	遠別	"			1	10		床		丹	床	丹		//			0		6

海				捕		獲	所		管	Ę	[施]	区5	}	海				捕		獲	所		管	J		区分	<u> </u>
	水		系							3	け	ま	す		水		系							31	+	ま	す
区				採	卵	場	車	業	所	[3]	民	国	民	区				採	卵	場	事	業	場	E	民	围	民
	西		別	西		别	虹		别		0		0		仁	雁	别	仁	雁	別	静	-	内		0		
根	矢	臼	別	矢	臼	别	浜		ψ		0		0		幌		満	幌		満		//			0		0
室海	風		蓮	風	٠	連		//			0		0		日	高朝	晃别	幌		别		//			0		
西区	別	当	賀	别	当	賀	厚		床		0		0		元		浦	元	浦	Ш		//			0		
	穂		香	穂		香		//			0				Ξ		石	Ξ		石		//			0		
計		2	0		2 1				9	1	1 8		1 2	襟	静		内	静		内		//			0		0
	幌		戸	幌		戸	太		田		0				新		冠	新		冠		//			0		
	別須	寒辺	牛	厚		岸		//			0			裳	沙		流	富		Ш		//			0		
	釧		路	釧		路	釧		路		0		0	以		鵡		鵡][]		//			0		
襟	チョ	10^	シツ	チョ	10-	\'y		//			0				勇		払	勇		払		//			0		
裳	Sa;		寒	阿		寒	[50]		寒		0			西	白		老	白		老	白		老		0		
	茶		路	茶		路	鶴		居		0				敷		生	敷		生	敷		生		0		
见	庶		路	庶		路		//			0			海	貫	気	別	貫	気	別	八		雲		0		
	音		别	音		別		//			0			区	長	万	部	長	万	部		//			0		
東	+		勝	打		内	+		勝		0				遊	楽	部	遊	奖	部		//		0		0	
海		//		東	3 3	号	幕		别		0				汐		泊	沙		泊		//			0		0
un		//		利		別		//			0				尻	岸	内	尻	岸	Ň		//			0		
区		//		幕		别		//			0		0		F.	切	地	戸	切	地	知		内		0		
		//		Ŧ	代	田	札		内		0		0		茂	辺	地	茂	辺	地		//			0		
	歴		舟	歴		舟	大		樹		0				亀		Ш	亀		JII		//			0		
	费		似	费		似		//			0		0		知		内	知		内		//			0		
	広		尾	広		尾		//			0			計		2	1		21			5		1	2 0	1	3
	猿		留	猿		留					0			合		8	8		9 5			4 0		3	8 2	2	4 4
計		1 3			1	7		8			1 7		4	計		0			50			-1 U		0	0 4	3	1 4

第2表 支場別さけ・ます捕獲採卵事業実施体制

				捕獲	9	実	施	区	分			
支	場	水	系		3	(+		ま		す	備	考
				採卵場	王	民	問	压	民	開		
北	見		1 5	16			1 5			12 -		
根	室		20	21	1		18			1 2		
+	勝		1 3	1 7			1 7			4		
天	塩		1 2	1 3	1		7	1		1 0		
干	莀		1 5	1.5			1 4	1		3		
渡	島		1 3	1 3	1		11	1		- 3		
iii E	#	1	88	9 5	3		8 2	3		4 4		
4 6	年度		8 5	9 3	3		7 7	2		5 5		

§ 2 さけ・ますふ化放流実施体制

昭和47年度のさけ・ます人工ふ化放流事業は、69カ所(国38カ所、道1カ所、民国30カ所)で実施し、35水系に稚魚を放流した。そのほかに、捕獲を実施しているが、ふ化場のない水系、捕獲・ふ化とも行なつていない水系にも稚魚を放流した。

海	放 流	放流実施	支 場	魚	種	海	放	流	放流実施	支 場	魚	種
区	水系名	事業場	又 场	さけ	ます	区	水	系 名	事 業場	义 物	さけ	ます
	岩尾別	岩尾別	北見	0	0		標	津	中標津	根室	0	
	斜 里	斜 里	"	0	0	根	当	咿	計根別	" .	0	0
オ	藻 零	藻 琴	"	0	0	室海	襾	别	虹 別	"	. 🔘	0
ホ	網 走	網走	"	0		区	風	蓮	浜 中	"	0	0
1	常 呂	北見	"	0	0	12.3	别	当 賀	厚 床	//	0	0
ツ	湧 別	湧 別	"	0	0	#		8	9	1	9	8
ク	渚 滑	渚 滑	"	0	0		別到		太田	十 勝	0	
海	幌 内	幌 内	"	0	0	襟	釧	路	釧路	//	0	
区	徳 志 別	徳 志 別	天 塩	0	0	裳		//	鶴 居	"	0	0
	北見幌別	歌 登	//	0		IJ	ßnj	寒	//	"	0	
	頓 別	頓 別	"	0	0	東	+	勝	十 勝	"	0	
計	1 1	1 1	-2	1 1	9	海		//	幕 別	"	0	
	天 塩	天 塩	天 塩	0	0	区		//	札 内	"	0	
日	"	中川	"	0			歴	舟	大 樹	//	0	
	石 狩	千 歳	千 歳	0		計		5	7	1	8	1
本	支笏湖	支笏湖	"		(姫)	5468	静	内	静 内	千 歳	0	
海	尻 別	尻 別	渡 島	0	0	禁裳	白	老	敷 生	"	0	
区	利别	利 別	"	0		以西	敷	生	"	"	0	
	厚沢部	厚沢部	"	0		海区	遊	樂部	八雲	渡 島	0	0
計	6	7	3	6	3		知	内	知 内	//	0	
根	羅臼	羅 臼	根 室	0	0	計		5	4	2	5	1
宝宝	薫 別	燕 別	"	0	Ò	合						
海	伊茶仁	伊茶仁	"	0	0			3 5	3 8	6	3 9	2 2
区	標準	根 * 室	"	0	0	計						

第2表 道・民間の収容施設

さ け・・・○さ けます・・ {○さくらます ○からふとます

大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大			_											
大	₩		放	*	流	収	容 実	施	女		倡	魚	種	備 老
大ホーック海区 鬼 ホロンイ 鬼 ホロンイ 鬼 ボロンイ 鬼 ボロンイ 鬼 ボロンイ 鬼 ボロンイ 鬼 ボロンイ 鬼 ボロック 鬼 ボロック	一件 区	-	水	系	名	筃	所	名			נער	さけ	ます	viii ~
大水一ツク海区 鬼 志 別 天 塩 ○ ○ 猿払漁協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協 東 別 日 本 海 区 東 別 日 市 市		_	来		運	来		運	北		見	0		斜里第1漁協
A文島ホロゲ 船 泊 天 塩 ○ ○ 船泊浴漁協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協	オホーツク海	×		志	別	鬼	志	別			塩	0		猿払漁協
増 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・						船		泊	天		塩	0	0	船泊漁協
日日本本海区								5.50		//			0	
日本海区						信				//		0	0	增毛漁協
厚	日本海	ヌ		寒	別	暑	寒	別		//				"
美天 の 接 国		_				厚		田	千		歳			厚田漁協
美天 の 接 国					市	0.7		市		//				余市漁協
大 の 次 島 ○ 上の国漁協 2 回漁協 2 回流					玉	美		玉		//		0		美国漁協
根 室 海 区					0			0	渡		島			上の国漁協
大			ル		サ・	ル		サ	根		室	0		羅臼漁協
 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	相会流	×	床		丹	床		丹		//		0	0	野村漁協
一	以 主 何	_	矢	白	别	矢	日	別		//		0		別海漁協
A	-		穂		香	穂		香		//		. 0		根室漁協
A	T- T-		幌		戸	幌		戸	+	-	勝	0		浜中漁協
一番					路	茶		路		//				白糠漁協
十					別	音		別		//				//
広 尾 広 尾	襟裳以東海	区	厚		内	厚		内		//				大津漁協
		1	+		勝	利		別		//				池 田 町
一			広		尾	広		尾		//			7	広尾漁協
元 浦 川			猿		留	猿		留		//		0		幌泉町
一次 流 富 川 " 過川漁協 費 気 別 費 島 ○ 週川漁協 費 内 房 房 内 少 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 人 大 大 古 内 別 別 上 日 別 別 別 上 日 日 別 別 日	2		歌		别	歌			千		歳	0		
(株 裳 以 西 海区 貫 気 別 貫 気 別 渡 島 ○ 豊浦漁協 尻岸内漁協 尻岸内漁協 別 治 沙 泊 " ○ 銭亀沢漁協 十古内漁協 月 切 地 有 川 " ○ 上磯漁協			元		浦	元	浦	JH		//			0	浦河町
R B D R B D R B D R B D R B D R B D R B D R B D B D B D D B D D			沙		流	富		JH		//				鵡川漁協
R	继党口而海	IZ	貫	気	別	貫	気	別	渡		島			
亀 川 亀 川 ″ ○ 木古内漁協戸 切 地 有 川 ″ ○ 上磯漁協	京 衣 丛 四 传	Z.	尻	岸	内		岸	内		//				
戸切地有川 " 上磯漁協	L. I., A	-	沙		泊					//				
			亀		Ш					//				The second secon
茂 辺 地 │ / / │			,	切	地					//				
			茂,	辺	地	茂	辺	地		//				The second second second second
森 / ○ 北海道							森	4		//		0		北 海道
合 計 30 31 6 31 5	合 計			3	0		3 1			6		3 1	5	

註 収容箇所名のうちゴジツク体で表わしたものは、年度当初に計画したもので、その他は仮収容施設

第3表 還元·輸送放流

	,									
海		放流実施	所属	魚	種	海	41.000 1.77	放流実施	所 属	魚 種
区	放流水系	事 業 場	支 場	115	ます	区	放流水系	事業場	支 場	さけます
オ	奥薬別	斜 里	北見	0		海	芭 露	湧 別	北 見	0
ホ	パイラギ	網 走	"	0		区	與 部	渚 滑	"	0
1	能取湖	網走・斜里	"	0			猿 払	天塩(鬼志別)	天 塩	0
ッ	ライトコロ	北 見	"	0			遠別	(信 砂)	天 塩	0
2	佐呂間別	北見・湧別	"	0			風連別	(")	//	0'

34		+4 >+ 04 +	44 :	DT 63	tz.	Tel:	34-		44. W th 44	or so	tr.	T.F.
海	放流水系	放流実力		所 属	魚	種	海	放流水系	放流実施	所属	魚	種
区				支 場	115	ます	区	2010/3/21	事業場	支 場	さけ	ます
	古丹別	(信	砂)	天 塩	0		裳	阿寒	鶴 居	十 勝	0	
1	小平薬	(")	//	0		以	庶 路	//	"	0	
日	浜 益	(森)	渡 島	0		東海	茶 路	// -	//	0	
	厚 田	千	歳	千 歳	0		伊区	豊 似	(広 尾)	//	0	1
本	積 丹	(森)	渡島	0		P.S	歌別	(元 浦 川)	千 歳	Ŏ	
海	古宇	尻	別	"	0	0		仁雁 别	(")	//	O	1.1
lut	朱 太		森)	//	0			幌 満	(")	//	O	0
区	泊		别		ŏ			日高幌別	(")	//	Ŏ	
	突 符	(森	~)		0			三石	静内 (元浦)	//	ŏ	91
	石崎	("	5	渡島	Õ			静 内	千 歳	"	Õ	
	及部	("	5	//	Ŏ		襟	新冠	//	//	Õ	
	サシルイ		8	根 室	Ö			沙流	千歳・敷牛	//	Õ	
	春刈古丹	₩ //	-	// ±	0		裳	趙 川	千 歳	,,	Õ	
根	植り別	"	- 1	"	0		DI	白老	敷生	//	0	
1.00	元崎無異			"	0		12	貫気別	(森)	渡島	1	
	崎 無 異	",			0		西	長万部	(//)	(1) kg	0.0	- 1
室		羅臼・伊茶		"				落 部				
				"	0		海			"	0	- 3
	古多糠		仁	//	0		区	常路	(森)	//	0	
海	忠 類	/n === // == H		"	0	0		大船	八雲	//	0	-
		伊茶仁・計		//	0			尻岸内	(森)	"	0	. 4
		浜中 (床丹		//	0	0		汐 泊	八雲(森)	//	0	1 A.
区	春 別	*	丹)	//	0			大当别	(茂 辺 地)	// .	Ö	
	矢 臼 別		別	//	0	0		松倉	八雲	"	0	
		虹別•計根別	引	//	0		-	亀 川	八雲(茂辺地)	//	0	- 1
	別当賀	_" "		//	0			知 内	(森茂辺地)	//	0	14
	穂 香		別	//	0			福島	(茂 辺 地)	. //	0	
襟	チョロペツ	釧	路	十 勝	0		計	6 3	2 6	6	6 2	5

註;()は,道・民間個所

第4表 支場別さけ・ますふ化放流実施体制

支	場	放 流		岛 化	施 設		実 施	区分	備	考
	物	水系数	国営	道営	民 間	11	さけ	ます	נווט	7
北	見	1 5	8		1	9	0		,	
根	室	20	9		4	1 3	0	0	*	
+	勝	1 4	7		7	14	0	0		
天	塩	1 4	5		5	1 0	0	0		
干	皷	18	4		6	10	0	0		
渡	島	2 5	, 5	1	. 7	13	0	0		
	計	106	3 8	1	3 0	6 9	Ÿ			

§ 3 さけ・ます増殖事業経費

昭和47年度のさけ・ます増殖事業のために要した経費、予算および決算額は、下記のとおりである。

昭和47年度さけ・ます増殖事業のための予算および決算額

区 分.	予 \$	平 額	決 算 都	備 考
(組織)		円	þ	∃
水 産 庁	5 0 8,9	0 0,0 0 0	5 0 0, 4 5 0, 5 6	8
(項)				
北海道さけ・ますふ化場	4 1 9,9	73,000	4 1 1,5 4 1,3 2	0
(月)				
人当経費	2 7 1,0	0 0 2,0 0 0	2 6 2,7 4 8,1 2	0
職 員 旅 對	7,0	3 4,0 0 0	7,0 3 3, 4 1	9
. 庁 費	1 2,6	6 6 6,0 0 0	1 2,6 5 5,9 1	1
採卵ふ化放流庁費	1 1 7,4	157,000	1 1 7,4 2 3,9 3	0
土地建物借料	1,6	8 1,0 0 0	1,550,62	5
各 所 修 繕	9.6	6 9 7,0 0 0	9,6 9 6,9 4	5
自動車重量税	1	191,000	187,50	0
国有資産所在市外校小税	:	2 4 5,0 0 0	2 4 4,8 7	0
水產庁施設缸	8 8,5	9 2 7,0 0 0	8 8, 9 0 9, 2 4	8
施設施工旅資	,	7 5 0,000	7 4 9,2 7	6
施設施工庁红	!	5 6 5,0 0 0	5 6 4,9 7	2
施設整備試	8 7,	6 1 2,0 0 0	8 7,5 9 5,0 0	0
農林本省		5 1 0,0 0 0	, 5 0 9,5 0	0
農林本省施設貿		5 1 0,0 0 0	5 0 9,5 0	0
施設整備貿		5 1 0,0 0 0	5 0 9,5 0	0
合 計	5 0 9,	4 1 0,000	5 0 0,9 6 0,0 6	8

§ 4 北海道さけ・ますふ化場の現員

昭和48年3月31日現在の本場および支場別人員配置状況は第1表のとおりである。

第1表 北海道さけ・ますふ化場職員本・支場別人員配置表

場	名	技 .	官	事務 宝官	計
本	場		3.0	名 1 5	名 4 5
北	見	-	1 7	5	2 2
根	室		1 9	5	2 4
+	勝		2 1	4	. 25
天	塩		8	. 4	1 2
, 千	綾		10	a, 4	1 4
渡	峊		8	3	1 1
	計		1 1 3	4 0	1 5 3
前	年 度		1 1 7	3 6	1 5 3

註 本場の技官のうち8名は研究員

§ 5 北洋さけ・ます漁業

1) 漁業規模

第1表 母船式さけ・ます流し網漁業(隻数)

企業別		年 度	昭和 4 6 年	昭和47年
母		船	1 1	1 0
独	航	船	3 6 9	3 3 2

第2表 48度以南流し網・はえなわ漁業(許可隻数)

年 度 許 可 別	昭和 4 6 年	昭和47年
大臣~中型さけ・ます 流し 網	大平洋 327 日本海 175	3 7 4 1 7 5
大臣~中型さけ・ますはえなわ	3 6 9	0
知事~大平洋7トン以上流し網	3	0

第3表 その他さけ・ます漁業(道知事許可隻数)

許	可	別		年	度	昭和46年	昭和47年
	太平	洋/	小型流し網7	トン未	満	1, 2 8 2	1, 1 3 2
3	日	本	海小型	流し	網	1 0 0	1 0 0
	津	軽	海 峡 流	L	網	1 0 0	1 0 0
	日:	本	海小型は	えな	わ	484	4 1 4

資料は「日ソ漁業委員会について」1973年(水産庁)による。

2) 昭和47年さけ・ます漁業実績

第4表 日本およびソ連のさけ・ます漁獲量(区域別)

(単位:トン)

							立:トン)
	_	_	年次	1 9 6 9	1970	1 9 7 1	1 9 7 2
区	5.	}		4 4	4 5	4 6	4 7
		A	母 船 式	4 0, 4 0 0	3 6, 5 4 5	3 7, 3 5 7	3 5, 3 2 6
	割	区	太平洋流し網	9, 3 5 0	8, 4 5 5	8, 6 4 3	8, 1 7 4
		域	計	4 9, 7 5 0	4 5, 0 0 0	4 6, 0 0 0	4 3, 5 0 0
	当	f	太平洋流し網	3 5, 4 5 0	2 8, 7 5 0	3 1, 4 0 0	3 8, 6 0 0
日		В	太平洋はえなわ	1 4, 0 0 0	1 1, 1 5 0	1 2, 3 0 0	0
	間	<u>X</u>	日本海漁業	5, 8 0 0	5, 1 0 0	5, 3 0 0	4, 9 0 0
		域	計	5 5, 2 5 0	4 5, 0 0 0	4 9, 0 0 0	4 3, 5 0 0
		A	·B区域計	1 0 5, 0 0 0	9 0, 0 0 0	9 5, 0 0 0	8 7, 0 0 0
		A	母 船 式	4 0, 2 7 4	3 6, 4 0 9	3 7, 2 3 8	3 5, 2 0 5
	実	区	太平洋流し網	9, 3 1 5	8, 4 2 6	8, 6 0 7	8, 1 5 8
		域		4 9, 5 8 9	4 4, 8 3 5	4 5, 8 4 5	4 3, 3 6 3
			太平洋流し網	3 8, 2 0 9	3 1, 4 1 6	3 4, 2 4 3	4 2, 1 0 4
本	績	В	太平洋はえなわ	1 5, 3 4 1	9, 0 4 5	1 3, 3 9 2	0
		区	日本海漁業	6, 6 1 8	5, 5 5 8	5, 8 1 5	4, 9 9 8
		域	11	6 0, 1 6 8	4 6, 0 1 9	5 3, 4 5 0	4 7, 1 0 2
		A	·B区域計	1 0 9, 7 5 7	9 0, 8 5 4	9 9, 2 9 5	9 0, 4 6 5
		光	学————	2 6, 8 3 1	2 3, 6 8 6	3 4, 6 0 3	7, 0 3 4
		E	本 計	1 3 6, 5 8 8	1 1 4, 5 4 0	1 3 3, 8 9 8	9 7, 4 9 9
ソ			(計 画)	8 0, 0 0 0	4 0, 0 0 0	8 3, 0 0 0	4 0, 0 0 0
連			実績	7 5, 4 6 8	3 9, 0 5 3	7 7, 5 9 5	3 0, 6 1 3
-	日	•	ソ漁獲量計	2 1 2, 0 5 6	1 5 3, 5 9 3	2 1 1, 4 9 3	1 2 8, 1 1 2

§ 6 さけ・ます増殖事業成績総括

昭和47年度さけ・ます捕獲採卵事業は47年5月1日から48年1月15日までの間において実施 ペニサケも実施しており、これらの成績は第1表のとおりである。

第1表 海区別、魚種別成績集計表

		魚		種			3		(†		
海	区	項		目	水系数	実施箇所数	捕獲数	採卵数	水系数	実施箇所数	放 流 数千尾
		計		画	1 3	1 4	1 5 5,7 0 0	169,336	1 9	1 1	1 5 0,4 5 9
オホーツ	ク海区	実		續	1 7	1 8	2 1 5,0 0 8	2 1 8,1 7 6	2 0	1 3	1 3 4,0 8 6
		達	成	率			1 3 8.1%	1 2 8.8 %			8 9.1 %
		計		画	6	7	1 3.0 0 0	1 3.6 2 4	1 6	8	60,280
日本	海 区	実		績	9	1 0	3 0, 8 3 9	34,504	2 5	1 4	3 9,1 6 9
		達	成	率			237.2%	253.3%			65.0%
		=		画	1 6	1 7	1 4 9,0 0 0	165,919	1 6	1 1	1 3 0,0 1 0
根室	海区	実		績	1 8	1 9	9 6,4 0 6	1 0 8,8 1 7	2 0	1 3	1 1 5,1 5 9
		達	成	率			64.7%	6 5.6 %			8 8.6 %
		計		画	8	1 2	2 9 7, 4 0 0	2 9 1,2 1 5	1 3	1 0	1 3 8,9 5 2
襟裳以	東 海区	実		績	1 3	1 7	2 3 4,9 0 8	208,751	1 4	1 5	1 4 3.7 0 5
		達	成	率			7 9.0 %	7 1.7%			103.4%
		計		画	1 8	1 8	2 5,8 0 0	25,244	2 2	1 1	6 8,0 4 0
襟裳以	西海区	実		机	2 1	2 1	3 7,0 7 8	26,981	2 7	1 4	4 3.6 8 6
		達	成	率			1 4 3.7 %	1 0 6.9 %			64.2%
		計		画	6 1	6 8	640,900	6 6 5,3 3 8	8 6	5 1	5 4 7,7 4 1
合	計	実		績	7 8	8 5	6 1 4,2 3 9	5 9 7,2 2 9	106	6 9	475,805
		達	成	率			9 5.8 %	8 9.8 %			8 6.9 %


- 註 1. 計画には、そ上調査河川を含んでいない。
 - 2. 実績には、そ上調査河川を含んでいる。
 - 3. さけ採卵数 (実績) には海産卵を含んでいないが放流数には含む。
 - 4. さくらます放流数には拡大再生産事業分(389千尾)を含まない。
 - 5. ベニさけ放流数は、46年度産のものである。


し、主要3魚種の稚魚は、48年1月1日から同年6月20日の間に放流した。また、このほかにひめます、

		さく	ら ま	す	-				カゝ	5 \$	٢	ま	す
水	実施			水	実施		水	実施			水	実施	
系	簡所	捕獲数	採卵数	系	簡所	放流数	系	施箇所	捕獲数	採卵数	系	施簡所	放 流 数
数	数	尾	千粒	数·	数	千尾	数	数	尾	千粒	数	数	千尾
6	6	7,900	7,706	9	7	6,547	1 4	1 5	1 9,700	1 2,60 5	1 5	1 1	10,222
8	8	4,267	3.2 4 2	4	4	1,913	1 7	1 7	3 5,1 0 3	1 9,2 1 1	9	9	1 1,7 1 0
		5 4.0 %	4 2.1 %			2 9.2 %			178.2%	1 5 2.4 %	1		1 1 4.6 %
4	4	2,100	3.5 4 0	3	3	3.910	1	1	200	8 6	4	2	1,669
7	7	2,156	3.197	5	5	1,576	5	6	98	3 0	4	4	2,6 4 5
		102.7%	9 0.3 %			4 0.3 %			4 9.0 %	3 4.9 %			1 5 8.5%
9	1 0	5,7 0 0	6,801	- 9	3	4,989	1 3	1 4	2 2,8 0 0	10,727	1 3	5	5,509
1 0	1 0	4,407	4,3 2 9	1 0	8	3.4 9 3	1 2	1 2	11,278	3.1 4 3	8	6	3.4 6 8
		7 7.3 %	6 3.7 %			7 0.0 %			4 9.5 %	2 9.3 9			6 3.0 %
0	0	0	0	0	0	0	2	3	600	307	2	3	246
0	0	. 0	0	0	0	0	3	4	3 3 5	1 5 5	- 1	1	105
									5 5.8%	5 0.5 %			4 2.7 %
2	2	6 0 0	680	1	1	286	3	3	1,900	976	3	2	3.3 7 9
0	0	0	0	1	1	2 0	4	4	3.662	1,2 1 1	2	2	2,4 6 2
		0%	0%			0.7 %			1 9 2.7 %	1 2 4.1 %			72.9%
2 1	2 2	1 6,3 0 0	18,7 27	2 2	1 4	1 5,7 3 2	3 3	3 6	4 5, 2 0 0	2 4,7 0 1	3 7	2 3	2 1,0 2 5
2 5	2 5	10,830	1 0.7 6 8	2 0	1 8	7,002	4 1	4 3	50,476	2 3. 7 5 0	2 4	2 2	20,390
		6 6.4%	5 7.5%			4 4.5 %			1 1 1.7 %	9 6.1 %			9 7.0%

	魚		種	2	めまっ	9	~	5 31
海区	項		月	捕獲数	採卵数	放 流 数	捕獲数	採卵数
				尾	千粒	千尾	尾	千粒
	計		画					
オホーツク海区	実		績					
	達	成	率					
	計		画	20,000	3.6 0 0	1,915		,
日本海区	実		績	1 9,7 3 0	2,743	1,009		
	達	成	率	9 8.7 %	7 6.2 %	5 2.7%		
	計	,	画				900	486
根室海区	実		績			4	8 8	1 0
	達	戍	率				9.8%	2.1 %
	計		画					
襟裳以東海区	実		績			,		
	達	成	率					
	計		画					
襟裳以西海区	実		績				•	
	達	成	率					
X	計		画	20,000	3.6 0 0	1,9 1 5	900	486
合 計	実		續	1 9,7 3 0	2,743	1,009	8 8	1 0
	達	成	率	98.7%	7 6.2 %	5 2.7 %	9.8%	2.1%

17			合		計		
放 流 数 千尾	水系数	実施箇所数	捕 獲 数 尾	採 卵 数	水系数	実施箇所数	放 流 数
	1 5	1 6	183.300	1 8 9,6 4 7	2 1	1 1	1 6 7,2 2 8
	2 0	2 1	2 5 4, 3 7 8	2 4 0,6 2 9	2 0	1 3	1 4 7,7 0 9
			1 3 8.8%	1 2 6.9 %		/	8 8.4 %
	8	9	3 5,3 0 0	20,850	1 7	1 2	6 7,0 5 9
	1 4	1 5	5 2,8 2 3	40,474	2 5	1 4	4 4, 3 9 9
, -			1 4 9.6 %	1 9 4.1 %			6 6.2 %
267	1 9	2 0	1 7 8,4 0 0	1 8 3.9 3 3	1 9	1 7	1 4 1,4 9 0
6 5	2 0	2 1	1 1 2,1 7 9	1 1 6,2 9 9	2 0	1 4	1 2 2,1 8 5
2 4.3 %			6 2.9 %	6 3.2 %			8 6.4 %
	7	1 2	2 9 8,0 0 0	2 9 1,5 2 2	1 3	1 0	1 3 9,1 9 8
	1 3	1 7	2 3 5,2 4 3	2 0 8,9 0 6	1 4	1 4	1 4 3.8 1 0
			7 8.9 %	71.7%			1 0 3.3 %
	1 9	1 9	2 8,3 0 0	2 6, 9 0 0	2 4	9	7 1,7 0 5
	2 1	2 1	4 0,7 4 0	2 8,1 9 2	2 7	1 4	4 6,1 6 8
			1 4 4.0 %	104.8%			64.4%
267	6 8	7 6	7 2 3.3 0 0	7 1 2,8 5 2	9 4	5 9	5 8 6,6 8 0
6 5	8 8	9 5	6 9 5,3 6 3	6 3 4,5 0 0	1 0 6	6 9	5,04,271
2 4.3 %			9 6.1 %	89.0%			8 6.0 %





第2表 さけ海産卵 (海産魚からの採卵)

海区	実 施 地 区	採 卵 数	収容事業場	実 施 者	海 区	実施 地区	採卵数	収容事業場	実 施 者
· ·	ウトロ	1, 2 0 0	岩 尾 別	ウトロ農協					
オホーツク海区	常。吕	5 6 0	北見	常呂漁協	襟 裳 以 東 海 区	広 尾	5 8	(広尾)	広 尾 漁 協
A 4 Julia	湧別	1, 8 2 2	湧 別	湧 別 漁 協	W W N IN IL	猿 留	2 0 4	(猿 留)	幌 泉 漁 協
	計	3, 5, 8, 2				計	2 6 2		
	標準	2, 8 3 4	伊 茶 仁	標準漁協		浦 河	3 4 9	(元浦川)	萩 伏 漁 協
根室海区	野村	2 3 6	計 根 別	野付漁協	襟裳以西海区				h.
IN THE THE	想 香	272	(穂 香)	根室漁協		計	3 4 9		. <
	豊富	3, 3 4 2						,	

註 () は国営以外の施設

第3表 最近10カ年のさけ増殖事業成績(昭和38~47年度)

年 度 内 訳	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	平 均
沿岸来遊戲(千尾)	3,769	3.8 1 4	4.749	3,8 0 5	4.501	2,138	4,173	5,287	7,652	6,957	4,6 8 5
河川內抽獲数(千尾)	3 6 1	593	806	397	592	2 3 6	578	626	8 4 5	6 1 4	5 6 5
そ 上率(%)	9.6	1 5.5	1 7.0	1 0.4	1 3.2	1 1.0	1 3.9	1 1.8	1 1.0	8.8	1 2.1
♀ 親 魚 捕 獲 な(千尾)	173	204	3 9 9	171	269	104	223	286 .	3 4 4	274	2 4 5
9 比(%)	48.1	3 4.6	4 9.5	4 3.2	4 5. 5	4 4.0	3 8.6	4 5.6	4 0.6	4 4.6	4 3.4
♀親魚使用数(千尾)	1 4 7	167	296	133	202	8 9	199	235	309	249	203
使用率(%)	8 4.7	8 1.5	7 4.3	77.7	7 5.1	8 5.6	8 9.3	8 2.3	9 0.1	9 0.8	8 2.9
採 明 数(千粒)	361,263	410,925	774.420	3 4 2, 6 7 6	5 3 8,9 5 1	2 3 5,0 8 6	472,529	5 4 6,6 2 0	751,755	5 9 7,2 2 9	5 0 3,1 4 5
1尾平均採卵数(粒)	2,3 9 2	2,464	2,610	2,600	2,6 7 0	2,6 5 0	2,380	2,3 2 0	2,2 1 0	2,3 9 8	2,479
仮収容卵数(千粒)	362,441	4 1 3,4 2 6	774,591	3 4 8,4 7 9	5 4 6,0 1 4	241,698	475,344	5 5 9,7 3 2	760,963	604,764	5 0 8,7 4 5
海 産 卵 (千粒)	990	2,502	171	5,895	7,144	6,660	3,420	1 3,1 1 2	9,208	7,535	5.664
収容卵数(千粒)	3 1 8, 3 4 6	3 9 0,4 4 4	7 0 6,3 4 6	3 4 8,4 6 9	5 4 5, 6 4 6	2 4 1,1 1 4	461,628	5 5 6, 5 8 9	7 4 8,6 5 1	601,010	491,824
収/仮(%)	8 7.8	9 4.4	9 1.2	9 9.9	9 9. 9	9 9.8	9 7.1	9 9.4	. 98.4	9 9.4	9 6.7
ふ 出 尾 数(千尾)	285.279	3 4 8,0 1 3	593,640	289,096	472,448	215,976	389,504	4 6 7,1 1 8	6 2 4,9 4 2	508,035	419,405
ふ/収(%)	8 9.5	8 9.2	8 4.0	8 3.0	8 6.6	8 9.6	- 84.4	8 3.9	8 3.5	8 4.5	8 5.3
給 餌 尾 数(千尾)	7 3,3 0 8	1 0 3,6 4 5	1 2 1, 2 7 4	1 5 7,4 9 2	2 1 1,1 6 1	192,143	2 7 6,5 1 9	3 2 7,1 2 1	4 3 5,6 1 5	376,969	2 2 7, 5 2 5
給/ふ(%)	2 5.7	2 9.8	20.4	5 4.5	4 4.7	8 9.0	7 1.0	7 0.0	6 9.7	7 4.2	5 4.2
給/収(%)	2 3.0	26.5	1 7.2	4 5.2	3 8.7	7 9.7	4 2.4	5 8.8	5 8.2	6 2.7	4 6.3
放 流 尾 数(千尾)	272,106	3 3 4,4 6 3	549,278	272.036	4 3 4,7 2 9	207,438	3 6 1,5 7 1	4 4 2,1 0 1	5 7 5,9 8 6	4 7 5,8 0 5	3 9 2, 5 5 1
放 / 採(%)	7 5.3	81.4	7 0.9	7 9.4	80.7	8 8.2	7 6.5	8 0.9	7 6.6	7 9.7	7 8.0

§ 7 さけ増殖事業

1 さけの沿岸来遊概況

昭和47年度の全道の来遊量(沿岸十河川)は、695.7万尾で、これは、戦後最高を記録した前年度(765.2万尾)に次ぐものであつた。その主群は、3年魚で335万尾(48.2%)回帰し、4年魚は、270万尾(38.9%)しか回帰がなく、また前年度に豊漁をもたらした1967年級の生残りが、5年魚として82万尾(11.8%)回帰したため5年魚としては多かつた。

河川内そ上数 (捕獲数) は、沿岸の豊漁にもかかわらず、 6 1.4 万尾にとどまり、そ上率 8.8 % と 1 0 % を割り最低を記録した。

本年度の計画目標は、親魚捕獲数、640万尾、採卵数、6億6千533万粒で78水系、85捕獲 / 採卵場で実施した。これらの実績と前年度の対比は、第1表のとおりである。

		8召 5	和 4 7 年	度	昭和46年度.	前年度との
区	分	計 画 数	実 績	達成率%	実 続	対比增減△
捕獲	数(尾)	6 4 0, 9 0 0	6 1 4,2 3 9	9 5.8	8 4 5,1 7 9	△ 230,940
採卵	数 (千粒)	6 6 5,3 3 8	5 9 7,2 2 9	8 9.8	7 5 1,7 5 5	△ 154,526
放 流	数 (千尾)	5 4 7,7 4 1	4 7 5,8 0 5	8 6.9	5 7 5,9 8 6	△ 100,181

第1表 事業計画と実績ならびに前年度との比較

各海区の状況は次のとおりである。

(1) オホーツク海区

この海区の沿岸来遊量は、3,463.8千尾(沿岸3,248,8千尾、河川215,0千尾)で、豊漁であった前年度をも大幅に上廻り、2年続きの大豊漁であった。沿岸域では、斜網地区は斜里川、網走川系群の回帰量が非常に多かったため270万尾と大豊漁であり、また、斜網地区以西の各地区も、これら地域の河川系群の回帰が例年より多かったため好漁であった。そして、3年魚が主群であった。

河川内そ上数は、2 1 5,0 千尾であり、一応計画数を上廻つたが、多くの来遊量があつたにもかかわらず、そ上率は、6.2 %と前年度(4.4 %)をやや上廻つたが、1 0 %を割つており来遊量の少ないときは、必要河川のそ上量の確保が困難であり、再生産にとつて好ましいことではないので、このような時態が生じた場合には、何らかの規制措置をとる必要がある。

(2) 日本海区

この海区は、51,9千尾(沿岸21,1千尾、河川30,8千尾)の来遊で、前年度の35.0千尾と比較 すると1.5倍であるが、往年の来遊量には程遠い。

河川内そ上数は多く30,8千尾が捕獲され、そ上率は59.4%と非常に高く石狩川をはじめ各河川とも4年魚(64%)が主群であつたが、厚沢部川は、3年魚(54.0%)が主群であつた。

この海区の沿岸漁獲は、来遊量が少ないため漁業経営上から沿岸漁獲努力が弱く2万尾程度しか漁獲

-19-

されていないため、河川内捕獲は、3万尾であり、半数以上がそ上している。このように多くの河川そ上があつたことは、最近におけるこの海区の増殖努力の強化を考え合せ、この資源を大事に育てることに期待するところが大きい。

(3) 根室海区

この海区は、1.780.5千尾(沿岸1,684.1千尾、河川96.4千尾)の来遊で、前年度(248万尾)には及ばなかつたが、この海区としては、好漁であつた。しかし、地域によつて差異がみられ、野付半島の北側は、オホーツク海区系の漁獲および標津川、伊茶仁川系の魚群の多回帰などで好漁であつたが、野付半島以南域は、西別川系をはじめ他河川系群の回帰が少なかつたため歯舞地区以外は、前年を大幅に下廻つた。

そしてこの漁獲のうち、この海区で再生産された回帰魚は、130万尾程度で主群は、3年魚で59万尾(46.2%)であり、4年魚は、51万尾(39.8%)と少なく5年魚は17万尾(13.5%)と例年より多く回帰した。

河川内捕獲は、96,4千尾と沿岸漁獲量に比し、そ上率も5.4%と前年度(6.0%)を下廻り、この 海区のそ上率は、年々低下の傾向にある。

(4) 襟裳以東海区

この海区の来遊量は、1,318,3千尾(沿岸1,083,4千尾、河川234,9千尾)であり、前年度(184,6万尾)の70%程度の来遊で、最近の平均水準であつた。

この海区の回帰魚の90%以上は、十勝川系、釧路川系群が占めこの二大河川の回帰量によって漁が 左右されるが、十勝川系群の回帰が少なかつたため大津、厚内沿岸は漁が悪かつた。白糠より東側の各 地区は、釧路川系群が前年並みの回帰があつた。回帰魚は、4年魚が主群で722.2千尾(54.8%) であり、3年魚群は351,4千尾(26.7%)と少なく、5年魚群は225,9千尾(17.1%)と例年 より多く回帰した。

河川内捕獲数は、234,9千尾で、前年度の半分にとどまり、そ上率も17.8%とと前年度(28.3%)を大幅に下廻つた。このうち55.5%は、十勝川系で占め、次いで釧路川系(39.5%)であつた。また、辺寒牛川は、8.1千尾で、その他の河川は僅少であつた。

(5) 襟裳以西海区

この海区の来遊量は、342.6千尾(沿岸305,5千尾、河川37,1千尾)と,前年度(47.4万尾)の70%程度の漁であつた。しかし、この海区の再生産資源は年々増加の傾向にあるが、多獲地域である日高沿岸は、際袰以東海区系群が余り回遊しなかつたため、前年度を下廻り禁業沿岸が最もその影響を受けた。胆振地区、津軽海峡地区は前年並み、噴火湾地区、鹿部、南茅部地区は前年度を上廻る好漁であった。

河川内捕獲は、37,1千尾と前年度(32,8千尾)を若干上廻つた。また、そ上率も10.8%と始めて10%台を上廻つた。

2 沿岸漁業と再生産用親魚の確保

北海道沿岸におけるさけ漁業は、その大部分がさけ定置網漁業によつて占められているが、この資源 の再生産は人工&化事業によつて維持されている。

現在、沿岸来遊資源の回帰率は1.0 %程度であり、現状における再生産効率を勘案すれば、或一定量の沿岸来遊量を維持するための再生産用親魚量は14.2 %と算定される。即ち、沿岸来遊量が100万尾あり、この水準を維持するとしてゆくものと想定した場合の必要親魚数は14.2 万尾となる。(これからの稚魚生産放流尾数は1億尾となる。)しかし、現状では沿岸における漁獲努力が大きな影響を与えている。

沿岸のさけ資源を安定したものとするためには、河川そ上率を云云することよりも親魚の絶対必要量 の確保が課題となる。

本年度の沿岸来遊量は695.7万尾と戦後2番目の成績を記録した。河川内親魚捕獲数は61.4万尾と計画数(64.1万尾)に対して95.8%と目標を達成できなかつた。そ上率では8.8%と10%台を大きく下廻つた。

第2表 昭和47年度さけ定置網の許可統数

海	12	₹ .	支	庁	支庁別統数	海区別統数	
オホ	*//	ク	報母	走	1 0 6	1 3 0	
N W			宗	谷	3 5	1 3 0	
			留	荫	1 5		
B		本	石	狩	1 6	4 8	
			後	志	6		
			檜	山,	734**		
根		室				1 0 6	
			根	至	1 2 0		
襟 裳	以	東	東	釧	路	6 2	1 1 3
			+	勝	2 9		
			B	[6]	8 1		
وللذر والان	150	71.	胆	振	2 6		
襟 裳	以	西	渡	島	1 6	1 1 5	
		<u> </u>			5 1 2	5. 1 2	

第3表 海区別のさけ沿岸漁獲数、河川捕獲数、河川そ上率

単位 { そ上率(%)

															-
		白	度	1 9	6 7	1 9	6 8	1 9 6	9	1 9 7	0	1 9 7	1	1 9	7 2
海区	事	項		4 2	年度	4 3	年度	4 4 年	度"	4 5 年	度	4 6年	度	4 7	年度
オホ	沿		岸	1, 3	1 7	7	7 6 9	1, 3	2 1	1, 3	6 3	2, 6	9 1	3,	2 4 9
1 2	河		Ш		4 8		3 3	1	7 7	2	2 1	1	2 3		2 1 5
ク	合		計	1, 3	6 5	- 8	3 0 2	1, 4	98	1, 5	8 4	2, 8	1 4	3,	4 6 4
海区	そ	Ŀ	率		3. 5		4. 1	1	1. 8	1	4. 0		4. 4		6. 2
	沿		岸		4 7		3 3		1 5		9 -		1 8		2 1
日本	河		Щ		1 2		1 7		9		7		1 7		3 1
海区	合		計		5 9		5 0	-	2 4		1 6		3 5		5 2
区	そ	· 上	率	2	0. 3		3 4. 4	3	7. 5	4	3. 8	4	8. 6		5 9. 4
根	沿		岸	1, 4	4 0		6 1	9	9 9	1, 9	2 4	2, 3	3 4	1,	6 8 4
室	河]1[1	6 3		8 6	, 1	8 9	1	1 3	1	4 9		9 6
海区	合		計	1, 6	0 3	(6 4 7	1, 1	8 8	2, 0	3 7	2, 4	8 3	1,	7 8 0
	そ	.L	率	1	0. 2	1	3. 3	1	5. 9		5. 6		6. 0		5. 4
襟	沿		岸	8	0 3		3 2 9	9	7 7	1, 1	4 3	1, 3	2 3	1,	0 8 3
裳以	河		Ш	3	5 3		8 5	1	9 1	2	6 2	5	2 3		2 3 5
東海	合		11	1, 1	5 6		1 1 4	1, 1	6 8	1, 4	0 5	1, 8	4 6	1,	3 1 8
区	そ	上	率	3	0. 6	2	2 0. 5	1	6. 4	1	8. 7	2	8. 3		1 7.8
襟	沿		岸	3	0 2	1	2 1 0	2	8 3	2	1 3	4	4 1		3 0 6
裳以	河]]]		1 6		1 5		1 2		2 3		3 3		3 7
西海	台		=	3	1 8		2 2 5	2	9 5	2	3 6	4	7 4		3 4 3
区	そ	上	率		5. ()		6. 5		4. 1		9. 8		7. 0		1 0.8
全	沿		岸	3, 9	0 9	1, 9	9 0 2	3, 5	9 5	4, 6	5 1	6, 8	0 7	6,	3 4 3
道	河		Ш	5	9 2	:	2 3 6	5	7 8	6	2 6	8	4 5		6 1 4
計	合		=	4, 5	0 1	2,	1 3 8	4, 1	7 3	5, 2	7 7	7, 6	5 2	6,	9 5 7
п	そ	上	率	1	3. 2		1 1. 0	1	3. 9	1	1. 8	1	1. 0	i	8. 8
-	1													-	

註 1. 千尾未満の数字は四捨五入してまとめた。

											æ									1
松	,																			
備																				
級		4 7	7 5	0 4	2 0	6 9	7 1	4 5	7	6 6	3 6	5 9	5 5	8	1 6	8 4	9 3	5 4	0 2	0 0
草木			1	3	7	4	00				4	9	5	C)	1	1	n	3	4	1
	: 第					,														
(%)	6 年									,										
改	年 魚	1 9 1	7.4	6.9	1 1.1	0. 2	1.7	2. 2		8.1		1.8	7. 4	0. 7	2.6	4 0. 2	5. 3	2 3.1	4.5	6.0
_	co .																			
郊	年魚	2 1.3	2 8.6	2 5.7	3 0.0	0.0	2 2.3	5 7.8	0 0 0	7 6.8	9 9. 5	6 8.4	6 3.6	4 1.1	6 9. 0	3 3.7	5 1.7	3 5.9	2 7.4	3 1.0
∜ F	4 4								-						×					
年.	. 魚	5 9.6	6 4.0	6 5.8	5 8.8	2 9. 2	7 4.0	3 3. 3		1 5.1	0.5	2 9.8	2 7. 7	5 7.5	2 5.8	2 5.0	4 3.0	4 1.0	6 8.1	6 3. 0
	3 年									-										
	●			1.6	0.1	0.6	2.0	6. 7					1.3	0.7	2. 6	1. 1		-		
	2 年																			
Q	ĘĘ.	Ξ	Ξ	Ξ	=	\equiv	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	\equiv	Ξ	Ξ	\equiv	Ξ	\equiv	Ξ	Ξ
Ξ	Ξ,	尾 別	田	型	別	沿河	别	Bil	韓	型型	寒 別	茶	341	兴 部	Ш	別	茶	鼓	別	澂
ļ	(п)	部	蓧	知	旗	鶞	車	盘	型型	K	1/1	日	利	匝片	羅	校.	色	献	阳	闽
⊭	×		+	< + /	- 5	V 2 3	東 凶			Ш	K	推	X			母	HAT	煁	\times	

^{2.} 河川そ上率とは、河川捕獲数÷ (沿岸漁獲数十河川捕獲数) である。

第1図海区別事業成績

日本海区	日本海区
5.0% 30.839尾	5.8% 34.504千粒
- 襟裳以西海区	- 襟裳以西海区
6.0% 37.078尾	4.5% 26.981 千粒
オホーツク海区 35% 215.008尾 捕 獲 数 614.239尾 根室海区 15.8% 96.406尾 オホーツク海区 36.5% 採 卵 218.176干粒 597.22 根窓海区 108.817干	

	□日本海区	日本海区	
	9.1% 54.591 干粒	8.2% 39.169千尾	3
		一襟裳以西海	X
	一襟裳以西海区	9,2	
	9.7 % 5 8.0 1 8 千粒	4 3.6 8 6	干尾
	オホーツク海区	梅区	
	2 9.3 %		
*	134086千尾	改流尾数	
	標裳以東海区	襟裳以東海区	
	601.010千粒 29.6%	7 5.8 0 5千尾 3 0.2 %	
	根室海区 178.112千粒 根室海	区 143.705千尾	
	2 2.3% 1 3 4.3 0 9千粒	\ . /	
	115.1	159千尾	
			3

柳				V.					
担	ELA.						. ,		
越木粉	+	3 4 3	806	5 4 1	3.8	1,058	1, 1 0 4	674	4.7
8	6 年 魚								
報	5 年 魚	3 0.9		2 1.6		3.8	5.9	1 3.0	1 4.9
₹	4 年 魚	6 8.5	5 0.7	5 9, 5		5 8 3	4 7. 3	6 1.0	8 0 8
年	3 年 魚	9.0	3 7.7	1 7.6	1 0 0.0	3 7.1	3 4.5	2 2.1	. 4.3
	2 年 魚		1, 6	1.3		0.8	1 2.3	3.9	
*		寒辺牛川	出	器	舟 川	楽 部 川	豆		₹
ķ	T+)	別	靈	+	쩶	樹	茂	錮	展

昭和47年度さけ年令組成(本州・河川) 第5表 析

疆

数

 \forall 華

魚

無 # 2 器

無

4 令

年

3

好

Ξ

厄

海 区

(%) # 9

出

4

6 6 2

5.4

6 1.7

6.8 魚

6. 1 魚 サ 62

本平

月光川支流

1 9 1 4 2 1 2

5 0 7

6.3 5.1 5.0

5 3.7 2 1.4 2 7.1 5 9.2 4 2.9

6 8 8 6 6

6.3 1 1 5.7 1 1 4.6 1 1 6.9

物會渡得面戀

雄祭中簿三言言

Ш

 \forall

EEEEEE

0 0 4

က က က

第6表 昭和47年度海区別さけ事業成績集計表

, 項目			. #	甫 图	雙 採	
	抽	獲	数	♀性比	♀ 親 魚	9 親魚
府 区	ę.	8	計	+ 1111	使用数	使用率
オホーツク海区	102,271	112,737	尾 215,008	96 4 7.6	尾 99,400	% 97.2
日本海区	14,196	1 6,6 4 3	30,839	4 6.0	1 2,0 7 2	. 8 5.0
根室海区	48,421	47,985	9 6,4 0 6	5 0.2	4 7,0 2 0	9 7.1
襟裳以東海区	94,806	140,102	2 3 4,9 0 8	4 0.4	78,037	8 2.3
襟 篡以 西海区	1 4,6 3 6	22,442	3 7,0 7 8	3 9.5	1 2,4 9 8	8 5.4
合 計	2 7 4, 3 3, 0	3 3 9,9 0 9	6 1 4,2 3 9	4 4.7	2 4 9,0 2 7	9 0.8
前 年 度	3 4 3, 6 4 4	501,535	8 4 5,1 7 9	4 0.7	3 0 9,6 1 2	9 0.1

第7表 昭和47年度支場別さけ事業成績集計表

		項	月			拼	i M	採	
	1	·.,		捕	獲	数	♀性比	♀親魚	♀親魚
溮	区		1	٩	8	計	1.5 20	使用数	使用率
北	見	支	場	93,6:1	103,793	197,484	96 47.4	尾 91,297	% 97.4
根	室	支	鳷	48,421	47,985	96,406	5 0. 2	47,020	9 7.1
+	勝	支	場	9 4.8 0 6	1 4 0,1 0 2	2 3 4.9 0 8	4 0.4	78,037	8 2.3
天	塩	支	場	1 3,0 4 7	1 4,2 3 2	2 7,2 7 9	47.8	10,984	8 4.2
Ŧ	羧	支	場	1 0,0 2 7	13,887	2 3,9 1 4	4 1.9	8,550	8 5.3
渡	鶶	支	場	14,338	19.910	3 4, 2 4 8	4 1, 8	1 3,1 3 9	9 1.6
	合	ä	+	274,330	3 3 9,9 0 9	614,239	1 4.7	2 4 9,0 2 7	9 0.8
	前至	F . B	Ž	3 4 3,6 4 4	501,535	8 4 5,1 7 9	4 0.7	3 0 9,6 1 2	9 0. 1

奶	成	績		ふ 化	放 流	成 績	
平均採卵数	採 卵 数	実施期間	収容卵数	ふ出尾数	ふ 出 率	放流尾数	放流期間
粒 2,1 9 5	千粒 218,176	9. 1~1.1 2	千粒 175,980	千尾 1 4 2,4 9 2	% 8 1.0	千尾 134,086	3. 1~6. 1
2,8 5 8	34,504	8.1 6~1219	54,591	46,493	8 5.2	3 9,1 6 9	2. 1~6.30
2,3 1 4	108,817	9. 1~1.1 5	1 3 4, 3 0 9	1 1 8,1 8 1	8 8.0	1 1 5,1 5 9	3. 1~5.31
2,6 7 5	208,751	9. 1~1231	178,112	1 5 2,7 3 4	8 5.0	1 4 3,7 0 5	2.1 5~5.3 1
2,1 5 9	26,981	8. 1~1231	58,018	48,135	8 3.0	43,686	2.1 0~5.1 5
2,3 9 8	5 9 7,2 2 9	8. 1~1.15	6 0 1,0 1 0	5 0 8,0 3 5	8 4.5	4 7 5,8 0 5	2. 1~6.30
2,4 3 0	7 5 1,7 5 5	8. 2~1.23	7 4 8,6 5 1	6 2 4,9 4 2	8 3.5	5 7 5,9 8 6	3. 3~6.20

阿	成	績		\$ 12	放 流	成 績	
平均採卵数	採 卵 数	実施期間	収容卵数	ふ出尾数	率出。	放流尾数	放流期間
粒 2,1 2 6	千粒 194,329	9. 1~1.10	千粒 157,103	千尾 125,487	% 7 9.9	千尾 118,816	3. 1~5.31
2,3 1 4	1 0 8,8 1 7	9. 1~1.1 5	134,309	1 1 8,1 8 1	8 8.0	115,159	3. 1~5.3 1
2,6 7 5	208,751	9. 1~1231	178,112	1 5 2,7 3 4	8 5.8	1 4 3,7 0 5	2.1 5~5.3 1
2,9 3 3	3 2,2 2 1	9. 1~1228	4 1,0 1 1	36,953	9 0.1	29,886	3.1 5~6.3 0
2,7 5 8	2 3, 5 8 5	8. 1~1230	4 5,8 5 7	36,808	8 0. 3	34,019	2.28~5.28
2,2 4 7	2 9,5 2 6	9. 1~1231	4 4,6 1 8	37,872	8,4.9	3 4.2 2 0	2. 1~5.23
2,3 9 8	5 9 7,2 2 9	8. 1~1.1 5	6 0 1,0 1 0	5 0 8,0 3 5	8 4.5	4 7 5,8 0 5	2. 1~6.3 0
2,4 3 0	751,755	8. 2~1.23	7 4 8,6 5 1	624,942	8 3.5	575,986	3. 1~6.1 5

第8表 昭和47年度海区・水系別さけ親魚捕獲・採卵成績表

海区	水系	捕獲	所 管	捕	獲	数	使	用 親
149 142	75 X	採卵場	事業場	٩ ,	8	計	P	8
	ルシャ	ルシャ	岩尾別	尾 0	尾 0	尾 0	尾 0	Į.
Wat -	岩尾別	岩尾別	"	1,923	1,979	3,902	1,923	5 5
	奥藥別	奥蘂别	斜里	1,803	1,7 1 8	3,5 2 1	1,771	6 3
	斜 里	斜 里	"	2 5,6 1 4	26,066	51,680	24,958	8,8 7
	藻 琴	藻 琴	藻 琴	592	448	1,0 4 0	577	24
オ	網 走	網走	網走	21,247	2 2,4 5 8	43,705	20,253	8,38
	//	西網走	"	5.5	2 5	80	5 5	2
ホ	小 計			21,302	2 2,4 8 3	4 3,7 8 5	20,308	8,41
1	能取湖	能取湖	觀 走	51	103	154	. 9	
	常 呂	常呂	北見	3,1 7 3	3,1 5 1	6,3 2 4	3,1 6 4	1,03
"	ライトコロ	ライトコロ	"	7 8	4 6	124	7 8	3
2	佐呂間別	佐呂間別		968	814	1,782	937	2 7
海	湧 別	湧 別	湧 別	3 2, 3 7 5	40,027	7 2,4 0 2	31,789	9,3 6
test.	渚 滑	渚 滑	渚 滑	4.1 8 3	4.4 1 5	8,598	4.1 6 4	1,3 0
区	藻與部	藻與部	"	9 9	97	196	93	5
	幌 内	幌 内	幌 内	1,530	2,446	3,976	1,526	5 2
	徳 志 別	徳志別	徳志別	5.7 2 7	5,493	11,220	5,403	2,5 2
61	北見幌別	北見幌別	歌 登	1,173	1,7 9 9	2,972	1,023	3.7
	頓 別	頓 別	頓 別	1,680	1,652	3,3 3 2	1,677	1,30
	X= 137 €L	本年度		1 0 2,2 7 1	1 1 2,7 3 7	215,008	9 9,4 0 0	3 5,5 1
	海区計	前年度	2.	6 3,0 7 5	6 0,2 0 7	1 2 3,2 8 2	60,803	21,01
	増 幌	増 幌	中川	4 8	6 2	110	4 7	6
	天 塩	天 塩	天 塩	1,8 4 1	2,660	4.5 0 1	351	6 (
B	"	下中川	中 川	1,779	1,5 6 0	3,3 3 9	1,712	475
	小 計			3,620	4,2 2 0	7,840	2,0 6 3	541
1	オピラシベ	オピラシベ	中川	2	9	11	0	(
本	暑寒別	暑寒別	天 塩	797	997	1,794	771	436
	石 狩	西 越	千 歳	6,0 7 3	6,8 2 6	12,899	5,5 9 7	1,4 4 6
海	余 市	余 市	"	475	404	879	4 4 8	125
	朱 太	朱 太	尻 別	138	160	298	130	7 1
*	利別	冷 水	利 別	1,223	1,101	2,3 2 4	1,207	5 0 4
区	厚沢部	厚沢部	厚沢部	1,8 2 0	2,8 6 4	4.684	1,809	915
	海区計	本年度		1 4,1 9 6	1 6,6 4 3	30,839	1 2,0 7 2	4.1 0 5
	四日 12. 首	前年度		6,4 6 4	10,388	16,852	5,4 6 9	1,993

数	採卵数	增減卵数	仮収容卵数	9 親魚	平 均	実施 期日
計	1米 別 致	日 例 列 致	VX4X 4.1913X	使用率	採卵数	× 1/3 × 1
尾 0	千粒 0	千粒	千粒 0	0.0	粒 0	9. 1~1 1.30
2,4 7 5	4.179	海 1,200	5.3 7 9	1 0 0.0	2,1 7 3	1 0. 1~1 2.3 i
2,402	3,4 4 9		3,4 4 9	9 8.2	1,9 4 7	9. 20~12.14
3 3,8 3 2	5 0,1 6 3		5 0,1 6 3	9 7.4	2,0 1 0	9. 1~12.25
819	1,478		1,4 7 8	9 7.5	2,5 6 2	9, 2 0 ~ 1 2. 2 0
2 8,6 4 1	4 8,0 1 7		48,017	9 5.3	2,3 7 1	9. 1~ 1. 9
8 0	118		118	1 0 0.0	2,1 4 5	1 1.2 5~1 2.2 0
28,721	4 8,1 3 5		4 8,1 3 5	9 5.3	2.3 7 0	9. 1~ 19
1 8	14		14	1 7.6	1,5 5 6	1 0. 1 0 ~ 1 1. 2 4
4,203	6,9 4 3	海 560	7,5 0 3	9 9.7	2,194	9. 1~1 2.2 1
114	280		280	1 0 0.0	3,5 9 0	1 0. 2 1 ~ 1 1. 1 7
1,208	1,9 0 6	,	1,906	9 6.8	2,0 3 4	1 0. 1~1 2.2 2
41,149	64,098	海 1,822	65,920	9 8.2	2.016	9. 1~ 1.12
5,466	9,7 6 9		9,769	9 9.5	2,3 4 6	9.21~1 2.29
150	189		189	9 3.9	2,0 3 2	1 0. 5~ 1 2. 2 7
2,0 4 9	3,726		3,7 2 6	9 9.7	2,4 4 2	9.10~12.20
7,9 3 1	1 6,0 4 7		1 6,0 4 7	9 4.3	2,970	9. 1~1 2.1 8
1,3 9 4	2,9 4 4		2,9 4 4	8 7.2	2,8 7 8	9. 5~11.17
2,980	4.8 5 6		4,8 5 6	9 9.8	2,8 9 6	9. 2 1~ 1 1. 2 6
1 3 4, 9 1 1	218,176	海 3,582	221,758	97.2	2,1 9 5	9. 1~ 1.1 2
81,822	1 4 1,5 5 8	海 4.779	1 4 6,3 3 7	9 6.4	2,3 3 0	9. 1~ 1.23
108	110		110	9 7.9	2,3 4 0	9. 2 1 ~ 1 0. 3 1
4 1 7	970		970	1 9.1	2,7 6 4	9. 7~1 0.2 6
2,1 8 7	5,1 4 9		5,1 4 9	9 6.2	3,0 0 8	9. 1~1 2.1 0
2,6 0 4	6,1 1 9		6,1 1 9	5 7.0	2,966	9. 1~1 2.1 0
0	0		0	0.0	0	9.10~12.19
1,207	2,1 4 5		2,1 4 5	9 6.7	2,7 8 2	9. 1 7~1 1. 2 0
7,0 4 3	1 5,6 1 8		1 5,6 1 8	9 2.2	2,7 9 0	8. 2 0 ~ 1 1. 2 8
573	1,4 2 2		1,4 2 2	9 4.3	3,180	9. 8~11.30
207	3 2 5		3 2 5	9 4.2	2,500	9. 1~12. 1
1,711	3,8 2 0		3,820	9 8.7	3,1 6 5	9. 1 1 ~ 1 1. 2 0
2,724	4,9 4 5		4,9 4 5	9 9.4	2,7 3 4	9.21~11.25
1 6,1 7 7	3 4,5 0 4		34,504	8 5.0	2,8 5 8	8.1 6~ 1 2.1 9
7,462	1 4.3 6 9		1 4,3 6 9	8 4.6	2,6 3 0	8. 2~1 2.2 0

ate ice	-t-	捕獲	所管	捕	獲	数	. 使.	用親
海区	水系	採卵場	事業場	Ŷ.	8	計	9	8
	ルサ	ルサ	羅 臼	尾 403	尾 376	尾 779	尾 384	尾 243
	羅白	羅. 臼	"	4,791	2,6 4 1	7,432	4,282	1,9 9 2
	植別	植別	"	2,094	1,2 1 6	3,3 1 0	1,998	1,029
根	元崎無異	元崎無異	,,	1,3 2 6	664	1,990	1,251	5 2 4
	崎 無異	崎 無 異	"	1,131	640	1,771	1,0 6 1	. 485
	燕別	燕 別	茂 別	2,4 7 1	947	3,4 1 8	2,3 8 6	923
	古多糠	古多糠	伊茶仁	349	276	6 2 5	.303	161
室	忠 類	忠 類	."	961	478	1,439	957	3 4 8
	伊茶仁	伊茶仁	"	4.3 1 9	1,7 4 3	6,0 6 2	4,295	1,4 5 2
	標準	標準	根 室	1 2,9 7 6	20,019	3 2,9 9 5	1 2,8 9 5	5,4 3 6
	"	31 線	中標準	78	8 9	167	5 8	4 1
y ⊨	小 計		1	1 3,0 5 4	20,108	3 3,1 6 2	1 2,9 5 3	5,477
海	当幌	当 幌	計根別	1,327	1,484	2,8 1 1	1,281	9 3 1
	春 別	春 別	. "	348	242	590	348	242
	床丹·	床 丹	"	717	662	1,3 7 9	710	6 5 8
	西 別	西 別	虹 别	1 3,6 2 1	1 4, 5 2 0	28,141	1 3,5 1 1	5,6 8 6
区	矢 臼 別	矢臼别	浜 中	5 6	3 2	88	47	2 2
	風蓮	風 遊	"	656	588	1,2 4 4	515	207
	別当賀	別当賀	厚床	7 2 1	1,3 1 4	2,0 3 5	679	753
	穂 香	穂 香	"	7 6	5 4	130	5 9	2 6
	海区計	本年度		4 8,4 2 1	47,985	9 6, 4 0 6	4 7,0 2 0	21,159
	1-3 12 11	前年度		7 5,6 4 1	7 3,5 4 5	1 4 9,1 8 6	7 3,9 3 6	3 1,8 3 7
	幌 戸	硴 戸	太田	108	106	214	. 72	3 2
	別寒辺牛	厚 岸	"	4.3 6 7	3,8 0 5	8,172	4.0 5 3	1,307
i i	釧路	釧路	釧路	3 7,6 7 4	5 5,1 9 1	9 2,8 6 5	31,213	1 1,5 9 1
襟	チョロベツ	チョロベツ	"	49	7 2	121	2 7	17
裳	河 寒	阿寒	阿寒	2 0	5 4	7.4	17	5
	庶 路	庶 路	鶴居	4 6	19	6.5	19	5
以	茶 路	茶 路	"	8 4	193	277	6 8	17
東	音 別	音 別	"	3 2	6	3 8	31	. 6
海	十 勝	打 内	1	1 8,6 1 9	28,476		10,950	1,5 3 2
区	, "	利別	幕別	203	501	704	141	60
	"	東33号	"	2,712	3,474	6,186	2,5 4 6	632
	"	幕別	".	6,588	7,655	1 4.2 4 3	6,1 9 7	1,238
						er er er er		
				-30-				
	,			€.	,			

魚	**					♀親魚	平 均	
	計	採卵数	增加	咸卵 数	仮収容 卵 数	使用率	採卵数	実施期日
	尾 627	千粒 723		千粒	千粒 723	% 9 5.3	粒 1,883	1 1. 1~1 2.2 5
	6,274	9,888			.9,888	8 9.4	2,309	1 0. 2 0 ~ 1 2. 2 6
	3,0 2 7	4,6 6 4			4.664	9 5.4	2,3 3 4	9. 1 5~ 1 2. 2 3
	1,7 7 5	2,6 9 4			2,6 9 4	9 4.3	2,1 5 3	1 0. 3~1 2.2 3
	1,546	2,4 4 8			2,4 4 8	9 3.8	2,307	1 0. 1~1 2.2 3
	3,309	5.7 5 5			5,7 5 5	9 6. 6	2.4 1 2	9. 2 6 ~ 1 2. 2 5
	464	656			6 5 6	8 6.8	2,1 6 5	1 0. 3~1 2.2 3
	1,305	2,2 5 6			2,2 5 6	9 9.6	2,357	9.11~12.25
	5,747	10,303	海	2,8 3 4	1 3,1 3 7	9 9.4	2,3 9 9	9.11~12.31
	1 8,3 3 1	29,498			2 9,4 9 8	. 99.4	2,2 8 8	9. 1~ 1 7
	9 9	1 3 0			1 3 0	7 4.4	2,2 4 2	1 0. 2 1 ~ 1 2. 1 0
	18,430	2 9,6 2 8			2 9,6 2 8	9 9.2	2,287	· 9. 1~ 1 7
	2,212	2,6 9 4			2,6 9 4	9 6.5	2,1 0 3	9. 1~1 2.3 1
	5 9 0	805			805	1 0 0.0	2,3 1 3	9. 1~1 2.3 1
	1,3 6 8	1,7 5 4	海	236	1,990	9 9.0	2,4 7 0	9.10~12.20
	19,197	31,270			3 1,2 7 0	9 9. 2	2.3 1 4	9. 1~ 1.1 5
	6 9	9 7			9 7	8 3.9	2,0 6 4	9.21~11.13
	7 2 2	1,3 5 0			1,350	7 8.5	2,6 2 1	9. 1~1 1.2 1
	1,432	1,6 9 8			1,6 9 8	9 4.2	2,5 0 1	9. 1~12.10
	8 5	1 3 4	海	272	406	7 7.6	2,2,7 1	9.11~11.30
	6 8,1 7 9	1 0 8,8 1 7	海	3,3 4 2	1 1 2,1 5 9	9 7.1	2,3 1 4	9. 1~ 1.15
	105,773	1 7 4,0 5 3	海	2,0 9 9	176,152	97.7	2.3 5 0	9. 1~ 1.22
	104	173			173	6 6.7	2,4 0 3	9. 1~11.20
	5,3 6 0	11,411			1 1,4 1 1	9 2.8	2,8 1 5	9. 8~11.20
	4 2,8 0 4	8 4,1 2 3			8 4.1 2 3	8 2.9	2,695	9. 3~12.21
	4 4	7 5			7 5	5 5.1	2,778	9. 2 1~ 1 2. 2 0
	22	4 2			4 2	8 5.0	2,471	9. 3~10.20
	2 4	5 0			5 0	41.3	2,6 3 2	9. 1~12.20
	8 5	177			177	8 1.0	2,603	9.11~11.17
	3 7	9 7			9 9	9 6.9	3.1 9 3	9. 2 1 ~ 1 1. 6
	1 2,4 8 2	2 9,4 1 3			2 9,4 1 3	5 8.8	2,6 8 6	9.10~11.21
	201	3 1 3			313	6 9.5	2,2 2 0	9. 2 4~ 1 0. 3 1
	3,1 7 8	6,7 2 0			6,7 2 0	9 3.9	2,6 3 9	9.10~10.20
	7,4 3 5	1 6,3 5 4			1 6,3 5 4	9 4.1	2,6 3 9	9.10~12.20.

		捕獲	所 管	护	獲 数	故	使	用 親
海区	水系	採卵場	事業場	9	8	計	9	8
	十 勝	千代 田	札内	尾 23,280	尾 39,032	尾 6 2,3 1 2	尾 21,933	尾 5,456
100	小 計			51,402	7 9,1 3 8	1 3 0, 5 4 0	41,767	8,9 1 8
禁裳	歴 舟	歴 舟	大 樹	373	774	1,1 4 7	254	111
以	豊似	豊似	"	5	6	11	5	6
東海	広 尾	広 尾	"	604	674	1,2 7 8	472	1 3 2
区	猿 留	猿 留	"	4 2	6 4	106	3 9	4 4
	× 17 51	本年度		9 4,8 0 6	1 4 0,1 0 2	2 3 4, 9 0 8	78,037	2 2,1 9 1
	海区計	前年度		185,184	3 3 7,8 0 6	5 2 2,9 9 0	157,513	34,235
	仁雁 別	仁雁別	静内	8 4	158	242	8 1	109
	幌 満	幌 満	. //	4	6	10	3	5
	日高幌別	日高幌別	"	280	3 2 1	601	266	8 5
	元 浦	元浦川	"	5 7	66	1 2 3	5 6	2 4
襟	三 石	三石	"	5 4	32	8 6	5 2	1 8
	静内	静内	"	1,8 5 2	3,8 3 7	5,689	1,1 5 7	3 9 8
	新 冠	新 冠	"	58	7 4	1 3 2	5 0	3 0
裳	沙流	富川	"	392	569	961	2 3 6	117
	鵡	鵡川	"	363	4 3 8	801	3 3 8	4 9
	勇 払	勇 払	千 歳	1 2 6	433	559	6 5	2 7
以	白 老	白老	白老	4 7	226	273	3 9	4 0
	敷生	敷 生	敷 生	162	497	659	162	128
Æί	貫気別	貫気 別	八雲	26	3 4	6.0	7	11
ħ.d	長万部	長万部	"	6 9	6 2	131	6 2	2 9
	尻岸内	尻 岸 内	"	9 4	8 4	178	28	18
海	遊楽部	遊樂部	"	1,928	2,0 1 1	3,9 3-9	1,8 2 2	854
	汐 泊	汐 泊	"	715	1,219	1,934	411	175
	戸切地	戸切地	知内	8 6	104	190	8 4	. 3 7
X	茂辺地	茂 辺 地	"	7,5 9 9	11,727	1 9,3 2 6	6,996	3,988
	亀	亀 川	"	386	354	740	377	181
	知 内	知 内	"	254	190	444	206	7.8
	海区計	本年度		14,636	2 2,4 4 2	37,078	12,498	6,4 0 1
	四四日	前年度		1 3,2 8 0	19,589	3 2,8 6 9	11,891	5,868
合	計	本年度	,	274,330	3 3 9,9 0 9	614,239	249,027	8 9, 3 6 7
	Þί	前年度	1	3 4 3,6 4 4	501,535	8 4 5,1 7 9	309,612	94,952

魚 数				DB_4.8.1.5	♀ 親魚	平 均	
計	採卵数	增減卵	数	仮収容卵数	使用率	採卵数	実 施 期 日
尾 27,389	千粒 5 7,8 8 8		千粒	千粒 57,888	% 9 4.2	粒 2,639	9.10~12.20
50,685	1 10,688			110,688	8 1.3	2,6 5 0	9. 1~1 2.2 5
365	5 9 8			598	6 8.1	2,3 5 4	9. 1~1 2.2 5
1 1	13			1 3	1 0 0.0	2,600	9. 2 5 ~ 1 2. 3 0
604	1,2 1 4	海	5 8	1,2 7 2	7 8.1	2,5 7 2	9. 1~11.3 Ī
8 3	88	海 2	204	292	9 2.9	2,2 5 6	9. 1~1 2.3 1
1 0 0, 2 2 8	2 0 8,7 5 1	海 2	262	209,013	8 2.3	2,6 7 5	9. 1~1 2.3 1
191,748	3 9 5,6 0 0	海 1,0	86	3 9 6,6 8 6	8 5.1	2,5 1 0	9. 1~1 2.2 9
190	224	,		2 2 4	9 6.4	2,7 6 5	9. 1~1 2.3 0
8	10	7		10	7 5.0	3,3 3 3	9. 4~1 1.3 0
3 5 1	677			677	9 5.0	2,5 4 5	9. 1~1 2.2 5
80	129	海 :	3 4 9	478	9 8.2	2,3 0 4	9.10~12.20
7 0	135			1 3 5	9 6.3	2,5 9 6	9.16~12.20
1,555	2,995			2,995	6 2.5	2,5 8 9	8. 1~1 2.30
8 0	126	į.		1 2 6	8 6.2	2,5 2 0	9.12~12. 8
353	7 2 2			7 2 2	6.0.2	3,0 5 9	8. 1 0 ~ 1 1. 1 7
387	749			749	9 3.1	2,2 1 6	8.24~11.20
9 2	2 3 8			238	5 1.6	3,6 6 2	9. 5~11.15
7 9	98			98	8 3.0	2,5 1 3	9.10~12.15
290	4 4 2			442	1 0 0.0	2,7 2 8	9. 3~12. 5
18	2 2			2 2	2 6.9	3,143	1 0. 1~1 1.2 3
9 1	159			159	8 9.9	2,5 6 5	9.11~12. 2
4 6	4 3			4 3	2 9.8	1,5 3 6	1 0. 1 ~ 1 1.3 0
2,6 7 6	5,445			5,445	9 4.5	2,988	9. 1~1 2.2 9
586	1,2 4 8			1,2 4 8	5 7.5	3,0 3 6	9. 1~12.20
121	202			202	97.6	2,405	1 0. 2 3 ~ 1 2. 1 6
10,984	11,811			1 1,8 1 1	9 2.1	1,688	1 0. 1~1 2.3 1
558	937			937	9 7.7	2,4 8 5	1 0. 1~1 2.3 1
284	569			569	8 1.1	2,7 6 2	9.20~12.20
1 8,8 9 9	26,981	海	3 4 9	2 7,3 3 0	8 5.4	2,159	8. 1~1 2.3 1
1 7,7 5 9	2 6,1 7 5	海 1,:	244	27,419	8 9.5	2,200	8.22~ 1.10
3 3 8,3 9 4	5 9 7,2 2 9	海 7,	5 3 5	6 0 4,7 6 4	9 0. 8	2,398	8. 1~ 1.15
4 0 4,5 6 4	751,755	海 9,5	208	760,963	9 0.1	2,4 3 0	8. 2~ 1.23

第9表 昭和47年度支場・事業場別さけ親魚捕獲・採卵成績表

-tr 19	علاد علاد	10	捕	獲	数	使 用	親魚	数
支場	事 業	場	우	\$	計	P	8	計
北	岩尾	別	1,923	1,979	3,902	尾 1,923	尾 552	尾 2,4 7 :
4	斜	里	27,417	27,784	5 5,2 0 1	26,729	9,505	3 6, 2 3
見	藻	琴	592	4 4 8	1,0 4 0	5 7 7	2 4 2	8 1 9
50	網	走	21,353	2 2,5 8 6	4 3,9 3 9	2 0, 3 1 7	8,4 2 2	2 8,7 3
支	北	見	4.2 1 9	4.0 1 1	8,2 3 0	4.1 7 9	1,3 4 6	5,52
	湧	別	3 2,3 7 5	4 0,0 2 7	7 2,4 0 2	3 1,7 8 9	9,360	41,14
†目	渚	滑	4,282	4,512	8,7 9 4	4,257	1,3 5 9	5,61
場	幌	内	1,530	2,4 4 6	3,976	1,5 2 6	5 2 3	2.0 4
#L	本年	度	93,691	1 0 3,7 9 3	1 9 7,4 8 4	9 1,2 9 7	3 1, 3 0 9	1 2 2, 6 0
=	前年、	度	6 0,7 7 4	5 6,4 9 1	1 1 7,2 6 5	5 8,7 5 4	20,236	78,99
	羅	臼	9,7 4 5	5,5 3 7	1 5,2 8 2	8,9 7 6	4.273	1 3,2 4
根	燕	別	2,4 7 1	9 4 7	3,4 1 8	2,3 8 6	9 2 3	3,3 0
宏	伊 茶	仁	5,629	2,497	8,1 2 6	5,5 5 5	1,961	7,5 1
室	根	室	1 3,0 5 4	2 0, 1 0 8	3 3,1 6 2	1 2,9 5 3	5,477	1 8,4 3
支	計根	别	2,3 9 2	2,3 8 8	4.7 8 0	2,3 3 9	1,831	4,1 7
Im.	虹	别	1 3,6 2 1	1 4, 5 2 0	2 8,1 4 1	1 3,5 1 1	5,686	1 9,1 9
場	浜	中	7 1 2	620	1,3 3 2	5 6 2	229	7 9
	厚	床	797	1,368	2,1 6 5	738	779	1,51
=4.	本 年	度	4 8, 4 2 1	4 7,9 8 5	9 6,4 0 6	4 7,0 2 0	21,159	6 8,1 7
計	前年	度	7 5, 6 4 1	7 3,5 4 5	1 4 9,1 8 6	7 3,9 3 6	3 1,8 3 7	1 0 5,7 7
	太	田	4,472	3,911	8,3 8 6	4,125	1,3 3 9-	5,4 6
	釧	路	3 7,7 2 3	5 5, 2 6 3	9 2,9 8 6	3 1,2 4 0	1 1,6 0 8	42,84
+	鶴	居	162	218	3 8 0	118	28	. 14
勝	ßoj	寒	2 0	5 4	7 4	1 7	. 5	2
+	+	勝	1 8,6 1 9	2 8,4 7 6	4 7,0 9 5	10,950	1,532	1 2,4 8
支	札	内	2 3,2 8 0	3 9,0 3 2	6 2,3 1 2	21,933	5,4 5 6	2 7,3 8
場	幕	别	9,503	11,630	2 1,1 3 3	8,884	1,930	1 0,8 1
	大	樹	1,0 2 4	1,518	2,5 4 2	770	293	1,0 6
æ1	本 年	度	9 4,8 0 6	1 4 0, 1 0 2	2 3 4,9 0 8	7 8,0 3 7	2 2,1 9 1	100,22
計	前 年	度	185,184	3 3 7,8 0 6	5 2 2,9 9 0	157,513	34,235	191,748

		11.	A. C.		♀ 親 魚				
採	卵 数	增	減卵数	仮収容卵数	使用率	平均採卵数	実	施	期間
	千粒 4.179	海	千粒 1,200	干粒 5.3 7 9	1 0 0.0	2,1 7 3	月日 10.1	~ ~	月日 12.31
	5 3,6 1 2			5 3,6 1 2	9 7.5	2,0 0 6	9. 1	~	1 2.2 5
	1,478			1,478	9 7.5	2,5 6 2	9.2 0	~	1 2.2 6
	48,149		-	48,149	9 5.1	2,3 7 0	9. 1	~	1 2.2 0
	9,1-2 9	海	5 6 0	9,689	9 9.1	2,1 8 4	9. 1	~	1 2.2 2
	6 4,0 9 8	海	1,8 2 2	6 5.9 2 0	9 8.2	2,0 1 6	9. 1	~	1.10
	9,9 5 8			9,958	9 9.4	2,3 3 9	9.2 1	~	1 2.2 9
	3,726			3,726	9 9.7	2,4 4 2	9.11	~	1 2.2 0
	1 9 4, 3 2 9	海	3,5 8 2	197,911	97.4	2,1 2 6	9. 1	~	1.1 0
	1 3 6,2 2 3	海	4.7 7 9	141,002	9 6.7	2,3 2 0	9. 1	~	1.2 3
	2 0,4 1 7			2 0,4 1 7	9 2.3	2,2 7 0	9.1 5	~	1 2.2 6
	5,7 5 5			5.7 5 5	9 6.6	2,4 1 2	9.2 6	~	1 2.2 5
	1 3,2 1 5	海	2,834	1 6,0 4 9	9 8.7	2.3 7 9	9.1 1	~	1 2.3 1
	2 9,6 2 8			2 9,6 2 8	9 9. 2	2,287	9. 1	~	1. 7
	5,253	海	236	5.4 8 9	9 7.8	2.246	9. 1	\sim	1 2.3 1
	3 1,2 7 0			3 1,2 7 0	9 9.2	2,3 1 4	9. 1	~	1.1 5
	1,447			1,447	7 8.9	2,575	9. 1	~	1 1.1 3
	1,832	海	272	2,104	9 2.6	2,4 8 2	9. 1	~	1 2.1 5
	108,817	海	3,3 4 2	1 1 2,1 5 9	9 7.1	2,31.4	9. 1	~	1.1 5
	174,053	海	2,0 9 9	176,152	9 7.7	2,3 5 0	9, 1	~	1.2 2
	1 1,5 8 4			1 1,5 8 4	9 2.2	2,808	9. 1	~	11.20
	84,198			8 4,1 9 8	8 2.8	2,6 9 5	9. 3	~	1 2.2 1
	3 2 6	,		3 2 6	7 2.8	2,762	9.1 1	~	1 1.1 7
	4 2			4 2	8 5.0	2,4 7 1	9. 3	~	1 0.2 0
	2 9,4 1 3			2 9,4 1 3	5 8.8	2,686	9.10	7	1 1.2 1
	5 7,888			5 7,8 8 8	9 4.2	2,639	9. 1	~	1 2.2 5
	2 3,3 8 7			23,387	9 3.5	2,6 3 3	9.10	~	1 2.2 0
	1,913	海	262	2,1 7 5	7 5.2	2,484	9. 1	~	1 2.3 1
	2 0 8,7 5 1	海	262	2 0 9,0 1 3	8 2.3	2,6 7 5	9. 1	~	12.21
	3 9 5,6 0 0	海	1,086	3 9 6,6 8 6	8 5.1	2,510	9. 1		1 2.2 9

±48	- str	2444	40	捕	獲	数	使月	見 親 魚	数
支場	事	業	場	٠ 9	8	計	9	8	計
	徳	甚	別	尾 5,727	尾 5,493	尾 11,220	尾 5,403	尾 2,528	尾 7,931
天	ark Turk		登	1,173	1,799	2,972	1,023	371	1,3 9 4
塩	頓		別	1,6 8 0	1,652	3,3 3 2	1,6 7 7	1,303	2,980
支	th.		H	1,8 2 9	1,6 3 1	3,4 6 0	1,7 5 9	536	2,2 9 5
場	天		抽	2,6 3 8	3,657	6,295	1,1 2 2	502	1,624
÷1.	本	年	度	1 3,0 4 7	1 4,2 3 2	2 7,2 7 9	1 0,9 8 4	5, 2 4 0	1 6,2 2 4
#	前	年	度	3,2 3 6	6.5 3 4	9,770	2,6 6 3	1,031	3,694
Ŧ	Ŧ		オ	6,6 7 4	7,6 6 3	1 4,3 3 7	6,1 1 0	1,5 9 8	7,7-0 8
オ	静		内	3,144	5,5 0 1	8,645	2,239	8 3 5	3,0 7 4
支	白		老	4 7	2 2 6	273	3 9	4 0	7 9
揚	敷		生	162	497	6 5 9	162	1 2 8	290
e1.	本	年	度	1 0,0 2 7	1 3,8 8 7	2 3,9 1 4	8,5 5 0	2,6 0 1	1 1,1 5 1
計	前	年	度	7,1 3 7	11,104	1 8,2 4 1	5,637	1,935	7,5 7 2
	尻		別	1 3 8	1 6 0	298	1 3 0	7 7	207
渡	利		別	1,2 2 3	1,101	2,3 2 4	1,207	5 0 4	1,7 1 1
島	厚	沢	部	1,8 2 0	2,8 6 4	4,684	1,809	915	2,7 2 4
支場	八		蛋	2,8 3 2	3,4 1 0	6,2 4 2	2,3 3 0	1,0 8 7	3,417
723	知		内	8,3 2 5	1 2,3 7 5	20,700	7,663	4,284	1 1,9 4 7
51-	本	年	度	1 4, 3 3 8	1 9,9 1 0	3 4,2 4 8	13,139	6,867	20,006
計	前	年	度	11,672	1 6,0 5 5	2 7,7 2 7	11,109	5,6 7 8	16,787
ASI	本	年	度	274,330	3 3 9,9 0 9	6 1 4,2 3 9	2 4 9,0 2 7	8 9,3 6 7	3 3 8,3 9 4
台計	前	年	度	3 4 3,6 4 4	501,535	8 4 5,1 7 9	3 0 9,6 1 2	94,952	4 0 4,5 6 4

			♀ 親 魚		
採卵数	增減卵数	仮収容卵数	使用率	平均採卵数	実 施 期 間
千粒 16,047	千粒	千粒 16,047	% 94.3	数 2,9 7 0	月日 月日 9.1~12.28
2,9 4 4		2,9 4 4	8 7.2	2,8 7 8	9. 5 ~ 11.17
4,856		4,8 5 6	9 9.8	2,896	9.21 ~ 11.26
5,2 5 9		5,2 5 9	9 6.2	2,989	9. 1 ~ 1 2.1 0
3,1 1 5		3,1 1 5	4 2.5	2,7 7, 6	9. 7 ~ 1 1.2 0
3 2,2 2 1		3 2,2 2 1	8 4.2	2,9 3 3	9. 1 ~ 1 2.2 8
6,901		6,901	8 2.3	2,5 9 0	9. 1 ~ 1 2.2 0
1 7,2 7 8		1 7,2 7 8	9 1.5	2,8 2 8	8.1 6 ~ 1 1.3 0
5.7 6 7	海 349	6,1 1 6	7 1.2	2,5 7 6	8. 1 ~ 1 2.3 0
98		98	8 3.0	2,5 1 3	9.10 ~ 12.15
4 4 2		4 4 2	1 0 0.0	2,7 2 8	9. 3 ~ 12.15
2 3,5 8 5	海 349	23,934	8 5.3	2,758	8. 1 ~ 1 2.3 0
1 4.5 9 3	海 933	1 5,5 2 6	7 9.0	2,5 9 0	8. 2 ~ 1 2.2 8
3 2 5		3 2 5	9 4.2	2,5 0 0	9. 1 ~ 12. 1
3,820		. 3,8 2 0	98.7	3,165	9.11 ~ 11.20
4.9 4 5		4,9 4 5	9 9.4	2,7 3 4	9.2 1 ~ 1 1.2 5
6,917		6,917	8 2.3	2,9 6 8	8.27 ~ 12.29
1 3,5 1 9		1 3,5 1 9	9 2.0	1,764	9.20 ~ 12.31
2 9,5 2 6		2 9,5 2 6	9 1.6	2,2 4 7	9. 1 ~ 1 2.3 1
24,385	海 311	24,696	9 5.2	2,1 9 0	9. 1 ~ 1. 10
5 9 7,2 2 9	海 7,535	6 0 4, 7 6 4	9 0.8	2.3 9 8	8. 1 ~ 1.15
7 5 1,7 5 5	海 9,208	760,963	9 0.1	2,4 3 0	8. 2 ~ 1.23

3. さけ種卵の移殖

本年度、さけの採卵数は計画(6 6 5.3 3 8 千粒)に対して実績(5 9 7.2 2 9 千粒)の達成率は、まつたが、前年度不振地区のオホーツク海区、1 2 8.8%、日本海区、2 5 3.3%、襟裳以西海区は、種卵の移殖は、次の方針に基づいて実施した。

- ① オホーツク海区北部、日本海区および襟裳以西海区への資源均てん化
- ② 稚魚飼育事業計画に基づく不足種卵の供給
- ③ 本州に対する再生産用種卵の供給
- ④ 早期群および後期群の資源育成のための供給

第10表 さけ種卵の移殖ならびに試験供用に伴なう動き

支	場	卵子収	採 卵 数	増 減	卵 数	仮 収 容
Х.	柯	容設備	採卵数	海産卵	△供試卵	卵 数
北	見	2 1 0,6 0 0	1 9 4, 3 2 9	3,5 8 2		1 9 7,9 1 1
根	室	1 9 6,5 1 5	1 0 8,8 1 7	3,3 4 2		112,159
+	<i>l</i> 券	2 3 5,9 7 5	2 0 8, 7 5 1	262		2 0 9,0 1 3
天	塩	40,200	3 2,2 2 1	0		3 2, 2 2 1
千	歳	7 9,9 5 0	2 3,5 8 5	3 4 9		2 3,9 3 4
渡	Ē	6 5,6 9 0	2 9,5 2 6	. 0		2 9,5 2 6
合	=	8 2 8,9 3 0	5 9 7,2 2 9	7,5 3 5		6 0 4,7 6 4

- 註 1. 収容設備は、事業計画書による。
 - 2. 収容設備には、道、民間を含み、一部では増収ポツクス設備を含む。
 - 3. 発眼卵の移殖は移籍卵数。

8 9.8 %で予想を下廻り、昨年度、好成績であつた根室海区は、6 5.6 %、襟裳以東海区 7 1.7 %にとど 1 0 6.9 %と計画を上廻る好成績を挙げた。

(单位: 千粒)

受精直後卵	日の移殖		式 発 II	and the second s	殖	最終.	収容能力に
供給卵数	受給卵数		数 道 供給卵数	· 內 受給卵数	△ 本 州	収容卵数	対する収容率 (%)
20,986			1 9,8 2 2			1 5 7,1 0 3	7 4.6
	2 9,5 9 8		10,136	2,688		1 3 4,3 0 9	6 8.3
1 3,5 6 8			1 3,5 9 5		△3,7 3 8	178,112	7 5.5
			1,1 3 8	9,928		4 1,0 1 1	1 0 2.0
		1	1,550	23,489		4 5, 8 7 3	5 7.4
	4,9 5 6			10,136		4 4,6 1 8	6 7.9
3 4.5 5 4	3 4,5 5 4	1	6 46,241	46,241	△3,738	601,010	7 2.5

第11表 道 内 移 殖(供給状況)

供	給 地	 被	受 約	地	移列	直卵の片	可訳	Artic Tr
支場名	事業場名	移殖年月日	支場名	事業場名	移籍卵数	移殖前死數数	移殖実卵数	摘要
北見	斜 里	4 7.1 2. 4	根 室	虹 別	千粒 2,4,99	干粒	·千粒 2,4 9 9	受精直後卵
//	//	" 5	//	"	3,7 8 3		3,783	//
//	//	// 6	"	" "	2,5 4 4		2,5 4 4	//
//	//	<i>"</i> 9	"	"	2,1 8 7		2,187	"
//	//	// 13	//	, ,,	2,1 9 4		2,1 9 4	//
"	//	48. 1.26	天 塩	天 塩	7,720	644	7,076	発眼卵
	小計				20,927	6 4 4	7,070	
//	網走	4 7.1 2. 4	根室	虹 別	2,8 0 7		2,807	受精直後卵
//	//	<i>"</i> 6	"	. ,,	3,0 3 0		3,0 3 0	//
.//	#	" 9	"	"	1,942		1,9 4 2	//
	小計				7,7 7 9		7,779	
//	湧 別	48. 1.27	天 塩	天 塩	2,2 0 8	954	1,2 5 4	発眼卵
//	//	2. 6	千 歳	千 歳	4,994		4,994	発眼卵 (未検卵
//	//	7	"	"	4,900		4,900	発眼卵 (未検卵
	小計				1 2,1 0 2	954	1 1,1 4 8	Citago
	計				4 0,8 0 8	1,5 9 8	3 9, 2 1 0	
根 室	虹 別	48. 1.18	渡島	(称)	6,0 0 0	1,0 1 2	4,988	発眼卯
-//	"	#23	"	(")	1,578	3 3 9	1,239	//
. #	//	"	"	尻 別	1,509	298	1,211	//
//	//	"	"	八 雲	1,049	164	885	"
	小 計				1 0,1 3 6	1,8 1 3	8,323	
	計				1 0,1 3 6	1,813	8,323	
十 勝	釧路	4 7.1 1.1 8	渡 島	(納	2,853		2,8 5 3	受精直後卵
//	"	// 21	· //	(")	2,103		2,103	//
//	"	. // 25	根室	計根別	4,4 3 1		4,4 3 1	"
"	//	// 30	"	//	4,181	*	4,181	ii
//	"	1 2.2 1	千 歳	千 歳	5,3 1 4		5,3 1 4	発眼卵 (未検卵
	小 計				1 8,8 8 2		1 8,8 8 2	

供	給 地	砂筋左目口	受為	合 地	移	殖卵の	内訳	摘 要
支場名	事業場名	移殖年月日	支場名	事業場名	移籍卵数	移殖前死卵数	移殖実卵数	摘 要
十 勝	十 勝	4 7.1 2.1 8	千 歳	敷生	千粒 1,810	千粒 307	千粒 1,503	発眼卵
//	"	1.1 6	"	(元浦河)	1,146	146	1,000	"
//	"	48. 2. 5	"	千 歳	5,3 2 5	1,1 5 0	4,175	"
	小計				8,2 8 1	1,603	6,678	
	<u> </u>				27,163	1,603	2 5, 5 6 0	
天 塩	徳志別	47.11.28	根 室	伊茶仁	1,138	8 2	1,056	発眼卵
千 歳	千 歳	47.11.28	根室	伊茶仁	1,5 5 0	104	1,446	//
合	計				80,795	5,200	7 5,5 9 5	

第12表 道 内 移 殖 (受給状況)

受為	合 地	Tert/T D D	供給	地	移	殖卵の	内訳	摘 要
支場名	事業場名	移殖年月日	支場名	事業場名	移籍卵数	移殖前死卵数	移殖実卵数	11向 安
根室	虹别	47.12. 4	北見	斜里	千粒 2,499	千粒	千粒 2,499	受精直後卵
"	"	5	//	//	3,783		3,7 8 3	"
"	"	6	//	//	2,5 4 4		2,544	"
//	"	.9	"	"	2,187		2,187	. 11
//	//	1 3	"	"	2,194		2,194	"
//	"	4	"	網走	2.8 0 7		2,8 0 7	"
"	"	6	"	"	3,0 3 0		3,0 3 0	"
. //	"	9	. "	"	1,9 4 2		1,9 4 2	"
	小計				20,986		20,986	
根室	伊茶仁	1 1.2 8	千 歳	千 歳	1,550	104	1,446	発眼卵
//	"	"	天 塩	徳志別	1,138	8 2	1,056	"
	小計				2,688	186	2,502	
根室	計根別	1 1.2 5	十 勝	釧路	4,431		4,431	受精直後卵
//	//	3 0	"	//	4,181		4,181	"
*	小計				8,612		8,6 1 2	
支	易計		To the same of the		3 2,2 8 6	186	3 2,1 0 0	

罗 衤	合 地	1465 to 11 m	供給	地	移	殖卵の戸	为 訳	摘 要
支場名	事業場名	移殖年月日	支場名	事業場名	移籍卵数	移殖前死卵数	移殖実卵数	7间 安
天 塩	天塩″	48. 1.26	北 見	· 斜 里	千粒 7,720	千粒 644	千粒 7,076	発眼卵
	<i>"</i> ·	"	"	湧 別	2,208	954	1,2 5 4	"
支寸	易計				9,928	1,5 9 8	8,320	
千 歳	敷生	4 7.1 2.1 8	十 勝	十 勝	1,810	3 0 7	1,5 0 3	発眼卵
"	千 歳	2 1	"	釧路	5,314		5,314	発眼卵 (未検卵)
"	"	4 8. 2. 5	"	十 勝	5,3 2 5	1,1 5 0	4,175	発服卵
"	n,	2. 6	北見	湧 別	4,994		4,994	発眼卵 (未検卵)
"	"	7	"	"	4,900		4,900	発限卵 (未検卵)
	小計				2 2,3 4 3	1,457	2 0,8 8 6	
千 歳	(元浦河)	4 8. 1.1 6	十 勝	十 勝	1,146	146	1,0 0 0	
支力	場 計				23,489	1,603	2 1,8 8 6	
度島	八雲	48. 1.23	根室	虹别	1,0 4 9	1 6 4	885	発眼卵
"	尻 別	"	"	"	1,509	2 9 8	1,211	"
"	(科)	1.18	"	"	6,000	1,012	4,988	"
11	"	2 3		//	1,578	3 3 9	1,239	"
"	- #	4 7.1 1.1 8	十 勝	釧路	2,8 5 3		2,8 5 3	受精直後卵
//	"	// 21	"	"	2,103		2,103	"
	小計				1 2,5 3 4	1,3 5 1	1 1,1 8 3	
支	場計				1 5,0 9 2	1,8 1 3	1 3,2 7 9	
台	**				8 0, 7 9 5	5,200	7 5,5 9 5	

第13表 本 州 移 殖

受	給 地	that had a	供給地			12	移	訳	4:xbc	要	
支場名	事業場名	移殖年月日	支場名 事業場		場名	移籍卵数	移殖前死卵数	移殖実卵数	摘	女	
岩手県	太平洋さ け・ます 増殖セン ター	47.12.19	+	勝	+	勝	千粒 3,738	千粒 229	千粒 3,509	発眼卵	3

4 さけふ化放流成績概要

本年度は、採卵数597,229千粒、寄贈海産卵7,535千粒を受入れ、仮収容卵数604,764千粒の種卵を38事業場と道営1ケ所、民営30ケ所、計69ケ所のふ化場に収容し、給餌稚魚376,969 魚生産率79.2%)48年2月1日から同年6月30日にかけて、全道106水系へ放流した。

これらの水系別、支場別のふ化放流成績は、第14表、第15表のとおりである。

第14表 昭和47年度海区・水系別さけふ化放流成績

海	-	55	事業	易	गिर कोड ठाव अ ध	Tire #/	· 11 = *L	> 11t-	放	流尾	汝
区	水	系	(収容)	場)	収容卵数	ACAH 3X	ふ出尾数	率出る	無給餌	給 餌	計
					千粒	千粒	千尾	%	千尾	千尾	千尾
	岩尾	别	岩尾	別	10,189	501	. 9,688	9 5.1	7,5 7 5	1,9 7 5	9,5 5 0
	奥薬	别			0	0	0	0.0	0	2,5 0 0	2,5 0 0
	斜	里	斜	里	25,134	2,2 1 7	2 2,9 1 7	9 1.2	7,5 2 4	1 0, 9 3 5	1 8,4 5 9
オ	"		来	運	5,0 6 0	4 6 0	4,6 0 0	9 0.9	.0	2,0 1 0	2,010
	藻	琴	藻	學	9,308	1,104	8,204	8 8.1	5,600	2,200	7,8 0 0
水	網	走	網	走	25,671	3,0 2 5	2 2,6 4 6	8 8.2	1 3,5 0 0	5,500	1 9,0 0 0
	バイラ	ギ			0	0	0	0.0	1,5 7 0	0	1,5 7 0
1	能 取	湖			0	0	0	0.0	1,3 5 0	4,000	5,3 5 0
ッ	常	呂	北	見	9,3 4 4	800	8,5 4 4	91.4	2.5 0 0	0	2,500
	//		北	見	1,3 1 4	757	557	4 2.4	2,5 3 0	0	2.5 3 0
2	ライトコ	10			0	0	0	0.0	1,400	0	1,4 0 0
	佐呂間	别			0	0	0	0.0	3,0 0 0	0	3,000
海	岜	露	1		0	0	0	0.0	2,0 0 0	0	2,0 0 0
	湧	别	湧	别	4 3, 3 9 1	1 6,0 5 6	2 7,3 3 5	6 3.0	7,1 2 8	1 6,9 7 1	24,099
K	渚	滑	猪	骨	1 1,5 0 2	1,676	9,826	8 5.4	0	6,748	6,7 4 8
	興	部			0	0	0	0.0	0	3,000	3,000
	幌	内	幌	内	1 6,1 9 0	5,0 2 0	1 1,1 7 0	6 9.0	0	7,300	7,300
	徳 志	别	徳志り	别	7,396	388	7,0 0 8	9 4.8	0	6,600	6,6 0 0
	北見幌	別	歌	登 .	4,4 1 6	301	4,1 1 5	93.2	0	3,870	3,8 7 0

の中から道外移殖 (本州) 3.738千粒および供試卵数16千粒を除き、最終収容卵数601,010千粒 千尾(給餌放流率79.2%)、無給餌稚魚98.836千尾の合計475,805千尾の稚魚を生産し、(稚

L/ >+ +C 88	7-44-	-1-7	仮电	マ容か	54	容ま	での)卵(D動	き・	· 事	紫場单	单位
放流期間	備	考	稚	魚	移	殖	放	流		٠.	·括	弧	書
5.1~ 5.20	斜里より 4,81	0 千粒											
5.23 ~ 5.24	斜里へ3.449	千粒 (来運より:	2, 5 0	0千	尾)								
3.1 5 ~ 5.3 1	虹別へ 1 2,9 6 2 より 5,0 8 0 千粒	千粒、信砂へ 7,7 、来運へ 5,0 6 0 千	20千	粒、岩 坦葵另	尾別より) 3, 4	,81 49=	0千粒	o、** (能	東内 取	\ 3,0 \ 4,	0 6千 0 0 0 =	粒、網走 千尾)
5.23 ~ 5.24	斜里より 5,06	0 千粒(奥薬別~	2, 5	0 0	千尾)							
3.20 ~ 5.20	網走より 7,83	0 千粒											
3. 5 ~ 5.20	虹別へ 8,0 2 4千 湖より 1 4千粒	粒、北見へ1,54 (能取湖へ1,350	4千粒	、深	琴へ	7,8 3 F~ 1	30千 1,57	粒、 0千/	斜里	里へ	5,08	0千粒	、能取
4.22 ~ 4.22	(組走より1,5	70千尾)											
4.17 ~ 4.19	網走へ14千粒	(網走より1,3:	0千	尾、	斜里	より	4, 0	0 0	千月	€)			
3. 1 ~ 5.1 9	へ,2,000千尾	千粒、佐呂間別。 、ライトコロへ 千粒、佐呂間別。	, 2 0	0 千	尾、	常呂	網走 へ 2,	より53	1, : 0 =	5 4	4 千粒	位 (佐	呂間別
4.2 6 ~ 4.2 6		30千尾、ライ)						
4.20 ~ 4.20	(北見より1.2	00千尾、常呂。	(1) 2	0 0	千尾)							
4.18 ~ 5.19	常呂へ348千粒	1、北見へ1,561	千粒	北見	しより	2.0	0 O Ŧ	尾、	湧	別よ	U 1,0	001	一尾)
5.21 ~ 5.22	(湧別より 2.0	0 0 千尾)	ξ,	3.5									
5.2 1 ~ 5.2 2	天塩へ 2, 2 0 8 千尾、芭露へ 2,	千粒、千才へ9.8 000千尾)	9 4	千粒	、幌	内へ	9, 4	5 8	千米	立 (1	左呂間	別へ	1,000
4.17 ~ 5.15	北見より 1,5 4	4 千粒(興部へ:	, 0 0	0 千	尾)								
4.20 ~ 5.12	(渚滑より3,0	0 0 千尾)											
4. 1 ~ 5.31	湧別より 9.45	8千粒、斜里よし	3, 0	0 6	千粒								
4. 1 ~ 5.31	伊茶仁へ1,13 粒、中川へ5,4	8 千粒、歌登へ 2 5 2 千粒	. 6 0	7 千	粒、	天塩	∼ 1	0 3	干米	V. ii	次登よ	(1) 6	4 9 千
3.1 5 ~ 5.1 5	徳志別より 2,6	07千粒、徳志宏	J\^ 6	4 9	千粒	、天	塩へ	4 8	6 7	F粒			

海	-al-		777	事	業場	गोपने करन होता स्टे	Thirtie Wie	> III CONTA	> iliete	放	流尾	数
区	水		系	(収:	容場)	収容卵数	死卵数	ふ出尾数	本出る	無給餌	給 餌	計
						千粒	千粒	千尾	%	千尾	千尾	千尾
オ	頓		別	頓	别	4,8 5 7	204	4,653	9 5.8	0	3,700	3,700
ホーツ	猿		払			0	0	0	0.0	8 5 0	0	850
ク海	鬼	志	別	鬼	志別	2,2 0 8	9 7 9	1,2 2 9	5 5.7	250	0	250
区	海	17	計	本	年度	1 7 5,9 8 0	3 3,4 8 8	1 4 2, 4 9 2	8 1.0	5 6,7 7 7	7 7,3 0 9	1 3 4,0 8 6
	(tit	区	βl	前	年度	1 5 2,9 9 5	2 6,7 0 5	1 2 6,2 9 0	8 2.5	6 7,2 5 5	5 5,4 9 6	1 2 2,7 5 1
	礼亦	文ロナ	島イ	(船	泊)	236	3 0	206	8 7.3	150	0	150
	增		幌	(增	幌)	110	2	108	9 8.2	8 6	0	8 6
	天		塩	天	塩	2,504	1.93	2,3 1 1	9 2.3	0	2,1 3 0	2,1 3 0
		//		中	JII	9,419	881	8,5 3 8	9 0.6	0	4.400	4,4 0 0
В	11		計			11,923	1,0 7 4	1 0,8 4 9	9 1.0	0	6,530	6,530
	遠		别			0	0	0	0.0	0	1,300	1,300
	風	連	別			0	0	0	0.0	0	1,000	1,000
本	古	丹	別			0	0.	0	0.0	0	1,000	1,0 0 0
4	小	平	薬			0	0	0	0.0	0	1,3 0 0	1,300
	信		砂	(信	砂)	7,7 2 0	900	6,8 2 0	8 8.3	0	1,4 0 0	1,4 0 0
海	暑	寒	別	(暑	寒別)	2,1 4 5	180	1,965	9 1.6	0	1,850	1,8 5 0
119	浜		益			0	0	0	0.0	0	300	300
	厚		田	(厚	田)	200	5 4	1 4 6	7 3.0	489	0	489
区	石		狩	干	才	1 7,2 3 7	3,656	1 3,5 8 1	7 8.8	5	8,775	8,7 8 0
	余		币	(余	而)	4,684	9 0 4	3,780	8 0.7	0	3,469	3,469
	美		围	(美	国)	1,020	245	775	7 6.0	0	7 4 5	7 4 5
	穑		丹			0	0	0	0.0	0	. 560	560
7	古		宇			0	0	0	0.0	100	0	100
	尻		别	尻	别	1,8 3 4	3 8 5	1,4 4 9	7 9.0	4 1 5	0	4 1 5
	朱		太			0	0	0	0.0	7 0 0	800	1,500

放 流 期 間	仮収容から収容までの卵の動き・・事業場単位
4.1 5 ~ 5.12	
6. 1 ~ 6. 1	(鬼志別より850千尾)
6. 1 ~ 6. 1	天塩より 2,208千粒 (猿払へ850千尾)
3. 1 ~ 6. 1	
3.1 5 ~ 5.3 1	
5. 4 ~ 5. 4	天塩より236千粒
6.30 ~ 6.30	
4. 1 ~ 5.21	徳志別より103千粒、湧別より2,208千粒、歌登より486千粒、鬼志別へ2,208 千粒、船泊へ236千粒、中川より1,182千粒
4.20 ~ 4.30	徳志別より 5,452 千粒、天塩へ1,182 千粒
4. 1 ~ 5.21	
6.12 ~ 6.12	(信砂より1,300千尾)
6.11 ~ 6.11	(" 1,000千尾)
6. 7 ~ 6. 7	(// 1,000千尾)
6. 6 ~ 6. 6	(// 1,300千尾)
6. 6 ~ 6.20	斜里より7,720千粒 (小平薬へ1,300千尾、)古丹別へ1,000千尾、風蓮別へ1,000千尾、遠別へ1,300千尾)
5.10 ~ 6.10	
4.24 ~ 4.25	(森より300千尾)
4. 4 ~ 5. 8	千才より200千粒 (千才より350千尾)
2.28 ~ 5.10	元浦河へ2,844千粒、厚田へ200千粒、勇払より238千粒、鵡川より749千粒、静内へ5,125千粒、敷生へ5,884千粒、余市へ3,262千粒、美国へ1,020千粒、伊茶仁へ1,550千粒、本場(調査課)へ16千粒、釧路より5,314千粒、十勝より5,325千粒、湧別より9,894千粒(厚田へ350千尾、静内へ850千尾、新冠へ500千尾、富川へ800千尾、鵡川へ1,300千尾)
4.20 ~ 5.25	千才より 3.2 6 2 千粒
5.28 ~ 5.28	干オより 1,0 2 0 千粒
4.11 ~ 4.11	(森より560千尾)
5.2 2 ~ 5.2 2	(尻別より100千尾)
4.1 5 ~ 5.2 3	虹別より1,509千粒、朱太より325千粒 (朱太へ700千尾、古字へ100千尾、泊へ100千尾)
3.28 ~ 4. 5	尻別へ325千粒(森より800千尾、尻別より700千尾)

海	水	系	事業場	収容卵数	死卵数	ふ出尾数	ふ出率	放	流尾	tt
区	-34	75	(収容場)	D. L. OP S.	709132	W III / E X		無給餌	給 餌	計
	泊			千粒 0	千粒 0	千尾	% 0.0	千尾 100	千尾 0	千尾 10(
日	利	别	利別	2,902	288	2,614	9 0.6	0	2,5 4 5	2,54
2	突	符		0	0	0	0.0	0	560	56(
本	厚 沢	部	厚沢部	3,880	357	3,5 2 3	9 0.8	420	2,8 5 0	3,2 7 (
ye.	天	0	(天 の)	700	2 3	677	9 6.7	600	0	60(
毎	石	崎	*	0	0	0	0.0	0	560	56
区	及	部		0	0	0	0.0	0	560	5 6 (
	Mer ITT	-1	本年度	54,591	8,098	4 6,4 9 3	8 5.2	3,0 6 5	3 6,1 0 4	3 9, 1 6
	海 区	計	前年度	4 4,8 3 8	7,4 0 3	3 7,4 3 5	8 3.5	1,210	3 3,3 3 5	3 4, 5 4 5
	N	サ	(ル サ)	1,0 7 2	9 6	976	9 1.0	9.7 1	0	9 7
	サシル	1		0	0	0	0.0	0	383	38
	羅	臼	羅臼	1 3,0 2 8	1,1 3 2	11,896	9 1.3	0	5,974	5,97
			4							
设	春刈古	丹		0	0	0	0.0	0	958	9 5
	植	别	(植 別)	0	0	0	0.0	0	1,0 0 3	1,00
	元崎無	異	(元崎無異)	0	0	0	0.0	0	1,563	1,56
榁	崎 無	異	(崎無異)	0	0	0	0.0	0	5 0 0	5.0
	煮	別	煮 別	3,939	4 5 4	3,485	8 8.5	0	6,611	6,61
	古多	糠		0	0	0	0.0	0	520	5 2
毎	忠	類		0	0	0	0.0	0	585	5 8
	伊茶	仁	伊茶仁	27,232	3,5 3 6	23,696	8 7.0	0	8,1 20	8,1 2
									1	
	標	津	根室	9,112	971	8,1 4 1	8 9.3	0	2 3,3 8 1	23.38
X										
	標	津	中標準	8,210	1,280	6,930	8 4.4	0	6,915	6,91
	小	計		17,322	2,2 5 1	1 5,0 7 1	8 7.0	0	30,296	3 0, 2 9
	当	幌	計根別	14,751	2,5 5 2	12,199	8 2.7	0	4,174	4,17
	春	別		0	0	0	0.0	900	0	9 0

放 流 期 間	備考	仮収容から収容までの卵の動き・・事業場単位
/JX (/IU 791 In)	ond ~~	稚 魚 移 殖 放 流・・・・ 括 弧 書
5. 2 2 ~ 5.2 2	(尻別より千尾)	
2. 1 ~ 4.2 0		
4. 7 ~ 4. 7	(森より560千尾)	
2. 1 ~ 4.30	八雲へ1,065千粒	
4.14 ~ 5.20	森より700千粒	
4. 9 ~ 4. 9	(森より560千尾)	
4.14 ~ 4.14	(森より560千尾)	
2. 1 ~ 6.30		
3.2 2 ~ 5.2 4		
4. 5 ~ 5.1 0	羅白へ587千粒、計根別へ68	3 千粒、根室へ68千粒、羅臼より1,072千粒
5.21 ~ 5.21	(羅臼より383千尾)	
5. 1 ~ 5.2 5	粒、根室へ199千粒、元崎無異	230千粒、ルサより587千粒、植別より1,875千 星より877千粒、崎無異より1,302千粒(サシルイ 尾、元崎無異へ1,563千尾、崎無異へ500千尾、春刈 60千尾)
5.2 1 ~ 5.2 1	(羅臼より958千尾)	
5.2 2 ~ 5.2 2	羅臼へ 1,8 7 5千粒、根室へ 1,0 5	6千粒、計根別へ1,733千粒(羅臼より1,003千尾)
5.21 ~ 5.21	羅臼へ877千粒、根室へ1,010=	千粒、計根別へ807千粒 (羅臼より1,563千尾)
5.21 ~ 5.21	羅白へ 1,302千粒、根室 619千米	粒、計根別へ 527千粒(羅白より 500千尾)
5. 1 ~ 5.3 1	伊茶仁へ1,816千粒(羅臼よし) 1,460千尾、伊茶仁より1,896千尾)
5. 1 ~ 5. 1	伊茶仁へ656千粒(伊茶仁より)520千尾)
5. 1 ~ 5. 1	伊茶仁へ 2, 2 5 6 千粒 (伊茶仁)	より535千尾)
4. 1 ~ 5.20	6.679千粒、古多糠より656	はり1,138千粒、薫別より1,816千粒、標準より 6千粒、忠類より2,256千粒(薫別へ1,896千尾、 85千尾、標準へ11,951千尾)
5.10 ~ 5.29	ルサより69千粒、羅臼より19千粒、崎無異より619千粒、樹 千粒、伊茶仁より11,951千眞	99 千粒、植別より1,056 千粒、元崎無異より1,010 農津より6,042 千粒、中標準より92 千粒、虹別より26 民、計根別より3.563 千尾)
4.1 7 ~ 5.1 5	標津より8,172千粒、根室へ9	92千粒
4.17 ~ 5.29		
4.27 ~ 5.31	粒、元崎無異より807千粒、崎)68千粒、羅臼より230千粒、植別より1,733千 5無異より527千粒、標準より1,485千粒 3.563千尾、別当質へ847千尾)
4.13 ~ 4.13	計根別へ471千粒、床丹へ33	3 4 千粒 (床丹より 9 0 0 千尾)

海	-b		7	事業		11725 sin \$/-	AL on Wh	> фож.	} (lists	放	流尾	数
区	水		系	(収容	5場)	収容卵数	死卵数	ふ出尾数	多出率	無給餌	給 餌	計,
	床		丹	(床	丹)	千粒 2,2 0 0	千粒 218	千尾 1,982	% 9 0.1	千尾 1,039	千尾 0	千尾 1,039
根	西		別	虹	別	47,027	4,867	4 2,1 6 0	8 9.7	0	35,742	35,742
室	矢	臼	别	(矢E	3別)	2,0 0 0	4 0 0	1,600	8 0.0	1,572	0	1,572
海	風		蓮	浜	中	3.634	4 6 0	3.1 7 4	8 7.3	0	7,3 1 9	7,3 1 9
· ×	別	当	賀	厚	床	1,698	1 3 9	1,559	9 1.8	259	5,832	6,0 9 1
	穂	1	香	(香)	406	2 3	3 8 3	9 4.3	380	458	838
	油	区	計	本生	下度	1 3 4,3 0 9	1 6,1 2 8	1 1 8,1 8 1	8 8.0	5,1 2 1	1 1 0,0 3 8	115,159
	114		p)	前至	下 度	2 2 2,6 8 8	3 2,7 7 6	189,912	8 5.3	21,091	1 5 3. 1 9 6	174,287
	幌		F	(幌	戸)	1,143	1 5 2	991	8 6.7	954	0	954
	別	寒辺	牛	太	田	1 0,4 4 1	1,583	8,8 5 8	8 4.8	8,695	0	8,695
エ	チ	ヨロへ	ミツ			0	0	0	0.0	0	1,200	1,200
	釧		路	釗[路	39,114	3.4 1 4	3 5,7 0 0	91.3	0	34,188	3 4,1 8 8
y	釧		路	鴾	居	15,162	1,749	13.413	8 8.5	0	9,7 0 0	9,700
	小		計			54,276	5,1 6 3	4 9, 1 1 3	9 0. 5	0	4 3.8 8 8	4 3.8 8 8
モ・	Enj		寒			0	0	. 0	0.0	0	1,000	1,000
	庶		路			0	0	0	0.0	0	1,0 0 0	1,0 0 0
以	茶		路	(茶	路)	1,226	179	1,0 4 7	8 5.4	0	2,0 0 0	2,0 0 0
	音		别		别)	2,9 1 4	3 3 1	2,583	8 8.6	0	2,5 0 0	2,500
東	厚		内	(厚	内)	1,7 2 8	220	1,5 0 8	8 7.3	0	1,400	1,4 0 0
	+		勝	+	勝	13.302	2,4 4 3	1 0,8 5 9	8 1.6	0	10,000	10,000
毎										190		
		//		幕	别	31,561	5,0 3 4	26,527	8 4.0	0	2 5,1 0 0	2 5,1 0 0
芝		//		札	内	46,260	7,870	3 8,3 9 0	8 3.0	0	3 3.1 4 8	3 3,1 4 8
		//		(利	别)	1,013	6.8	9 4 5	9 3.3	940	0	9 4 0
	小		1		*	9 2,1 3 6	1 5, 4 1 5	7 6,7 2 1	8 3.3	940	68,248	6 9,1 8 8
	歴		舟	大	樹	6,0 3 9	1,018	5,0 2 1	8 3.1	0	5,000	5,000

		仮収容から収容までの卵の動き・・事業場単位
放流	期間	間備考れ無移殖放流・・・・括弧書
4.10	~ 4.3 0	
3. 1 ~	∼ 5.2 0	森へ7,578千粒、尻別へ1,509千粒、八雲へ1,049千粒、浜中へ2,187千粒、 斜里より12,962千粒、網走より8,024千粒、標津より7,120千粒、根室へ26 千粒(風蓮へ2,200千尾、別当賀へ3.700千尾、穂香へ458千尾
5.10	∼ 5.3 1	浜中へ97千粒、計根別より2.000千粒
4.20 ~	~ 5.20	虹別より 2.187千粒、矢臼別より 97千粒 (虹別より 2.200千尾、計根別より 1.973千尾)
4.25	~ 5.2 5	(計根別より847千尾、虹別より3.700千尾)
5. 5	~ 5. 9	(虹別より 4 5 8 千尾)
3. 1	~ 5.31	
3.1 5	∼ 6.1 0	
4. 1 -	~ 5.3 1	太田より970千粒
4.1 2	~ 5.31	幌戸へ970千粒
4.23 -	~ 4.2 6	釧路へ75千粒 (釧路より1,200千尾)
	~ 5.1 6 ~ 4.3 0	14.794十粒、チョロペンより75十粒、大樹へ2.858十粒 広尾へ2.833 十粒 チョロペンペ1,200 年 阿寒より42 千粒、茶路より177 千粒、庶路より50 千粒、音別より99 千粒、釧路より
4 1 -	~ 5.1 6	14,794千粒 (阿寒へ 1,000千尾、庶路へ 1,000千尾、茶路へ 1,000千尾)
	~ 4.1 6	
4.1.7	~ 4.17	The state of the s
5.1 2	∼ 5.3 1	鶴居へ177千粒、十勝より1,226千粒(鶴居より1,000千尾)
5.12 ~	∼ 5.3 1	鶴居99千粒、十勝より2,914千粒
4.1 2	~ 4.2 7	十勝より1,728千粒
4. 1 ~	~ 4.20	敷生へ1.810千粒、元浦河へ1.146千粒、千才へ5.325千粒、釧路より5,717千粒、広尾へ2.153千粒、大樹へ2.583千粒、太平洋センターへ3.738千粒、札内より267千粒、猿留へ1,646千粒、厚内へ1,728千粒、茶路へ1,226千粒、音別へ2.914千粒利別へ700千粒
2.20 ~	~ 4.3 0	
2.1 5 ~	~ 4.2 5	十勝へ267千粒
3.20	~ 4.30	幕別より700千粒
2.15 -	~ 4.3 0	
4.20	~ 4.3 0	十勝より 2,583 千粒、釧路より 2,858 千粒

海				,事刻	柴場	distance on the	Ti'ri- w	> director	X	放	流尾	5
×	水		系	(収3	容場)	収容卵数	死卵数	ふ出尾数	多出率	無給餌	給 餌	計
エ	豊		似			千粒 0	千粒 0	千尾	% 0.0	千尾	千尾 500	千尾 500
リモロ	広		尾	(広	尾)	6,2 7 1	1,1 0 7	5,164	8 2.3	0	4,660	4,6 6 0
以東海区	猿		留	(猿	留)	1,938	2 1 0	1,7 2 8	8 9.2	1,7 2 0	0	1,7 2 0
X	36-r	C7	- L	本台	年度	178,112	2 5, 3 7 8	1 5 2,7 3 4	8 5.8	1 2,3 0 9	1 3 1,3 9 6	1 4 3.7 0 5
***************************************	海	区	計	前年	干度	2 4 5,9 8 8	3 7,4 4 3	2 0 8, 5 4 5	8 4.8	24,770	1 6 4, 9 4 3	1 8 9,7 1 3
	歌		别	(元剂	甫河)	3 6 0	6.0	3 0 0	8 3.3	287	1 5 0	437
	仁	雁	别			0	0	0	0.0	0	500	5 0 0
	幌		満			0	0	0	0.0	0	500	5 0 0
I	日	高幌	别			0	0	0	0.0	2,1 9 5	265	2,4 6 0
	元		浦	(元》	甫河)	6,6 1 9	990	5,629	8 5.0	0	1,7 0 0	1,7 0 0
IJ												
	Ξ		石			0	0	0	0.0	0	7 5 0	750
÷	静		内	静	内	7,0 7 7	1,0 2 5	6,0 5 2	8 5.5	8 5 0	4,404	5,254
以	新		冠			0	0	0	0.0	5 0 0	0	500
	沙		流	risr em]1]	4 2 6	4 1	385	9 0. 4	1,185	0	1,1 8 5
西	鵡		Ш		v	0	0	0	0.0	1,300	0	1,3 0 0
5.9	白		老			0	0	0	0.0	0	1,0 0 0	1,0 0 0
	敷		生	敷	生.	8,2 3 4	2,0 7 4	6,1 6 0	7 4.8	1,480	3.470	4,950
海	貫	気	別	(質多	烈別)	2 2	9	1 3	5 9. 1	12	800	8 1 2
	長	万	州			0	0	0	0.0	0	7 2 0	720
区	遊	楽	部	八	研究	9,3 8 0	1,2 0 7	8,173	8 7.1	2,0 5 0	4,9 2 3	- 6,973
	落		部			0	0	0	0.0	0	200	200
	常		路			0	0	0.	0.0	0	590	590
	大		船			0	0	0	0.0	0	5 0	5 0
	尻	岸	内	(尻岩	量内)	150	2 1	1 2 9	8 6.0	120	800	920

	·		hi Ba	備考	仮収容から収容までの卵の動き・・事業場単位
改	THE	3	射 [制	備考	稚 魚 移 殖 放 流・・・ 括 弧 書
5.	1 2	~	5.1 2	広尾13千粒(広尾より500	千尾)
4.	1 0	~	5.20	豊似より13千粒、十勝より2,1	53千粒、釧路より2.833千粒 (豊似へ500千尾)
4.	1 5	~	4.30	十勝より 1,646 千粒	
2.	1 5	~	5.3 1		
3.	20	~	6.2 0		
3.	1 0	~	4.19	静内より360千粒、(元浦河	より150千尾)
4.	1 9	~	4.1 9	元浦河へ224千粒、(元浦河、	より500千尾)
4.	1 9	~	4.1 9	元浦河へ10千粒、(元浦河よ	()500千尾)
4.	2 0	~	4.2 8	元浦河へ677千粒、(元浦河	より2,460千尾)
3.	20	~	4.28	千粒、幌別より677千粒、仁原	り1.240千粒、幌満より10千粒、千才より2.844 催別より224千粒、(歌別へ150千尾、仁雁別へ 幌別へ2,460千尾、三石へ250千尾)
4.	19	~	5.10	千才へ135千粒(静内より5	0 0千尾、元浦河より250千尾)
4.	- 1	~	5.1 5	元浦河へ1,240千粒、歌別へ 富川より722千粒、新冠より 千才より850千尾)	360千粒、富川へ426千粒、千才より5,125千粒、 126千粒、三石より135千粒(三石へ500千尾、
5.	9	~	5. 9	千才へ126千粒 (千才より5	0_0 千尾)
5.	8	~	5. 8	静内へ722千粒、静内より4	26千粒 (千才より800千尾)
5.	7	~	5. 7	千才へ7 4 9 千粒 (千才より 1,	3 0 0 千尾)
4.	2 0	~	4.2 0	(敷生より1,000千尾)	
3.	1	~	4.2 0	十勝より 1,810千粒、白老より	98千粒、千才より 5,884千粒、 (白老へ 1,000千尾)
4	1 0	~	4.1 4	(森より800千尾)	
3.	27	~	4. 5	八雲へ159千粒 (森より72	0千星)
3.	1 0	~	5.15	粒、長万部より159千粒、冷	り286千粒、汐泊より565千粒、尻岸内へ107千水より918千粒、厚沢部より1,065千粒 (亀川へ、落部へ200千尾、大船へ50千尾、松倉へ50千尾)
4.	9	~	4. 9	(八雲より200千尾)	
3.	2 2	~	4.10	(森より590千尾)	
4	1 9	~	4.1 9	(八雲より50千尾)	
2	1 0	~	4. 6	遊楽部より107千粒(森より	8 0 0 千尾)

海	水	-	系	事	業場	収容卵数	死卵数	ふ出尾数	ふ出率	放	流尾	数
区	Ī		715	(収	容場)	权台州弘	765132	必出电纵	多田寺	無給餌	給 餌	計
	わ		泊	(汐	泊)	千粒 936	千粒 186	千尾 750	% 8 0.1	千尾 680	千尾 600	千尾 1,280
	松.		倉			0	0	0	0.0	0	5 0	5 0
エ	戸	切	地	(有	川)	1,7 1 8	308	1,410	8 2.1	1,3 5 0	0	1,3 5 0
IJ	茂	辺	地	(茂	辺地)	1 0,2 9 5	1,289	9,006	8 7.5	7,200	0	7,200
モ	大	当	别			0	0	0	0.0	500	0	500
以	亀		Ш	(亀	川)	6 5 1	105	5 4 6	8 3.9	1,000	250	1,2 5 0
西海	知		内	知	内	569	104	4 6 5	8 1.7	785	400	1,1 8 5
区	福		島			0	0	0	0.0	7 0	0	7 0
				(森)	1 1,5 8 1	2,464	9,117	7 8.7	0	0	0
	36.			本	年度	5 8,0 1 8	9,883	4 8,1 3 5	8 3.0	21,564	2 2,1 2 2	4 3.6 8 6
	海	区	計	前	年度	8 2,1 4 2	1 9,3 8 2	6 2,7 6 0	7 6.4	2 6,0 5 8	2 8,6 3 2	5 4, 6 9 0
	合			本	年度	601,010	9 2, 9 7 5	5 0 8,0 3 5	8 4.5	98,836	3 7 6.9 6 9	4 7 5,8 0 5
			=	前	年度	7 4 8,6 5 1	1 2 3.7 0 9	6 2 4,9 4 2	8 3.5	1 4 0, 3 7 1	4 3 5,6 1 5	5 7 5,9 8 6

さけ種卵の採卵から収容までの動き

採 卵 数 河 川 597,229 千粒

海 産 7,535 " 仮収容卵数 604,764 // 本州移殖 3.738 // 収容卵 数 601,010 #

放流期間	仮収容から収容までの卵の動き・・事業場単位 備 考
DX (/IL 34) [FI]	稚 魚 移 殖 放 流・・・・括 弧 書
3.1 5 ~ 4.3 0	森へ247千粒、八雲へ565千粒、森より500千粒、(八雲より300千尾、森より300千屋
4.18 ~ 4.18	(八雲より50千尾)
3.20 ~ 4.20	茂辺地より1,516千粒
2.25 ~ 3.31	有川へ1,516千粒、(知内へ350千尾、大当別へ500千尾、亀川へ500千尾、福島へ70千尾)
3.1 9 ~ 3.1 9	(茂辺地より500千尾)
3. 5 ~ 4. 2	八雲へ286千粒、 (八雲より250千尾、茂辺地より500千尾)
3.1 5 ~ 4.1 5	(茂辺地より350千尾、森より400千尾)
3.28 ~ 3.28	(茂辺地より70千尾)
,	虹別より7,575千粒、釧路より4,956千粒、汐泊より242千粒、汐泊へ500千粒、天のへ700千粒、(貫気別へ800千尾、長方部へ720千尾、常路へ590千尾、尻岸内へ800千尾、汐泊へ300千尾、知内へ400千尾、及部へ560千尾、石崎へ560千尾、突将へ560千尾、朱太へ800千尾、積丹へ560千尾、浜益へ300千尾)
2.10 ~ 5.15	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. 3 ~ 5.19	
2. 1 ~ 6.30	
3. 3 ~ 6.2 0	

-55-

第15表 昭和47年度、支、事業場別さけふ化放流成績表

	the after the	alma andre de Mari		3 No.	s 0		<i>I</i> >= □
支場	事 業 場	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出率 B/A×	7	放 流 尾
	(収容場)	(A)	1	(B)	100	無給餌	給 餌
北見	岩尾別	千粒 10,189	千粒 501	千尾 9,688	% 9 5.1	千尾 7,5 7 3	千尾 1,975
	斜里	25,134	2,217	2 2,9 1 7	91.2	7,5 2 4	1 4,9 3 5
	(来 運)	5,0 60	460	4,600	9 0.9	.0	4,5 1 0
	藻 琴	9,3 0 8	1,104	8,204	8 8.1	5,6 0 0	2,2 0 0
	網走	2 5, 6 7 1	3,0 2 5	2 2,6 4 6	8 8.2	16,420	5,500
	北見(北見)	9,344	800	8,5 4 4	9 1.4	8,230	0
	// (常呂)	1,314	757	5 5 7	4 2.4	200	0
	湧 別	4 3,3 9 1	1 6,0 5 6	2 7,3 3 5	6 3.0	10,128	1 6,9 7 1
	渚 滑	11,502	1,676	9,8 2 6	8 5.4	0	9,748
	幌 内	1 6,1 9 0	5,020	11,170	6 9.0	0	7,3 0 0
	本年度計	157,103	31,616	1 2 5,4 8 7	7 9.9	5 5,6 7 7	63,139
	前年度計	1 3 9, 3 7 1	2 4, 1 7 2	1 1 5,1 9 9	8 2.7	6 7,0 1 2	4 5, 4 8 9
根室	(ル サ)	1,072	96	976	9 1.0	971	0
	羅臼	1 3,0 2 8	1,1 3 2	1 1,8 9 6	9 1.3	0	1 1,8 4 1
	薫 別	3,939	454	3,4 8 5	8 8.5	0	3,2 5 5
	伊茶仁	2 7,2 3 2	3,5 3 6	2 3,6 9 6	8 7.0	0	23,072
	根 室	9,112	971	8,1 4 1	8 9.3	0	7,8 6 7
	中標準	8,210	1,280	6,930	8 4.4	0	6,915
	計根別	1 4,7 5 1	2,5 5 2	1 2,1 9 9	8 2.7	0	1 0, 5 5 7
	(床 丹)	2,2 0 0	218	. 1,982	9 0.1	1,9 3 9	0
	虹 別	47,027	4,8 6 7	42,160	8 9.7	0	42,100
	厚床	1,698	139	1,559	9 1.8	259	1,285
	浜 中	3,6 3 4	460	3,1 7 4	8 7.3	0	3,1 4 6
	(矢 臼 別)	2,0 0 0	400	1,600	8 0.0	1,572	0
	(穂 香)	406	2 3	383	94.3	380	0
	本年度計	1 3 4, 3 0 9	1 6,1 2 8	118,181	8 8.0	5.1 2 1	110,038
	前年度計	2 2 2,6 8 8	3 2,7 7 6	189,912	8 5.3	21,091	153,196

数	放流率	+4- >= 10 00	備
計 (0)	C/AX 100	放流期間	備 考
千尾 9,550	93.7	5. 1~5.2 0	
2 2,4 5 9	9 3.3	3.1 5~5.3 1	*
4,510	8 9.1	5.2 3~5.2 4	
7,800	8 3.8	3.2 0~5.2 0	
21,920	8 5.4	3. 5~5.2 0	
8,230	8 8.1	3. 1~5.19	
200	1 5.2	4.2 6~4.2 6	
2 7,0 9 9	6 2.5	4. 1~5.3 1	
9,7 4 8	8 4.8	4.1 7~5.1 5	
7,300	4 5.1	4. 1~5.3 1	
118,816	7 5.6	3. 1~5.3 1	
1 1 2,5 0 1	8 0.7	3.1 5~5.3 1	
971	9 0.6	4. 5~5.10	
1 1,8 4 1	9 0.9	5. 1~5.2 5	
3,2 5 5	8 2.6	5. 1~5.3 1	
2 3,0 7 2	8 4.7	4. 1~5.20	
7,867	8 6.3	5.1 5~5.2 4	
6,915	8 4.2	4.1 7~5.1 5	
1 0,5 5 7	7 1.6	4.27~5.31	
1,9 3 9	8 8.1	4.1 0~4.3 0	
4 2, 1 0 0	8 9.5	3. 1~5.20	
1,5 4 4	9 0.9	4.2 5~5.2 5	
3,1 4 6	8 6.6	4.20~5.20	
1,5 7 2	7 8.6	5.1 0~5.3 1	
380	9 3.6	5. 5 ~ 5. 9	
115,159	8 5.7	3. 1~5.3 1	
174,287	7 8.3	3.1 5~6.1 0	

		事 業	場	収容卵数	71: 50 14	ふ出尾数	ふ出率	放	流尾
支	場	(収容場)		(A)	死 卵 数	(B)	B/AX 100	無 紿 餌	給 餌
+	勝	(吨	戸)	千粒 1,1 4 3	千粒 152	千尾 991	8 6.7	千尾 954	千尾 0
		太	田.	10,441	1,583	8,8 5 8	8 4.8	8,695	0
		釧	路	3 9,1 1 4	3,414	+3 5,7 0 0	9 1.3	0	3 5, 3 8 8
		(茶	路)	1,226	179	1.0 4 7	8 5.4	0	1,0 0 0
		鶴	居	1 5,1 6 2	1,7 4 9	1 3,4 1 3	8 8.3	0	1 2.7 0 0
		(音	別)	2,914	3 3 1	2,5 8 3	8 8.6	0	2,5 0 0
		(厚	内)	1,7 2 8	2 2 0	1,5 0 8	8 7.3	0	1,400
		幕	別	31,561	5.0 3 4	26,527	8 4.0	0	2 5,1 0 0
		(利	別)	1,0 1 3	68	9 4 5	9 3.3	9 4 0	0
		札	内	46,260	7,8 7 0	38,390	8 3.0	0	3 3,1 4 8
		+	勝	1 3,3 0 2	2,4 4 3	1 0,8 5 9	8 1.6	0	1 0,0 0 0
		大	樹	6.039	1,018	5,0 2 1	8 3.1	0	5,000
		(広	尾)	6,2 7 1	1,1 0 7	5,164	8 2.3	0	5,1 6 0
		(猿	留)	1,938	210	1,7 2 8	8 9.2	1,720	0
		本年度	計	1 7 8,1 1 2	2 5, 3 7 8	1 5 2,7 3 4	8 5. 8	1 2,3 0 9	1 3 1,3 9 6
	Ĺ	前年度	計	2 4 5.9 8 8	3 7,4 6 3	208,525	8 4.8	2 4,7 7 0	1 6 4, 9 4 3
天	塩	徳 志	别	7,3 9 6	388	7,0 0 8	9 4.8	0	6,6 0 0
		歌	登	4,4 1 6	301	4,115	9 3.2	0	3,8 7 0
		頓	别	4,857	204	4,6 5 3	9 5.8	0	3,7 0 0
		(鬼 志	别)	2,208	979	1,229	5 5.7	1,100	. 0
		(船)	泊)	236	30	206	8 7.3	150	0
		(增	幌)	110	2	108	98.2	8 6	0
		天 .	塩	2,5 0 4	193	2,3 1 1	9 2.3	0	2,1 3 0
		中	Ш	9,419	881	8,5 3 8	9 0.6	0	4,4 0 0
		(信	砂)	7,720	900	6,8 2 0	8 8.3	0	6,000
		(暑寒	別)	2,1 4 5	180	1,965	9 1.6	.0	1,8 5 0
		本年度	計	4 1,0 1 1	4,058	3 6,9 5 3	9 0.1	1,3 3 6	2 8,5 5 0
		前年度	計	2 1,5 4 2	4,0 5 8	1 7,4 8 4	8 1.2	973	. 15,541

数	放 流 率 C/A×	放 流 期 間	備	考
計 (c) 千尾	100			
954	8 3.5	4. 1~5.3 1		
8,695	8 3.3	4.1 2~5.3 1		
3 5,3 8 8	9 0.5	4. 9~5.1 6		
1,000	8 1.6	5.1 2~5.3 1		
1 2,7 0 0	8 3.8	3.2 0~ 5.1 5		
2,500	8 5.8	5.1 2~5.3 1		
1,400	8 1.0	4.1 2~4.2 7		
2 5,1 0 0	7 9.5	2.1 5~ 4.3 0		
9 4 0	9 2.8	3.2 0~4.3 0		
3 3,1 4 8	7 1.7	2.1 5~4.2 5		
1 0,0 0 0	7 5.2	4. 1~5.20	\	
5,0 0 0	8 2.8	4.2 0~4.3 0	,	
5,1 6 0	8 2.3	4.10~5.20		
1,7 2 0	8 8.8	4.1 5~4.3 0	,	
1 4 3,7 0 5	8 0.7	2.1 5~5.3 1		
189,713	7 7.1	3.20~6.20		
6,600	8 9.2	4. 1~5.31		
3,8 7 0	8 7.6	3.1 5~5.1 5		
3,700	7 6.2	4.1 5~5.1 2		
1,100	4 9.8	6. 1~6. 1		
150	6 3.6	5. 4~5.15	**	
8 6	7 8. 2	6.30~6.30		
2,1 3 0	8 5.1	4. 1~5.21		*
4.4 0 0	4 6.7	4.2 0~4.3 0		
6,0 0 0	7 7.7	6. 6~6.20		
1,8 5 0	8 6.2	5.10~6.10		
2 9,8 8 6	7 2.9	3.1 5~6.3 0		
1 6,5 1 4	7 6.7	3.75~5.31		

	I ED	事	業	場	収容卵数	TI: 60 W/	ふ出尾数	多出率	龙	流尾
支	場	(4	又容場	易)	(A)	死 卵 数	(B)	B/AX 100	無給餌	給 餌
干	歳	(厚		田)	千粒 200	千粒 54	千尾 146	% 7 3.0	千尾 139	千尾 0
		Ŧ		オ	1 7,2 3 7	3,6 5 6	1 3,5 8 1	7 8.8	3,8 0 5	8,775
		(余		市)	4,684	904	3,7 8 0	8 0.7	0	3,4 6 9
		(美		国)	1,0 2 0	2 4 5	775	7 6.0	0	745
		(歌		别)	3 6 0	6 0	300	8 3.3	287	0
		沅	浦	河)	6,6 1 9	990	5,6 2 9	8 5.0	2,1 9 5	3,3 6 5
		静		内	7,0 7 7	1,0 2 5	6,0 5 2	8 5.5	0	4,904
		(富		111)	4 2 6	4 1	3 8 5	9 0.4	385	.0
		敷		生	8,2 3 4	2,0 7 4	6,160	7 4.8	1,480	4.4 7 0
		本	年度	計	4 5,8 5 7	9,049	3 6,8 0 8	8 0.3	8,2 9 1	2 5,7 2 8
		前	年度	計	5 5,1 0 3	9,7 0 7	4 5, 3 9 6	8 2.4	7,387	3 1,1 7 4
渡	島	尻		別	1,834	3 8 5	1,4 4 9	7 9.0	1,3 1 5	0
		利		別	2,902	288	2,6 1 4	9 0.1	0	2,5 4 5
		厚	沢	部	3,8 8 0	357	3,5 2 3	9 0.8	420	2,8 5 0
		(天		Ø)	700	2 3	6 7 7	9 6. 7	600	0
		(貫	気	别)	2 2	9	1 3	5 9.1	1 2	0
		八		雲	9,3 8 0	1,207	8,1 7 3	8 7.1	2,0 5 0	5,773
		(森)	1 1,5 8 1	2,4 6 4	9,117	7 8.7	0	6,9 5-0
		(尻	岸	内)	150	2 1	129	8 6.0	120	0
		(沙		泊)	936	186	7 5 0	8 0.1	680	0
		(有		111)	1,718	308	1,4 1 0	8 2.1	1,3 5 0	0
		(茂	辺	地)	1 0, 2 9 5	1,289	9,006	8 7.5	8,620	. 0
		(亀		Ш)	6 5 1	105	5 4 6	8 3.9	500	0
		(知		内	5 6 9	104	4 6 5	8 1.7	4 3 5	0
		本	年度	計	4 4,6 1 8	6,7 4 6	37,872		1 6,1 0 2	1 8,1 1 8
		前生	年 度	計	63,959	1 5,5 5 3	48,406	7 5.7	19,138	2 5,2 7 2
合	計	本生	年度	計	601,010	9 2,9 7 5	5 0 8,0 3 5	8 4.5	9 8,8 3 6	3 7 6,9 6 9
erit.	14 [前:	年度	計	7 4 8,6 5 1	1 2 3,7 0 9	6 2 4,9 4 2	8 3.5	1 4 0, 3 7 1	4 3 5, 6 1 5

数	放 流 率		1
計 (c)	C/A× 100	放流期間	備考
千尾 139	6 9.5	4. 4~5. 8	
1 2,5 8 0	7 3.0	2.2 8~5.1 0	
3,4 6 9	7 4.1	4.20~5.25	
7 4 5	7 3.0	5.2 8~5.2 8	
287	7 9.7	3.1 0~4.1 7	
5,560	8 4.0	3.20~4.28	
4.9 0 4	6 9.3	4. 5~5.1 5	
3 8 5	9 0.4	4. 1~5. 8	
5,950	7 2.3	3. 1~4.20	
34,019	7 4.2	2.28~5.28	
38,561	6 8.5	3. 1~5.2 7	
1,3 1 5	7 1.7	4.1 5~5.2 3	*
2,5 4 5	8 7.7	2. 1~4.20	
3,2 7 0	8 4.3	2. 1~4.30	
6 0 0	9 6.0	4.1 4~ 5.2 0	
1 2	5 4.5	4.10~4.10	,
7,8 2 3	8 3.4	3.10~5.15	
6,9 5 0	6 0.1	3.22~4.24	
120	8 0.0	2.1 0~2.1 0	
680	7 2.6	3.15~4.30	
1,3 5 0	7 8.6	3.20~4.20	
8,6 2 0	8 3.7	2.25~3.31	
5 0 0	7 6,8	3. 5~3.3 1	
4 3 5 =	7 6.4	3.1 5~4.1 5	
3 4,2 2 0		2. 1~5.23	
4 4, 4 1 0	7 0.4	3. 3~5.24	
475,805	7 9.2	2. 1~6.30	
5 7 5,9 8 6	769	3. 1~6.1 5	

さけ稚魚の標識放流について、放流時異による回帰効果の確認などの目的によつて千歳川、遊楽部川でで実施した。なお優良品種の育成による回帰効果の確認の目的で網走川でも実施した。その概要は第16表のとおりである。

第16表 さけ稚魚標識放流

/.			и: аа			標		識
魚	種	河川名	放 流 期 間	尾 数	部 位	給餌 有無	魚体	月 的
				(千尾)			(9)	1
3	(†	千才	4 8.2.2 0~3. 6	200	脂ピレ	有	0.3 4~0.5 1	同一発生群権思の放
		"	4.8.3.2 9	2 1 1	左腹ピレ	有	0.74	流時期の相異による 回帰効果
		"	4 8.4.1 7~4.2 4	200	右腹ビレ	有	0.8 6	
		網走	48.5. 8~5.12	9 1	左腹ビレ	_	0.3 7	降下時期の差異による回帰効果
		"	4 8.5.2 8~5.3 0	8 0	-	-	0.7 6	
		遊楽部	48.4. 9	5 0	脂ピレ・ 右腹ピレ	有	0.4~0.47	(5年魚×) 5年魚) 優良品種
		"	48.4. 9~4.23	5 0	脂ピレ・ 左腹ピレ	有	0.3	(3年魚× の育成 3年魚)

§ 8. ます増殖事業

1 捕獲採卵成績概要

O さくらます

本年度は、25水系、25捕獲・採卵場で、47年5月1日から10月31日まで実施し10,830 尾(うち、雌7,459尾、雌比率68.9%)の親魚を捕獲し、蓄養中のへい死魚を除き6,094尾 の雌から10,768千粒の種卵を採卵した。(雌親魚使用率81.7%)

10,260千粒の種卵を,15事業場と民営3ケ所の計18のふ化場に収容し,給餌稚魚4,199千尾(給餌放流率60.0%),無給餌稚魚2,803千尾の合計7,002千尾(他にさくらます資源拡大再生産事業用292千尾)の稚魚を生産し,(稚魚生産率68.2%),48年1月1日から同年6月30日にかけて,全道20水系へ放流した。

とのほかに、さくらます資源拡大再生産事業用として、292千尾を千歳事業場において、飼育 管理中である。

なお、本種は、我が国初の海外移殖用種卵として、渡島支場尻別事業場より、チリ国コチャイケ地区へ159千粒(生卵150千粒)の発眼卵を供給した。これらは、チリ国の要請によりとり行なわれた。チリ国での放流は、1973年(848)1月4日、サイノー吸収後無給餌稚魚として シンプソン川水系クラロ川へ85千尾が放流された。

○ からふとます

本年度は、41水系、43捕獲・採卵場で47年5月1日から10月31日まで実施し、50.476 尾(うち、雌22.226尾、雌比率44.0%)の親魚を捕獲し、蓄養中のへい死魚等を除き18.159 尾の雌から、23.750千粒の種卵を採卵した。雌親魚使用率81.7%)

23,394千粒の種卵を17事業場と民営5ヶ所の計22のふ化場に収容し、給餌稚魚10,197 千尾(給餌放流率50.0%),無給餌稚魚10,193千尾の合計20,390千尾の稚魚を生産して (稚魚生産率87.2%)48年1月1日から、同年6月15日にかけて、全道24水系へ放流した。


事業計画と実績ならびに前年度との比較


第1表 さくらます

15	7		,		E	昭 利] 4	7 4	王 "度		昭和	4 6 年度	前年	度との	の対比	
. 12	×		2.	7	計画	数	実	績	達成	军 %	実	績	増	減	Δ	
捕	獲	数		尾	1 6,3	0.0	1 0	830	(6.4		6,9 4 0		3,8	90	
採	卵	数	千	粒	1 8,7	2 7	1 0	768		7.5		6,673		4,0	95	
放	流	数	千	尾	1 5,7	3 2	7	002	4	4.5		4,809		2,4	1 3	

第2表 からふとます

-	7					В	召	和	4	7	年	度			昭和	□ 4	6年	度	前年	度と	0	対比
[2	_		5.		計	画	数	T	実	績	j	達成率	5	%	実			績	増	海	ጲ	
捕	獲	数		尾	4	5,2	0 0		5 0,	476		1	1 1.	.7		2 7	3,7	3 3	Δ	2 2	3,2	5 7
採	卵	数	千	粒	2	4,7	0 1		2 3,	750			9 6.	.1		1 7	2,3	3 2		1 4	8,5	8 2
放	流	数	千	尾	2	1,0	2 5		20,	3 9 0		1	9 7.	.0		1 3	9,6	8 7		1 1	9,2	9 7





第3表 昭和47年度海区別さくらます事業成績集計表

						,
項			捕	獲	採卵	成
海目	捕	獲	数	0 14 11	♀親魚	♀親魚
区	· · ·	â	計	♀性比	使用数	使用率
	尾	尾	尾	%	尾	%
オホーツク海区	2,9 9 1	1,2 7 6	4,267	7 0.0	2,2 5 9	7 5.5
日本海区	1,3 9 7	7 5 9	2,1 5 6	6 4.8	1,3 2 6	9 4.9
根室海区	3,0 7 1	1,3 3 6	4,407	6 9.7	2,5 0 9	8 1.7
襟裳以東海区	0	0	0	0	0	. 0
襟裳以西海区	0	0	0	0	0	. 0
合 計	7,4 5 9	3,3 7 1	1 0,8 3 0	6 8.9	6,0 9 4	8 1.7
前年度	4,683	2,2 5 7	6,9 4 0	6 7.5	3,753	8 0.1

第4表 昭和47年度支場別さくらます事業成績集計表

	項	į .			捕	獲	採卵	成
支		目	捕	獲	数	♀性比	♀ 親 魚	♀ 親 魚
	場		Ş	ô	計	+ 1 1	使用数	使用率
			尾	尾	尾	%	尾	%
北	見	支 場	1,1 5 5	671	1,8 2 6	6 3.3	773	6 6.9
根	室	支 場	3,0 7 1	1,3 3 6	4,407	6 9.7	2,5 0 9	8 1.7
+	勝	支 場	0	0	0	0	0	0
天	塩	支 場	1,970	688	2,658	7 4.1	1,5 9 8	8 1.2
千	歳	支 場	4 8	2 1	6 9	6 9.6	4	8.3
渡	島	支 場	1,2 1 5	6 5 5	1,8 7 0	6 5.0	1,2 1 0	9 9.6
合	ì	計	7,459	3,3 7 1	1 0,8 3 0	6 8.9	6,0 9 4	. 8 1.7
前	年	度	4,683	2,2 5 7	6,9 4 0	6 7.5	3,753	8 0.1

註:()は、サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ

績			*:	ふ 化	放 流	成績	
平均採卵数	採卵数	実 施 期 間	収容卵数	ふ出尾数	ふ出 率	放流尾数	放流期間
粒	千粒		千粒	千尾	%	千尾	
1,4 3 5	3,2 4 2	5.1~1 0.1 5	2,4 7 1	2,1 2 6	8 6.0	1,9 1 3	1.1~5.3
2,4 1 0	3,1 9 7	5.1~1 0.3 1	3,4 3 3	2,8 9 7	8 4.4	1,5 7 6	5.1~6.3
1,7 2 5	4,3 2 9	6.1~1 0.1 0	4,3 2 9	3,7 7 7	8 7.2	3,493	1 2.3~5.2
0	0		0	0	0	0	
0	0		2 7	2 4	8 8.9	20	4.1~4.3
1,7 6 7	1 0,7 6 8	5.1~1 0.3 1	1 0,2 6 0	8,8 2 4	8 6.0	7,0 0 2	1 2.3~6.3
1,780	6,6 7 3	5.1~1 0.3 1	6,4 1 6	5,8 4 1	9 1.0	4,8 0-9	1.1~6.2

績			-	\$ 1L	放 流	成績	
平均採卵数	採卵数	実 施期 間	収容卵数	ふ出尾数	ふ出 率	放流尾数	放流期間
粒	千粒		千粒	千尾	%	千尾	
1,5 5 4	1,201	5.1~1 0.6	976	8 3 4	8 5.5	8 1 3	1.1~4.3 0
1,725	4,329	6.1~1 0.1 0	4,3 2 9	3,777	8 7.2	3,4 9 3	1 2.3~5.2 5
0	0	~	0	0	. 0	0	
1,411	2,2 5 4	5.1~1 0.3 1	1,7 0 8	1,463	8 5.7	1,2 2 6	5.1~6.30
2,7 5 0	11	8.1 6~9.3 0	433	389	8 9.8	(292)	1.9~
2,4 5 7	2,9 7 3	8.2 1~ 1 0.1 0	2,8 1 4	2,3 6 1	8 3.9	1,4 7 0	4.3 0~5.2 3
1,767	1 0,7 6 8	5.1~1 0.3 1	1 0,2 6 0	8,8 2 4	8 6.0	7,002	1 2.3~6.3 0
1,7 8 0	6,6 7 3	5.1~1 0.3 1	6,4 1.6	5,8 4 1	9 1.1	4,809	1.1~5.3 1

第5表 昭和47年度海区別からふとます事業成績集計表

項			捕	獲	採 卵	成
海目	捕	獲	数	0 141 114	♀ 親 魚	♀親魚
区	Ş	â	計	9性比	使 用 数	使用率
	尾	尾	尾	%	尾	%
オホーツク海区	1 6,3 9 5	1 8,7 0 8	3 5,1 0 3	4 6.8	1 4,1 2 2	8 6.1
日本海区	3 9	5 9	9 8	3 9.8	2 2	5 6.4
根室海区	3,9 0 4	7,3 7 4	1 1,2 7 8	3 4.6	2,7 4 5	7 0.3
襟裳以東海区	1 4 5	190	3 3 5	4 3.3	1 2 8	8 8.3
襟裳以西海区	1,7 4 3	1,9 1 9	3,6 6 2	4 7.6	1,1 4 2	6 5.5
合 計	2 2,2 2 6	2 8,2 5 0	5 0,4 7 6	4 4.0	1 8,1 5 9	8 1.7
前年度	1 3 8,6 2 8	1 3 5,1 0 5	273,733	5 0.6	1 2 3,3 0 8	8 8.9

第6表 昭和47年度支場別からふとます事業成績集計表

1		項				捕	獲	採卵	成
海			目	捕	獲	数	0 14 11	♀ 親 魚	♀ 親 魚
	区		/	Q	8	計	9性比	使用数	使用率
				尾	尾	尾	%	尾	%
北	見	支	場・	1 5,6 5 5	1 7,7 1 5	3 3,3 7 0	4 6.9	1 3,5 9 6	8 6.8
根	室	支	場	3,9 0 4	7,3 7 4	1 1,2 7 8	3 4.6	2,7 4 5	7 0.3
+	勝	支	場	1 4 5	190	3 3 5	4 3.3	1 2 8	8 8.3
天	塩	支	場	7 7 9	1,0 5 2	1,8 3 1	4 2.5	5 4 8	7 0.3
千	歳	支	場	2 6	1 1 6	1 4 2	1 8.3	0	. 0
渡	島	支	場	1,7 1 7	1,8 0 3	3,5 2 0	4 8.8	1,1 4 2	6 6.5
合		i	it	2 2,2 2 6	2 8,2 5 0	5 0,4 7 6	4 4.0	1 8,1 5 9	8 1.7
前	左	F B	度	1 3 8,6 2 8	1 3 5,1 0 5	273,733	5 0.6	1 2 3,3 0 8	8 8.9

績				ふ化	放 流	成 績	
平均採卵数	採卵数	実 施 期 間	収容卵数	ふ出尾数	ふ出 率	放流尾数	放流期間
粒	千粒		千粒	千尾	%	千尾	
1,3 6 0	1 9,2 1 1	7.1~1 0.3 1	1 3,3 5 7	1 2,0 6 3	9 0.3	1 1,7 1 0	2.1 2~5.8
1,3 6 4	3 0	5.1~1 0.3 1	3,0 3 9	2,8 4 0	9 3.5	2,6 4 5	5.1~6.1
1,1 4 5	3,1 4 3	6.1~1 0.2 1	4,0 7 0	3,5 2 5	8 6.6	3,4 6 8	1.1~5.2
1,210	155	8.1~ 9.3 0	1 5 5	1 2 0	7.7.4	1 0 5	3.2 0~3.3
1,060	1,2 1 1	7.3~1 0.3 1	2,7 7 3	2,5 4 8	9 1.9	2,462	2.2 3~5.1
1,3 0 8	2 3,7 5 0	5.1~1 0.3 1	2 3,3 9 4	2 1,0 9 6	9 0.2	2 0,3 9 0	1.1~6.1
1,4 0 0	1 7 2,3 3 2	5.21~ 11.20	172,292	1 4 4,8 4 6	8 4.1	1 3 9,6 8 7	1.20~6.2

績	MI			ふ化	放 流	成 績	4 () - ()
平均採卵数	採卵数	実 施 期 間	収容卵数	ふ出尾数	ふ出率	放流尾数	放流期間
粒	千粒		千粒	千尾	%	千尾	
1,3 7 0	1 8,6 3 4	7.1~1 0.3 1	1 2,7 8 0	1 1,5 5 8	9 0.4	1 1,2 4 0	2.1 2~5.8
1,1 4 5	3,1 4 3	6.1~1 0.2 1	4,070	3,5 2 5	8 6.6	3,468	1.1~5.25
1,211	155	8.1~9.30	155	120	7 7.4	105	3.20~3.31
1,108	607	5.1~1 0.3 1	3,616	3,3 4 5	9 2.5	3,1 1 5	4.1~6.15
0	0	8.1~	918	850	9 2.6	800	2.2 3~2.2 4
1,0 6 0	1,2 1 1.	7.3~1 0.1 9	1,855	1,6 9 8	9 1.5	1,662	4.1~5.10
1,308	2 3,7 5 0	5.1~1 0.3 1	2 3,3 9 4	2 1,0 9 6	9 0.2	20,390	1.1~6.1 5
1,400	172,332	5.21~ 11.20	1 7 2,2 9 2	1 4 4,8 4 6	8 4.1	1 3 9,6 8 7	1.20~6.20

第7表 昭和47年度海区・水系別さくらます親魚捕獲・採卵成績表

V=17	-14		77	捕	i	獲	所		管	捕	獲	数	使
海区	水		ボ	採	卵	場	事	業	場	Ş	ð	āt	Ş
	ル	シ	ヤ	N	シ	ヤ	岩	尾	別	尾 0	尾 0	0	尾 0
オ	岩	尾	別	岩	尾	別		"		7 8	3 1	109	7.7
ホ	斜		里	斜		里	斜		里	708	436	1.1 4 4	3 8 4
1	渚		滑	渚		滑	渚		滑	3 6 9	204	573	3 1 2
ッ	藻	興	部	藻	興	部		"		0	0	0	0
	徳	志	別	徳	志	别	徳	志	別	1,0 4 9	3 8 2	1,431	8 5 9
2	北!	見帳	别	北」	見帧	見別	歌		登	775	2 1 6	791	627
海	知	来	別	知	来	别	頓		別	1 2	7	1 9	0
区	海	区	計	本	年	度				2,9 9 1	1,2 7 6	4,2 6 7	2,259
	114		H	前	年	度			,	1,9 8 3	1,1 1 5	3,0 9 8	1,4 7 0
	増		幌	増		幌	中		Ш	1 1	2	1 3	1 1
日	天		塩	下	中	Ш		"		2 6	3 4	6 0	2 1
	遠		別	遠		別		"		1 5	0	. 1 5	3
本	信		砂	信		砂	天		塩	8 2	4 7	1 2 9	7 7
	石		狩	西		越	干		才	4 8	2 1	6 9	4
海	尻		别	名		駒	尻		別	1,2 1 5	655	1,8 7 0	1,210
	朱		太	朱		太		//		0	0	0	0
区	海	X	計	本	年	度				1,3 9 7	759	2,1 5 6	1,3 2 6
	11-3-	12	D1	前	年	度				6 6 9	198	8 6 7	5 5 4
根	忠		類	忠		類	伊	茶	仁	6	2	8	4
室	伊	茶	仁	伊	茶	仁		//		1 2	5	1 7	1 0
海	標		津	標		津	根		室	1,5 1 9	431	1,950	1,186
区	当		幌	当		幌	計	根	別	6 2	4 7	109	6 0

用親魚	、数	採卵数	抽油品料	仮収容卵数	♀ 親 魚	平均	実 施 期 日
ð	計	1木 別 数	产目仍认为7分X	以水石卯级	使用率	採卵数	実施期日
尾 0	尾 0	千粒 0	千粒	千粒 0	% 0.0	粒 0	5. 1~ 8.3 1
2 5	102	1 4 4		1 4 4	9 8.7	1,8 7 0	6. 1~ 9.26
160	5 4 4	6 2 7		6 2 7	5 4.2	1,6 3 3	5. 1~ 9.19
7 0	3 8 2	4 3 0		4 3 0	8 4.6	1,3 7 8	5.22~10.6
0	0	0		0	0.0	0	5. 1~1 0.15
2 4 4	1,103	1,3 4 1		1,3 4 1	8 1.9	1,5 6 1	5.26~ 9.30
185	8 1 2	700		700	8 0.9	1,1 1 6	5.21~ 9.30
0	0	0		0	0.0	0	7.1 0~ 8.3 1
684	2,9 4 3	3,2 4 2		3,2 4 2	7 5.5	1,4 3 5	5. 1~1 0.1 5
6 4 0	2,1 1 0	2,4 4 7		2,4 4 7	7 4.1	1,660	5. 1~1 0.1 5
2	1 3	1 3		1 3	1 0 0.0	1,1 8 2	7.21~ 9.30
8	2 9	4 3		4 3	8 0.8	2,0 4 8	9. 1~ 9.30
0	3	7		7	2 0.0	2,3 3 3	6. 2~ 9.23
47	124	1 5 0		150	9 3.9	1,9 4 8	5. 1~1 0.3 1
2	6	. 11	*	1 1	8.3	2,7 5 0	8. 3~ 9.30
6 5 5	1,8 6 5	2,9 7 3		2,973	9 9.6	2,4 5 7	5. 1~1 0.1 0
0	0	0		0	0.0	0	9. 1~1 0.20
7 1 4	2,0 4 0	3,1 9 7		3,197	9 4.9	2,4 1 0	5. 1~1 0.3 1
1 2 5	679	1,2 3 1		1,2 3 1	8 2.8	2,2 2 0	5. 1~1 0.31
2	6	7		7	6 6.7	1,7 5 0	6.1 1~1 0.1 0
3	1 3	1 7		1 7	8 3.3	1,700	6. 1~1 0.1 0
3 3 6	1,5 2 2	2,0 1 1		2,0 1 1	7 8.1	1,696	6.2 1~1 0.1 0
4 6	106	112		112	9 6.8	1,8 6 7	6. 1~ 9.30

				捕		獲	所		管	捕	獲	数	使
海区	水		系	採	卵	場	事	業	場	· · · · · · · · · · · ·	8	計	9
										尾	尾	尾	尾
	春		別	春		別	計	根	別	3 0	1 2	4 2	3 0
根	床		丹	床		丹		"		2 6	8	3 4	2 6
	西		別	西		別	虹		别	467	2 2 8	6 9 5	4 2 6
室	矢	白	別	矢	白	別	浜		中	5 7	4 6	103	1 2
海	風		蓮	風		蓮		//		3 2 3	1 3 3	4 5 6	189
100	別	当	賀	別	当	賀	厚		床	5 6 9	4 2 4	993	5 6 6
区				本	年	度	4	ij.		3,0 7 1	1,3 3 6	4,4 0 7	2,5 0 9
	海	区	計	前	年	度				2,0 1 3	9 3 9	2,9 5 2	1,7 2 2
襟海				Ĭ.	7		1		1				
裳以				本	年	度		Ļ'n	l,	0	0	0	0
西区	海	X	計	前	年	度				18	5	2 3	7
	-		5.1	本	年	度				7,4 5 9	3,3 7 1	1 0,8 3 0	6,0 9 4
合		Î	H	前	年	度		7		4,683	2,2 5 7	6,9 4 0	3,7 5 3

用 親 魚	数数	to on #4	1 4 444	/Ethada do#h	♀ 親 魚	平均	c # # # n
ô	計	採卵釵	增減卵数	仮収容卵数	使用率	採卵数	実 施 期 日
尾	尾	千粒	千粒	千粒	%	粒	*
1 2	4 2	6 2	. *	6 2	1 0 0.0	2,0 6 7	6. 1 ~ 9.3
8	3 4	6.5		6.5	1 0 0.0	2,5 0 0	6. 1 ~ 9.3 (
199	6 2 5	1,0 3 9		1,0 3 9	9 1.2	2,4 3 9	6.10 ~ 9.3
8	2 0	2 3		23	2 1.1	1,9 1 7	6.1 1 ~ 9.2
6 6	255	386	1	386	5 8.5	2,0 4 2	6.1 1 ~ 9.2
4 1 8	984	607		607	9 9.5	1,0 7 2	7. 1 ~ 9.3
1,0 9 8	3,607	4,3 2 9		4,3 2 9	8 1.7	1,7 2 5	6. 1~10.1
709	2,431	2,9 7 9		2,9 7 9	8 5.5	1,7 3 0	5.21 ~ 1 0.1
- 33							
0	0	0		0	0	0	
3	10	16		16	3 8.9	2,2 9 0	7. 1 ~ 1 0.2
2,4 9 6	8,5 9 0	1 0,7 6 8		1 0,7 6 8	8 1.7	1,7 6 7	5. 1 ~ 1 0.3
1,477	5,230	6,6 7 3	4 1 4	6,6 7 3	8 0.1	1,780	5. 1 ~ 1 0.3

第8表 昭和47年度支・事業場別さくらます親魚捕獲・採卵成績表

+ 40	nir	**	10	捕	獲	数	使	用 親 魚	数
支 場		業	物	φ	8	計	φ	8	計
dt.	岩	尾	別	78	尾 31	尾 109	尾 77	尾 25	尾 102
北見支場	斜		里	708	4 3 6	1,1 4 4	384	1 6 0	5 4 4
場	渚		滑	3 6 9	204	5 7 3	3 1 2	7 0	3 8 2
21.	本	年	度	1,1 5 5	671	1,8 2 6	773	2 5 5	1,0 2 8
計	前	年	度	1,7 4 2	1,0 7 3	2,8 1 5	1,3 5 9	610	1,969
	伊	茶	仁	1 8	7	2 5	1 4	5 .	19
根	根		室	1,5 1 9	. 431	1,9 5 0	1,186	3 3 6	1,5 2 2
室	計	根	別	118	6 7	185	116	6 6	182
支	虹		別	4 6 7	2 2 8	6 9 5	4 2 6	199	6 2 5
場	浜		中	380	179	5 5 9	201	7 4	275
	厚		床	5 6 9	4 2 4	993	5 6 6	418	984
=1	本	年	度	3,0 7 1	1,3 3 6	4,407	2,5 0 9	1,0 9 8	3,607
計	前	年	度	2,0 1 3	9 3 9	2,9 5 2	1,7 2 2	709	2,4 3 1
14	徳	志	別	1,0 4 7	3 8 2	1,431	8 5 9	2 4 4	1,1 0 3
天	歌		登	775	216	991	6 2 7	185	8 1 2
塩	頓		別	1 2	7	1 9	0	0	0
支	中		Ш	5 2	3 6	8 8	3 5	1 0	4 5
場	天		塩	8 2	4 7	1 2 9	7 7	4 7	1 2 4
ē.L	本	年	度	1,9 7 0	688	2,6 5 8	1,5 9 8	486	2,0 8 4
計	前	年	度	405	9 5	5 0 0	2 4 1	6 6	307
F才支場	干		才	4 8	2 1	6 9	4	2	6
=1	本	年	度	4 8	2 1	6 9	4	2	6
計	前	年	度	101	7 0	7 1	3 1	1 6	4 7
* p +-10	尻		別	1,2 1 5	6 5 5	1,8 7 0	1,210	6 5 5	1,865
度島支場	八		雲	0	0	0	0	0	0
- L	本	年	度	1,2 1 5	6 5 5	1,8 7 0	1,210	6 5 5	1,8 6 5
計	前	年	度	422	8 0	5 0 2	4 0 0	7 6	476
A =1	本	年	度	7,4 5 9	3,3 7 1	1 0,8 3 0	6,0 9 4	2,4 9 6	8,5 9 0
合 計	前	年	度	4,683	2,2 5 7	6,9 4 0	3,753	1,477	5,230

採 卵 数	增減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚 使 用 率	平均採卵数	実 施 期 間
千粒	千粒	千粒	%	粒	6. 1 ~ 9.2 6
1 4 4		1 4 4	9 8.7	1,8 7 0	
6 2 7		6 2 7	5 4.2	1,6 3 3	5. 1~ 9.1 6
4 3 0		4 3 0	8 4.6	1,3 7 8	5. 2~10. 6
1,2 0 1		1,2 0 1	6 6.9	1,5 5 4	5. 1~10. 6
2,2 8 1		2,2 8 1	7 8.0	1,6 8 0	5. 1~10.11
2 4		2 4	7 7.7	_ 1,7 1 4	6. 1 ~ 1 0.1 0
2,0 1 1		2,0 1 1	7 8.1	1,696	6.2 1 ~ 1 0.1 0
239		2 3 9	9 8.3	2,0 6 0	6. 1~10.10
1,0 3 9		1,039	9 1.2	2,4 3 9	6.10 ~ 9.30
407		407	5 2.9	2,0 3 4	6.11~ 9.29
607		607	9 9.5	1,0 7 2	7. 1~10.10
4,3 2 9		4,3 2 9	8 1.7	1,7 2 5	6. 1~10.10
2,9 7 9		2,9 7 9	8 5.5	1,730	5.2 1 ~ 1 0.1 0
1,3 4 1		1,3 4 1	8 1.9	1,5 6 1	5.26~ 9.30
700		700	8 0.9	1,1 1 6	5.21~ 9.30
0		0	0	0	7.1 0 ~ 8.3 1
6 3		6 3	6 7.3	1,800	6. 2~ 9.30
150		150	9 3.9	1,948	5. 1 ~ 1 0.3 I
2,2 5 4		2,2 5 4	8 1.2	1,411	5. 1 ~ 1 0.3 I
		4 3 9	5 9.5	1,8 2 0	5. 1 ~ 1 0.3 1
439	4	11	8.3	2,7 5 0	8.16~ 9.30
11		 	-	2,7 5 0	8.16~ 9.30
11		7 2	3.0.7	2,3 2 0	7. 1~10.20
7 2			3 0.7		8.2 1 ~ 1 0.1 (
2,9 7 3		2,9 7 3	9 9.6	2,4 5 7	0.21 - 10.10
0	2	0	0	0	0.01
2,9 7 3	-	2,973	9 9.6	2,4 5 7	8.21 ~ 1 0.1 (
902		902	9 4.8	2,2 6 0	8.2 1 ~ 1 0.1
1 0,7 6 8		1 0,7 6 8	8 1.7	1,767	5. 1 ~ 1 0.3
6,6 7 3	*	6,673	8 0.1	1,780	5. 1 ∼ 1 0.3

第9表 昭和47年度海区・水系別からふとます親魚捕獲採卵成績表

			_	捕		獲	所		管	捕	獲	数	使
海区	水		系	採	卵	場	事	業	場	Q	8	計	ę
	ル	シ	ヤ	ル	シ	ヤ	岩	尾	別	尾 430	尾 435	尾 865	尾 0
	岩	尾	别	岩	尾	別		//		6,1 0 0	8,0 0 0	1 4,1 0 0	6,0 9 7
オ	奥	蘗	別	奥	蘂	別	斜		里	3 6 7	1 1 6	483	3 5 3
	斜		里	斜		里		//		5,6 3 8	4,7 6 2	1 0,4 0 0	4,627
ホ	藻		琴	藻		睪	藻		琴	1 0	2	1 2	0
	網		走	網		走	網		走	4 3	8 9	1 3 2	3 9
1	常		呂	常		呂	北		見	772	1,0 9 9	1,8 7 1	5 5 4
	湧		別	湧		別	湧		別	1,1 0 2	1,8 3 5	2,9 3 7	9 5 0
ッ	渚		滑	渚		滑	渚		滑	5 7 4	871	1,4 4 5	476
	藻	與	部	藻	興	部		//		3 9	4 9	8 8	1 5
2	雄		武	雄		武	幌		内	111	151	262	7 7
	幌		内	幌		内		//		469	3 0 6	775	408
海	徳	志	別	徳	志	別	徳	志	別	5 4 9	8 4 3	1,3 9 2	3 8 2
	北.	見帧	別	北。	見帧	見別	歌		登	5 8	7 7	1 3 5	4 7
区	頓		別	頓		別	頓		別	1 2 5	6 4	189	9 7
	猿		払	猿		払		"		2	2	4	0
	知	来	別	知	来	別		"		6	7	1 3	0
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			本	年	度				1 6,3 9 5	1 8,7 0 8	3 5,1 0 3	1 4,1 2 2
	海	区	計	前	年	度				1 2 2,3 4 1	1 1 0,5 9 0	2 3 2,9 3 1	1 0 9,2 8 1
	増		幌	増		幌	中		Ш	2 0	2 5	4 5	2 0
日	天		塩	天		塩	天		塩	2	2	4	0
				下	中	Ш	中		Щ	0	4	4	0
本	小		計							2	6	8	0
	ホ	ロナ	- 1	船		舶	天		塩	1	3	4	1
海	遠		別	遠		別	中		Ш	1 5	2 5	4 0	0
	信		砂	信		砂	天		塩	. 1	0	1	1
X	V-	-	=1	本	年	度				3 9	5 9	98	2 2
	海	X	計	前	年	度				1,7 0 2	1,8 2 9	3,5 3 1	1,1 8 1

	- 44			<u> </u>	0 70 4	77 44	
用親魚	魚 数	採卵数	増減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚	平均	実 施 期 日
ð	計				使用率	採卵数	
尾 0	尾 0	千粒 0	千粒	千粒 0	0.0	粒 0	7. 1 ~ 1 1.1 5
899	6,9 9 6	8,6 1 0		8,6.1.0	9 9.9	1,4 1 2	7. 1 ~ 1 0.3 1
	3 5 3	475		4 7 5	9 6.2	1,3 4 6	9. 1 ~ 1 0.1 1
1,4 1 5	6,0 4 2	6,3 9 7		6,3 9 7	8 2.1	1,383	7. 1 ~ 1 0.1 4
0	0	0	-	. 0	0.0	0	9. 1 ~ 1 0.1 4
3 0	6 9	3 8	-	3 8	9 0.7	974	8. 1 ~ 1 0.1 6
136	690	6 0 0		600	7 1.8	1,083	8. 1 ~ 1 0.2 0
164	1,1 1 4	1,2 4 4		1,2 4 4	8 6.2	1,309	7.29 ~ 1 0.20
118	5 9 4	688		688	8 2.9	1,4 4 5	8. 1 ~ 1 0.1 1
3	18	1 5		1 5	3 8.5	1,0 0 0	7.10~10.10
2 7	104	9 9		9 9	6 9.4	1,286	7.11~10.12
1 3 5	5 4 3	468		4 6 8	8 7.0	1,1 4 7	8. 1 ~ 1 0.1 6
1 5 0	5 3 2	4 2 0		420	6 9.6	1,0 9 9	7. 1 ~ 1 0.2 0
18	6 5	5 0		5 0	8 1.0	1,0 6 4	7.20~10.11
4 5	1 4 2	107		107	7 7.6	1,1 0 3	8. 1 ~ 1 0.1 4
0	0	0		0	0.0	0	7.17~ 9.10
0	0	0		0	0.0	0	7.10 ~ 9.10
3,1 4 0	1 7,2 6 2	1 9,2 1 1		1 9,2 1 1	8 6.1	1,3 6 0	7. 1 ~ 1 0.3 1
2 5,1 4 0	134,421	155,223		1 5 5,2 2 3	8 9.3	1,4 2 0	6.10~11.20
3 2	3 2	2 6		2 6	1 0.0.0	1,3 0 0	7.10 ~ 10. 3
0	0	. 0		0	0.0	0	7. 1 ~ 9.20
0	0	0		0	0.0	0	7. 1 ~ 9.3 0
0	0	0		0	0.0	0	
4	4	2		2	1 0 0.0	2,0 0 0	7.28 ~ 9.30
0	0	0		0	0.0	0	7. 7~ 9.23
0	1	2		2	1 0 0.0	2,0 0 0	5. 1 ~ 1 0.3 1
1 5	3 7	3 0		3 0	5 6.4	1,3 6 4	5. 1 ~ 1 0.3 1
5 1 3	1,6 9 4	1,4 9 6	1.0	1,4 9 6	6 9.4	1,2 7 0	7.11 ~ 11. 9

*-			<i>T</i>	捕		獲	所		管	捕	獲	数	使
海区	水		系	採	卵	場	事	業	場	Q.	ô	計	9
	サ・	シル	. 1	サ:	シル	1	羅		臼	261	尾 141	尾 402	尾 125
	春〉	刈古	丹	春〉	川古	丹		//		6 7	2 3	9 0	3 6
根	忠		類	忠		類	伊	茶	仁	195	8 2 3	1,0 1 8	129
	伊	茶	仁	伊	茶	仁		"		109	9 6	2 0 5	7 7
-	標		津	標		津	根		室	865	2,1 2 0	2,9 8 5	6 2 7
室	当		幌	当		幌	計	根	別	164	1 3 8	3 0 2	156
-	春		別	春		別		//		2 1	1 5	3 6	2 0
,	床		丹	床		丹		//		195	1 9 7	3 9 2	195
海	西		別	西		別	虹		別	1,1 2 8	1,8 0 3	2,9 3 1	1,118
	矢	臼	別	矢	臼	別	浜		中	4	4	8	4
Image: Control of the	風		蓮	風		蓮		//		8 1 5	1,9 4 2	2,7 5 7	178
	別	当	賀	別	当	賀	厚		床	8 0	7 2	152	8 0
	Mer		#1.	本	年	度				3,9 0 4	7,3 7 4	1 1,2 7 8	2,7 4 5
	海	区	計	前	年	度				9,766	1 1,9 5 5	2 1,7 2 1	8,8 0 5
Lee	釧		路	釧		路	釧		路	1 4 5	190	3 3 5	1 2 8
禁裳	+		勝	幕		別	幕		別	0	0	0	0
以		" //		千	代	田	札		内	0	0	0	. 0
東	豊		似	豊		似	大		樹	0	0	0	0
海区	海	区	計	本	年	度				1 4,5	190	3 3 5	1 2 8
	(14		п	前	年	度				3,8 7 6	8,9 0 5	1 2,7 8 1	3,4 3 3
-felate	幌		満	幌		満	静		内	1	0	1	0
襟裳	静		内	静		内		//		2 5	116	1 4 1	0
以	遊	楽	部	遊	楽	部	八		雲	1,7 0 0	1,7 6 8	3,4 6 8	1,1 4 2
西	汐		泊	汐		泊			,	1 7	3 5	5 2	0
海区	海	区	計	本	年	度				1,7 4 3	1,9 1 9	3,6 6 2	1,1 4 2
	1144	15.	111	前	年	度				9 4 3	1,8 2 6	2,7 6 9	608
合		all a	it	本	年	度				2 2,2 2 6	2 8,2 5 0	5 0,4 7 6	1 8,1 5 9
			. 1	前	年	废	-			1 3 8,6 2 8	1 3 5,1 0 5	2 7 3,7 3 3	1 2 3,3 0 8

用親力	魚数	457 do *##	增減卵数	仮収容卵数	♀親魚	平均	実 施 期 日
8	計	採卵数	7官(成,月7安)	1X4X谷卯数	使用率	採卵数	天 旭 朔 口
尾 46	尾 171	千粒 140	千粒	千粒 140	% 4 7.9	粒 1,1 2 0	7.1 1 ~ 1 0.2 1
1 3	4 9'	4 0		4 0	5 3.7	1,1 1 1	8.1 5 ~ 1 0. 9
102	2 3 1	1 2 3		1 2 3	6 6.2	953	7. 1~10.10
6 2	139	7 4		7 4	7 0.6	961	7. 1 ~ 1 0.1 0
5 3 0	1,1 5 7	6 8 5		685	7 2.5	1,0 9 2	7. 1 ~ 1 0.1 0
121	277	174		174	9 5.1	1,1 1 5	6. 1 ~ 1 0.1 0
1 3	3 3	1 0		10	9 5.2	5 0 0	6. 1 ~ 1 0.1 0
197	392	1 4 3	. *.	1 4 3	1 0 0.0	7 3 3	6. 1 ~ 1 0.1 0
416	1,5 3 4	1,4 3 1		1,431	9 9.1	1,2 8 0	6.1 0 ~ 9.3 0
4	8	6		6	1 0 0.0	1,500	6.21~10.9
9 6	274	2 2 2	<	2 2 2	2 1.8	1,2 4 7	6.21~10.9
7 2	152	9 5		9 5	1 0 0.0	1,1 8 8	7. 1~ 9.30
1,6 7 2	4,4 1 7	3,1 4 3		3,1 4 3	7 0.3	1,1 4 5	6. 1 ~ 1 0.2 1
4,3 2 2	1 3,1 2 7	1 1,5 7 6		1 1,5 7 6	9 0.2	1,3 1 0	5.2 1 ~ 1 0.3 1
3 2	160	155		1 5 5	8 8.3	1,2 1 0	8. 1 ~ 9.30
0	0	0		0	0.0	0	9.10~ 9.30
0	0	0		0	0.0	0	
0	0	0		0	0.0	0	
3 2	160	155		155	8 8.3	1,2 1 0	8. 1~ 9.30
2,6 8 5	6,1 1 8	3,280		3,2 8 0	8 8.6	960	7. 1 ~ 1 0.2 1
0	0	0		0	0.0	0	9. 4~1 0.1 0
0	0	0		0	0.0	0	8. 1 ~ 1 0.3 1
3 5 9	1,5 0 1	1,2 1 1		1,2 1 1	6 7.2	1,0 6 0	7. 3~ 9.30
0	0	0		0	0.0	0	8. 1~ 8.31
3 5 9	1,5 0 1	1,2 1 1		1,2 1 1	6 5.5	1,060	7. 3 ~ 1 0.3 1
4 2 3	1,0 3 1	757		7 5 7	6 4.5	1,2 5 0	7. 1 ~ 1 1.2 0
5,218	2 3,3 7 7	2 3,7 5 0		2 3,7 5 0	8 1.7	1,3 0 8	5. 1 ~ 1 0.3 1
3 3,0 8 3	1 5 6,3 9 1	1 7 2,3 3 2		1 7 2,3 3 2	8 8.9	1,400	5.2 1 ~ 1 1.2 0

第10表 昭和47年度支・事業場別からふとます親魚捕獲・採卵成績表

L. Les		alle.	Les	捕	獲	数	使	用 親 魚	数
支場	争	業	場	Q.	â	計	9	8	言十
	岩	尾	別	尾 6,530	尾 8,4 3 5	尾 14,965	尾 6,0 9 7	尾 899	尾 6,996
北	斜		里.	6,0 0 5	4,8 7 8	1 0,8 8 3	4,9 8 0	1,4 1 5	6,3 9 5
B	藻		琴	1 0	2	1.2	0	0	0
見	網		走	4 3	8 9	1 3 2	3 9	3 0	6 9
支	北		見	772	1,0 9 9	1,8 7 1	5 5 4	1 3 6	690
	湧		別	1,1 0 2	1,8 3 5	2,9 3 7	950	1 6 4	1,1 1 4
場	渚		滑	613	920	1,5 3 3	491	1 2 1	6 1 2
~3D	幌		内	580	4 5 7	1,0 3 7	485	162	6 4 7
計	本	年	度	1 5,6 5 5	1 7,7 1 5	3 3,3 7 0	1 3,5 9 6	2,9 2 7	1 6,5 2 3
п	前·	年	度	1 0 1,7 0 9	9 1,1 2 6	1 9 2,8 3 5	9 3,6 9 7	2 0,9 0 3	1 1 4,6 0 0
I.C.	羅		臼	3 2 8	164	492	161	5 9	2 2 0
根	伊	茶	仁	3 0 4	9 1 9	1,2 2 3	206	164	370
室	根		室	8 6 5	2,1 2 0	2,9 8 5	6 2 7	5 3 0	1,1 5 7
	計	根	別	380	3 5 0	7 3 0	3 7 1	3 3 1	702
支	虹		別	1,1 2 8	1,8 0 3	2,9 3 1	1,1 1 8	416	1,5 3 4
場	浜		中	8 1 9	1,9 4 6	2,765	182	100	282
	厚		床	8 0	7 2	152	8 0	7 2	1 5 2
計	本	年	度	3,9 0 4	7,3 7 4	1 1,2 7 8	2,7 4 5	1,6 7 2	4,4 1 7
ы	前	年	度	9,7 6 6	1 1,9 5 5	2 1,7 2 1	8,8 0 5	4,3 2 2	1 3,1 2 7
十勝支場	釧		路	1 4 5	190	3 3 5	1 2 8	3 2	160
=+	本	年	度	1 4 5	190	3 3 5	1 2 8	3 2	1 6 0
	前	年	度	3,8 7 6	8,9 0 5	1 2,7 8 1	3,4 3 3	2,6 8 5	6,1 1 8

採卵数	增減卵数	仮収容卵数	♀ 親 魚 使 用 率	平均採卵数	実施期間
千粒 8,610	千粒	千粒 8,610	% 9 3.4	粒 1,4 1 2	7. 1 ~ 1 0.3 1
6,8 7 2		6,8 7 2	8 2.9	1,3 8 0	7. 1~1 0.1 4
0		0	0	. 0	7. 1 ~ 1 0.1 5
3 8		3 8	9 0.7	974	8. 1~10.16
600		6 0 0	7 1.8	1,0 8 3	8. 1 ~ 1 0.2 0
1,244		1,2 4 4	8 6.2	1,309	7.29~10.7
7 0 3		7 0 3	8 0.1	1,4 3 2	7.1 0 ~ 1 0.1 1
5 6 7	,	567	8 3.6	1,1 6 9	7.1 3 ~ 1 0.1 6
1 8,6 3 4		1 8,6 3 4	8 6.8	1,3 7 0	7. 1 ~ 1 0.3 1
1 3 4,6 4 6		1 3 4,6 4 6	9 2.1	1,4 4 0	6.1 0 ~ 1 1.2 0
180		1 8 0	4 9.1	1,1 1 8	7.11 ~ 1 0.21
197		197	6 7.8	9 5 6	6. 1~10.10
685		6 8 5	7 2.5	1,0 9 3	6.2 1 ~ 1 0.1 0
3 2 7		3 2 7	9 7.6	882	6. 1~10.10
1,4 3 1		1,4 3 1	9 9.1	1,2 8 0	6.1 0 ~ 9.3 0
2 2 8		2 2 8	2 2.2	1,253	6.1 1 ~ 1 0. 9
9 5	-	9 5	1 0 0.0	1,1 8 8	7. 1 ~ 1 0.1 0
3,1 4 3		3,1 4 5	7 0.3	1,1 4 5	6. 1~10.21
1 1,5 7 6		1 1,5 7 6	9 0.2	1,3 1 0	5.21 ~ 1 0.31
1 5 5		155	8 8.3	1,2 1 1	8. 1 ~ 9.30
1 5 5	1	155	8 8.3	1,2 1 1	8. 1~ 9.30
3,2 8 0		3,2 8 0	8 8.6	960	7. 1 ~ 1 0.2 1

-80-

	who	業	±en.	捕	獲	数	使	用 親 魚	数
支 場	争	来	物	Ŷ.	8	計	φ.	ô	計
天	徳	志	別	尾 549	843	尾 1,392	尾 382	尾 150	尾 532
塩	歌		登	5 8	7 7	1 3 5	4 7	18	6 5
支	頓		別	1 3 3	7 3	206	97	4.5	1 4 2
場	中		Ш	3 4	5 4	8 8	2 0	1 2	3 2
	天		塩	4	5	9	2	3	5
計	本	年	度	779	1,0 5 2	1,8 3 1	5 4 8	2 2 8	7 7 6
н	前	年	度	2 2,3 3 4	2 1,2 9 3	4 3,6 2 7	1 6,7 6 5	4,7 5 0	2 1,5 1 5
千才支場	静		内	2 6	116	1 4 2	0	0	0
計	本	年	度	26	116	1 4 2	0	0	0
н	前	年	度	516	1,214	1,7 3 0	2 1 5	287	5 0 2
渡島支場	八		雲	1,7 1 7	1,8 0 3	3,5 2 0	1,1 4 2	3 5 9	1,5 0 1
三十	本	年	废	1,7 1 7	1,8 0 3	3,5 2 0	1,1 4 2	359	1,5 0 1
П+	前	年	度	427	612	1,0 3 9	3 9 3	1 3 6	5 2 7
合 計	本	年	度	2 2,2 2 6	2 8,2 5 0	5 0,4 7 6	1 8,1 5 9	5,218	2 3,3 7 7
	前	年	度	1 3 8,6 2 8	1 3 5,1 0 5	2 7 3,7 3 3	1 2 3,3 0 8	3 3,0 8 3	1 5 6,3 9 1

	- I		♀親魚		
採卵数	增減卵数	仮収容卵数	使用率	平均採卵数	実 施 期 間
千粒	千粒	千粒	%	粒 1,0 9 9	7. 1 ~ 1 0.2 0
4 2 0	4	420	6 9.6	1,0 9 9	7. 1 - 10.20
5 0	· ·	5 0	8 1.0	1,0 6 4	7.20~10.11
107		107	7 2.9	1,1 0 3	7.10 ~ 10.14
2 6	,	2 6	5 8.8	1,3 0 0	7. 7~ 9.30
4		4	5 0.0	2,0 0 0	5. 1 ~ 1 0.3 1
607		6 0 7	7 0.3	1,108	5. 1 ~ 1 0.3 1
2 2,0 7 3		2 2,0 7 3	7 5.1	1,320	7. 1 ~ 1 1.1 4
0		0	0	0	8. 1~
0	1	0	0	0	8. 1~
298		298	4 1.7	1,390	7. 1 ~ 1 1.2 0
1,2 1 1		1,2 1 1	6 6.5	1,0 6 0	7. 3 ~ 1 0.1 9
1,2 1 1		1,2 1 1	6 6.5	1,0 6 0	7. 3 ~ 1 0.1 9
4 5 9		459	9 2.0	1,170	7. 1 ~ 1 1.1 0
2 3,7 5 0		2 3,7 5 0	8 1.7	1,307	5. 1 ~ 1 0.3 1
1 7 2,3 3 2		1 7 2,3 3 2	8 8.9	1,4 0 0	5.21~11.20

2. ます種卵の移殖

本年度のさくらますの採卵は、計画に対し5 7.5%の達成率で前年度(3 0.7%)をやや上廻る不成9 3 0 千粒,からふとます6,2 1 0 千粒の移殖をした。

ます種卵の移殖は,次の方針に基づいて実施した。

さくらます……… ① 「さくらます資源拡大再生産事業」用の種卵の移動

② 本州に対する再生産用種卵の供給

からふとます…… ① 資源の均てん化と、捕獲採卵不振地域における資源育成ための移動

② 本州に対する再生産用種卵の供給

第11表 ます移殖

-	40	4 46	to rin all.	増 減	卵 数	Bertham Star Standel	受精直後
支	場	魚種	採卵数	海産卵	供試卵	仮収容卵数	供給卵数
1		さくらます	1,201			1,2 0 1	
北	見	からふとます	1 8,6 3 4			1 8,6 3 4	
		計	1 9,8 3 5			1 9,8 3 5	
		さくらます	4,3 2 9			4,3 2 9	
根	室	からふとます	3,1 4 3			3,1 4 3	
			7,4 7 2			7,4 7 2	
		さくらます	0			0	
+	勝	からふとます	155			155	
		計	155		- 4	_ 155	
		さくらます	2,2 5 4			2,2 5 4	
天	塩	からふとます	607			607	
		計	2,8 6 1		1	2,8 6 1	
		さくらます	11			1 1	
Ŧ	才	からふとます	0			0	
,		計	11			11	

績であつた。からふとますの採卵は、計画に対し96.1%の成績であり、種卵の移動は、さくらます

(単位:千粒)

卵の移殖	発眼卵の	発 !	眼卵の移	多殖	最 終
		道	内	-1- 10	
受給卵数	供試卵数	供給卵数	受給卵数	本 州	収容卵数
	アメリカへ			△ 114	976
		5,8 5 4			1 2,7 8 0
	△ 111	5,854		△ 114	1 3,7 5 6
					4,3 2 9
			927		4,0 7 0
			9 2 7		8,3 9 9
					. 0
			à		155
					155
		422		△ 124	1,7 0 8
			3,0 0 9		3,616
		4 2 2	3,0 0 9	△ 124	5,3 2 4
			4 2 2		4 3 3
	<		918		918
			1,3 4 0		1,3 5 1

-+-	場	4. 45	407 Sin #44	増 減	卵数	Filo on some	受精直後
支	× 30	魚種	採卵数	海産卵	供試卵	仮収容卵数	供給卵数
		さくらます	2,9 7 3	, .		2,9 7 3	
渡	島	からふとます	1,2 1 1			1,211	
		計	4,184			4,184	
		さくらます	1 0,7 6 8			1 0,7 6 8	
合	計	からふとます	2 3,7 5 0			2 3,7 5 0	
-		計	3 4,5 1 8			3 4,5 1 8	

第12表 さくらます種卵の移殖

供約	合 地	移殖	受	給 地	移殖	卵の	内訳	+×x 700
支場	事業場	年月日	支場	事 業 場		移殖 前死 卵数	移 殖 実 卵 数	摘 要
天 塩	徳志別	47. 10. 14	千 歳	千 歲	千粒 422	千粒 40	千粒 382	発眼卵
"	"	10. 17	山形県	日本海さけ・ます 増殖センター	124	2 4	100	<i>#</i> ,
北見	斜 里	10. 18	岩手県	太平洋さけ・ます 増殖センター	114	4	110	"
"	"	",	米国	ワシントン漁業局	111	4	107	"
渡島	尻 別	11. 2	チリー国	コジヤイケ地区	159	9	150	<i>"</i> ·
1	†				930	8 1	8 4 9	

卵の移殖	発眼	NR Ø	発	限 卵 の 移	多殖		最終
	-		道	内	本	州	
受給卵数	供試	卵 数	供給卵数	受給卵数	4	711	収容卵数
	チリヘ	159					2,8 1 4
				1,0 0 0	Δ	3 5 6	1,855
	Δ	159		1,0 0 0	Δ	3 5 6	4,6 6 9
	Δ	270	4 2 2	4 2 2	Δ	2 3 8	1 0,2 6 0
			5,8 5 4	5,8 5 4	Δ	3 5 6	2 3,3 9 4
		270	6,2,7 6	6,2 7 6		5 9 4	3 3,6 5 4

第13表 からふとます種卵の移殖

供糸	合 地	移殖	受	給 地	移殖	卵の	内 訳	摘 要
支 場	事業場	年月日	支 場	事 業 場	移籍卵数	移殖 前死 卵数	移 殖 実 卵 数	1問 安
					千粒	千粒	干粒	
北見	岩尾別	47. 10. 30	天 塩	天 塩	1,3 6 6	5 8	1,3 0 8	発眼卵
"	"	" "		(礼文島船泊)	3 0 0	1 5	285	"
"	" "		- //	(增 幌)	4 2 0	2 0	400	"
"	// 11. 1		渡島	八 雲	1,0 0 0	4 2	9 5 8	<i>ii</i> .
	小 計				3,0 8 6	1 3 5	2,9 5 1	
"	斜 里	11.10	根室	浜 中	927	5 7	870	"
. "	"	11. 20	天 塩	(信 砂)	9 2 3	5 2	871	"
"	"	11. 19	千 歳	(元 浦 河)	918	5 5	863	<i>II</i> ,
	小 計				2,7 6 8	164	2,6 0 4	
渡島	八雲	11. 20	岩手県	有家	3 5 6	5 6	3 0 0	"
90	†			*	6,2 1 0	3 5 5	5,8 5 5	

3. ますふ化放流成績概要

さくらます

本年度は、採卵数10.768千粒から10.260千粒の種卵を、15事業場と民営3ケ所のふ化場の稚魚を生産し、(稚魚生産率68.2%)48年1月1日から同年6月30日にかけて、全道20水また、さくらます資源拡大再生産のため、千歳支場において管理中の種卵433千粒から292千

第14表 昭和47年度海区水系別さくらますふ化放流成績

海	7k	系	事業場	ांच्य क्षेत्र होता श्र ीत	FIT SID ##	> U.E.#	> 111 TH	放	流尾	数
区	1	ボ	(収容場)	収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出 率	無給餌	給 餌	神
1	岩尾	別	岩尾別	千粒 144	千粒 5	千尾 139	% 9 6.5	千尾 137	千尾 0	千尾 137
ホー	斜	里	斜 里	402	1 6	386	9 6.0	380	0	380
"	渚	滑	渚 滑	430	121	3 0 9	7 1.9	296	0	296
2	徳 志	別	徳志別	1,495	203	1,292	8 6.4	0	1,1 0 0	1,1 0 0
海区	海区	量十	本年度	2,4 7 1	3 4 5	2,1 2 6	8 6.0	813	1,1 0 0	1,9 1 3
	144	Πl	前年度	1,7 2 6	1 2 3	1,6 0 3	9 2.9	1,5 4 3	0	1,5 4 3
	増	幌	(増幌)	1 3	1	1 2	9 2.3	11	0	11
日	天	塩	天 塩	5 0	19	3 1	6 2.0	0	1 5	15
本	信	砂	(信砂)	150	2 2	1 2 8	8 5.3	0	100	100
14	石	狩	千 歳	4 3 3	4 4	389	8 9.8	0	0	0
海	古	宇		0	0	0	0.0	0	300	300
	尻	别	尻 別	2,7 8 7	450	2,3 3 7	8 3.9	0	1,150	1,1 5 0
区	海区	計	本年度	3,4 3 3	5 3 6	2,8 9 7	8 4.4	11	1,5 6 5	1,5 7 6
	(神 区	E1	前年度	2,8 9 5	3 3 2	2,5 6 3	8 8.6	8 2	1,5 5 0	1,6 3 2
根	薫	別	薫 別	103	3	100	9 7.1	9 6	0	9 6
根室海区	忠	類	(忠類)	0	0	0	0.0	9 4	0	9 4
区	伊茶	仁	伊茶仁	205	1 3	192	9 3.7	5 6	0	5 6

に収容し、給餌稚魚 4,199千尾(給餌放流率60.0%)、無給餌稚魚 2,803千尾,合計7,003千尾 系へ放流した。

尾の稚魚を生産し、飼育中である。

			/C ub	77 1 2	the tele	1-0	50004	L 3	nte All	6+E 74	
放流期間	備	考	饭収	谷から	以谷	までの	り別の重	かき・・・・・	争亲	長場早	11/
//X Via 753 1-3			稚	魚	移	殖	放	流	括	弧	書
5.2 0 ~ 4.3 0											
1. 1 ~ 1.3 1	太平洋センターへ	1 1 4 千粒,	ワシ	ントン	州へ	1 1 1	千粒				
4.17 ~ 4.17	٤										
5. 1 ~ 5.3 0	千歳へ422千粒,	日本海セン	ター・	∼ 1 2	4千)	粒					
1. 1~5.30											
1. 1~ 4.30	×										
5.30 ~ 5.31	,										
5. 1 ~ 5.1 1											
6.3 0 ~ 6.3 0											Υ.
Ţ	徳志別より422章	千粒(サクラ	·マス	資源拉	大再	生産事	業に維	怅続)			
5. 1 ~ 5.2 3	(尻別より300=	千尾)									
5. 1 ∼ 5.2 3	チリ国コヂヤイケイ	~1 5 9 千粒	7, 八雪		7千	粒(古	「字へ3	00千月	星)		
5. 1 ~ 6.3 0	,			3.5							
3.1 7 ~ 5.3 1											
2.26 ~ 2.28	伊茶仁より103=	千粒									
1.2 4 ~ 1.2 4	(伊茶仁より94=	千尾)									
1.2 4 ~ 1.2 4	薫別103千粒,根	室へ 1,5 5 9	千粒,	計根	別へ	1 6 8	千粒(忠類へ9	4千	尾)	

海			7	事業場	7					放	流尾	数
区	水	7	系	(収容場		収容卵数	死 卵 数	ふ出尾数	ふ出率	無給餌	給 餌	計
			-		+	千粒	千粒	千尾	%	千尾	千尾	千尾
	標		津	根 雪	76	1,5 5 9	234	1,325	8 5.0	0	1,1 4 5	1,1 4 5
根	当		幌	計根別	1]	168	8	160	9 5.2	153	0	153
	床		丹	(床丹)	2 3 9	4 3	196	8 2.0	196	0	196
室	西		別	虹	11)	9 4 8	118	830	8 7.6	717	0	717
	矢	臼	別	(矢臼別)	0	0	0	0.0	100	0	100
海	風		蓮	浜	Þ	5 0 0	8 4	416	8 3.2	0	389	389
1,77	別	当	賀	厚。	E	6 0 7	4 9	5 5 8	9 1.9	5 4 7	0	5 4 7
_		"		別当	貿	0	0	0	0.0	0	0	0
区	海	R	對十	本年	色	4,3 2 9	5 5 2	3,7 7 7	8 7.2	1,9 5 9	1,5 3 4	3,4 9 3
	(ut		[1]	前年原	变	1,781	1 1 8	1,6 6 3	9 3.4	1,5 9 0	0	1,5 9 0
エリモ	遊	楽	部	八 4	雲	2 7	3	2 4	8 8.9	2 0	0	2 0
	海	[X	計	本年	度	2 7	3	2 4	8 8.9	2 0	0	2 0
以西海区	(1)年		ы	前年月	度	1 4	2	1 2	8 5.7	11	3 3	4 4
	<u>^</u>		計	本年	度	1 0,2 6 0	1,4 3 6	8,8 2 4	8 6.0	2,803		
	合 計		前年	度	6,416	5 7 5	5,8 4 1	9 1.0	3,2 2 6	1,583	4,809	

さくらます種卵の採卵から収容までの動き

採 卵 数 10,768 千粒

仮収容卵数

1 0, 7 6 8 "

供試卵数 △ 270 ″

本州移殖卵数

2 3 8 "

収容 卵数

1 0, 2 6 0 "

仮収容から収容までの卵の動き 横 考	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	事美	美場	单位
放流期間 備 考 稚 魚 移 殖 放 流		括	弧	書
3.23~ 5.23 伊茶仁より1,559千粒				
2.20~ 2.28 伊茶仁より168千粒				
4. 1~ 4.10				
12.3~12.31 浜中へ104千粒, 矢臼別より13千粒(矢臼別へ10	0 千月	星)		
12.16~12.16 虹別へ13千粒, 浜中へ10千粒(虹別より100千尾	.)			
4.30~ 4.30 虹別より104千粒, 矢臼別より10千粒				
4.25~ 5.25 別当賀より607千粒				
厚床へ607千粒				
1 2. 3~ 5.2 5				
2.2 2 ~ 5. 9				
4. 1~ 4.30 尻別より27千粒				
4. 1~ 4.30				
4.14~ 4.14				
1. 1~ 6.30 ()書きは、サクラマス拡大再生産用				
1. 1~ 6.20				

第15表 昭和47年度支・事業場別さくらますふ化放流成績表

				5 11 M.	Y the other	+4	* 5	*4
支 場	事業場	収容卵数	死卵数	ふ出尾数	多出率	放		数
义 物	(収容場)	(A)	7 U 9 P WA	(B)	B/A×100	無給餌	給 餌	計 (C)
		千粒	千粒	千尾	%	千尾	千尾	千尾
北 見	岩尾別	1 4 4	5	1 3 9	9 6.5	1 3 7	0	1 3 7
	斜 里	402	1 6	386	9 6.0	380	0	380
	渚 滑	430	121	3 0 9	7 1.9	296	0	296
	本年度	976	1 4 2	8 3 4	8 5.5	813	0	8 1 3
	前年度	1,608	9 7	1,5 1 1	9 4.0	1,453	0	1,453
根室	薫 別	103	3	100	9 7.1	9 6	0	9 6
	伊茶仁	205	1 3	192	9 3.7	150	0	1 5 0
	根室	1,5 5 9	2 3 4	1,3 2 5	8 5.0	0	1,1 4 5	1,1 4 5
	計根別	168	8	160	9 5.2	153	0	153
	虹 別	9 4 8	118	8 3 0	9 7.6	817	0	8 1 7
	厚床	6 0 7	4 9	5 5 8	9 1.9	5 4 7	. 0	5 4 7
	浜中	5 0 0	8 4	416	8 3.2	0	3 8 9	3 8 9
	(床丹)	2 3 9	4 3	196	8 2.0	196	0	196
	本年度	4,3 2 9	5 5 2	3,7 7 7	8 7.2	1,9,5 9	1,5 3 4	3,4 9 3
	前年度	1,781	118	1,662	9 3.4	1,5 9 0	. 0	1,5 9 0
天塩	徳志別	1,495	203	1,2 9 2	8 6.4	0	1,1 0 0	1,1 0 0
	(増幌)	1 3	. 1	1 2	9 2.3	11	0	11
	天 塩	5 0	1 9	3 1	6 2.0	0	1 5	1 5
	(信砂)	1 5 0	2 2	128	8 5.3	0	100	100
	本年度	1,708	2 4 5	1,4 6 3	8 5.7	11	1,215	1,226
	前年度	3 9 1	3 6	3 5 5	9 0.9	172	156	3 2 8
千 歳	千 歳	4 3 3	4 4	389	8 9.8	_	(292)	(292
	本年度	4 3 3	4 4	3 8 9	8 9.8	-	(292)	(292
	前年度	408	7 8	3 3 0	8 0.9	0	(280)	(280
渡島	尻 別	2,7 8 7	450	2,3 3 7	8 3.9	0	1,4 5 0	1,4 5 0
	八雲	2 7	3	2 4	8 8.9	2 0	. 0	20
	本年度	2,8 1 4	453	2,3 6 1	8 3.9	2 0	1,4 5 0	1,470
	前年度	2,2 2 8	2 4 6	1,982	8 9.0	11	1,4 1 0	1,421
A =1	本年度	1 0,2 6 0	1,4 3 6	8,8 2 4	8 6.0	2,8 ⁰ ³ (0)		1
合 計	前年度	6,4 1 6	5 7 5	5,8 4 1	9 1.0	3,226	1,5 8 3 (2 8 0	4,809

放 流 率 C/A×100 *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **				
C/A×100 % 95.1 3.20~ 4.30 94.5 1. 1~ 1.31 68.8 4.17~ 4.17 8.3.3 1. 1~ 4.30 90.4 1. 1~ 5. 9 93.2 2.26~ 2.28 73.4 3.23~ 5.23 91.1 2.20~ 2.28 96.2 12. 3~ 12.31 90.1 4.25~ 5.25 77.8 4.30~ 4.30 82.0 4. 1~ 4.10 80.7 12. 3~ 5.25 89.3 2.22~ 5. 9 73.6 5. 1~ 5.30 84.6 5.30~ 5.31 30.0 5. 1~ 5.31 66.7 6.30~ 6.30 71.8 5. 1~ 6.30 83.9 3.15~ 5.31 67.4 サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 67.4 7.28 52.0 5. 1~ 5.23 74.1 4.30~ 4.30 52.2 4.30~ 5.23 63.8 4.14~ 5.31 68.2 1. 1~ 6.30 79.4 4.14~ 5.31	放 流 率	放 游 期 間	備	
9 5.1 3.2 0 ~ 4.3 0 9 4.5 1. 1 ~ 1.3 1 6 8.8 4.1 7 ~ 4.1 7 8 3.3 1. 1 ~ 4.3 0 9 0.4 1. 1 ~ 5. 9 9 3.2 2.2 6 ~ 2.2 8 7 3.2 1.2 4 ~ 1.2 4 7 3.4 3.2 3 ~ 5.2 3 9 1.1 2.2 0 ~ 2.2 8 9 6.2 12. 3 ~ 1 2.3 1 9 0.1 4.2 5 ~ 5.2 5 7 7.8 4.3 0 ~ 4.3 0 8 2.0 4. 1 ~ 4.1 0 8 0.7 12. 3 ~ 5.2 5 8 9.3 2.2 2 ~ 5. 9 7 3.6 5. 1 ~ 5.3 0 8 4.6 5.3 0 ~ 5.3 1 3 0.0 5. 1 ~ 5.1 1 6 6.7 6.3 0 ~ 6.3 0 7 1.8 5. 1 ~ 6.3 0 8 3.9 3.1 5 ~ 5.3 1 6 7.4 サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 6 7.4 7.2 8 5 2.0 5. 1 ~ 5.2 3 7 4.1 4.3 0 ~ 4.3 0 5 2.2 4.3 0 ~ 5.2 3 6 3.8 4.1 4 ~ 5.3 1 6 8.2 1. 1 ~ 6.3 0 7 9.4 1.1 ~ 5.3 1	C/A×100	/JX (/IL 99) [11]	thi)	
9 4.5	%			
68.8 4.17~ 4.17 83.3 1. 1~ 4.30 90.4 1. 1~ 5. 9 93.2 2.26~ 2.28 73.2 1.24~ 1.24 73.4 3.23~ 5.23 91.1 2.20~ 2.28 96.2 12. 3~12.31 90.1 4.25~ 5.25 77.8 4.30~ 4.30 82.0 4. 1~ 4.10 80.7 12. 3~ 5.25 89.3 2.22~ 5. 9 73.6 5. 1~ 5.30 84.6 5.30~ 5.31 30.0 5. 1~ 5.11 66.7 6.30~ 6.30 71.8 5. 1~ 6.30 83.9 3.15~ 5.31 67.4 サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 67.4 72.8 520 5. 1~ 5.23 74.1 4.30~ 4.30 52.2 4.30~ 5.23 63.8 4.14~ 5.31	9 5.1	3.2 0 ~ 4.3 0		
8 3.3 1. 1~ 4.30 90.4 1. 1~ 5. 9 9 93.2 2.26~ 2.28 73.2 1.24~ 1.24 73.4 3.23~ 5.23 91.1 2.20~ 2.28 96.2 12. 3~12.31 90.1 4.25~ 5.25 77.8 4.30~ 4.30 82.0 4. 1~ 4.10 80.7 12. 3~ 5.25 89.3 2.22~ 5. 9 73.6 5. 1~ 5.30 84.6 5.30~ 5.31 30.0 5. 1~ 5.11 66.7 6.30~ 6.30 71.8 5. 1~ 6.30 83.9 3.15~ 5.31 67.4 72.8 520 5. 1~ 5.23 74.1 4.30~ 4.30 52.2 4.30~ 5.23 63.8 4.14~ 5.31 68.2 1. 1~ 6.30 79.4 1.40 5.31 68.2 1. 1~ 6.30 79.4 1.40 5.31	9 4.5	1. 1~ 1.31		
9 0.4 1. 1 ~ 5. 9 9 3.2 2.2 6 ~ 2.2 8 7 3.2 1.2 4 ~ 1.2 4 7 3.4 3.2 3 ~ 5.2 3 9 1.1 2.2 0 ~ 2.2 8 9 6.2 12. 3 ~ 1 2.3 1 9 0.1 4.2 5 ~ 5.2 5 7 7.8 4.3 0 ~ 4.3 0 8 2.0 4. 1 ~ 4.1 0 8 0.7 12. 3 ~ 5.2 5 8 9.3 2.2 2 ~ 5. 9 7 3.6 5. 1 ~ 5.3 0 8 4.6 5.3 0 ~ 5.3 1 3 0.0 5. 1 ~ 5.1 1 6 6.7 6.3 0 ~ 6.3 0 7 1.8 5. 1 ~ 6.3 0 8 3.9 3.1 5 ~ 5.3 1 6 7.4 7 2.8 5 2.0 5. 1 ~ 5.2 3 7 4.1 4.3 0 ~ 4.3 0 5 2.2 4.3 0 ~ 4.3 0 5 2.2 4.3 0 ~ 5.2 3 6 3.8 4.1 4 ~ 5.3 1 6 8.2 1. 1 ~ 6.3 0 7 9.4	6 8.8	4.1 7 ~ 4.1 7		
9 3.2 2.2 6~ 2.2 8 7 3.2 1.2 4~ 1.2 4 7 3.4 3.2 3~ 5.2 3 9 1.1 2.2 0~ 2.2 8 9 6.2 12.3 ~ 12.3 1 9 0.1 4.2 5~ 5.2 5 7 7.8 4.3 0~ 4.3 0 8 2.0 4.1 ~ 4.1 0 8 0.7 12.3 ~ 5.2 5 8 9.3 2.2 2~ 5.9 7 3.6 5.1 ~ 5.3 0 8 4.6 5.3 0~ 5.3 1 3 0.0 5.1 ~ 5.1 1 6 6.7 6.3 0~ 6.3 0 7 1.8 5.1 ~ 6.3 0 8 3.9 3.1 5~ 5.3 1 6 7.4 サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 6 7.4 7 2.8 5 2.0 5.1 ~ 5.2 3 7 4.1 4.3 0~ 4.3 0 5 2.2 4.3 0~ 5.2 3 6 3.8 4.1 4~ 5.3 1 6 8.2 1.1 ~ 6.3 0 7 9.4 4.1 0.5 5.3 1	8 3.3	1. 1~ 4.30		
7 3.2	9 0.4	1. 1~ 5. 9		
73.4 3.23~5.23 91.1 2.20~2.28 96.2 12.3~12.31 90.1 4.25~5.25 77.8 4.30~4.30 82.0 4.1~4.10 80.7 12.3~5.25 89.3 2.22~5.9 73.6 5.1~5.30 84.6 5.30~5.31 30.0 5.1~5.11 66.7 6.30~6.30 71.8 5.1~6.30 83.9 3.15~5.31 67.4 サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 67.4 ナクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 67.4 カクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 68.2 1.1~6.30 79.4 1.1~6.30	9 3.2	2.26~ 2.28		
9 1.1 2.2 0 ~ 2.2 8 9 6.2 12. 3 ~ 1 2.3 1 9 0.1 4.2 5 ~ 5.2 5 7 7.8 4.3 0 ~ 4.3 0 8 2.0 4. 1 ~ 4.1 0 8 0.7 12. 3 ~ 5.2 5 8 9.3 2.2 2 ~ 5. 9 7 3.6 5. 1 ~ 5.3 0 8 4.6 5.3 0 ~ 5.3 1 3 0.0 5. 1 ~ 5.1 1 6 6.7 6.3 0 ~ 6.3 0 7 1.8 5. 1 ~ 6.3 0 8 3.9 3.1 5 ~ 5.3 1 6 7.4 サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 6 7.4 7 2.8 5 2.0 5. 1 ~ 5.2 3 7 4.1 4.3 0 ~ 4.3 0 5 2.2 4.3 0 ~ 5.2 3 6 3.8 4.1 4 ~ 5.3 1 6 8.2 1. 1 ~ 6.3 0 7 9.4 1.1 ~ 5.3 1	7 3.2	1.2 4 ~ 1.2 4		
9 6.2 1 2. 3 ~ 1 2.3 1 9 0.1 4.2 5 ~ 5.2 5 77.8 4.3 0 ~ 4.3 0 8 2.0 4.1 ~ 4.1 0 8 0.7 12.3 ~ 5.2 5 8 9.3 2.2 2 ~ 5.9 9 7 3.6 5.1 ~ 5.3 0 8 4.6 5.3 0 ~ 5.3 1 3 0.0 5.1 ~ 5.1 1 6 6.7 6.3 0 ~ 6.3 0 7 1.8 5.1 ~ 6.3 0 8 3.9 3.1 5 ~ 5.3 1 9 7 5.3 1 9 7 5.3 1 9 7 5.3 1 9 7 5.3 1 9 7 5.3 1 9 7 5.3 1 9 7 5.3 1 9 7 5.3 1 9 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	7 3.4	3.23 ~ 5.23		
9 0.1 4.2 5 ~ 5.2 5 77.8 4.3 0 ~ 4.3 0 82.0 4.1 ~ 4.1 0 80.7 12.3 ~ 5.2 5 89.3 2.2 2 ~ 5.9 9 73.6 5.1 ~ 5.3 0 84.6 5.3 0 ~ 5.3 1 30.0 5.1 ~ 5.1 1 66.7 6.3 0 ~ 6.3 0 71.8 5.1 ~ 6.3 0 83.9 3.1 5 ~ 5.3 1 67.4 72.8 52.0 5.1 ~ 5.2 3 74.1 4.3 0 ~ 4.3 0 52.2 4.3 0 ~ 5.2 3 63.8 4.1 4 ~ 5.3 1 68.2 1.1 ~ 6.3 0 79.4 1.1 ~ 6.3 0 79.4	9 1.1	2.2 0 ~ 2.2 8		
77.8 4.30~ 4.30 8 2.0 4.1~ 4.10 8 0.7 12.3~ 5.25 8 9.3 2.2 2~ 5.9 7 3.6 5.1~ 5.30 8 4.6 5.30~ 5.31 3 0.0 5.1~ 5.11 6 6.7 6.30~ 6.30 7 1.8 5.1~ 6.30 8 3.9 3.15~ 5.31 6 7.4 サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 6 7.4 7 2.8 5 2.0 5.1~ 5.23 7 4.1 4.30~ 4.30 5 2.2 4.30~ 5.23 6 3.8 4.14~ 5.31 6 8.2 1.1~ 6.30 7 9.4 4.1.4~ 5.31	9 6.2	1 2. 3 ~ 1 2.3 1		
8 2.0 4. 1 ~ 4.1 0 8 0.7 1 2. 3 ~ 5.2 5 8 9.3 2.2 2 ~ 5. 9 7 3.6 5. 1 ~ 5.3 0 8 4.6 5.3 0 ~ 5.3 1 3 0.0 5. 1 ~ 5.1 1 6 6.7 6.3 0 ~ 6.3 0 7 1.8 5. 1 ~ 6.3 0 8 3.9 3.1 5 ~ 5.3 1 6 7.4 サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 6 7.4 7 2.8 5 2.0 5. 1 ~ 5.2 3 7 4.1 4.3 0 ~ 4.3 0 5 2.2 4.3 0 ~ 5.2 3 6 3.8 4.1 4 ~ 5.3 1 6 8.2 1. 1 ~ 6.3 0 7 9.4 4.1 5.3 1	9 0.1	4.2 5 ~ 5.2 5		
8 2.0 4. 1 ~ 4.1 0 8 0.7 12. 3 ~ 5.2 5 8 9.3 2.2 2 ~ 5. 9 7 3.6 5. 1 ~ 5.3 0 8 4.6 5.3 0 ~ 5.3 1 3 0.0 5. 1 ~ 5.1 1 6 6.7 6.3 0 ~ 6.3 0 7 1.8 5. 1 ~ 6.3 0 8 3.9 3.1 5 ~ 5.3 1 6 7.4 サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 6 7.4 7 2.8 5 2.0 5. 1 ~ 5.2 3 7 4.1 4.3 0 ~ 4.3 0 5 2.2 4.3 0 ~ 5.2 3 6 3.8 4.1 4 ~ 5.3 1 6 8.2 1. 1 ~ 6.3 0 7 9.4 1 1.2 5.3 1	7 7.8	4.3 0 ~ 4.3 0		
8 9.3 2.2 2 ~ 5.9 9 7 3.6 5.1 ~ 5.3 0 8 4.6 5.3 0 ~ 5.3 1 3 0.0 5.1 ~ 5.1 1 6 6.7 6.3 0 ~ 6.3 0 7 1.8 5.1 ~ 6.3 0 8 3.9 3.1 5 ~ 5.3 1 6 7.4 サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 6 7.4 7 2.8 5 2.0 5.1 ~ 5.2 3 7 4.1 4.3 0 ~ 4.3 0 5 2.2 4.3 0 ~ 5.2 3 6 3.8 4.1 4 ~ 5.3 1 6 8.2 1.1 ~ 6.3 0 7 9.4	8 2.0	4. 1~ 4.10		
7 3.6	8 0.7	1 2. 3~ 5.25	2	_
8 4.6	8 9.3	2.2 2 ~ 5. 9	f	
30.0 5. 1 ~ 5.11 66.7 6.30 ~ 6.30 71.8 5. 1 ~ 6.30 83.9 3.15 ~ 5.31 67.4 サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 67.4 72.8 52.0 5. 1 ~ 5.23 74.1 4.30 ~ 4.30 52.2 4.30 ~ 5.23 63.8 4.14 ~ 5.31 68.2 1. 1 ~ 6.30 79.4 1. 1 ~ 5.31	7 3.6	5. 1~ 5.3 0		
6 6.7 6.3 0 ~ 6.3 0 7 1.8 5. 1 ~ 6.3 0 8 3.9 3.1 5 ~ 5.3 1 サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 6 7.4 サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 5 2.0 5. 1 ~ 5.2 3 7 4.1 4.3 0 ~ 4.3 0 5 2.2 4.3 0 ~ 5.2 3 6 3.8 4.1 4 ~ 5.3 1 6 8.2 1. 1 ~ 6.3 0 7 9.4 1.1 ~ 6.3 0 7 9.4 1.1 ~ 6.3 0	8 4.6	5.3 0 ~ 5.3 1		
71.8 5. 1~ 6.30 83.9 3.15~ 5.31 67.4 サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 67.4 72.8 52.0 5. 1~ 5.23 74.1 4.30~ 4.30 52.2 4.30~ 5.23 63.8 4.14~ 5.31 68.2 1. 1~ 6.30 79.4 1. 1~ 5.31	3 0.0	5. 1~ 5.11		
71.8 5. 1~ 6.30 83.9 3.15~ 5.31 67.4 サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 67.4 72.8 52.0 5. 1~ 5.23 74.1 4.30~ 4.30 52.2 4.30~ 5.23 63.8 4.14~ 5.31 68.2 1. 1~ 6.30 79.4 1. 1~ 5.31	6 6.7	6.3 0 ~ 6.3 0		
67.4 サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数) 67.4 72.8 52.0 5.1~ 5.23 74.1 4.30~ 4.30 52.2 4.30~ 5.23 63.8 4.14~ 5.31 68.2 1.1~ 6.30 79.4	7 1.8	5. 1 ~ 6.30	*	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8 3.9	3.1 5 ~ 5.3 1		
72.8 52.0 $5.1 \sim 5.23$ 74.1 $4.30 \sim 4.30$ 52.2 $4.30 \sim 5.23$ 63.8 $4.14 \sim 5.31$ 68.2 $1.1 \sim 6.30$ 79.4 $1.1 \sim 5.31$	6 7.4		サクラマス資源拡大再生産事業に引き継ぎ(全数)	50
52.0 $5. 1 \sim 5.23$ 74.1 $4.30 \sim 4.30$ 52.2 $4.30 \sim 5.23$ 63.8 $4.14 \sim 5.31$ 68.2 $1. 1 \sim 6.30$ 79.4	6 7.4	÷.		
$52.0 5. 1 \sim 5.23$ $74.1 4.30 \sim 4.30$ $52.2 4.30 \sim 5.23$ $63.8 4.14 \sim 5.31$ $68.2 1. 1 \sim 6.30$ $79.4 4.14 \sim 5.31$	7 2.8		2	
52.2 $4.30 \sim 5.23$ 63.8 $4.14 \sim 5.31$ 68.2 $1.1 \sim 6.30$ 79.4	5 2.0	5. 1 ~ 5.23	**************************************	
63.8 $4.14 \sim 5.31$ 68.2 $1.1 \sim 6.30$ 79.4	7 4.1	4.30 ~ 4.30		
6 8.2 1. 1 ~ 6.3 0	5 2.2	4.3 0 ~ 5.2 3		
7 9.4	6 3.8	4.1 4 ~ 5.3 1		
$\begin{pmatrix} 79.4 \\ (79.3) \end{pmatrix}$ 1. 1 ~ 5.31	6 8.2	1. 1 ~ 6.30		
	7 9.4 (7 9.3)	1. 1~ 5.31		

からふとます

本年度は、採卵数 2 3,7 5 0 千粒から道外移殖卵を除いた 2 3,3 9 4 千粒の種卵を 1 7 事業場と民営 尾、合計 2 0,3 9 0 千尾の稚魚を生産し、4 8 年 1 月 1 日から同年 6 月 1 5 日にかけて、全道 2 4 水系

第16表 昭和47年度海区・水系別からふとますふ化放流成績表

海	-le 7	事業場	the ext sin *h	死卵数	è Ш Б %h	у ш ф	放	流尾	数
区	水系	(収容場)	収容卵数	分丘 卯 安义	ふ出尾数	ふ出率	無給餌	給 餌	計
			千粒	千粒	千尾	%	千尾	千尾	千尾
	岩尾別	岩尾別	4,8 9 4	222	4,672	9 5.5	2,6 2 0	1,980	4.6 0 0
	斜 里	斜 里	4,104	250	3,8 5 4	9 3.9	1,804	1,970	3,774
才	藻 睪	藻 琴	6 6 8	6 2	606	9 0.7	600	0	600
ホ	常呂	北 見	600	7 4	5 2 6	8 7.7	5 2 0	0	5 2 0
1	湧 別	湧 別	1,2 4 4	275	969	7 7.9	. 0	872	872
٧	渚 滑	渚 滑	703	142	5 6 1	7 9.8	5 2 4	0	5 2 4
2	幌 内	幌 内	567	197	370	6 5.3	350	0	350
海	徳志別	徳志別	470	6 0	410	8 7.2	0	380	380
区	頓 別	頓 別	107	12	9 5	8 8.0	0	9 0	90
		本年度	1 3,3 5 7	1,294	1 2,0 6 3	9 0.3	6,418	5,292	1 1.7 1 0
	海区計	前年度	7 2.9 7 7	1 0,0 3 2	6 2.9 4 5	8 6.3	4 7,5 4 2	1 4.5 5 7	6 2.0 9 9
-	124 441								
	増幌	(増 幌)	4 4 6	3 6	410	9 1.9	0	405	405
B	天 塩	天 塩	1,3 6 6	7.5	1,291	9 4.5	0	1,200	1,200
本	信 砂	(信 砂)	9 2 5	72	853	9 2.2	0	770	770
海	礼文島ホロナイ	(船 泊)	302	1 6	286	9 4.7	0	. 270	270
区	V= [7 =1	本年度	3,0 3 9	199	2,8 4 0	9 3.5	0	2,6 4 5	2,6 4 5
	海区計	前年度	5 0,9 9 5	9,279	41,716	8 1.8	9,400	2 2,7 0 0	3 2,1 0 0

5 ケ所のふ化場に収容し, 給餌稚魚 1 0,1 9 7 千尾(給餌放流率 5 0.0%), 無給餌稚魚 1 0,1 9 3 千 に放流した。

+L 7# 40 BB	備	仮収容な	から収容	までの卵の	動き	事業場	単位	
放 流 期 間	1/用	考 稚 魚	移	殖放	流	括弧	書	
4. 1 ~ 4.30	天塩へ1,36651,000千粒,			1~300	千粒,增	晃へ42	0 千粒,	八雲へ
3.1 0 ~ 4.3 0	浜中へ927千	粒,信砂へ	9 2 3 千米	位,元浦河·	~918 ⁼	F 粒		
3. 1 ~ 3.31	岩尾別より63	0 千粒,網法	きより 3:	8 千粒				
3. 1 ~ 3.31								
2.1 2 ~ 5. 8								
4.17 ~ 4.17								
3. 1 ~ 3.31								
4. 1 ~ 5.31								
4.1 5 ~ 4.1 6								
2.1 2 ~ 5. 8								
3. 1 ~ 5.12								
6. 1 ~ 6. 1	岩尾別より42	0 千粒						
5. 1 ~ 5.11	" 1,36	6千粒						-
5.15 ~ 6.15	斜里より 92	3千粒			æ			
6. 9 ~ 6. 9	岩尾別より30	0 千粒						
5. 1 ~ 6.15								
4. 6 ~ 6.20				,				

海	7	(T.	事	業場	収容卵数	死卵数	ふ出尾数	ふ出 率	放	流 尾	数
区	/3	`	715	(47	(容場)		列 奶 数	か川宅奴	多田幸	無給餌	給 餌	計
						千粒	千粒	千尾	%	千尾	千尾	千尾
	羅		日	羅	臼	180	2 3	157	8 7.2	152	0	152
根	忠		類	忠	類	0	0	0	0.0	200	0	200
	標		津	根	室	8 8 2	107	775	8 7.9	970	0	970
室	当		幌	当	幌	0	0	0	0.0	100	150	250
	-床		丹	(床	(丹)	3 2 7	4 3	284	8 6.8	183	0	183
海	西		別	虹	別	1,4 3 3	2 2 4.	1,209	8 4.4	1,1 8 5	0	1,1 8 5
	風		蓮	浜	中	1,1 5 3	1 3 7	1,0 1 6	8 8.1	0	448	4 4 8
区	別	当	賀	厚	床	9 5	1 1	8 4	8 8.4	8 0	0	8 0
	海	X	計	本	年 度	4,0 7 0	5 4 5	3,5 2 5	8 6.6	2,8 7 0	598	3,4 6 8
	1119		ы	前	年 度	3 4,1 3 4	5,5 7 6	2 8,5 5 8	8 3.7	2 7,7 8 5	230	2 8,0 1 5
エリエ	釧		路	鶴	居	155	3 5	120	7 7.4	105	0	105
エリモ以東	海	IZ.	計	本	年 度	1 5 5	3 5	120	7 7.4	105	0	105
海区	(144			前	年度	3,2 8 0	703	2,5 7 7	7 8.6	2,4 6 5	0	2,4 6 5
エ	幌		満			0	0	0	0.0	800	0	800
リモ	元		浦	(元	浦河)	918	6 8	850	9 2.6	0	0	0
以一	遊	楽	部	八	雲	1,8 5 5	157	1,698	9 1.5	0	1,662	1,662
西海	海	X	計	本	年 度	2,7 7 3	2 2 5	2,5 4 8	9 1.9	800	1,6 6 2	2,4 6 2
区	(14)		a)	前	年度	1 0,9 0 6	1,8 5 6	9,050	8 3.0	1 3,5 1 4	1,494	1 5,0 0 8
	合		計	本	年度	2 3,3 9 4	2,2 9 8	2 1,0 9 6	9 0.2	1 0,1 9 3	10,197	20,390
	П		a1	前	年度	1 7 2,2 9 2	27,446	1 4 4,8 4 6	8 4.1	1 0 0,7 0 6	3 8,9 8 1	1 3 9,6 8 7

からふとます種卵の採卵から収容までの動き

採 卵 数 23,750千粒

道外移殖卵 △ 356 ″

収容卵数 23,394 //

+4 75 40 88	/db	-#-	仮収名	字から	収容	までの	卵の頭	動き事	業場道	单位
放 流 期 間	備	考	稚	魚	移	殖	放	流括	弧	書
3. 1 ~ 4.25										
	(浜中より20	0千尾)							
3.2 0 ~ 4.3 0	伊茶仁より88	2 千粒(〔浜中』	L b 2	0 0	千尾)				
	(床丹より10	0千尾,	浜中』	L b 1	5 0	千尾)				
4. 1 ~ 4.10	(当幌へ100	千尾)								
1. 1 ~ 1.31	矢臼別より2千	粒								
4.16 ~ 4.30	斜里より927	千粒(当	当幌へ 1	5 0	千尾	,忠舞	i^2	0 0 千尾,	標津^	、200千尾)
4.2 5 ~ 5.2 5	別当賀より95	千粒								
1. 1 ~ 5.25										
1.20 ~ 4.30										
3.20 ~ 3.31										
3.20 ~ 3.31										
4.1 5 ~ 5. 5										
2.23 ~ 2.25	(元浦河より8	0 0 千月	書)							
~	斜里より918	千粒(剪	見満へ 8	0 0	千尾)				
4. 1 ~ 5.10	有家(東北)へ 用として2千尾	3 5 6 1	一粒,岩	尾別	より	1, 0 0	0 千米	位(道水産。	か化場	湯へ調査試験
2.23 ~ 5.10										
3.20 ~ 4.26				;	· 3~					
1. 1 ~ 6.15										
1.20 ~ 6.20										

第17表 昭和47年度支・事業場別からふとますふ化放流成績表

-											
支	場	事	業	場	収容卵数	死卵数	ふ出尾数	ふ出率	放	流尾	数
	780	(4)	【容場	易)	(A)	2U 91 30	(B)	B/A×100	無給餌	給 餌	計 (C)
北	見	岩	尾	別	千粒 4,8 9 4	千粒 222	千尾 4,672	% 9 5.5	千尾 2,620	千尾 1,980	千尾 4,600
		斜		里	4,104	250	3,8 5 4	9 3.9	1,804	1,970	3,774
		澟		琴	668	62	606	9 0.7	600	0	600
		北		見	600	7 4	5 2 6	8 7.7	5 2 0	0	5 2 0
		湧		別	1,2 4 4	275	969	7 7.9	0	872	872
		渚		滑	703	142	561	7 9.8	5 2 4	0	5 2 4
		幌	L	内	567	197	370	6 5, 3	350	0	350
		本	年	度	1 2,7 8 0	1,2 2 2	1 1,5 5 8	9 0.4	6,418	4,8 2 2	1 1,2 4 0
		前	年	度	6 6,0 1 9	9,2 6 8	5 6,7 5 1	8 6.0	4 3,9 4 2	1 0,5 7 8	5 4,5 2 9
根	室	羅		日	180	2 3	157	8 7.2	152	0	152
		根		室	882	107	7 7 5	8 7.9	770	0	770
		(月	F F	子)	327	4 3	284	8 6.9	283	0 -	283
		虹		別	1,433	224	1,2 0 9	8 4.4	1,1 8 5	0	1,185
		厚		床	9 5	11	8 4	8 8.4	8 0	0	8 0
		浜	1	中	1,153	1 3 7	1,0 1 6	8 8.1	400	598	998
		本	年	度	4,0 7 0	5 4 5	3,5 2 5	8 6.6	2,8 7 0	598	3,4 6 8
		前	年	度	3 4,1 3 4	5,5 7 6	28,558	8 3.7	27,785	230	2 8,0 1 5
+	勝	鶴		居	155	3 5	120	7 7.4	105	0	105
		本	年	废	155	3 5	120	7 7.4	105	0 -	105
		前	年	废	3,280	703	2,5 7 7	7 8.6	2,4 6 5		2,4 6 5

	放 流 率 C/A×100	放 流 期 間	備	考
	% 9 4.0	4. 1 ~ 4.30		
	9 2.0	3.10 ~ 4.30		· .
	8 9.8	3. 1 ~ 3.31		
	8 6.7	3. 1 ~ 3.31		
	7 0.1	2.1 2 ~ 5. 8		
	7 4.5	4.17 ~ 4.17		
-	6 4.4	3. 1 ~ 3.31		
	8 8.1	2.1 2 ~ 5. 8		
	8 2.6	3. 1 ~ 5. 5		
	8 4.4	3. 1 ~ 4.25		
	8 7.3	3.20 ~ 4.30	•	
	8 6.5	4. 1 ~ 4.10		
	8 2.7	1. 1 ~ 1.31	,	-
Ì	8 4.2	4.25 ~ 5.25		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	8 6.6	3. 6 ~ 4.3 0		
	8 5.2	1. 1 ~ 5.25		
	8 2.1	1.20 ~ 5.31	5-3-e	· .
	6 7.7	3.20 ~ 3.31		
	6 7.7	3.3 0 ~ 3.3 1		· ·
	7 5.2	4.15 ~ 5. 5		

-1.	Len	事 業 場	収容卵数	TT 50 #4	ふ出尾数	ふ 出 率	放	-流 尾	数
支	場	(収容場)	(A)	死 卵 数	(B)	B/A×100	無給餌	給 餌	計 (C)
天	塩	徳 志 別	千粒 470	千粒 60	千尾 410	% 8 7.2	千尾	千尾 380	千尾 380
7		頓 別	107	1 2	9 5	8 8.8	0	9 0	9 0
		(増 幌)	4 4 6	3 6	4 1 0	9 1.9	0	4 0 5	405
		天 塩	1,3 6 6	7 5	1,2 9 1	9 4.5	0	1,2 0 0	1,200
		(信 砂)	9 2 5	7 2	853	9 2.2	0	770	770
		(船 泊)	3 0 2	16	286	9 4.7	0	270	270
		本 年 度	3.6 1 6	271	3,3 4 5	9 2.5	0	3,1 1 5	3,1 1 5
		前 年 度	37,956	5,5 5 2	3 2,4 0 4	8 5.4	4,3 0 0	2 6,6 7 0	30,970
千	歳	(元浦河)	918	6 8	850	9 2.6	800	0	8 0 0
	- 1	本 年 度	918	6 8	850	9 2.6	800	0	800
		前年度	2 4,8 6 5	5,2 3 8	1 9,6 2 7	7 8.9	1 8,9 1 3	0	1 8,9 1 3
渡	島	八雲	1,855	157	1,6 9 8	9 1.5	0	1,6 6 2	1,6 6 2
-		本 年 度	1,8 5 5	157	1,6 9 8	9 1.5	0	1,6 6 2	1,6 6 2
		前年度	6,0 3 8	1,1 0 9	4,9 2 9	8 1.6	3,3 0 1	1,494	4,795
合	計	本 年 度	2 3,3 9 4	2,2 9 8	2 1,0 9 6	9 0.2	1 0,1 9 3	10,197	20,390
		前年度	17 2,2 9 2	2 7,4 4 6	14 4,8 4 6	8 4.1	10 0,7 0 6	3 8,9 8 1	13 9,6 8 7

第18表 ます稚魚標識放流

4 105	27 111 67	+L 7= H0 BB	標
魚 種	河川名	放 流 期 間	尾 数 部 位
からふとます	湧 別	4 8. 5. 7	101千尾 脂ビレ・右腹ビレ
	"	4 8. 5. 8	98 "・左腹ビレ

放流率 C/A×100	放 流 期 間	備	考
% 8 0.9	4. 1 ~ 5.31		
8 4.1	4.15 ~ 4.16	,	
9 0.8	6. 1 ~ 6. 1		
8 7.8	5. 1 ~ 5.11		
8 3.2	5.15 ~ 6.15		
8 9.4	6. 9 ~ 6. 9		· v
8 6.1	4. 1 ~ 6.15		
8 1.6	3.15 ~ 6.20		
8 7.1	2.2 3 ~ 2.2 4		¥
8 7.1	2.2 3 ~ 2.2 4		
7 6.1	4. 1 ~ 4.20	_	
8 9.7	4. 1 ~ 5.10		= 1
8 9.7	4. 1 ~ 5.10		~
7 9.4	3.20 ~ 5.31		
8 7.2	1. 1 ~ 6.15		
8 1.1	1. 20~ 6.20		

			識	
給餌有無	魚	体		
有		-	(河口より7Km) }放流場所の相異による回帰効果の確認。	
有		-		

§ 9. ひめます増殖事業

1. ひめます捕獲採卵概況

本年のひめます捕獲採卵事業は、前年度と同様に支笏湖内の2捕獲採卵場で10月1日から11月25日まで実施し、19.730尾(うち雌10.220尾)の親魚を捕獲し、蓄養へい死等を除き、7.226尾の雌から2.743千粒の種卵を採卵した。(雌親魚使用率70.7%)計画に対しては、捕獲で98.7%、採卵で76.2%の達成率であつた。

第1表 昭和47年度ひめます親魚捕獲採卵成績表

海	1. =	捕獲	所 属	捕	獲	数	使	用親魚	数
区	水系	採卵場	事業場	♀ (尾)	8 (尾)	計(尾)	.♀ (尾)	8 (尾)	計(尾)
日	-t- Arts 340	湖畔	支笏湖	4,8 9 5	4,7 4 7	9,6 4 2	3,7 0 2	475	4,177
本	支笏湖	ポロピナイ	. "	5,3 2 5	4,763	1 0,0 8 8	3,5 2 4	4 3 8	3,9 6 2
海	A 51	本 年 度		1 0,2 2 0	9,5 1 0	1 9,7 3 0	7,2 2 6	913	8,139
区	合 計	前 年 度		8,0 4 3	5,5 4 3	1 3,5 8 6	6,3 4 3	1,1 4 4	7,487

採卵数	增減卵数	仮収容卵数	2 親魚使用率	平均採卵数	実 施 期 間
(千粒)	(千粒)	(千粒)	(%)	(粒)	关 施 物 间
1, 4 2 9	0	1, 4 2 9	7 5. 6	3 8 6	10. 1~11.25
1, 3 1 4	0	1, 3 1 4	6 6.2	3 7 3	1 0. 1 ~ 1 1.2 3
2, 7 4 3	0	2, 7 4 3	7 0.7	3 8 0	1 0. 1 ~ 1 1.2 5
2, 6 0 9	0	2, 6 0 9	7 8.9	4 1 0	1 0. 1 ~ 1 1.3 0

. 2. ひめます種卵の移殖ならびに分与

本年度は、ベニさけ生産事業用種卵945千粒を根室支場虹別事業場へ移殖,道内人工湖沼開発資源育成試験用として128千粒を北海道立水産ふ化場へ分与した。

また、この他に道内および本州の湖沼再生産種苗として514千を分譲した。

第2表 種卵の移殖・分与(発眼卵)

付	共 糸	合 地	1074 (E E	受	と糸	合 地	ļ	移	殖	斯] (0	内	訳		+本 西
支	場	事業場	移殖年月日	支	場	事業	場	移籍卵	数	移死	殖卵	前数	移実	卵	殖数	摘要
干	歳	支笏湖	47. 12. 23	根	室	虹	別	千 9 4	1			粒 3		F 9 0	粒) 2	ベニさけ生産事業用
,	"	"	48. 1.10	道立	7.水产	量ふ化	場	1 2	8			8		1 2	20	人工湖沼開発資源育成 試験用
	昔日	+						1,0 7	3		5	1	1	1,02	2 2	P-MX/13

第3表 種卵の分譲(発眼卵)

供	給 地	分譲年月日	受 給 地	分	譲卵	数	Labor Tana
支場	事業場名	の酸平方口	受給 地	移籍卵数	分譲前死卵数	分 実 卵 数	摘 要
千歳	士体油	49 1 10	日田田小本北洋町	千粒	千粒	千粒	
	支笏湖	48. 1. 10	長野県水産指導所	1 2 8	8	120	青木湖 (発眼卵)
"	"	1. 11	愛媛県土居町	1 1	1	1 0	土居多目的ダム(〃).
"	//	1. 9	福井県奥越漁協	107	7	100	九頭竜ダム (〃)
"	"	1. 22	福島県農制部	7 5	5	7 0	秋元湖, 沼沢沼(")
"	"	1. 10	洞爺湖漁協	8 6	6	8 0	洞爺湖 (〃)
"	. "	1. 10	阿寒湖漁協	6 4	4	6 0	阿寒湖 (〃)
"	//	1. 10	虎杖浜漁協	4 3	3	4 0	俱多楽湖 (")
	計			5 1 4	3 4	480	

3. ひめますふ化放流

支笏湖で 2.7 4 3 千粒の種卵を採卵し、このうち虹別事業場へ9 4 5 千粒、道立水産ふ化場へ1 2 8 千粒、長野県水産指導所、その他へ5 1 4 千粒を移殖および分譲し、残り1,1 5 6 千粒を支笏湖事業場へ収容した。これから1,0 0 9 千尾の稚魚を生産して、全数給餌を行なつて、4 8 年 5 月 7 日支笏湖へ放流した。

第4表 昭和47年度ひめますふ化放流成績表

海	水系	事	業	場	収容卵数	死卵数	ふ出尾数	ふ出率	放	流	尾	数
区	Z ((4	又容均	易)	N-11 51%	70 90 80	N-M/-E&X	204 III = 122	無給餌	給	餌	計
日十	支笏湖	支	笏	湖	千粒 1,1 5 6	千粒 71	千尾 1,085	% 9 3.9	千尾 0	1,	千尾	千尾 1,009
本海	合 計	本	年	度	1,1 5 6	7 1	1,0 8 5	9 3.9	0	1,0	009	1,009
区	н ні	前	年	度	1,382	1 2 3	1,259	9 1.1	1,204		0	1,2 0 4

th	放 流 期 間				備	考	仮事	容から	,収容	までの	り卵の	動き	·事業	場単	位	B-4-100
/JX	OIL	11/ 7	[H	J	1/闸	5	稚	魚	移	殖	放	流	·括	弧	書	
5.	7	~	5.	7	虹別事業場へ9	4 5	千粒,	道立水	産ふ	化場~	1 2	8 千粒,	長野	県水	産指導	所
5.	7	~	5.	7	OC 300 / J L / H - J	1 1	千粒,	福井県	奥越	漁協~	\1 0	7 千粒,	福島	県農	攻部へ	75
4.	2 5	~	4.2	5	千粒,洞爺湖漁 粒	筋へ	867	粒, kn	寒湖	漁協へ	√6 4 °	干粒,虎	杖浜	漁協	∼ 4 3	Ŧ

§ 10. 昭和47年度さけ・ます親魚蓄養成績

[さけ]

78水系85捕獲場で♀274,330尾, 8339,909尾合計614,239尾の親魚を捕獲し,♀274,330尾のうちから即日採卵25,100尾(即日使用率9.1%)蓄養不能3,428尾を除いた245,802尾が催熟のために蓄養された。(蓄養率98.6%)。

このうち、蓄養中の減耗は、へい死18,285尾、(蓄養へい死率7.4%)逃逸2.607尾、老魚740尾、調査4尾、未熟107尾、盗難95尾、その他不明37尾を差し引いた223,927尾(催熟率91.1%)が採卵に供された。2の総使用数は即日採卵25.100尾を加えると、249,027尾となり、全道平均の2使用率は前年度(90.1%)を若干上廻る90.8%の好成績を収めた。この成績を支場別に示すと、次のとおりである。

北見支場管内では、♀93,691尾を捕獲し即日採卵3,017尾,蓄養不能23尾を除く90,651 尾が蓄養された(蓄養率99,9%)蓄養中の滅耗はへい死,2,313尾(へい死率2.5%,)その他未熟,不明が58尾,これらを差引いた88,280尾(催熟率97.4%)が採卵に供され,これに即日採卵3,017尾を加えると♀の総使用数は91,297尾で,この使用率は97.4%となり前年度の96.7%を上廻る好成績を示した。なお、岩尾別川では総使用数のうち87.9%が即日採卵されたものである。根室支場管内では♀48.421尾を捕獲し、即日採卵6.976尾、蓄養不能628尾を除く40.817尾が蓄養された(蓄養率98.5%)。蓄養中の滅耗は、へい死474尾、老魚213尾、未熟86尾で、これを差引いた40.044尾(催熟率98.1%)が採卵に供され、これに即日採卵の6.976尾を加えると♀総使用数は47.020尾で、この使用率は97.1%の好成績を示した。

十勝支場管内では♀94,806尾を捕獲し、即日採卵86尾、蓄養不能343尾を除く94.377尾が蓄養された(蓄養率99.6%)。蓄養中の減耗はへい死13,326尾(へい死率14.1%)逃逸2.578尾、老魚470尾、盗難32尾を差引いた77,951尾(催熟率82.6%)が採卵に供され、これに即日採卵86尾を加えると♀総使用数は、78,037尾となり♀使用率は、82.3%(前年度85.1%)と、全道平均の90.8%をやや下廻る成績に終つた。

天塩支場管内では、\$213,047尾を捕獲しこれらは即日採卵 2.872尾、蓄養不能 906尾を除く 9,269尾が蓄養された(蓄養率 91.1%)。蓄養中の減耗はへい死 1,142尾、老魚 9尾、盗難 6尾 でこれらを差し引いた 8.112尾(催熟率 87.5%)が採卵に供され、これに即日採卵 2.872尾を加えると、9総使用数は 10.984尾となり、9使用率は 84.2%であつた。

千歳支場管内及び渡島支場管内でも前年度の捕獲尾数を上廻つたが、新規捕獲河川のへい死率は、いずれも低く蓄養技術の再検討が必要である。

[さくらます]

25水系25捕獲場で、27.459尾, 33.371尾の合計10.830尾の親魚を捕獲し、27.459尾のうちから、即日採卵1.163尾(即日使用率15.6%)、蓄養不能51尾を除いた6.245尾が催勢のために蓄養された。(蓄養率99.2%)

とのうち蓄養中の減耗は、へい死1,201尾(蓄養へい死率19.2%)逃逸113尾で、差し引き 4,931尾(蓄養率79.0%)が採卵に供され、♀の総使用率は即日採卵1,163尾を加えると6,094 尾となり,全道平均の♀使用率は,81.7%であつた。

各支場別には、北見支場管内で捕獲した♀親魚 1.1 5·5 尾を対象に蓄養実施されたが、蓄養中の減耗 (へい死 2 7.3%, 逃逸 5.3%)が多く最終的に♀使用率は、66.9%の成績にとどまつた。

根室支場管内では、前年度に比べ捕獲蓄養数は増加したものの蓄養中のへい死率は18.3%と前年度(14.5%)に比べ多く、従つて使用率も前年度を下廻る結果となつた。

また、天塩支場管内は前年度の約5倍の♀親魚を蓄養しその減耗も少なく、♀使用率81.1%(前年度.59.5%)の成績を残した。また、渡島支場管内では、捕獲親魚に対して、95.0%が即日採卵に供され、♀使用率は.99.6%の好成績をおさめた。

千歳支場管内では、蓄養尾数が少ないにもかかわらずほとんどが蓄養中滅耗し♀使用率 8.3%の不成績に終つているので今後、速やかな改善が望まれる。

[からふとます]

4 1 水系 4 3 捕獲場で、 Q 2 2.2 2 6 尾、 & 2 8.2 5 0 尾の合計 5 0.4 7 6 尾の親魚を捕獲し、 Q 親 魚のうちから即日採卵 5 1 尾 (即日使用率 0.2%)蓄養不能 3 5 1 尾を除いた 2 1.8 2 4 尾が、催熟の ために蓄養された。 (蓄養率 9 8.4%)

このうち、蓄養中の減耗はへい死3,211尾(蓄養へい死率14.7%), 逃逸440尾, 老魚65尾でこれらを差し引いた18,108尾(催熟率83.0%)が採卵に供され、♀の総使用数は即日採卵51尾を加えると、18,159尾となり全道平均での♀使用率は81.7%で前年度(88.9%)を下廻る成績であつた。

支場別では、北見支場管内が前年度と同様多数の来遊量があり、捕獲♀15,655尾のうち146尾の蓄養不能を除く15,509尾が蓄養された。

蓄養中の滅耗はルシャ並びに藻琴で河川増水のため、蓄養全数を失う一方へい死も1.457尾を数え 早使用率は86.8%と前年度(92.1%)を下廻る成績にとどまつた。

また、渡島支場管内でも前年度の約 4 倍近い蓄養があり、大いに期待されたが蓄養中 3 0.5 %の親魚を失ない、\$ 使用率 6 6.5 %にとどまつた。

根室支場・十勝支場・天塩支場管内では蓄養数が前年度に比較して非常に少なかつたが、♀使用率は70~80%台にとどまり、全道平均をやや下廻る結果となつたので今後の技術改善が望まれる。

[ひめます]

ひめますは前年同様支笏湖の湖畔及びポロピナイの.2.ヶ所で行なわれ、♀10,220尾89,510尾の合計19,730尾の親魚を捕獲し、♀10,220尾のうちから蓄養不能2.701尾を除く、7.519尾が催熟のために蓄養された。(蓄養率73.6%)

このうち蓄養中の減耗は、へい死174尾(α い死率2.3%)、逃逸119尾で差し引き7.226尾(催熟率96.1%)が採卵に供され、 α 使用率は α 0.7%と前年度の α 8.9%より若干下廻る成績になった。

〔べにさけ〕

根室支場管内,西別川捕獲採卵場で♀49尾&39尾の合計88尾の親魚を捕獲し,虹別事業場の湧水池へ全数を輸送して蓄養したが,魚病の発生により蓄養親魚の約90%を失ない♀親魚使用率は14.3%の不成績に終つたので,今後速やかなる改善が望まれるところである。

第1表 昭和47年度さけ親魚蓄養成績

「佰	В	44	v#:	AL.		9	親	魚	のタ	几 理			
項		捕	獲	数	試	即日	採卵	蓄		養	N.	蓄	養
採卵場	Column 1	ф	ð	計	験控除	尾 数	即日使用率	要 蓄 数	蓄 用 不能数	蓄用数	蓄養率	Q	ô
		尾	尾	尾		尾	%	尾	尾	尾	%	尾	尾
北見支	場												
岩尾	别	1,923	1,979	3,902		1,690	8 7.9	2 3 3	0	2 3 3	1 0 0.0	2 3 3	3 4 9
奥 蘂	別	1,8 0 3	1,7 1 8	3,5 2 1		0	0.0	1,8 0 3	0	1,8 0 3	1 0 0.0	1,8 0 3	0
斜	里	2 5,6 1 4	2 6,0 6 6	5 1,6 8 0		1 6 8	0.7	2 5,4 4 6	0	2 5,4 4 6	1 0 0.0	2 5,4 4 6	8,482
藻	琴	5 9 2	4 4 8	1,0 4 0		4 6	7.8	5 4 6	0	5 4 6	1 0 0.0	5 4 6	216
網	走	21,247	2 2,4 5 8	4 3,7 0 5		1,056	5.0	2 0,1 9 1	0	2 0,1 9 1	1 0 0.0	2 0,1 9 1	9,3 3 8
西 網	走	5 5	2 5	8 0		5 5	1 0 0.0	0	0	0	0.0	0	0
能取	湖	5 1	103	154		2	3.9	4 9	1 1	3 8	77.3	3 8	1 0
常	呂	3,1 7 3	3,1 5 1	6,3 2 4		0	0.0	3,1 7 3	0	3,173	1 0 0.0	3,173	1,039
ライトニ	in.	7 8	4 6	124		0	0.0	7 8	0	7 8	1 0 0.0	7 8	4 6
佐呂間	別	968	8 1 4	1,782		0	0.0	968	0	968	1 0 0.0	968	282
湧	別	3 2,3 7 5	4 0,0 2 7	7 2,4 0 2		0	0.0	3 2,3 7 5	1 2	3 2,3 6 3	9 9.9	3 2,3 6 3	9,367
渚	滑	4,183	4,4 1 5	8,5 9 8		0	0.0	4,183	0	4,183	1 0 0.0	4,183	1,304
藻 興	部	9 9	9 7	196		0	0.0	9 9	0	9 9	1 0 0.0	9 9	6 1
幌	内	1,5 3 0	2,4 4 6	3,9 7 6		0	0.0	1,5 3 0	0	1,5 3 0	1 0 0.0	1,5 3 0	5 2 '
(北見記	計)	9 3,6 9 1	103,793	197,484		3,0 1 7	3.2	9 0,6 7 4	2 3	9 0,6 5 1	9 9.9	9 0,6 5 1	3 1,0 2
前年	度)	6 0,7 7 4	56,491	117,265		9,479	156	5 1,2 9 5	6 4	5 1,2 3 1	9 9.9	5 1,2 3 1	2 5,1 8 9
根室支	場												
ル	サ	403	3 7 6	7 7 9		270	6 7.0	1 3 3	1 9	114	8 5.7	1 1 4	1.1,3
羅	臼	4,7 9 1	2,6 4 1	7,4 3 2		3,9 3 4	8 3.1	8 5 7	478	3 7 9	4 6.3	3 7 9	1 2
植	別	2,0 9 4	1,2 1 6	3,3 1 0		4 6 4	2 2.2	1,6 3 0	0	1,6 3 0	1 0 0.0	1,630	800
元崎無	、異	1,326	6 6 4	1,990		390	2 9.4	936	0	9 3 6	1 0 0.0	936	4 2 3
崎 無	異	1,1 3 1	6 4 0	1,771		3 3 1	2 9.3	800	1	799	9 9.9	799	4 0
薫	別	2,4 7 1	9 4 7	3,4 1 8		420	1 7.0	2,0 5 1	2 6	2,0 2 5	9 8.7	2,0 2 5	8.0
古 多	糠	3 4 9	276	6 2 5		8 3	2 3.8	2 6 6	5	261	9 8.1	2 6 1	19
忠	類	9 6 1	4.78	1,439		6 4	6.7	8 9 7	0	8 9 7	1 0 0.0	897	4 5
伊茶	仁	4,3 1 9	1,7 4 3	6,0 6 2		1 2 8	3.0	4,1 9 1	0	4,1 9 1	1 0 0.0	4,191	1,70
標	津	1 2,9 7 6	2 0,0 1 9	3 2,9 9 5		8 6	0.7	1 2,8 9 0	0	1 2,8 9 0	1 0 0.0	1 2,8 9 0	6,1 0
3 1	線	7 8	8 9	1 6 7		5 6	7 1.8	2 2	2 0	2	9.1	2	
当 .	幌	1,3 2 7	1,4 8 4	2,8 1 1		2 6	2.0	1,3 0 1	2 7	1,2 7 4	9 7.9	1,274	7 5
春	别	3 4 8	2 4 2	5 9 0		0	0.0	3 4 8	0	3 4 8	1 0 0.0	3 4 8	2 4

蓄		養		内		訳	1				総	使
数		蓄	養		ρ		親		魚		使	用
計	催熟	催熟率	へい死	へい死	- 7		0	他		その他	用	
пI	1年 水	1年次(十)	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
	÷		81									
5 8 2	2 3 3	1 0 0.0	0	0.0	-	-	-	-	0	0.0	1,9 2 3	1 0 0.0
1,803	1,771	9 8.2	3 2	1.8	_	-	-	-	0	0.0	1,7 7 1	9 8.2
3 3,9 2 8	24,790	9 7.4	619	2.4	-	-	不明 37	-	3 7	0.1	2 4,9 5 8	9 7.4
762	5 3 1	9 7.3	1 5	2.7	-	-	-	-	0	0.0	5 7 7	9 7.5
2 9,5 2 9	1 9,1 9 7	9 5.1	994	4.9	-		-	-	. 0	0.0	20,253	9 5.3
0	0	0.0	0	0.0	-	-	-	-	0	0.0	5 5	1 0 0.0
48	7	1 8.4	3 1	8 1.6	_	-	-		0	0.0	9	1 7.6
4,2 1 2	3,164	9 9.7	9	0.3	-	-		-	0	0.0	3,1 6 4	9 9.7
1 2 4	7 8	1 0 0.0	0	0.0	-	_	-	-	0	0.0	7.8	1 0 0.0
1,250	937	9 6.8	3 1	3.2	-	-	-		0	0.0	937	9 6.8
4 1,7 3 0	31,789	9 8.2	553	1.7	_	-	-	2 1	2 1	0.1	3 1,7 8 9	9 8.2
5,487	4,164	9 9.5	19	0.5	_	-	-	-	0	0.0	4,1 6 4	9 9.5
160	9 3	9 3.9	6	6.1	_	-	_	-	0	0.0	9 3	9 3.9
2,057	1,5 2 6	9 9.7	4	0.3	-	_	-	-	0	0.0	1,5 2 6	. 9 9.7
121,6 7 2	8 8,2 8 0	9 7.4	2,3 1 3	2.5	Θ	0	(3円)	2 1	5.8	0.1	9 1,2 9 7	9 7.4
7 6,4 2 0	4 9,2 8 4	9 6.2	1,7 5 1	3.4	1 3 7	5 9	0	0	196	0.4	5 8,7 6 3	9 6.7
				-								
2 2 7	114	1 0 0.0	0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	384	9 5.3
507	3 4 8	9 1.8	2 9	7.7	-	-	_	2	2	0.5	4,282	8 9.4
2,4 3 0	1,5 3 4	9 4.1	8	0.5	-	5 6	-	3 2	88	5.4	1,998	9 5.4
1,358	861	9 2.0	1 3	1.4	_	4 3	-	19	6 2	6.6	1,251	9 4:3
1,205	730	9 1.4	9	1.1	-	3 5	-	2 5	6.0	7.5	1,061	9 3.8
2,8 3 2	1,966	9 7.1	0	0.0	_	5 9	-	-	5 9	2.9	2,3 8 6	9 6.6
457	2 2 0	8 4.3	1 3	5.0	-	2 0	-	8	28	1 0.7	303	8 6.8
1,355	893	9 9.6	4	0.5	-	-	-	-	0	0.0	9 5 7	9 9.6
5,893	4.1 6 7	9 9.4	2 4	0.7	_	_	_	-	0	0.0	4,295	9 9.4
1 8,9 9 6	1 2,8 0 9	9 9.4	8 1	0.6	-	_	-	_	0	0.0	1 2.8 9 5	9 9.4
4	2	i 0 0.0	0	0.0	_		_	_	0	0.0	-58	7 4.4
2,0 2 5	1,255	9 8.5	19	1.5	_	-	-	_	0	0.0	1,281	9 6.5
5 9 0	3 4 8	1 0 0.0	0	0.0	_	-	_	_	0	0.0	3 4 8	1 0 0.0

-107-

			7		·	親	魚	0	処 理			
項目	捕	獲	数	試		採卵			変 達		蓄	養
採卵場	ę	â	計	験控除	尾数	ル 伊 伊 ア ア	要蓄	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率		8
	尾	尾	尾	EST	尾	%	尾	尾	、尾	%	尾	尾
床 丹		662	1,3 7 9		0	0.0	717	0	717	1 0 0.0	717	662
	1 3,6 2 1	1 4,5 2 0	2 8,1 4 1		724	5.3	1 2,8 9 7	0	1 2,8 9 7	1 0 0.0	1 2,8 9 7	5,3 2 7
矢臼別	5 6	3 2	8 8		0	0.0	5 6	0	5 6	1 0 0.0	5 6	3 2
風 蓮	656	588	1,2 4 4		0	0.0	656	3 2	624	9 5.1	624	258
別当賀	721	1,3 1 4	2,0 3 5		0	0.0	7 2 1	20	701	9 7.2	701	896
穂 香	7 6	5 4	1 3 0		0	0.0	7 6	0	7 6	1 0 0.0	7 6	5 3
(根室計)	4 8,4 2 1	4 7,9 8 5	9 6,4 0 6		6,9 7 6	1 4.4	4 1,4 4 5	6 2 8	4 0,8 1 7	9 8.5	4 0,8 1 7	1 9,3 6 1
(前年度)	7 5,6 4 1	7 3,5 4 5	149,186		4,4 6 5	5.9	7 1,1 7 6	3 2 6	7 0,8 5 0	9 9.5	7 0,8 5 0	3 2,3 8 3
十勝支場												
幌戸	108	106	2 1 4		0	0.0	108	10	98	9 2.5	98	7 1
厚岸	4,3 6 7	3,8 0 5	8,172		0	0.0	4,3 6 7	0	4,3 6 7	1 0 0.0	4,3 6 7	1,493
釧路	3 7,6 7 4	5 5,1 9 1	9 2,8 6 5		0	0.0	3 7,6 7 4	0	3 7,6 7 4	1 0 0.0	3 7,6 7 4	1 3,2 8 0
チョロベツ	4 9	7 2	121		0	0.0	4 9	0	4 9	1 0 0.0	4 9	7 2
阿寒	20	5 4	7 4		0	0.0	2 0	0	20	1 0 0.0	2 0	5
茶 路	8 4	193	277		0	0.0	8 4	0	8 4	1 0 0.0	8 4	2.1
庶 遊	4 6	1 9	6 5		0	0.0	4 6	1 2	3 4	7 3.9	3 4	5
音 別	3 2	6	3.8		0	0.0	3 2	0	3 2	1 0 0.0	3 2	6
打 内	1 8, 6 1 9	2 8,4 7 6	4 7,0 9 5		0	0.0	1 8,6 1 9	257	1.8,362	9 8.6	1 8,3 6 2	2,8 1 8
利別	203	5 0 1	704		0	0.0	203	2 2	181	8 9.2	181	6 1
東33号	2,7 1 2	3,474	6,1 8 6	-	0	0.0	2,7 1 2	. 0	2,7 1 2	1 0 0.0	2,7 1 2	1 3 6
幕 別	6.5 8 8	7,6 5 5	1 4,2 4 3		0	0.0	6,5 8 8	4	6,5 8 4	9 9.9	6,584	1,2 9 2
千代田	2 3,2 8 0	3 9,0 3 2	6 2,3 1 2		0	0.0	2 3,2 8 0	6	2 3,2 7 4	9 9.9	2 3,2 7 4	6,210
歴 舟	3 7 3	774	1,1 4 7		6 3	1 6.9	310	3	3 0 7	9 9.0	307	156
広 尾	604	6 7 4	1,2 7 8		0	0.0	604	2 7	577	9 5.5	577	156
豊 似	5	6	11		0	0.0	5	0	5	1 0 0.0	5	6
猿 留	4 2	6 4	106		2 3	5 4.8	19	2	1 7	8 9.9	1 7	3 5
(十勝計)	94,806	140,102	234,908		8 6	0.1	94,720	3 4 3	94,377	9 9.6	94,377	2 5,8 2 3
(前年度)	185,184	337,806	522,990	142	1 3 7	0.1	184,905	1,3 6 2	183,543	9 9.3	183,543	4 2,6 9 9

	者	ŧ.	養	ě	内	3	訳				総	使
数		蓄		養	Ş		親	魚	A		使	用
計	催熟	催熟率	へい死	へい死		そ	0	他		その他	用。	713
	THE TAX	惟水中	.4.70	率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
1,379	710	9 9.0	7	1.0	-	-	-	-	0	0.0	7 1 0	9 9.0
1 8,2 2 4	1 2.7 8 7	9 9.1	110	0.9	-	-	-	-	0	0.0	1 3,5 1 1	9 9.2
8 8	4 7	8 3.9	9	1 6.1	-	-	-	-	0	0.0	4 7	8 3.9
882	515	8 2.5	109	1 7.5	-	-	-	-	0	0.0	5 1 5	7 8.5
1,5 9 7	679	9 6.9	2 2	3.1	-	-		-	0	0.0	679	9 4.2
1 2 9	5 9	7 7.6	1 7	2 2.4	-		_	-	0	0.0	5 9	7 7.6
60,178	4 0,0 4 4	9 8.1	474	1.2	0	213	0	8 6	299	0.7	4 7,0 2 0	9 7.1
103,233	6 9,4 7 1	9 8.1	1,0 9 2	1.4	2 6	2 2 6	0	3 5	287	0.4	7 3,9 3 6	9 7.7
169	7 2	7 3.5	2 6	2 6.5	-	, -		-	0	0.0	7 2	6 6.7
5,8 6 0	4,053	9 2.8	282	6.5	-		(盗難32)	-	3 2	0.7	4,0 5 3	9 2.8
5 0,9 5 4	3 1,2 1 3	8 2.9	5,5 6 1	1 4.8	900		-	-	900	2.3	3 1,2 1 3	8 2.9
1 2 1	27	5 5.1	2 2	4 4.9		-	-	_	0	0.0	. 27	5 5.1
2 5	17	8 5.0	3	1 5.0	-	-	-	-	0	0.0	1 7	8 5.0
1 0 5	68	8 1.0	1 6	1 9.0	-	-	_	-	0	0.0	6 8	8 1.0
3 9	1 9	5 5.9	1 5	4 4.1	-	-	-	-	.0	0.0	19	4 1.3
3 8	3 1	9 6.9	1	3.1	-		-	-	0	0.0	3 1	9 6.9
2 1,1 8 0	1 0,9 5 0	5 9.6	5,484	2 9.9	1,4 3 8	490	_	-	1,928	1 0.5	1 0,9 5 0	5 8.8
2 4 2	1 4 1	7 7.9	4 0	2 2.1	-,-	-	_	-	0	0.0	1 4 1	6 9.5
2,8 4 8	1					-	-	-			2,5 4 6	9 3.9
7,8 7 6	30,676	9 4.2	1,6 5 4	5.1	240	-	-	-	2 4 0	0.0	6,1 9 7	9 4.1
2 9.4 8 4	J					_	-	-			21,933	9 4.2
463	191	6 1.2	116	3 8.8	-	-	_	-	0	0.0	254	6 8.1
7 3 3	472	8 1.8	1 0 5	1 8.2	_		-	-	0	0.0	472	7 8.1
11	5	1 0 0.0	0	0.0	-	-	-	-	0	0.0	5	1 0 0.0
5 2	1 6	9 4.1	1	0.6	_	-	-	_	0	0.0	3 9	9 2.9
120,200	77,951	8 2.6	13,326	1 4.1	2,5 7 8	490	(盗難32)	0	3,100	3.3	78,037	8 2.3
226,242	157,376	8 5.7	23,880	1 3.0	6 6	0	(不明魚	0	2,2 8 7	1.2	157,513	8 5.1

	755 [7]			411		·	親	魚	のタ	0 理			
/	項目	捕	獲	数	試	即日	採卵	幸	苔	翁		蓄	養
採項	市場	9	8	計	験控除	尾数	即 日使用率	要 蓄 数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	ç	8
		尾	尾	尾		尾	%	尾	尾	. 尾	%	尾	尾
天塩	支場												
徳	志別	5,727	5,493	1 1,2 2 0		2,023	3 5.3	3,704	281	3,4 2 3	9 2.4	3,4 2 3	1,2 3 5
北見	幌別	1,1 7 3	1,799	2,972		0	0.0	1,1 7 3	0	1,1 7 3	1 0 0.0	1,1 7 3	3 8 5
頓	别	1,680	1,652	3,3 3 2		0	0.0	1,680	0	1,680	1 0 0.0	1.6 8 0	1,303
増	幌	48	6 2	110		1 6	3 3.3	3 2	0	3 2	1 0 0.0	3 2	6 1
天	塩	1,8 4 1	2,6 6 0	4,5 0 1		0	0.0	1,841	5 7 8	1,263	6 8.6	1,263	3 1 3
下	中川	1,779	1,5 6 0	3,3 3 9		8 3 3	4 6.8	9 4 6	4 7	899	9 5.0	899	296
小	平藥	2	9	1 1		0	0.0	2	0	2	1 0 0.0	2	9
署	寒別	797	997	1,794		0	0.0	797	0	797	1 0 0.0	797	5 1 9
(天	塩計)	1 3,0 4 7	1 4,2 3 2	27,279		2,8 7 2	2 2.0	1 0,1 7 5	906	9,269	9 1.1	9,269	4,1 2 1
(前	年度)	3,2 3 6	6,5 3 4	9,770		693	2 1.4	2,5 4 3	6 6	2,477	9 7.4	2,477	1,298
千岁	支場												
西	越	6,073	6,8 2 6	1 2,8 9 9		2,0 1 7	3 3.2	4,0 5 6	2 1 9	3,8 3 7	6 3.2	3,8 3 7	1,0 5 9
余	市	475	404	8 7 9		. 5	1.1	470	4	466	9 8.1	466	1 2 5
仁	雁別	8 4	158	2 4 2		1 2	1 4.0	. 72	1	7 1	8 4.0	7 1	1 1 5
幌	満	. 4	6	1 0		1	2 5.0	3	0	3	7 5.0	3	5
幌	別	280	3 2 1	601		0	0.0	280	1	279	9 9.6	279	2 4 5
元	浦川	5 7	6 6	123	3	2 3	4 0.4	3 4	0	3 4	1 0 0.0	3 4	1 2
三	石	5 4	3 2	8 6	5	4	7.4	5 0	0	5 0	1 0 0.0	5 0	2 9
静	内	1,8 5 2	3,8 3 7	5,6 8 9)	0	0.0	1,8 5 2	5 0 3	1,3 4 9	7 2.8	1,3 4 9	4 6 3
新	冠	5 8	7 4	1 3 2	2	0	0.0	5 8	8	5 0	8 6.2	5 0	3 6
富)11	3 9 2	5 6 9	961		0	0.0	3 9 2	7	3 8 5	9 8.2	3 8 5	117
鹉	Ш	3 6 3	4 3 8	8 0	1	0	0.0	3 6 3	2 5	3 3 8	9 3.1	3 3 8	4 9
勇	払	1 2 6	4 3 3	5 5 9)	0	0.0	1 2 6	0	1 2 6	1 0 0.0	1 2 6	7 1
白	老		2 2 6	273	3	3 3	7 0:2	1 4	0	1 4	1 0 0.0	1 4	1 2
敷	生	162	4 9 7	6 5 9	9	162	1 0 0.0	0	0	0	0.0	0	0
-	歳計)	-	1 3,8 8 7	2 3,9 1	4	2,2 5 7	2 1.4	7,7 7 0	768	7,0 0 2	9 0.1	7,0 0 2	2,3 3 8
1	年度)		1 1,1 0 4	1 8,2 4	6	1,213	1 1.4	5,918	358	5,5 6 0	9 3.9	5,5 6 0	2,1 2 7

	蓄	養		内		Ē	尺				統	使
数		蓄	善	Ę I	φ		親	魚			使	用
計	催熟	催熟率	へい死	へい死		そ	0	他		その他	用	
	711	1,22,111		率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
4,658	3,3 8 0	9 8.7	3 9	1.1	-	4	-	-	4	0.1	5,4 0 3	9 4.3
1,5 5 8	1,0 2 3	8 7.2	150	1 2.8	-	-	-	-	0	0.0	1,0 2 3	8 7.2
2,983	1,677	9 9.8	3	0.2	-	-	-	-	0	0.0	1,677	9 9.8
9 3	3 1	9 6.9	1	3.1	-	-	-	-	0	0.0	4 7	9 7.9
1,5 7 6	3 5 1	2 7.8	9 1 2	7 2.2	-	-	_	-	0	0.0	3 5 1	1 9.1
1,1 9 5	8 7 9	9 7.8	9	1.0	-	5	(盗難)	-	1 1	1.2	1,712	9 6.2
1 1	0	0.0	2	1 0 0.0	-	-	-	-	0	0.0	0	0.0
1,3 1 6	771	9 6.7	2 6	3 3	-	-	-	-	0	0.0	7 7 1	9 6.7
1 3,3 9 0	8,112	8 7.5	1,1 4 2	1 2.3	0	9	(盗難)	0	1 5	0.2	1 0,9 8 4	8 4.2
3,775	1,970	7 9.5	406	1 6.4	16	8 3	1	1	101	5.1	2,668	8 2.3
4,896	3,5 8 0	9 3.4	257	6.6	-	-	-	-	0	0.0	5,5 9 7	9 2.2
5 9 1	4 4 3	9 5.1	2 3	4.9	-	-		-	0	0.0	4 4 8	9 4.3
186	6 9	9 7.0	2	2.0	-	_	-	_	0	0.0	8 1	9 6.0
8	2	6 6.7	1	3 3.3	-	-	-	-	0	0.0	3	7 5.0
5 2 4	266	9 5.3	1 2	4.3	-	-	1	-	1	0.4	266	9 5.0
4 6	3 3	9 7.1	1	2.9	-	-	-	-	0	0.0	5 6	9 8.2
7 9	4 8	9 6.0	2	4.0	-	-	_	_	0	0.0	5 2	9 6.3
1,8 1 2	1,1 5 7	8 5.8	171	1 4.2	18	-	3	-	2 1	1.6	1,1 5 7	6 2.5
8 6	. 50	1 0 0.0	0	0.0	_	_	-	-	0	0.0	5 0	8 6.2
502	2 3 6	6 1.3	9 2	2 3.9	-	-	(盗難)	-	5 7	1 4.8	2 3 6	6 0.2
387	338	1 0 0.0	0	0.0	-	-	_	-	0	0.0	3 3 8	9 3.1
197	6.5	5 1.6	6 1	4 8.4	_	-	1, 44	_	0	0.0	6 5	5 1.6
2 6	6	4 2.9	0	0.0	-	8	-	-	8	5 7.1	3 9	8 3.0
0	0	0	0	0.0	_	-	7-1	-	0	0.0	162	1 0 0.0
9,3 4 0	6,2 9 3	8 8.2	622	1 0.9	18	8	(答舞)	-	8 7	1.2	8,5 5 0	8 1.2
7,687	4,424	7 9.6	968	1 7.4	0	9	0	159	168	3.8	5,637	7 9.0

/	項目	1	44	ytts	*/-		Q	親	魚	0	処 理			
/	火!	1	捕	獲	数	試	即日	採卵	177	蒈	養		蓄	養
採	卵場		ę	8	計	験控除	尾数	即日使用率	要 蓄 数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	φ	ð
		1	尾	尾	尾		尾	%	尾	尾	尾	%	尾	尾
渡	島支場	177							+				6	
遊	楽部	ß	1,9 2 8	2,0 1 1	3,9 3 9		6 3 1	3 2.7	1,2 9 7	6 5	1,2 3 2	9 5.0	1,2 3 2	991
貫	気 另	IJ	26	3 4	6 0		0	0.0	2 6	1	2 5	9 6.2	2 5	2 9
長	万部	3	6 9	6 2	1 3 1		0	0.0	6 9	6	6 3	9 1.3	6 3	3 (
尻	岸片	3	9 4	8 4	178		15	1 6.0	7 9	1 6	6 3	7 9.7	6 3	4
汐	淮	5	7 1 5	1,2 1 9	1,9 3 4		4 0	5.6	675	1 3	662	9 8.1	662	1,0 4
F	切地	b.	8 6	104	190		0	0.0	8 6	0	8 6	1 0 0.0	8 6	10
茂	辺地	1	7,5 9 9	1 1,7 2 7	1 9,3 2 6		6,9 9 6	9 2.1	603	603	0	0.0	0	- (
亀	Л	1	386	3 5 4	7 4 0		3 3 3	8 6.3	5 3	9	4 4	8 3.1	4 4	1
知	P	3	254	190	4 4 4		116	4 5.7	1 3 8	3 1	107	7 7.5	107	9 :
厚	沢音	B	1,8 2 0	2,8 6 4	4,684		5 5 4	3 0.4	1,2 6 6	0	1,2 6 6	1 0 0.0	1,2 6 6	7 1
利	另	ij	1,223	1,101	2,3 2 4		1,207	9 8.7	1 6	1 6	0	0.0	0	
朱	t	7	138	1 6 0	298		- 0	0.0	138	0	1 3 8	1 0 0.0	1 3 8	8
())	[島計)	1 4,3 3 8	1 9,9 1 0	3 4,2 4 8		9,8 9 2	6 9.0	4,4 4 6	760	3,6 8 6	8 2.9	3,686	3,1 4
前	「年度)	1 1,6 7 2	1 6,0 5 5	2 7,7 2 7		9,383	8 0.4	2,289	493	1,796	7 8.5	1,796	1,25
合	章	+	274,330	339,909	614,239	0	25,100	9.1	249,230	3,4 2 8	245,802	9 8.6	245,802	85,81
前	年度	芝	343,644	501,535	845,179	148	25,370	7.4	318,126	2,6 6 9	315,457	9 9.2	315,457	104,952

	習	ř	煮		P	3	訳				総	使
数		蓄		養	9		親	魚			使	用
計	催熟	催熟率	へい死	へい死		そ	0	他		その他	用	
D.I.	惟然	惟杰华	-V-19L	率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
2,2 2 9	1,1 9 1	9 6.7	2 1	1.7	_	2 0	-	-	2 0	1,6	1,8 2 2	9 4.5
5 4	- 7	2 8.0	18	7 2.0	_	-	-	-	0	0.0	7	2 6.9
93	6 2	9 8.4	1	1.6	-	-	-	-	0	0.0	6 2	8 9.9
104	1 3	2 0.1	3 9	6 1.9	1 1	-	-	-	1 1	1 7.5	28	2 9.8
1,704	3 7 1	5 6.0	291	4 4.0	-		-	-	0	0.0	411	5 7.
190	8 4	9 7.7	2	2.3	-	-	-	-	0	0.0	8 4	9 7.
0	0	0.0	0	0.0	-	-	-	_	0	0.0	6,996	9 2.
5 8	4 4	1 0 0.0	0	0.0	-		, L -	-	0	0.0	3 7 7	9 7.
199	9 0	8 4.1	17	1 5.9	-	-	-	-	0	0.0	206	8 1.
1,977	1,255	9 9.1	11	0.9	-	-	-	-	0	0.0	1,8 0 9	9 9.
0	0	0	0	0.0	-	_	-	-	0	0.0	1,207	9 8.
2 2 5	1 3 0	9 4.2	8	5.8		-	-		0	0.0	1 3 0	9 4.
6,8 3 3	3,2 4 7	8 8.1	408	1 1.1	1 1	20	0	θ	3 1	0.8	1 3,1 3 9	9 1.
3,0 5 2	1,7 2 6	9 6.1	5 3	3.0	- 0	1 2	5	0	1 7	0.9	1 1,1 0 9	9 5.
331,613	223,927	9 1.1	18,285	7.4	2,6 0 7	盗難95 740	不明37 4 不明2221	107	3,5 9 0	1.5	249,027	9 0.
420,409	284,251	9 0.1	28,150	8.9	206	389 盗難39	6	195	3,0 5 6	1.0	309,621	9 0.

第2表 昭和47年度さくらます親魚蓄養成績

項目	捕	獲 娄	汝		ρ	親	魚		0. 理			
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1用	9支 女		試験	即日	採卵	Ť	皆	老	Ė	蓄	養
採卵場	\$	ô	計	映控除	尾数	即日使用率	要 蓄 数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	φ	ô
	尾	尾	尾		尾	%	尾	尾	尾	%	尾	尾
北見支場		,										
岩尾別	7 8	3 1	109		0	0.0	7 8	0	7 8	1 0 0.0	7 8	3 1
斜 里	708	4 3 6	1,1 4 4		0	0.0	7 0 8	0	708	1 0 0.0	708	293
渚 滑	369	204	5 7 3		0	0.0	3 6 9	8	3 6 1	9 7.8	3 6 1	7 2
(北見計)	1,1 5 5	671	1,8 2 6		0	0.0	1,1 5 5	8	1,1 4 7	9 9.3	1,1 4 7	3 9 6
(前年度)	1,7 4 2	1,0 7 3	2,8 1 5		1 1	0.6	1,7 3 1	0	1,7 3 1	1 0 0.0	1,731	8 3 6
根室支場												
忠 類	6	2	8		0	0.0	6	0	6	1 0 0.0	6	2
伊茶仁	1 2	5	1 7		0	0.0	1 2	0	1 2	1 0 0.0	1 2	5
標準	1,5 1 9	4 3 1	1,9 5 0		0	0.0	1,5 1 9	0	1,5 1 9	1 0 0.0	1,5 1 9	4 3 1
当 幌	6 2	4 7	109		0	0.0	6 2	0	6 2	1 0 0.0	6 2	4.7
春 別	3 0	1 2	4 2		0	0.0	3 0	0	3 0	1 0 0.0	3 0	1 2
床 丹	2 6	8	3 4		0	0.0	2 6	0	2 6	1 0 0.0	2 6	8
西 別	467	228	695		0	0.0	4 6 7	0	4 6 7	1 0 0.0	467	2 2 8
矢 臼 別	5 7	4 6	103		0	0.0	5 7	0	5 7	1 0 0.0	5 7	4 6
風 蓮	3 2 3	133	456		0	0.0	3 2 3	0	3 2 3	1 0 0.0	3 2 3	8 3
別当賀	5 6 9	424	993		0	0.0	5 6 9	0	5 6 9	1 0 0.0	569	424
(根室計)	3.0 7 1	1,3 3 6	4,407		0	0.0	3,0 7 1	0	3,0 7 1	1 0 0.0	3,0 7 1	1,286
(前年度)	2,013	939	2,9 5 2		0	0.0	2,0 1 3	0	2,0 1 3	1 0 0.0	2,0 1 3	939
天塩支場					0							
徳 志 別	1,0 4 9	382	1,4 3 1		0	0.0	1,0 4 9	1 3	1,0 3 6	9 8.8	1,0 3 6	3 7 7
北見幌別	7 7 5	216	991		0	0.0	7 7 5	2 2	. 753	9 7.2	753	216
知来別	1 2	7	1 9		0	0.0	1 2	0	1 2	1 0 0.0	1 2	
増 幌	1 1	2	1 3		0	0.0	1 1	0	1 1	1 0 0.0	1 1	1
下中川	2 6	3 4	6 0		9	3 4.6	1 7	4	1 3	7 6.5	1 3	
遠別	1 5	0	1 5		0	0.0	1 5	4	1 1	7 3.3	1 1	(
信 砂	8 2	4 7	1 2 9		0	0.0	8 2	0	8 2	1 0 0.0	8 2	4 '
(天塩計)	1,9 7 0	688	2.6 5 8		9	0.5	1,961	4 3	1,9 1 8	9 7.8	1,9 1 8	654
(前年度)	405	9 5	500		4	1.0	401	3 3	368	9 0.9	368	7 5

	蓄	養		内		ii)					彩色	使
数		蓄	養		ô		親	魚			使	用
計	催熟	催熟率	へい死	へい死	7		0	他	and the second of the second	その他	用	
н.	THE AM	THE ANN T		率	逃逸	老魚		未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
1 0 9	7 7	9 8.7	1	1.3	_	-	_	-	0	0.0	7 7	9 8.7
1,0 0 1	3 8 4	5 4.2	263	3 7.1	6 1	-	-	-	6 1	8.6	3 8 4	5 4.2
4 3 3	312	8 6.4	4 9	1 3.6	-	-	-	-	0	0.0	3 1 2	8 4.6
1,5 4 3	773	6 7.4	3 1 3	2 7.3	6 1	0	0	0	6 1	5.3	773	6 6.9
2,5 7 7	1,3 4 8	7 8.0	3 7 6	2 1.6	7	0	0	0	7	0.4	1,3 5 9	7 8.0
8	4	1 0 0.0	2	3 3.3	_	_	_		0	0.0	4	6 6.6
17	1 0	8 3.3	2	1 6.7	_	_	_	_	0	0.0	10	8 3.3
1,950	1,186	7 8.1	3 3 3	2 1.9	_	_	-	-	0	0.0	1,1 8 6	7 8.1
109	6.0	9 6.8	2	3.2	-	-	_	_	0	0.0	6.0	9 6.8
4 2	3 0	1 0 0.0	0	0.0	_	_	_	_	0	0.0	3 0	1 0 0.0
3 4	26	1 0 0.0	0	0.0	_	_	_	_	0	0.0	26	1 0 0.0
695	426	9 1.2	4 1	8.8	_	_	_	_	0	0.0	4 2 6	9 1.2
103	1 2	2 1.1	4 5	7 8.9	_	_	_	_	0	0.0	12	2 1.1
406	189	5 8.5	1 3 4	4 1.5	-	_	_	_	0	0.0	189	5 8.5
993	566	9 9.5	3	0.5	-	_	_	_	0	0.0	566	9 9.5
4,3 5 7	2,5 0 9	8 1.7	562	1 8.3	0	0	0	0	0	0.0	2,5 0 9	8 1.7
2,9 5 2	1,7 2 2	8 5.5	2 9 1	1 4.5	0	0	0	0	0	0.0	1.7 2 2	8 5.5
1,413	8 5 9	8 2.9	1 2 5	1 2.1	5 2	-	-	-	5 2	5.0	859	8 1.9
969	6 2 7	8 3.3	1 2 6	1 6.7	-	-		-	0	0.0	627	8 0.9
1 9	0	0.0	1 2	1 0 0.0	-	7.4	-	-	0	0.0	0	0.0
1 3	1 1	1 0 0.0	0	0.0	-	-	-	-	0	0.0	1 1	1 0 0.0
18	1 2	9 2.3	1	7.7	-	-	-	-	0	0.0	2 1	8 0.8
1 1	3	2 7.3	8	7 2.7	-	-	-	-	0	0.0	3	2 0.0
1 2 9	7 7	9 3.9	5	6.1	-	-	-	-	0	0.0	7 7	9 3.9
2,5 7 2	1,589	8 2.8	227	1 4.4	5 2	0	0	0	5 2	2.7	1,5 9 8	8 1.1
4 4 3	237	6 4.4	127	3 4.5	0	4	0	0	4	1.1	2 4 1	5 9.5

					9	親	魚	0	処 理			
項目	捕	獲	数	試験	即日	採卵	著	ř	羞	N. A.	蓄	養
採卵場	Q.	ô	計	験控除	尾数	即日使用率	要 蓄 数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	ę	â
	尾	尾	尾		尾	%	尾	尾	尾	%	尾	尾
千歲支場 西越	4 8	2 1	6 9		0	0.0	4 8	0	4 8	1 0 0.0	4 8	2 1
(千歳計)	4.8	2 1	6 9		0	0.0	4 8	0	4 8	1 0 0.0	48	2 1
(前年度)	101	7 0	171		0	0.0	101	1	100	9 9.0	100	2 6
渡島支場												
名 駒	1,2 1 5	655	1,8 7 0		1,1 5 4	9 5.0	6 1	0	6 1	1 0 0.0	6 1	1 2 1
(渡島計)	1,2 1 5	6 5 5	1,8 7 0		1,1 5 4	9 5.0	6 1	0	6 1	1 0 0.0	6 1	121
(前年度)	4 2 2	8 0	5 0 2		3 1 8	8 0.7	104	8.	9 6	7 1.4	9 6	3 5
合 計	7,4 5 9	3,3 7 1	1 0,8 3 0		1,1 6 3	1 5.6	6,2 9 6	5 1	6,2 4 5	9 9.2	6,2 4 5	2,4 7 8
前年度	4,683	2,2 5 7	6,9 4 0		3 3 3	7.1	4,3 5 0	4 2	4,3 0 8	9 2.0	4,308	1,9 1 1

	1	蒈	養		内	3		訳			総	使
数		蓄	養		φ		親	魚	ι		使	FF1
計	催熟	催熟率	へい死	へい死率		そ	0	他		その他	用	用
пI	1年 次	惟水华	1019E	率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
6 9	4	8.3	4 4	9 1.7	-	-	_	-	0	0.0	4	8.3
6 9	4	8.3	4 4	9 1.7	0	0	0	0	0	0.0	4	8.3
1 2 6	3 1	2 1.0	6 9	6 9.0	0	0	0	0	0	0.0	3 1	3 0.7
												- 1
182	5 6	9 1.8	5	8.2	-	-	-	-	0	0.0	1,210	9 9.6
182	5 6	9 1.8	5	8.2	0	0	0	0	0	0.0	1,2 1 0	9 9.6
1 3 1	8 2	8 5.4	1 2	1 4.6	0	0	0	2	2	2.4	400	9 4.8
8,7 2 3	4,9 3 1	7 9.0	1,201	1 9.2	1 1 3	0	0	0	1 1 3	1.8	6,0 9 4	8 1.7
6,2 1 9	3,420	7 9.4	8 7 5	2 0.3	7	4	0	2	1 3	0,3	3,7 5 3	8 0.1

1. 3.

第3表 昭和47年度からふとます親魚蓄養成績

750			der		P	親	魚	0 1	処 理			
項目	捕	獲	数	試	即日	採卵	著	Ħ	· 養		蓄	養
採卵場	Q.	ô	計	験控除	尾数	即日使用率	要 蓄 数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	Q	ô
	尾	尾	尾		尾	%	尾	尾	尾	%	尾	尾
北見支場	1											
ルシャ	430	435	865		0	0.0	430	0	430	1 0 0.0	4 3 0	4 3 5
岩尾別	6,1 0 0	8,0 0 0	1 4,1 0 0		0	0.0	6,1 0 0	0	6,100	1 0 0.0	6,100	1,2 2 1
奥藥別	367	116	483		0	0.0	3 6 7	0	367	1 0 0.0	367	0
斜 里	5,6 3 8	4,762	1 0,4 0 0		0	0.0	5,6 3 8	0	5,6 3 8	1 0 0.0	5,6 3 8	1,474
藻 琴	1 0	2	12		0	0.0	1 0	0	1 0	1 0 0.0	1 0	2
網走	4 3	8 9	132		0	0.0	4 3	0	4 3	1 0 0.0	4 3	3 0
常呂	772	1,0 9 9	1,871		0	0.0	772	6 0	712	9 2.2	712	167
湧 別	1,102	1,8 3 5	2,9 3 7		0	0.0	1,102	5 6	1,0 4 6	9 4.9	1,0 4 6	209
渚 滑	574	871	1,4 4 5		- 0	0.0	574	0	574	1 0 0.0	574	118
藻興部	3 9	4 9	8 8		0	0.0	3 9	9	3 0	7 6.9	3 0	7
雄 武	111	151	262		0	0.0	111	1 1	100	9 0.1	100	5 2
幌 内	469	306	775		0	0.0	469	1 0	459	9 7.9	459	164
(北見計)	1 5,6 5 5	1 7,7 1 5	3 3,3 7 0		0	0.0	1 5,6 5 5	1 4 6	15,5 0 9	9 9.1	15,509	3,879
(前年度)	101,709	9 1,1 2 6	192.8 3 5		5 7 6	0.6	101,1 3 3	179	100,9 5 4	9 9.3	100,954	3 4,0 1 6
根室支場												
サシルイ	261	1 4 1	402		0	0.0	261	0	261	1 0 0.0	261	120
春刈古丹	6 7	2 3	90		0	0.0	6 7	5	62	9 2.5	6 2	2 3
忠 類	195	823	1,018		0	0.0	1 9 5	0	195	1 0.0 0	195	166
伊茶仁	109	9 6	205		0	0.0	109	. 0	1 0 9	1 0.0 0	1 0 9	9 (
標準	865	2,1 2 0	2,985		0	0.0	865	0	8 6 5	1 0.0 0	865	85
当 幌	164	1 3 8	3 0 2		0	0.0	164	0	164	1 0.0 0	164	108
春 別	2 1	1 5	3 6		0	0.0	2 1	0	2 1	1 0.0 0	2 1	1 :
床 丹	195	197	3 9 2		0	0.0	195	0	195	1 0.0 0	195	19
西 別	1,1 2 8	1,803	2,9 3 1		0	0.0	1,1 2 8	0	1,1 2 8	1 0.0 0	1,1 2 8	9 4
矢 臼 別	4	4	8		0	0.0	4	0	4	1 0.0 0	4	
風 蓮	8 1 5	1,9 4 2			0	0.0	815	100	7 1 5	8 7.7	7 1 5	5 5
別当賀	8 0	7 2	1 5 2		0	0.0	8 0	0	8 0	1 0 0.0	8 0	7 :
(根室計)	3,9 0 4	7,3 7 4	1 1,2 7 8		0	0.0	3,904	105	3,799	9 7.3	3,799	3,15
(前年度)	9,766	1 1,9 5 5	2 1,7 2 1		3 9	0.4	9,7 2 7	6 8	9,659	9 8.9	9,6 5 9	5,5 2

	蓄		養		内		訳				総	使
数		蓄	養		2		親	魚			使	用
計	催熟	催熟率	へい死	へい死		そ	0	他		その他	用	/HI
āl .	惟然	惟於华	10,370	率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%-
							-					
8 6 5	0	0.0	0	0.0	430	(増水の	Dため親:	魚流失)	4 3 0	1 0 0.0	0	0.0
7,3 2 1	6,0 9 7	9 9.9	3	0.1	-	-	-	-	0	0.0	6,0 9 7	9 9.9
3 6 7	353	9 6.2	1 4	3.8	-	-	-	-	0	0.0	3 5 3	9 6.2
7,1 1 2	4,627	8 2.1	995	1 7.6	-	1 6	-	-	1 6	0.3	4,6 2 7	8 2.1
1 2	0	0.0	0	0.0	10	(増水	Dため親	魚流失	10	1 0 0.0	0	0.0
7 3	3 9	9 0.7	4	9.3	-	-	-	-	0	0.0	3 9	9 0.7
879	5 5 4	7 7.8	158	2 2.2	-		-	-	0	0.0	5 5 4	7 1.8
1,255	950	9 0.8	9 6	9.2	-	-	-	-	0	0.0	9 5 0	8 6.2
692	476	8 2.9	98	1 7.1	-		-	-	0	0.0	476	8 2.9
3 7	15	5 0.0	1 5	5 0.0	-	-	-	-	0	0.0	1.5	3 8.5
152	7 7	7 7.0	2 3	2 3.0		-		-	0	0.0	7 7	6 9.4
623	408	8 8.9	5 1	1 1.1	-	-	-	_	0	0.0	408	8 7.0
19,388	1 3,5 9 6	8 7.7	1,457	9.4	440	16	0	0	456	2.9	1 3,5 9 6	8 6.8
134,970	9 3,1 2 1	9 2.2	7,3 6 8	7.3	414	2 0	0	3 1	465	0.5	9 3,6 9 7	9 2.1
Ty												
381	1 2 5	4 7.9	1 3 6	5 2.1	-	_	-	-	0	0.0	1 2 5	4 7.9
8.5	3 6	5 8.1	2 6	4 1.9	(_		-	0	0.0	3 6	5 3.7
3 6 1	129	6 6.2	6 6	3 3.8	-	_	-	-	0	0.0	1 2 9	8 1.1
205	7 7	7 0.6	3 2	2 9.4	-	-	-	_	0	0.0	7 7	7 0.6
1,722	627	7 2.5	2 3 8	2 7.5	_	_	-	-	0	0.0	627	7 2.5
272	156	9 5.1	8	4.9	-	_	-	-	0	0.0	156	9 5.1
3 6	2 0	9 5.2	1	4.8	-	- L	-	-	0	0.0	20	9 5.2
392	195	1 0 0.0	0	0.0	-	-	-	-	0	0.0	195	1 0 0.0
2,0 7 5	1,1 1 8	9 9.1	10	0.9	-	-	-	-	0	0.0	1,1 1 8	9 9.1
8	4	1 0 0.0	0	0.0	-	-	_	-	0	0.0	4	1 0 0.0
1,266	178	2 4.9	537	7 5.1	-	-	_	_	0	0.0	178	2 1.8
152	8 0	1 0 0.0	0	0.0	-	-	_	-	0	0.0	8 0	1 0 0.0
6,9 2 2	2,7 4 5	7 2.3	1,0 5 4	2 7.7	0	0	0	0	0	0.0	2,7 4 5	7 0.3
1 5,1 8 6	8,7 6 6	9 0.8	819	9.2	0	6 7	0	7	7 4	0.8	8,8 0 5	9 0.2

		au-	***		P	親	魚	O \$	0 理			
項目	捕	獲	数	試	即日	採卵	苕	皆	養		蓄	養
採卵場	9	ô	計	験控除	尾数	即 日 使用率	要 蓄 数	蓄 養不能数	蓄養数	蓄養率	Ş	8
	尾	尾	尾		尾	- %	尾	尾	尾	%	尾	尾
十勝支場												
釧路	1 4 5	190	3 3 5		0	0.0	1 4 5	0	1 4 5	1 0 0.0	1 4 5	4 0
(十勝計)	1 4 5	190	3 3 5		0	0.0	1 4 5	0	1 4 5	1 0 0.0	1 4 5	4 0
(前年度)	3,8 7 6	8,9 0 5	1 2,7 8 1		0	0.0	3,8 7 6	0	3,8 7 6	1 0 0.0	3,8 7 6	3,210
天塩支場												
徳志別	5 4 9	8 4 3	1,3 9 2		6	1.1	5 4 3	11	5 3 2	9 8.0	5 3 2	157
北見幌別	5 8	7 7	1 3 5		0	0.0	5 8	0	5 8	1 0 0.0	5 8	18
頓 別	125	6 4	189		0	0.0	1 2 5	0	1 2 5	1 0 0.0	1 2 5	6 4
猿 払	2	2	4		0	0.0	2	0	2	1 0 0.0	2	2
知来別	6	7	1 3		0	0.0	6	0	6	1 0 0.0	6	7
増 幌	2 0	2 5	4 5		0	0.0	20	0	20	1 0 0.0	2 0	2 3
天 塩	2	2	4		0	0.0	2	2	0	0.0	0	0
下中川	0	4	4		0	0.0	0	0	0	0.0	0	3
船 泊	1	3	4		0	0.0	1	0	1	1 0 0.0	1	3
遠別	1 5	2 5	4 0		0	0.0	1 5	2	1 3	8 6.7	1 3	18
信 砂	1	0	1		0	0.0	1	0	1	1 0 0.0	1	0
(天塩計)	779	1,0 5 2	1,8 3 1		6	0.8	773	1 5	758	9 8.1	758	295
(前年度)	2 2,3 3 4	2 1,2 9 3	4 3,6 2 7		8 7	0.3	2 2 2,4 7	939	2 1,3 0 8	9 5.4	2 1,3 0 8	7,961
千歲支場												
静 内	2 5	1 1 6	1 4 1		0	0.0	2 5	19	6	2 4.0	6	3
(千歳計)	2 5	1 1 6	1 4 1		0	0.0	2 5	19	6	2 4.0	6	3
(前年度)	5 1 6	1,2 1 4	1,7 3 0		0	0.0	5 1 6	9 9	417	8 0.8	417	462
渡島支場												
遊楽部	1,700	1,7 6 8	3,4 6 8		4 5	2.6	1,655	4 8	1,6 0 7	9 7.1	1,607	6 4 6
汐 泊	17	3 5	5 2	:	0	0.0	1 7	1 7	0	0.0	0	0
(渡島計)	1,7 1 7	1,803	3,5 2 0		4 5	2.6	1,6 7 2	6 5	1,6 0 7	9 6.1	1,607	6 4 6
(前年度)	427	6 1 2	1,0 3 9		0	0.0	4 2 7	2	4 2 5	9 9.5	4 2 5	402
合 計	22,226	28,250	50,476		5 1	0.2	2 2,1 7 5	3 5 1	21,824	9 8.4	21,824	8,019
前年度	138,628	135,105	273,733	3	702	0.5	137,926	1,287	136,639	9 8.6	136,639	51,588

蓄		養		内		訳					総	使
数		蓄	養		9	親		魚			使	用用
計	催熟	催熟率	へい死	へい死		そ	0	他		その他	用	
ы	THE 755	TE/M-P		率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
1 8 5	1 2 8	8 8.3	1 7	1 1.7	-	-	-	_	0	0.0	1 2 8	8 8.3
185	1 2 8	8 8.3	1 7	1 1.7	-	-	-	-	0	0.0	1 2 8	8 8.3
7,0 8 6	2,4 3 3	8 8.6	418	1 0.7	0	0	(盗難25) 0	. 0	2 5	0.6	2,4 3 3	8 8.6
689	3 7 6	7 0.7	127	2 3.8	-	2 9	_	-	2 9	5.5	3 8 2	6 9.6
7 6	4 7	8 1.0	1 1	1 9.0	-	-	-	-	0	0.0	4 7	8 1.0
189	9 7	7 7.6	2 8	2 2.4	-	-	-	-	0	0.0	97	7 7.6
4	0	0.0	2	1 0 0.0		-	-	-	0	0.0	0	0.0
1 3	0	0.0	6	1 0 0.0	-	-	-	-	0	0.0	0	0.0
4 3	2 0	1 0 0.0	0	0.0	-	-	-	-	0	0.0	20	1 0 0.0
0	0	0.0	0	0.0	1-1	-	-	-	0	0.0	0 .	0.0
3	0	0.0	0	0.0	-	-	-	-	0	0.0	0	0.0
4	1	1 0 0.0	0	0.0	-	-	-	-	0	0.0	1	1 0 0.0
3 1	0	0.0	1 3	1 0 0.0	-	-	-	-	0	0.0	0	0.0
1	1	1 0 0.0	0	0.0	-	-	-	-	0	0.0	1	1 0 0.0
1,053	5 4 2	7 1.5	187	2 4.7	0	2 9	0	0	2 9	3.8	5 4 8	7 0.3
2 9,2 6 9	1 6,6 7 8	7 8.3	4,114	1 9.3	0	3 9 8	0	118	516	2.4	1 6,7 6 5	7 5.1
9	0	0.0	6	1 0 0.0	_	-			0	0.0	0	0.0
9	0	0.0	6	1 0 0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
8 7 9	2 1 5	5 1.6	199	4 7.7	0	3	0	0	3	0.7	2 1 5	4 1.7
0.050	1007		400	205		2.6						
2,2 5 3	1,0 9 7	6 8.3	490	3 0.5	-	20.		_	2 0	1.2	1,1 4 2	6 7.2
0	0	0	0	0.0	-	_	-	-	0	0.0	0	0.0
2,2 5 3	1,0 9 7	6 8.3	490	3 0.5	0	20	0	0	2 0	1.2	1,1 4 2	6 6.5
8 2 7	3 9 3	9 2.5	18	4.2	0	1 4	0	0	1 4	3.3	3 9 3	9 2.0
29,843	18,108	8 3.0	3,211	1 4.7	440	6 5	0 (盗難25) 0	0	505	2.3	18,159	8 1.7
188,227	122,606	8 9.7	12,936	9.5	414	502	0	0	1,0 9 7	0.8	123,308	8 8.9

第4表 昭和47年度ひめます親魚蓄養成績

750			201			9	親	魚	処	理			
項目	捕	獲	数	試	即日	採卵		者	F	養		蓄	養
採卵場	ę	ô	計	験控除	尾数	即 日 使用率	要養	蓄数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	\$	ô
	尾	尾	尾		尾	%		尾	尾	尾	%	尾	尾
湖畔	4,8 9 5	4,7 4 7	9,6 4 2		Ó	0.0	4,8	3 9 5	1,0 6 1	3,8 3 4	7 8.3	3,8 3 4	9 1
ボロピナイ	5,3 2 5	4,7 6 3	1 0,0 8 8		0	0.0	5,3	3 2 5	1,6 4 0	3,685	6 9.2	3,685	
(合 計)	1 0,2 2 0	9,5 1 0	1 9,7 3 0	0	0	0.0	1 0,2	220	2,7 0 1	7,5 1 9	7 3.6	7,5 1 9	9 1
(前年度)	8,0 4 3	5,5 4 3	1 3,5 8 6	4 3	0	0.0	8,0	0 0 0	1,0 8 3	6,9 1 7	8 6.0	6,9 1 7	1,25

第5表 昭和47年度べにさけ親魚蓄養成績

項目	44	YH:	44.		9	親	焦	Į.	0	処 理			
(現日)	捕	獲	数	試験	即日	採卵		茎	tie.	活	Jak.	蓄	養
採卵場	Q	ð	計	颗 控除	尾数	即 日 使用率	要養	蓄数	蓄 養 不能数	蓄養数	蓄養率	9	ô
	尾	尾	尾		尾	%	-	尾	尾	尾	%	尾	尾
西別	4 9	3 9	8 8		0	0.0		4 9	7	4 2	8 5.7	4 2	3 5
合計	4 9	3.9	8 8		0	0.0		4 9	7	4 2	8 5.7	4 2	3 5
(前年度)	6 6 3	663	2,609		0	0.0	6	6 3	0	663	1 0 0.0	663	1,9 4 6

	蓄		養		内			訳			総	使
数		蓄	養		Q		親	魚			使	red
				へい死	2	-	0	他	1	その他	用	用
計	催熟	催熟率	へい死	率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	尾	%	尾	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
-4,750	3,7 0 2	9 6.6	7 1	1.9	6 1	-	-	-	6 1	1.6	3,702	7 5.
3,685	3,5 2 4	9 5.6	103	2.8	5 8	-	-	-	5 8	1.6	3,5 2 4	6 6.
8,4 3 5	7,2 2 6	9 6.1	174	2.3	119	0	0	0	1 1 9	1.6	7,2 2 6	7 0.
8,167	6,3 4 3	9 1.7	463	6.7	0	0	7 4	3 7	111	1.6	6,3 4 3	7 8.

7		· 養		内			訳			能包	使
	蓄	養		Q		親	魚			使	用
	Total delicate		へい死	-7-		0	他		その他	用	712
催熟	催熟率	へい死	率	逃逸	老魚	調査	未熟	計	の率	数	率
尾	%	%	%	尾	尾	尾	尾	尾	%	尾	%
7	1 6.6	3 5	8 3.3	-	-	-	-	0	0.0	7	1 4.3
7	1 6.6	3 5	8 3.3	0	0	0	0	0	0.0	7	1 4.3
129	1 9.5	5 3 4	8 0.5	0	0	0	0	0	0.0	1 2 9	1 9.5
	催熟尾7	催熟 催熟率尾%7 16.67 16.6	著 養催 熟 催熟率 へい死 尾 % % 7 16.6 35 7 16.6 35	蓄 養 催 熟 催熟率 へい死率 尾 % % 7 16.6 35 83.3 7 16.6 35 83.3	蓄 養 ♀ 催 熟 催熟率 へい死率 そ 選 % % 尾 7 16.6 35 83.3 - 7 16.6 35 83.3 0	蓄 養 Q 催 熟 催熟率 へい死 そ 速 老魚 尾 % % 尾 尾 7 16.6 35 83.3 - - 7 16.6 35 83.3 0 0	蓄 養 Q 親 催 熟 催熟率 へい死率 その逃逸 老魚 調査 尾 % % % 尾 尾 尾 7 16.6 35 83.3 - - - 7 16.6 35 83.3 0 0	蓄 養 Q 親 魚 催 熟 企業 本 の 他 逃逸 老魚 調査 未熟 尾 % % 尾 尾 尾 尾 7 16.6 35 83.3 - - - - 7 16.6 35 83.3 0 0 0 0	蓄 養 Q 親 魚 催熟 催熟率 へい死率 その他 他 逃逸 老魚 調査 未熟 計 尾 % % 尾 尾 尾 尾 7 16.6 35 83.3 - - - - 0 7 16.6 35 83.3 0 0 0 0	蓄 養 Q 親 魚 催熟率 へい死率 その他 その他の率 退逸 老魚 調査 未熟 計の率 尾 % % 尾 尾 尾 尾 尾 尾 尾 尾 尾 尾 のの率 7 16.6 35 83.3 - - - - 0 0.0 7 16.6 35 83.3 0 0 0 0 0 0.0	蓄 養 Q 親 魚 催熟率 へい死率 その他 その他 日間 逃逸 老魚 調査 未熟 計の率 数 尾 % % 尾 尾 尾 尾 尾 尾 尾 尾 7 16.6 35 83.3 - - - - 0 0.0 7 7 16.6 35 83.3 0 0 0 0 0 0.0 7

. ...

§ 11. ベニさけ牛産事業

1. 1972年級群の採卵およびふ化飼育

(1) 支 笏 湖 産

支笏湖産ヒメマス卵は、千歳支場支笏湖事業場管下の湖畔およびポロピナイ採卵場において、昭和47年10月24日~27日かけて採卵された、795千粒(移籍卵数945千粒)外、同年12月23日発眼卵として収容地である根室支場虹別事業場へ向けて輸送した。輸送途中での運搬害死卵数は、少なく良好な成績をもつて収容を終えた。

本出は、翌年1月14日~26日の間に終了したが、浮上までに1.8千尾の滅耗を生じ残り、755千尾を対象に同年3月1日より餌付けを始めた。餌付け方法は従来どおりである

第1表 支笏湖産ベニさけふ化放流成績

vier	75	<i>E</i> B D	印	娄	女 .	備考
事	項	年月日	収容卵数	死 卵 数	差引卵数)H 5
			粒	粒	粒	
採	卵	4 7.1 0.2 4~2 7	(945,000)			支笏湖事業場へ収容
発	眼	4 7.1 1.2 8~3 0				<i>3</i>
移	殖	4 7.1 2.2 3	7 9 5,0 0 0		(尾)	虹別事業場へ収容
\$	出	4 8. 1.1 4~2 6	7 9 5,0 0 0	3 8,2 0 0	7 5 6,8 0 0	
浮	上	4 8. 3. 7	(尾) 756,800	(尾) 1,800	(尾) 755,000	餌付け

(2) アラスカ産

47年11月4日米国アラスカ州より、コディアック島アカルラ湖産ベニさけ発眼卵248千粒が移殖された。輸入卵は一旦千歳支場へ仮収容した後、同月7日に根室支場虹別事業場へ輸送した。卵子輸送にはジュラルミン製輸送箱を使用し、収容地到着時の卵温は、8~90°に保たれており運搬害死卵数も少なく好結果のもとに、死卵1千粒を差し引いた247千粒を無事現地収容した。 か出は、同年12月4日~10日の間に終了したが、浮上までに1千尾の減耗を生じ残り245.5千尾を対象に48年1月4日より餌付を始めた。餌付け方法は従来どおりである。

第2表 アラスカ産ベニさけふ化成績

zelo:	巧	年 月 日	卵		数	備	考
事	項	年月日	収容卵数	死 卵 数	差引卵数	унз	~~
			粒	粒	粒	*	-
移	殖	4 7.1 1. 7	2 4 8,0 0 0	1,0 0 0	2 4 7.0 0 0	発眼卵で虹別	事業場へ収容
\$	出	47.12. 4~10	2 4 7.0 0 0	5 0 0	(尾) 246,500		
浮	上	48. 1. 4	(尾) 246,500	(尾) 1,000	(尾) 24,5,500	餌付け	7

(3) 国 産(西別産)

西別産ベニさけは、西別川に回帰した88尾(うち929尾,9比率55.7%)の親魚を、虹別事業場構内湧水池にて一旦蓄養し、その後構内採卵で、9.8千粒の種卵を生産した。これらは同事業場第1ふ化室に収容し、昭和48年1月5日~21日の間にふ出を終了した。ふ出までの死卵数は1.7千粒であり、浮上までに100尾の減耗を生じ残り8千尾を対象に同年2月19日より餌付けを始めた。餌付け方法は従来どおりである。

第3表 西別産ベニさけふ化成績表

事	項	年月日	Ŋ	ja §	汝	備考
7	块	4 7 1	収容卵数	死 卵 数	差引卵数	EHV EHV
採	卵	47.1 0.21~11.7	9,8 0 0	a a		第1 ふ化室に収容
発	眼	4 7.1 2				
à	出	4 8.1.5~1.2 1	9,800	1,700	8,1 0 0	
浮	上	4 8. 2. 1 9	8,1 0 0	100	8,0 0 0	餌付け

2. 1971年級群の飼育および放流

(1) 飼育管理

アラスカ産ベニさけ208千尾は、昭和47年4月1日より餌付けを開始した。餌付け当初は、サケ用餌料(稚魚前期用)A号を粉末に再加工し、水を加えてミルク状にしたものを1日5~6回投与し充分に餌慣しを行なつた。慣れた時期を見はからい徴粒子の餌料から徐々にサケ用餌料B号に切り換えながら飼育管理を行なつた。

当初は,アトキンス式 2 間槽 1 4本を使用し注水量は 1 カラン当 9 2 8 ℓ /分 ℓ した。 稚魚の摂 飼状態は非常に活発で順調に成長し, 2 ケ月後の 5 月 3 1 日には,体長 4 2 ~ 5.5 cm,体重 0.7 ~ 1.6 9 の段階でふ化槽より,ベニさけ試験池(3 4 6 平方メートル)へ移し換えを行なつた。

しかし、移し換えを行なつた直後よりへい死魚が目立ち始め6月中旬以降には、日を追うごとにその数を増し、6月末には約10万尾以上の飼育魚を失う結果となつた。へい死魚の症状ならびに解剖の結果、ウイルス性菌による疾病と推定されたため、これらに係る対策としてサルフア剤、ダ

イメトン散および抗プラスミン剤、イブシロン等の餌料添加投与を行なつた結果 1 ヶ月後(7月) に入つてから若干減耗が柔らぎ始めた。

この頃には、体長 1 $1.0 \sim 1$ 5.2 cm、体重 1 $2.1 \sim 3$ 8.5 g に成長し、9 8 比 1 ; 2 の割合で生殖巣の形態は、肉眼でも明瞭に区別できた。また鱗の生長輪数は、1 $8 \sim 2$ 6 の範囲内で、平均 2 0.4 本が数えられた。

支笏湖産ヒメマス稚魚 7 5 7.0 0 0 尾を対象に、4 7 年 3 月 5 日よりアトキンス式 2 間槽 4 0 本を使用し注水量は1 カラン当り 2 8 化/分として、上記アラスカ産同様の方法で餌付けを行なつた。同年 6 月 3 日にふ化槽よりさけ用飼育池へ移し換えを行ない飼育管理を行なつたが、アラスカ産同様ウイルス性菌による疾病により 6 月末までに飼育魚の全数のへい死を招ねいだ。

一方西別産ベニさけ稚魚163,600尾を対象に47年2月4日よりアトキンス式2間槽13本を使用し餌付けを開始した。餌付け方法は、アラスカ産、支笏湖産と同様であり、同年6月3日にふ化槽よりさけ用飼育池へ移し換えを行なつたが、支笏湖産と同様6月末までに飼育魚の全数のへい死するに至つた。

第4表 アラスカ産・支笏湖産,西別産ベニサケ飼育経過

飼	育期間	1	飼 育	量	月始	魚体	給餌	餌	水 温(で	2)
年月	日~日	日数	尾 数	重量	体長	体重	量	料	低~高	平均
			尾	Kg	ст	д	Kg			
47. 2	4~28	2 5	西 163,600	1 3.1	2.4	0.08	5	サケ用A号	8.6~ 8.8	8.7
3	5~31	2 6	支 757,000	6 0.6	2.4	0.08	6 0	A号	9.0~ 9.2	9.1
	1~31	3 1	西 161,600	1 7.8	2.5	0.01	20	"	"	"
4	1~30	3 0	ア 208,000	4 1.6	2.8	0.20	2 0	A号	9.2~ 9.6	9.4
		"	支 742,000	1 3 3.6	2.8	0.18	100	"	"	"
		"	西 157,600	4 1.0	3.0	0.26	4 0		"	"
5	1~31	3 1	ア 202,000	8 0.8	3.8	0.40	100	A号	9.2~ 9.8	9.5
		"	支 740,000	3 7.0	4.0	0.5 0	265	A·B号	"	"
		"	西 155,500	9 1.7	4.2	0.5 9	100	B号	"	"
6	1~30	3 0	ア 201,500	2 2 0.0	5.2	1.4 2	150	B号	9.8~1 0.0	9.9
			支 687,400	8 2 5.0	5.1	1.20	300	"	"	//
			西 155,000	2 2 2.0	5.0	1.1 0	250	A·B号	9.6~1 0.0	9.8
7	1~31	3 1	ア 100,800	3 2 8.0	6.6	3.25	120	B号	1 0.0~1 0.2	1 0.1
8	1~31	3 1	ア 87,200	4 1 9.0	7.7	4.8 0	7 0 2 0 0	B号 C-4	9.5~1 1.8	1 0.7
9	1~30	3 0	ア 85,200	8 0 9.0	1 0.0	9.5 0	5 4 0	C-4	1 0.0~1 1.0	1 0.5
1 0	1~31	3 1	ア 82,200	1,2 3 3.0	1 1.5	1 5.0	600	C - 4	9.8~1 0.6	1 0.2
1 1	1~30	3 0	7 81,200	1,8 6 8.0	1 2.6	2 3.0	600	C - 4	9.2~ 9.8	9.5
1 2	1 ~ 31	3 1	ア 80,200	2,3 5 8.0	1 3.7	2 9.4	260	C - 4 P - 5	9.0~ 9.6	9.3
4 8. 1	1 ~ 31	3 1	7 7 9,2 0 0	2,5 2 6.0	1 4.0	3 1.9	400	P-5	9.0∼ 9.5	9.3
2	1~28	28	7 7 8,2 0 0	2,7 4 5.0	1 4.8	3 5.1	390	P- 5	9.2~ 9.8	9.5
3	1~31	3 1	7 77,700	2,8 4 4.0	1 4.9	3 6.6	4 4 0	P - 5	9.6~1 0.4	1 0.0
. 4	1 ~ 25	25	7 77,200	2,8 8 7.0	1 5.3	3 7.4	7 8.7 5 3 9.3	C-4 $P-5$	9.6~1 0.7	1 0.2

[記号凡例]

ア… アラスカ産 西… 西別産 С… クランブル餌料

支… 支笏湖産 A・B号さけ用餌料

P… ペレット餌料

PH	D O (PPm)	水 量	飼 育 飼育面積	へい死尾 数	月末飼育尾数	1尾增量	増重比	備考
	,		m^2	尾	尾	9	倍	
7.2		1カラン28		2,000	161,600	0.03	1.38	2 間槽 1 3 本
7.2		2 8	7.	1 5,0 0 0	7 4 2,0 0 0	0.1	2.2 5	″ 40本
//		"		4,0 0 0	175,600	0.1 5	2.3 6	// 13本
7.2		28		6,000	202,000	0.20	2.0 0	// 14本
//		"		2,000	7 4 0,0 0 0	0.32	2.7 7	// 52本
//		"		2,1 0 0	155,500	0.33	2.2 7	// 13本
7.2	,	2 8		5 0 0	201,500	0.70	2.7 5	// 16本
//		"		5 2,6 0 0	687,400	0.70	2.4 0	// 5 4 本
//	7.			500	1 5 5,0 0 0	0.83	2.4 1	// 16本
7.2		1.3屯	3 4 6	1 0 0,7 0 0	1 0 0,8 0 0	2.1 5	2.9 5	試験池へ
//		4 2 7.0	1 3 2	6 8 7,4 0 0	0			サケ飼育池へ
//		"	6 6	1 5 5,0 0 0	0			"
7.2	1 0.0	1.3屯	3 4 6	1 3,6 0 0	8 7.2 0 0	1.5 5	1.4 7	
7.2	1 0.0	1.3 //	3 4 6	2,0 0 0	8 5,2 0 0	4.7 0	1.9 7	
7.2	1 0.0	1.3 //	3 4 6	3,0 0 0	8 2,2 0 0	5.5 0	1.5 8	
7.2	1 0.0	1.3 //	3 4 6	1,0 0 0	8 1,2 0 0	8.0 0	1.5 8	
7.2	1 0.0	1.3 "	3 4 6	1,0 0 0	8 0,2 0 0	8.4 0	1.2 8	
7.2	1 0.0	1.0 "	3 4 6	1,000	7 9,2 0 0	2.5	1.0 9	
7.2	1 0.0	1.0 "	3 4 6	1,000	7 8,2 0 0	3.2	1.1 0	
7.2	1 0.0	1.0 "	3 4 6	500	7 7.7 0 0	1.5	1.0 4	
7.2	1 0.0	1.0 "	3 4 6	500	7 7.2 0 0	0.8	1.0 2	
7.2	1 0.0	1.0 "	3 4 6	2,7 0 0	7 4,5 0 0	2.6	1.0 7	4月26~27日 65,305尾放流 (※不明無外 9,195尾)

2.放流

47年度ベニさけ放流魚は,アラスカ産 65,305 尾を 48 年 4月27~28 日かけて放流された。 幼魚放流地点は,前年同様,西別川河口において実施され,その放流成績は,第1表に示したとおりである。

なお、支笏湖産、西別川産は、47年6月末ウイルス性菌による疾病により飼育魚の全数へい死する に至った。

第1表 47年度飼育幼魚の放流成績

方	汝 流	魚	4 6 年 度 アラスカ産	4 6 年 度 支 笏 湖 産	4 6 四 另	年 度
			尾	尾		尾
放	流	量	6 5, 3 0 5			-
平	均体	長	1 5.6 cm	-		-
平	均体	重	4 0.0 %	_		_
放	流期	間	4 8.4.2 7~2 8		. =	u —
放	流址	点。	西別川河口	<u> </u>		

※ 備 考 輸送距離 6 4.5 km 所要時間 8 0 分 放流時の河川水温 6.0 ℃

§ 12 さくらます資源拡大再生産事業

本事業は、46年度から日本海区における、さくらます資源の増大を図るを目的として開始された新規 事業で、本年度は2年目である。

本年度は、昨年同様サクラマス池中飼育を行なうための種苗育成に主眼をおき、最も効果的な本種の飼育方法、採卵および事業遂行に必要な資料蒐集を行なった。

この種苗は、地元西越採卵場で採卵した10千粒と天塩支場管内徳志事業場から移殖を受けた423千粒の種卵から389千尾の稚魚を生産した。ふ出成績は、か1表のとおりである。

オ1表 さくらます資源生産用種卵のふ化経過

項	目区	分	地	場	卵	移	殖	抑	合	1	計	備	考
採	卵 場	名	西		越	徳	志	別			-		
採	卵 月	日	47. 9.	28~	9.30	47. 9.	5 ~	9, 11			_		
採	月日	数		1 0, 0	0 0 粒	4	2 3, 0	000粒	4	3 3, 0	0 0		
死	阳	数			0	+	4 4, (000		4 4.0	0 0		
S	出 尾	数		1 0,0	00尾	3	7 9, 0	00尾	3	8 9, 0	0.0		
\$	出	率		1 0	0.0 %			8 9. 6 %	,	8	9.8%	Post	

飼育経過

▲ 46年度級群の飼育管理

46年度産さくらます稚魚280千尾を47年1月10日から飼育を開始し、本年度も継続実施した。 飼育成績は、オ2表のとおりである。

飼育	is ti	а	18		食	ij		育		ij	t		J] 始	魚	4		41	- GT	H M		餌 料	水温	^	γ,	死		月	ž	ŧ	餇	増	まし
即	寸 共	3 1	EU	層	E		**	攵	limil	in.	量		体	長	1	*	重	市口	i fir	+ 311	1	出午 个十	八価	取	L)	毛数		育	E	E	数	, E	_
47.1.	10~	1	.31	2	8	0,	0 (尾)0			6.	9	,	cm	0	. 2	9			Kg 4.		C-4	°c 8.3			7,5	尾00	2.7	7 2	., 5	尾00		倍
2.	1~	2	. 28	2	7	2,	5 (0 (8	3 9.	9	3.	4 3	0	. 3	3		2	7.	0	"	8.3		1	2,8	2 0	2 5	5 9	, 6	80		-
3.	1~	3	. 31	2	5	9,	6 8	3 0		1 3	3 2	4	3.	6 3	0	. 5	1		9	3.	6	"	8.6	不明	9	4,6 5,7	1 3 4 0	1 5	5 9), 3	27	2,3	3 7
4.	1~	4	. 30	1	5	9,	3 2	2 7	1	. 9	7.	4	5.	0 5	1	.2	4	1	1	8.	9	"	9.1				8 4	1 5	5 9),2	43	1,2	8 2
5.	1~	5	. 31	1	5	9,	2	13	2	2 !	5 4.	8	5.	4 0	ī	. 6	0	1	2	5.	6	"	9.5				8 9	1 5	5 9	, 1	5 4	1,2	2 4
6.	1~	6	.30	1	5	9,	1 !	5 4	:	3	1 8.	3	6.	0 0	2	0.5	0	1	2	2.	6	"	9.6	標本		2,5	30.	1 5	5 6	5,6	0 7	1,2	2 4
7.	1~	7	. 31	1	5	6,	6 (7	:	3 5	6.	2	6.	4 8	2	2.5	3	1	5	5,	2	- "	9.6	標本		4.4		1 5	5 2	2,0	98	1,5	5 4
8.	1~	8	. 31	1	5	2,	0 !	9 8		6	3.	0	7.	1 4	4	. 0	3	1	6	4.	5	"	9.5	標本		2,3		1 4	4 9), 6	88	1,3	3 9
9.	1~	9	. 30	1	4	9,	6	8 8		7 8	3 1	.4	7.	9 1	5	5. 2	2	1	6	3.	0	P-2	9.6			1,4	0 0	1 4	4 8	3, 2	8 8	1,(0 0
10.	1~	10	. 31	1	4	8,	2	8 8		3	5	4	7.	2 0	4	. 1	5	1	6	6.	5	"	9.6			1,6	1 3	1	4 6	5, 6	7 5	1,0	0 0
11.	1~	11	.30	1	4	6,	6	7 5		5	1 6	.0	7.	3 5	4	. 2	0	1	6	1.	0	"	9.6			1,5	2.7	1	4 5	5, 1	4 8	1,(0 (
12.	1~	12	.31	1	4	5,	1	48		6	18	.3	7.	4 0	4	1.2	6	1	4	0.	5	"	7.2			1,4	28	1	4 3	3, 7	20	1,	0 1
48. 1	.1~	-1	.31	1	4	3,	7	2 0		6	2 6	. 6	7.	5 0	4	1.3	6	1	5	5.	0	P-5	7.2			1,4	1 1	1 -	4 2	2,3	0 9	1,	5 2
2.	1~	2	.28	1	4	2,	3	0 9		9	53	. 5	8.	5 0) 6	5.7	0	1	4	7.	2	C-4	7.6			2,0	1 1	1	4 (), 2	98	1,	1 1
3.	1~	3	.31	1	4	0,	2	9 8	1,)	5 9	.2	9.	5 2	2 7	. 5	5	1	6	4.	7	"	7.9			7,0	48	1	3 :	3,2	5 0	1,	1 1

B 47年度級群の飼育管理

4 7年度産ふ出尾数は、3 8 9千尾で、浮上までに 9 7千尾の減耗を生じ残り 2 9 2 千尾を対象に4 8 年 1 月 9 日より飼育を開始した。これらは、4 8 年度事業として、千歳支場構内サクラマス育成池において継続飼育中である。

飼育成績は、 才3表のとおりである。

才3表 昭和47年度産、さくらます飼育成績表

A2 -> H0 68	飼	育	量	月始	魚体	«Λ λοτ [e]	eur skel	-LVB	へい死	月末飼	LV ST. II.
飼育期間	尾	数	重量	体長	体 重	給餌量	餌料	水温	取 上 数	育尾数	増重比
48.1,9~1.30	2 9 2,0	尾00	K <i>g</i> 5 8.4	cm 3.0 4	<i>g</i> 0.200	Kg 1 4.6	{ 1 C 4 C 6 P	7.1	尾 8,0 0 0	尾 284.000	1,2 3 4
2.1~2.28	2 8 4.0	0 0	7 2.1	3.2 7	0.254	2 4.6	1 C	7.6	1 5,0 0 0	269,000	1,3 9 7
3.1~3.31	2 6 9,0	0 0	1 0 0.7	3.4 6	0.374	1 5.4	1 C	7.9	1 6,0 0 0	2 5 3,0 0 0	1,390

§ 13 昭和 47年度河口涌過観測事業

1. 実施方針

本年度は昨年度に引続き十勝川、遊楽部川、網走川の3河川において実施した。

十勝川については、大型河川の代表として、又、遊楽部川については小型河川の代表として、今迄通りのトラップに依る観測方法を、又、網走川については、河川の状況から、上記2河川において用いているトラップの使用は無理なことから、落し網式のトラップを使用し、3河川とも経年的に資料の蓄積を図るを目的に実施された。特に網走川については、河川上流に所在する網走湖との関連、湖沼餌料と降下状況を調査すべく行なわれた。

2. 観 測 方 法

[十勝川]

- ① 河川の右岸寄りにトラップ (口径 1.0 m× 0.5 m) 1 基を設置して実施した。 (河口より 8 km 上流)
- ② 観測は3日毎に24時間観測を実施した。
- ③ 千代田において曳網(長さ $1.0 \text{ m} \times 1.2 \text{ m}$ 、網目 $4 \times 4 \%$)を用い稚魚を採集し生態調査を実施した。
- ④ 観測の対象となる稚魚は、十勝、札内、幕別、利別の各ふ化施設より放流されたもので、その数は 6 9,1 8 8 干尾である。
- ⑤ 幕別、十勝の両事業場において稚魚162千尾に標識を施し放流、降下動態の調査を行なった。
- ⑥ 河川左岸の流下状況を曳網により調査した。

〔遊楽部川〕

- ① 今年使用のトラップは平水時と増水時の両方使用し得る改良型トラップ (浮動式、位置移動式 □径 0.5 m×1.0 m、長さ8 m、網目 6×6 %と 4×4 %) 1 基を用いた。
- ② 4日毎に24時間観測と12時間観測を1回づつ組合せる方法で行なった。
- ③ トラップ効率試験時には1週間の連続操業を行なった。
- ④ 観測の対象となる稚魚は $3/10\sim5/15$ の間に八雲事業場から放流された 6,973千尾である。 〔網走川〕
- ① 当該河川は干満潮の影響をまともに受けるため、上記2河川と異なったトラップ (落し網式) 1 基により操業。
- ② 観測時間は前年同様 9:00~17:00 迄の操業とし、4月中6回の2時間観測を行なった。
- ③ 観測の対象となった稚魚は 才1 ふ化室 (呼人)、 オ2 ふ化室 (網走) から放流された 19,000 千尾である。

た。

3, 実施結果

才1表 観測対象稚魚の放流状況

_					-	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I				
支	場	名	河	Ш	名	放流場所	放流期間	放流尾数	摘	要
+		勝	+	勝	Ш	札内事業場	2/15~4/25	3 3,1 4 8,0 0 0		
-						十勝 "	4/ 1~4/20	1 0,0 0 0,0 0 0		
						幕別 "	2/20~4/30	2 5,1 0 0,0 0 0		
Ì						利别 "	3/20~4/30	9 4 0,0 0 0		
						計	2/15~4/30	6 9, 1 8 8, 0 0 0		
渡		島	遊	楽 音	111	八雲事業場	3/10~5/15	6.9 7 3,0 0 0		
北		見	網	走	Ш	網走湖	3/ 1~5/20	1 9,0 0 0,0 0 0		

米 2 表 河口通過稚魚觀測状況

	72表 河上	」通過框無觀測状	(元		
支場名	河川名	観測期間	トラップ、曳網操業場所	トラップ、曳網の基数、規模及設置	方法
十 勝	十勝川	48.4.20 ~ 6.30	豊頃町長臼 (河口より約1.2 km上流) 河口より上流茂岩橋下ま での本流	網目 7×7% 4× 曳網 1ケ統 長さ 10, 幅 1.	0 m (4 %m
渡島	遊楽部川	48. 4 1 ~ 6. 8	採卵場前 (河口より約2.0 m上流) 遊楽部川河口から八雲事 業場に至る本流及び支流 セイヨベツ川	網目 6×6 % 4× 曳 網 1ケ統 長 さ 10. 幅 1.	0 m
北見	網走川	48. 4. 1 ~ 7. 9	捕獲、採卵場前 (河口より 3.0 km上流) 河口から上流網走湖の落 口までの網走川本流及び 網走湖内一円	長さ 6. 網目 4× 曳網 1ケ統 長さ 10. 幅 1.	0 m 0 m 4 m/m

十 勝 川

	_	旬別		3	月		4	月	,	5 J]		6)	月
項	目		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
気		∰ °C						6. 3	8. 7	15.8	14.7	13.8	15. 3	18.4
水	Ž	∄ °C						7. 4	9.5	10.0	12. 2	13.6	15.7	15.3
水	i	采 m						247. 0	214.6	225. 9	213.4	193.3	188. 1	196.0
111	ſ	† m						180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
流	ì	速m/s						-				- 1		_
断	面積	資 m²						431.4	386.3	406.6	384. 2	348.0	338.6	352. 8
流	1	量ℓ/m						· -	_			-		
稚	体士	₹ cm						5. 0	5. 2	4.6	3. 4	6. 0	5. 0	5. 1
魚	体重	重 3						1. 2	0.9	0. 9	1. 0	2. 0	0. 9	1. 2

遊楽部川

	旬 別		3	月	4	.)	目		<i>, , ,</i>		6		月
項目		上	中	下	上	中	下	上。	中	下	上	中	下
気	温 °C				5. 5	6. 9	8.5	11.0	13.4	14. 3	12. 8		
水	温 °C)	3. 1	4.7	6.0	7. 4	9.7	13.3	13.0		
水	深 四				53.3	72. 5	61.0	55. 0	46.1	38. 2	32. 5		
JII	rti m				51. 2	55. 0	52. 8	51. 5	49.7	48. 1	47. 0		
流	速 m/s				0.674	0.728	0.699	0. 515	0. 533	0.441	0. 387		
断面	積 m²				35. 7	44. 9	39.4	36.5	32. 2	28. 4	25. 7		
流	量 ℓ/m							_		-			
稚体	長 cm				3. 9	3. 9	3. 9	4.0	4. 1	3. 8			
魚体	重 9				0.5	0.5	0.5	0. 5	0.6	0.4			

網走川

	旬別		3	月	4	J].	5	月		(5)]
項	E .	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
気	%				6. 1	8. 2	7. 4	9. 8	12. 9	12.9	13.5	14. 8	19.6
水	温 ℃				2. 2	3. 6	6. 4	8. 0	11. 6	12. 5	13. 3	17. 7	17. 1
水	深 m				178.0	195.8	196.5	183. 1	169. 8	161.0	167. 8	183.8	165. 2
III	th m				60.0	60.0	60. 0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
流	速 m/s												
断	面積m				106.8	117. 6	118. 2	109. 8	102.0	96. 6	100.2	110.4	99. 0
流	量 ℓ/m				2. 0	20	2. 0	2.)	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0
稚	体 長 cm												
魚	体重 8				0. 27			0. 37					

4. 結果および考察

本年度も昨年同様、十勝、遊楽部、網走の3河川を事業河川として観測を行なった。特に網走川については昨年同様、オホーツク海沿岸の稚魚調査と併行して実施された。

降下稚魚数の算定は3河川とも昨年と同様の方法で行ない、その計算方法も又、昨年同様の方法で行なった。 つまり、使用するトラップの効率(標識再捕尾数/標識放流尾数/河川断面積/トラップ断面積)を 標識稚魚を用いて求めておき、実際にトラップに乗網した稚魚数に河川拡大倍率(河川断面積/トラップ 断面積)を乗じこれをトラップ効率で除して求めた。

河川の拡大倍率は日々の水位によって変化する。したがってトラップ効率の値もその都度変化することになるが、毎日標識魚を放流してその効率を調査することは事実上困難なので、月に1度の割で期間中2~3回実施し、その値の平均値を使用した。

河川ごとの結果考察は次のとおり

〔十勝川〕

本川は昭和45年度より大河川の代表として、十勝川全般の通過量を把握するため、本流において、 十勝、札内、幕別、利別の各ふ化施設より放流される稚魚を対象に実施された。

本年も、2月15日~4月30日迄の間に上記4ふ化施設より放流された69,188,000尾の稚魚 (内給餌稚魚68,248,000尾、無給餌稚魚940,000尾)を対象に豊頃町長日 (十勝川河口より8km上流)にトラップを設置し、4月21日より6月23日迄の間観測を実施した。本年の十勝川は融雪が例年より早く3月中旬より下旬にかけて、それほど大きい増水ではなかったが増水期間があり、この増水に乗じて3月中旬までに各場で放流された稚魚17,000,000尾は降河したものと推定される。観測に入ってからの推定通過尾数のピークは4月下旬に示されているが、旬別放流数及び4月下旬以降のトラップの乗網数からみて、このピークはほぼ間違いないものと思われ、これからすると観測前にもピークが一つあるので、十勝川については観測に入ってからの推定通過尾数5,253,500尾(通過率7.59%)よりかなりアップした数値が考えられる。

(遊樂部川)

本州は昨年迄、増水時と普通時とでトラップの種類を変え実施してきたが、本年度はこれを改良、何れのときでも操作でき得るトラップ(浮動式、位置移動式、口径 $0.5\,\mathrm{m} \times 1.0\,\mathrm{m}$ 、長さ $8\,\mathrm{m}$ 、網目 $6\,\mathrm{m}$ $\times 6\,\mathrm{m}$ 、 $4\,\mathrm{m} \times 4\,\mathrm{m}$) 1 基を操作し実施した。観測は $4\,\mathrm{f}$ $1\,\mathrm{f}$ $1\,\mathrm{f}$ 1

本年度は春先に大雪があったり、4・5月には最近にない連続した雪融け増水を呈する等、異常な気象条件下の操業であったが、一度の欠測もなく十分な観測を行なうことができた。

当川は、小型河川の代表として、昭和37年以降連続実施しているが、本年は特に①通過量の基礎となる稚魚の正確な全数算定、②降下稚魚の河川分散調査等に主眼をおいて、3月10日~5月15日にか

けて八雲事業場から放流された 6,973,000尾の稚魚を対象に行なった。しかし、①の稚魚の主数算定放流は体制上の都合から、 4月分のみ重量算定を行なったが、 $3\cdot5$ 月分については推定という変則的なものになった。また、②についても異常な雪融水による増水および $3\cdot5$ 月分放流稚魚数が推定ということ等から、正確な結果は得られなかった。

トラップ効率調査は 4月と 5月の 2回標識魚を用いて行なった結果、 4月観測時 f=0.122、 5月 観測時 f=0.69 7の値が得られたので、この値を前者は 4月に、後者を f=0.69 7の値が得られたので、この値を前者は 4月に、後者を f=0.69 6月にあてはめ推定通過 尾数を算出した結果、通過率(放流数に対する推定通過数の割合) f=0.69 6 1.3%の値を得た。

「網走川]


本川は昨年と同様、当事業と併行して湖水における天然餌料と降下時期との関係および沿岸における 回遊分散状況把握のため実施した。今年はとくに①降河の時期的な傾向の把握、②降下の時期的差異に よる降下魚体の生長度合、③海水の逆流の影響を加味した大型河川の観測方法の検討(特にトラップの 検討)等を主眼として実施した。

この結果については、現在本場調査課において資料分析中である。

本川に設置したトラップは十勝、遊楽部に設置したトラップと異なり、前年同様な2段落網式のものを河口より3km上流の網走り捕獲採卵場の位置に設置、4月9日~6月23日の間連日観測を行ない、 稚魚の通過推定尾数3,682,800尾(通過率19.38%)の数値を得た。

2月 3月 4月 5月 6月 若 上中下上中下 中 放 20-流 10--10°C 1 0-放流数 通 20--20℃ 6 9.1 8 8.0 0 0尾 3.0-通過数 4 0-5,253,500尾 温 過 50-6 0-

才1図 昭和47年度放流量と通過量



114 昭和47年度降河稚魚保護事業

実 施 結 果

本年度の降河稚魚保護事業は、47年度の継続として次の事項について重点的に行ない、放流稚魚の 安全降海と生残り量の増大に努めた。

(1) 稚魚の輸送放流

(2) 害鳥、害魚の防駆除

害鳥については、北見支場管内2河川で実施し、181羽カモ、アイサ等を捕獲して捕食魚の調査を行なった。(オ4表)

また、害魚駆除は、千才、渡島支場を除く 4 支場 1 0 河川で行なった。結果については、为 5 表に示すとおりである。この事業は放流水路に飛来する鳥類および放流稚魚を捕食するとみられる魚類の防駆除を目的としたものである。

(3) 河川清掃および放流水路の整備

放流魚の降河に障害となる風倒木、繁茂する水草等を除去し、放流水路の整備を行なった。

(4) 河川パトロール

放流稚魚の降河動向および降河稚魚の突発事故防止を目的に行なつた。実施河川は、第6表に示したとおり29河川を対象に実施した。

(5) 弘 報

放流河川に立看板を設置し、また、チラシ等を作成して降河稚魚の保護を沿川および沿岸住民、各 関係団体へ PRを行なった。

. 40

才1表 さけ稚魚輸送放流結果

-1-16	the alle	La	輸 送	放流場所	放	流	輸送力	放流 尾 娄	女 (千尾)
支場	事業	場	水 系	放 流 点	期間	日数	輸送尾数	へい死数	放流尾数
	斜	里	奥 別	河口より3Km上流	5. 23 ~ 5. 24	2	2,500		2,500
	網	走	能 取 湖	ヌリカルシェ対	4. 17~4. 19	3	5,3 5 0		5,350
			バイラギ	ニッ岩	4. 22	1	1,5 7 0		1,570
北			網 走	白羽川合流点	3. 24~4. 24		1 0,3 8 8		1 0, 3 8 8
	北	見	常呂	若松大橋	4. 26~5. 19		2,5 3 0		2,530
			ライトコ ロ	三線橋	4. 20	, 1	1,200		1,200
			佐呂間別	仁倉市街	4. 18~4. 21	4	2,0 0 0		2,000
	湧	别	"	支流仁倉川 合流点	5. 19	1	750		750
	,		芭 露	河口より 300~600m	5. 21~5. 22	2	2,0 0 0		2,0 0 0
見			床 丹	床 丹 礄	5. 19	1	250	50	200
	渚	滑	渚 滑	ウツツ村 6線	4. 17~5. 15		6,7 4 8		6,7 48
			興 部		4. 20~5. 20		3,0 0 0		3,0 0 0
	小	it					3 8,2 8 6	5 0	3 8, 2 3 6
	羅	日	サシルイ	サシルイ橋上流	5. 21	1	383		383
根	-		春刈古丹	春刈古丹橋下流	"	1	9 5 8		958
			植 別	植別橋上流	5. 22	1	1,0 0 3		1,003
			元崎無異	元崎無異橋下流	5. 21	1	1,5 6 3		1,563
室			崎 無 異	崎無異橋上流	"	1	500		500
			黨 別	乳橋下流	5. 22	1	1,460		1,460

輸		法	. 1	回当り	の輸	送り	況	放流時の	*** ** ** **
車 別	9	ンク	輸送距離	酸素消費	水量	·水温	輸送尾数	河川状況	輸送目的
営(漁協) 4		ст	Km 2 5.0	£ 5.0	t 1.5	6.5	千尾 500	7.2 ~ 7.5	
,, 4	300×	150×145	6 0.0		3.0	8.0	700	5.5 ~ 7,5	
官 1	180×	90× 90	1 3.0		1.0	6.5	260	5.0 ~ 7.0	
, 1		"	8.0		1.0	6.5	3 2 0	3月 25~85 4月 60~140	
" 1.5	1.0 t #	ポリ製タンク	6.0		0.7	7.0	300	6.5~10.2	
営(漁協) 2.0	1.5 t	ステン製	. 55.0		1.0	5.0	600	10.8~11.6	
"(") 4.0	1.5 t	"	7 0.0		1.0	5.0	550	7.0~9.0	
"(")1.75	1.5 t	"	6 0.0		1.2	6.0	250	7.5 ~ 8.0	
"(")"	1.5 t	"	2 5.0		1.2	6.0	400	4.0~5.0	
"(")"	1.5 t	"	3 5.0		1.0	6.0	300	8.5 ~ 9.0	
4.0	250×	(150×7.0	8.0		1.8	6.0	400	4.8~9.0	
" "		"	3 0.0		1.2	6.0	300	6.7~7.8	
営(漁協) 2	1.5 t	ステン製	1 0.0		1.0	6.8	3 8 3	4.5	
"(")"	" "	"	1 2.0		1.0	6.8	500	6.2	
"(")"	"	"	2 5.0		1.0	6.6	500	5. 2	
"(")"	"	"	2 9.0		1.0	6.8	500	7.0	
"(")"	"	"	3 0.0		1.0	6.8	500	7.4	
"(")"	"	"	4 3.0		1.0	5.6	500	6.0	

-le tea	abe Alle I sa		輸送	放 流 場 所	放	流	輸送方	效流 尾 数	(千尾)
支場	事業場	水	系	放 流 点	期間	日数	輸送尾数	へい死数	放流尾数
	伊茶仁	薫	別	乳橋下流	5. 1	1	1,896		1,896
		古	多糠	中央橋下流	"	1	5 2 0		5 2 0
		忠	類	忠類橋下流	,,,	1	585		585
		標	津	本 流 5 線	5. 11~5. 12	2	11,951		1 1,951
	根 室		"	俣落川との 合流点	5. 15~5. 24	2	7,3 6 0	-	7,3 6 0
	計根別		"	支流ケネカ川	5. 29	1	3,5 6 3	-	3,563
根	. *	風	蓮	風蓮橋上流 30 m点	4. 2.7	1	1,973	,	1,973
		別	当 賀	捕獲場前	5. 17	1	8 4 7		8 4 7
	虹 別		"	. "	4. 23~4. 25	3	3,700		3,700
	1	西	別	"	4. 18~4. 25	8	7,0 0 0		7,000
		風	蓮	旧風蓮橋	4. 13~4. 14	2	2,2 0 0		2,200
	1	穂	香	穂 香 橋	5. 8	1	458	,	458
	(床 丹)	春	別	捕獲場前	4. 13	1	900		900
				+			ī		
室									
							j#		
						\	1_		
	小計			1			4 8,8 2 0	0	48,820

	輸	送	方	法		1	回当り	の輸	送状	況	放流時の	松米日 松
車		別	g	ν	ク	輸送距離	酸素消費	水量	・水温	輸送尾数	河川状況	輸送目的
営(漁	魚協)	4 t	1.5 t	ステ	cm ン製	Km 1 8.0	l	1.0	1 3.0	千尾 480	°c 9.0	
" (″)	2 t			<i>,,</i>	9.0		1.0	1 4.0	584	1 2,0	
官		2 t			"	1 2.0		1.0	1 4.0	519	1 3,0	
官営		2 t 4 t		キャンパス ステ		1 2.0		2.5 1.0	9.5	728	8.7	1
官		2 t	1.5 t	ステ	ン製	9.3		1.3	8.5	5 2 5	1 2,0	
"		2 t	"		"	8.0		1.3	7.0	450	1 1,0	
営		2 t	"		"	6 5. 0		1.3	8.5	400	7,7	
"		2 t	"		"	7 6.0		1.3	8.8	430	8.0	
"	d	4.5 t	1.5 t 1.0 t		・ ン製 ″	8 3.0		1.1	9.7	3 0 0	8.0	
"	:	4.5 t "	"		"	5 6.0		1.1	9.7	300	8.5	
"		"	"		"	6 7.0		1.1	9.7	300	6.5	
"		2 t	1.5 t	ステ	ン製	1 0 0.0		1.2	9.8	458	1 4.0	,
"		//	1.0 t	プラスチ	ック製	3 5.0	٠	0.7	7.3	200	7.0	
								- Gra-				
											4	
						κ,				1		y
					7							

	br al	k 18		輸	送力	改 流	場所		放		流	輸送力	改流 尾 数	(千尾)
支場	事弟	東場	水	3	Ř.	放	流	点	期	間	日数	輸送尾数	へい死数	放流尾数
	釧	路	釧		路	弟子	屈町下 3	鐵別 7線	4. 9	~ 5. 17	1 5	3 0,1 1 1		3 0,1 1 1
			チョ	ロベ	ツ	チョ	ロベツ	7川橋	4. 23	~4. 26	4	1,230	3 0	1,200
+	鹤	居	阿		寒						_	1,000		1,000
			庶		路							1,0 0 0		1,000
			茶		路							1,0 0 0		1,000
勝	(広	尾)	豊		似							500		500
/- -	小	計										3 4,8 4 1	3 0	3 4,8 1 1
	天	塩	時		前	河口	より 5 Kz	n上流	4.	1 8	1	300		300
天	(猿	払)	猿	1	払	+	モマ	7 沼	6.	1	1	850	6	8 4 4
	(信	砂)	小	平	薬	河口	より 10Km	n上流	6.	6	1	1,3 0 0		1,300
		"	古	丹	别	"	4 Kn	n上流	6.	7	1	1,000		1,000
		"	風	連	別	"		"	6.	1 1	1	1,000		1,000
塩		"	遠		別	"	5 Kr	n上流	6.	1 2	1	1,3 0 0		1,300
	小	計										5,744	6	5,744
	千	歳	厚		田	厚	田	Ш	5.	8	1	3 5 0		350
千			新		冠	新	冠	Ш	5.	9	1	500		500
			沙		流	沙	流	Ш	5.	8	1	800		800
			静		内	静	内	Ш	5.	10	1	850	,	850
			鵡		Ш	鵡		Щ	5.	7	1	1,3 0 0		1,300
歳	静	内	三		石	Ξ	石	JII	4. 19	~ 5. 10	1	500		500
	敷	生	白		老	白	老	Ш	4.	20	1	1,000		1,000

	輸送	方 法	1	回当り	の輸送な	犬 況	放流時の	*** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
車	別	タ ン ク	輸送距離	酸素消費	水量・水温	輸送尾数	河川状況	輸送目的
官ク	スタウト	cm K K 1 8 1 型	Km 1 1.5	e	t c 1.5 8.5 ~ 1 0.0	千尾 300~ 410	6.0~11.0	
営(漁	協)ダイナ	グラスフアイバータンク	9 0.7			300		
		•						
								-
		,						
			2.0					
営	4 t	1.5 t ステンレス製	2 1 3.0		1.5~5.5	300	5.5	
"	2	キャンバス	2 5.0		1.0 11.0	3 0 0	9.0	
"	4	布製キャンバス 4ケ	2 9.6		1ケ当り _{7.5} 0.7		1 9.5	
"	"	"	6 5.4		" 8.5		2 2.0	
"	"	"	9 4.4		" 8.2		1 8.5	9
"	"	"	1 1 9.2		" 8.5		2 2.0	
"	"							7
官(漁	協) 3 t	200×150×100	9 9.2		1.5 8.0	3 5 0		7.
官営(漁	2 t 協)	ニッケイアルミ製 100×100×100	1 1 5.0		0.8 8.0	3 5 0 1 5 0		
	"	200×150×100 100×100×100	8 5.0	3.4	1.5 0.8 8.0	400	d	1
官	2 t	ニッケイアルミ製 1819型	1 2 8.0		2.0	850		
官営(漁	2 t 協)	ニッケイアルミ製 100×100×100	4 9.5		0.8 8.0	600 200		
官	2 t	ニッケイアルミ製1819型	1 7.5		2.0 8.0	500		
官営(漁	2 t 協)	100×100×100	1 5.0		0.8 8.0	200		

	whe sile tel		輸送	放流場所	放	流	輸送力	放流尾数	ζ -,
支場	事業場	水	系	放流点	期間	日数	輸送尾数	へい死数	放流尾数
	(元浦幌)	歌	別	歌別川	4. 19	1	150		150
干		仁	雁別	仁 雁 別 川	4. 19	1	500		500
		幌	満	幌 満 川	4. 19	1	500		500
		日	高幌 別	幌 別 川	4. 20~4. 28	9	2,4 6 0		2,460
荿		Ξ	石	三 石 川	4. 19~5. 10		250		250
	小 計						9,160	0	9,160
	八雲	落	部	河口より 1 5 Km上流	4. 9	1	200		200
		大	船	″ 5 Km 上流	4. 19	1	50		50
渡		汐	泊	ふ化場より	4. 13	1	300		300
	4	松	倉	河口より 1 0 Km 上流	4. 18	1	50		50
		亀	Ш	ふ化場より	4. 1 2	1	250		250
	尻 別	古	宇	河口より 8.5 Km上流	5. 22	1	100		100
	-	朱	太	本流と中流部	4. 24~5. 22	2	700		700
			泊	河口より 10Km上流	5. 2 2	1	100		100
	(茂辺地)	大	当 別	" 3 Km上流	3. 1 9	1	500		500
		亀	Ш	ふ化場より	3. 1 9	1	500		500
島		知	内	河口より 2.5 Km 上流	3. 1 9	1	350		350
		福	島	"	3. 2 8	1	7 0		70
	小計						3,1 7 0	0	3,170
	合	,	計				1 4 0,0 2 7	8 6	1 3 9, 9 4 1

輸送	方 法	1 [回当り	の輸送	送 状	況	放流時の	岭,关日的	
車 別	タ ン ク	輸送距離	酸素消費	水量・カ	水温	輸送尾数	河川状況	輸送目的	
営(漁協) 2 t	cm 1 0 0×1 0 0×1 0 0	Km 5 3.0	l	0.8	°c 8.0	干尾 150	c		
" "	"	3 4.5		0.8	8.0	250			
" "	"	2 7. 5		0.8	8.0	250			
" "	"	27.5		0.8	8.0	250			
官 2 t	ニッケイアルミ製 1819型	1 7.5		20	8.0	250			
営(漁協)	1.5 t ステン製	4 4.0				200		移殖	- 1
"	キャンバス 1.0×1.2×1.0	8 5.0				5 0		試験	
<i>"</i>	1.5 t ステン製	9 6.0				300		還元	
"	" "	9 3.0				50		試験	
"	" "	1 1 8.0				250		還元	
<i>"</i>	" "	7 3.0				100	7.0	移殖	-
"	" "	1 9.0 ~2 2.0			7.9	350	9.7	還元	
"	" "	4 0.0				100		移殖	
"	キャンパス 1.0×1.2×1.0	1 3.0				500		"	
"	, "	2 7. 0				500		"	
官用車	"	4 8.0				3 5 0		"	,
"		8 9. 0				70		試験	

オ 2 表 さくらます稚魚輸送放流結果

		輸送	放流場 所	放	流	輸送加	效流 尾 数	文 (千尾)
支場	事業場	水系	放 流 点	期間	日数	輸送尾数	へい死数	放流尾数
北見	渚 滑	渚 滑	ウツツ村 6 線	4. 17	1	297		2 9 7
	根 室	武 佐	1 7号 9線	3. 23~5. 23		263		263
	*	種		3. 23~5. 22		6 3		6 3
		熊	j.	3. 2 3		3 8		3 8
		イロンネペツ	6 号	3. 23~5. 23		107		107
根		ウラップ	西 3 号	3. 2 8		7 5		7 5
		シュラ		"		3 3		3 3
		ポン俣落	1 4号	"		20		2 0
	-	荒		3. 28~4. 28		6 1		61
		秋 田	19号	, ,,		2 7		2 7
		モアン	2 5号	"		2 7		27
		俣 落		4. 28~5. 22		80		80
		ケネカ	19号	5. 22		3 2		3 2
室		紅 葉		5. 23		3 2		3 2
		標津	俣落川との 合流点	"		3 2		32
	伊茶仁	忠 類	金山大橋下	1. 2 4		9 4		94
	虹 別	矢 臼 別	矢 臼 別 川	12. 26		100		100
	小 計					1,0 8 4	0	1,0 8 4
天塩	徳 志 別		歌登事業場より 約10km上流	5. 24	1	2 7 5	0	2 7 5
	尻 別	尻別川支流 下賀老	オ2ダム上流の 林道との合流点	5. 23		100		100
渡		月殼沢川	オ 2 ダム貯水部	"		150		150
		″ 上目名川	分 2目名川橋下	"	,:	250		250
島		古 字		5. 22		300		300
	小 計				-	800	0	800
	合	計	1			2,456	0	2,456

	輸 送	方 法	1	回当り	の輸	送尾	3 数	放流時の	
耳	5 別	タンク	輸送距離	酸素消費	水量·	水温	輸送尾数	河川状況	輸送目的
営	4 t	cm 2 5 0×1 5 0×7 0	Km 8.0	e	t 1.8	°c 6.0	千尾 297	°c 4.5∼5.0	
官		20ℓビニール袋			4.1ℓ	1 3.0		4.5~11.5	•
"		. "			"	"		6.1	
"		- <i>"</i>			"	"		5.5	
"		. "			"	"		6.0	
"		"	х .		"	"		5.0	1.5
"		"			"	"		5.0	
"		"			"	"		5.0	
"		"		-	"	"		5.0	
"		"			"	"		5.0	
"		"		,	"	"		5. 5	
"		"			"	"		8.8	
"		"			"	"	,	12.0	
"		"			"	"		9.5	
"	~	- //			"	"		11.0	
"		"			"	7.2		4.0	
営	2 t	" "				9.1		4.2	
官	1 t	ステン製 1.5×1.0×0.47	3 5.5	5,4	_	4.0	2 7 5	8.5	
官		1.5 t ステン製	8.0			7. 6			資源保護水面への
″		キャンバス 1.0×1.2×6.0	8.5						分数放流
"		"	8.0			1 3.0		^	"
営	(漁協)	1.5 t ステン製	7 3.0						移植放流

オ3表 からふとます稚魚輸送放流結果

				輸送	放流場所	放	流	輸送力	放流尾 娄	女 (千尾)
支場	事弟	美場	水	系	放 流 点	期間	日数	輸送尾数	へい死数	放流尾数
北見	渚	滑	渚	滑	ウツツ村 6線	4. 17	1	5 2 4		524
	浜	中	忠	類	仮 収 容 所	3. 6	1	200		200
根		,	標	津	根室事業場	3. 22	1	200		200
	/	,	当	幌	当幌橋下	4. 26	1	150		150
	(床	丹)		"	. "	4. 13	1	100		100
室	小	計						650	0	650
渡	八	雲	汐	泊	ふ化場より	4. 13	1	200		200
	,	,	大	船	河口より 5 Km 上流	4. 19	1	5 0		5 0
島	小	計		1				250	0	250
合			計				1,425	0	1,4 2 5	

オ4表 害鳥の防・駆除結果

支場	事業場	実施期間	実 施 区 域	実 施 内 容
北	岩尾 別 料 里 見	4. ₁ 5 ~5. 14	浮遊池、飼育池 飼育池 常呂川(日吉橋より下流川口まで) 常呂川支流幌内川、ライトコロ川 (13号橋より下流ポント沼周辺)	飛来防止 飛来防止 地元猟友会に依頼、区域内に飛 来する鳥類の実態調査及び駆除
見	渚滑	4. 1~5. 31	紋別市渚滑川 9 線及びウツツ川 8 線 沢河口まで	" "
天	徳 志 別		養魚池、飼育池 ""放流河川	飛来防止
塩	頓 別中 川		放水路	" .

	輸 送	方	法		1.	回当り	の輪	送划	? 況	放流時の	±Δ '¥-	D#1
車	〔 別	g	ン	ン	輸送距離	酸素消費	水量·	水温	輸送尾数	河川状況	輸送	日的
営	4.0 t	250×	150)	cm < 7 0	Km 8.0	ℓ 2.5	1.8	7.3	千尾 300	€ 4.8~6.0		
"	"	20 €	ピニー	- ル袋	9.0			3.3	200	3.4	還	元
官	クラウンバン		"		6.4			4.5	200	4.4	/	
営	2 t	プラスチ	ックタン	// 1t	8.2		0.8	5.5	1 5 0	5.9	/	,
"	"		"		2.0		0.8	5.8	100	6.4	分	散
営	(漁協)	1.5 t	スラ	テン製	9.6						移	殖
	"	キャン 1.0×		< 1.0	8.5	1.				N	試	験

-	- 201			駆	除害	鳥	ł	甫 食 稚	魚	備考	
行	猟	具	種		類	類 羽		種	尾	備考	
古	刺	網									
~		ル		٠.							
			カ		モ	106					
散	弾	銃	ア	1	サ	6					
			>			,			3.		
	//		カ		モ	4 9					
			ア	1	サ	2 0					
古	刺	網								網を池に覆うことによる食害防」	E
爆	音	器								爆音による飛来侵入防止	
古	刺	網								網復いによる食害防止	
	"									"	

氷 5表 害魚駆除ならびにさけ・ます稚魚食害結果

mbr) m	-80	alie	18	टोट क्षेत्र संग्री सह	採	取 場 所	採取漁具
支場	事	業	場	実施期間	水 系	区間	床 収 庶 矣
北				4. 1 2~4. 30	エトンビ川 ″		タモ網
."	渚		滑	"	"	構内飼育池排水路からエトンビ	
見	ΠH		173	4. 7~6. 15	,,	川支流北川	ウ ラ イ
				,,	,,		
	滅		别	5. 22~5. 26	薫別川 支流	養漁上端から末流まで	タモ網・刺網
	伊	茶	仁	4. 20~5. 10	無名 川 安流 無名 川	水源より下流 1 Kmの間	" "
根					無名川		
	虹		別	4. 10~5. 20	西別川	水源池から下流800m地点の間	竿・ヤス・タモ
							-
室				•	- I	,	1
	浜		中	5. 1~5. 31	風蓮川	事業場から下流 800 m地点の間	タモギ
						a di ang	
	+	-	勝	4. 4~4. 6	札内川支流 ヌップク川	愛国橋附近	刺網 ・ どう
				-			
+	札		内	3. 7~4. 24	十勝川支流メン川	事業場より合流点の間	刺網·曳和
	幕		别	3. 15~4. 24	旧途別川	事業場より猿別川との合流点まで	刺網・曳網どう
	太		田	4. 19~5. 31	尾 幌 川	〃 尾幌川河口まで	刺
							-
勝					1	f 1	
				, , - e			
				No. of the second			
天塩	天		塩	4. 26~5. 17	美 深 川	美深川と天塩川との合流点	刺網·曳料

	採	取	魚	捕食	され	ていたさけ	,ます稚魚	Alt: -tw
魚	種	尾 数	体長範囲.	魚	種	尾 数	体 長 箆 囲	一 備 考
1.7	ナ	200	6.5 ~ 3 5.0 cm	8	け	431	c	m
ニジマ	ス	4	1 4.5 ~ 3 0.5	"	c .	2 7		
アメマ	ス	1	2 6. 5	"		3		
イワ	ナ	3 3	6.8 ~ 2 6.0	さからふん	けます	2 7 9 1 2		
アメマ	ス	2	18.5~26.0	3	け	7		
イワ	ナ	15	1 2.0 ~ 1 8.0	2	け	200	3.4 ~3.8	本流は急流のため中止
アメマ	ス	8 5 9	1 8.0 ~ 2 3.0	· "		2 0,0 0 0	1	1
17	ナ	898	8.5 ~ 1 7.0	^	,	1 3,0 0 0	3.8 ~4.3	
オショロ:	コマ	254	9.5 ~ 1 7.0	- "	1 ,	3,0 0 0		
アメマ	ス	3 7	1 4.0 ~ 2 7.0		, "	370		
カワマ	ス	6	9.0 ~ 1 4.0	/	,	0	「さ体長个	等、ヤスは4月中 使用
ニジマ	ス	11	9.0 ~ 2 4.0		•	0	明	V -9
アメマ	ス	135	7.5~13.0	からふ	とます	280	1.1	
17	ナ	120	5.0~10.0	からふ	とます	110		
ウグ	イ	3,3 0 0	1 4.0 ~ 2 1.0	3	け	2,640		
ニジマ	、ス	, 2	2 0.0		,	5 0		
ウグ	イ	43,207	4.5 ~ 2 4.0	,	,	消化されため尾数		河川水温 6.2~1 6.0 ℃
ウ グ	1	1 8,5 7 2	9.0 ~ 3 2.0	,	"	5 7,3 4 2	2	// 4.0∼ 7.8 ℃
ウ グ	1	794	1 4.7 ~ 3 7.2	,	,	1		
アメマ	、ス	60	2 2.6 ~ 4 8.3	,	,	Pdr±31 stel		
1 1	ウ	2	2 3.4 ~ 3 2.0		"	確認第 他は消 め不明	(55尾 i化のた i	
かれ	٧v	1 4 8	1 1.0 ~ 2 3.2	1. 9	,	37,19		
きぅ	Ŋ	2,808	15.5~30.0					
ウ グ	イ	71,000		3	け	消化されため不明	ている	

第6表 河川パトロール結果

	第6表 初川ハトロール結果									
+ 10	ate alle LH	パトロール期間		パトロール区域						
支場	事業場	および 回数	水系	区域						
根	薫 別	5. 21~5. 26 2 □	薫 別 川	養魚池末端から河口までの間						
	伊茶仁	4. 1~5. 21 5 🗈	伊茶仁川	"						
室	虹 別	3. 12~4. 26 3 🗓	西 別 川	虹別橋から別海橋までの間						
	十 勝	4. 4~5. 26	十勝川水系札内川支	ふ化場から札内川との合流点まで						
		150	流ヌップク川	,						
+	幕 別	3. 22~4. 27 7 🗓	旧 途 別 川	ふ化場より旧途別川と猿別川との合流点まで						
勝	太田	4. 10~6. 25 28回	ホマカイ川及び 尾幌川	放流口より尾幌川河口まで						
	徳志別	4. 16~4. 30 15回	徳 志 別 川	ふ化場より河口まで及び山臼漁港一帯						
天	歌 登	3. 18~6. 7 . 37 🗀	-t- Sto . 9 - , for 1- 1 111	事業場より (パンケナイ川) 幌別川河口まで						
				-						
	頓 別	3 中旬~5. 月	頓別川支流ヌルイ川 及びウソタン川	事業場より頓別川合流点まで						
塩	中 川天 塩	4. 20~4. 30 4.上旬~5月下旬	天塩川支流 パンケナイ川 天塩川支流 美深川	事業場より天塩川との合流点に至るパンケナイ川 美深川一円						

パトロール状況及び結果

水溜に閉鎖された稚魚は、本流河床がかなり低いためなし。

4月中旬には水門および本流のよどみに多く見られたが、5月に入って水門の開放が行なわれ各所に見られた。

飼料生物および稚魚の降下稚魚を調査した。

パトロール期間中は随所に稚魚の遊泳がみられたが、特に降下に障害となる水溜等は見受けなかった。 ゴミ、ビニール等の投棄については、かなりの量が見受けられたが、現在の所稚魚の降下には支障は認められない。

3/22巡回ではふ化場附近のみに稚魚が見られたが、3/26にはふ化場より川成りに6㎞下流でも散見出来たが群はなしていない。その後3/31、4/5とパトロールするに従い、だんだんと群の数が多くなり、4/12~4/22にかけてピークとなった。その後の調査では猿別川にも魚体の大きくなった大きな群を認めた。日途別川は河川の蛇行と両岸及び河川内に雑草の繁茂が著しく、その他にも立木、沈木が多く見られ、降下に多くの障害となっているが、幸い本年は暖かかったせいか稚魚の降下が早かった。

4月中旬、河川全域に魚影が見受けられるようになり、特に河川に注入している小川入口あたりに群が多く見受けられた。その後5月上旬頃より河川全域の魚群が厚くなり、この状態は6月上旬初めまで続いたが、上旬後半はこの群も疎となり、6/22のパトロール以降は河川間に稚魚の遊泳は見受けなかった。しかし、河口附近には小群遊を時折り見受けた。

4月中旬よりパトニールを行なった。この間の河川の水温は3.6~6.8 cの範囲で水量も平常水位より20~100cmも増水していた。稚魚の降下状況は、パトロール終了時迄常に河川内に稚魚の群を認めたが、河口すぐ構にある山田漁港では6/21以降急激に稚魚群が見受けられた。

解氷前より迷入場所の整備、障害物の除去等のパトロールを開始、4/7幌別川全面解氷するも稚魚は 認められず、4/20のパトロールで始めて遊泳稚魚を認める。しかし、その後河川増水のため(河川 水温2.5~4.0 c)、遊泳稚魚を見受けることは出来なかったが5月に入り平水位より増水ぎみではあったが、随所に多くの稚魚を認めた。この間増水のため迷入し凹地で溜っている稚魚を水路を切って再放流する等の作業を行なった。

3月中旬、養魚池より出た若干の稚魚の遊泳を認める。4月中旬、ヌルイ川及びウソタン川全域の淀みに及びゆるやかな瀬につく。5月中旬、全数放流によりヌルイ川、ウソタン川全域にかなり厚く遊泳を認めたので、早期の追い出しを計るため水中ポンプによる水管調節で約10日間で頓別川本川に降下した。

増水時に凹地に閉鎖された稚魚の再放流を実施。

放流河川には防大用水、生コンドに、水内灌漑等の稚魚迷入個所が多くあるため、随所パトロールを行なった。特に防災用水の取水口においては、両岸の堰板附近に溜る稚魚を曳網により追い出す方法をとった。

				.0	トロール区域	
支場	事業場	パトロール期間				
		および回数	水	系	区	域
	千 歳	13回	千 歳)11	鳥棚舞橋~西越	
		2 🗊	"		千歳支場~舞鶴橋~江別	
干						
	千 歳		厚 田	Щ	河口附近	
	(元浦川)		歌別	Ш	"	,
	"		仁 雁 別	Щ	"	-
	"		幌 満	Ш	"	
	"		幌 別)1]	"	
	静 内 (元浦川)		三 石	Ш	"	4
	千 歳	4 🗆	静内	Щ	"	
	"		新 冠]][<i>"</i>	
	"		沙流	JII	"	
歳	"		鴊	311	"	
	敷 生		白 老	Ш	"	
	支笏湖		支 笏	湖		
	支 場	4. 21~6. 30	遊樂部	3 111	セイヨベツ橋より遊楽部川口ま	で
		20回				
1					0	
渡						
		×				
	八雲	3. 15~3. 31	遊菜部川支	流	事業場よりセイヨベツ橋附近	
		100	セイヨベ	ツ川		
-	-					
島	刺 别	2. 24 ~5. 10	利別川皮流冷	水川		至る冷水川
		27回			の間	
	戌 別	2. 24~5. 31 19 🗇	尻別川 支流目	名川	事業場より尻別川との合流点に	至る間
		100				

パトロール状況及び結果

放流水路附近の障害物除去

初期は、千歳市街及び西越採卵場附近及び各所に稚魚多数の群を見受けたが、舞鶴橋より下流は濁水の ため、稚魚流下状況は確認し得なかった。

ミナ川より河口に至る間、4回にわたりパトロールした結果 稚魚は順調に流下した事を認める。 何れも昨年より河川水やや多く、 河口が近いため、又特殊な障害物 もなく、順調に流下したものと思 われる。

放流時、湖水水温 7.5 °、晴天無風にして絶好の天候にて、餌料を粉砕投餌する。

4/下旬より5/上旬まで、稚魚の群は見えなかったが、5/12各所の淀みに稚魚が見受けられた。 その後は上流での砂利採取が活発となったため、河川は常に濁水となっており、稚魚を見受けることは 困難であった。しかし、5月下旬に1度かなり厚い群が各所の淀みに見られたが、その後は以前同様濁 水により発見できず。

河川は全般に砂利採取により濁水により常に濁り、特にパトロール後は減水になるにつれてひどいように感ぜられた。又、河口は工場廃水による汚染も認められた。

3/15~3/24の間3日間パトロールを実施、流木等稚魚の降下に障害となる物を除去する。稚魚発見出来ず。

3/25以降、放流水路及びセイヨペツ川にて稚魚を確認、その後稚魚の群は大型化し、多くの群が順 次降下して行くのを認める。

最初のパトロール 2 / 2 4 の時点で魚影を発見、3 月に入り丹羽橋附近で稚魚の降下を確認、3 月中旬には合流点及び利別川本流にも遊泳を確認、4 月上旬には合流点附近で相当数の稚魚の群泳を見る。その後も中旬にかけて大きい群泳の降下を確認したが、下旬に入り急激に稚魚の姿は消え、周辺の水溜りに封鎖された椎魚のみを確認、再放流する。5 月上旬以降は稚魚を散見せず。

2月~3月下旬には稚魚の遊泳は認められなかったが、下旬後半になり放流水路で散見される。その後

	the Mile I I	パトロール期間			トロール地域	
支場	事業場	及び回数	水	系	. 区	域
渡	厚沢部	2. 22~5. 10 16回	厚 沢	川部	厚沢部川支流目名川及び厚 沿岸	
島						

才7表 広報 活動

支	場	活
:lt.	兒	降下稚魚の安全を計るため、小中学校に対し、保護を文書依頼した。
根	至	降下稚魚保護を訴えたチラシを各学校、漁組及び沿岸住民に配布す
+	服券	" " 配布し
千	歳	各河川の稚魚の放流数及び稚魚保護の標語をあしらったチラシを作
渡	島	放流河川の主要個所に立看板を設置し、放流椎魚保護の P R につと

岁8表 河川清掃及び放流水路整備

根	差	羅臼、薫別、伊茶仁、虹別、浜中各事業場放流水路に点在する流木
+	勝	十勝・札内事業場において放流水路の障害物除去を行なう。
天	塩	管下全事業場において放流水路の障害物除去を行なうとともに、歌
		消毒(害魚駆除と併せて)及び迷入口への土俵積込等の整備を実施。
干	歳	静内敷生事業場において放流水路の障害物除去を行なう。
渡	1-1 0-10	八雲、尻別事業場において放流水路の障害物除去を行なう。

パトロール状況及び結果

融雪による増水のため稚魚の確認が思うようにいかなかったが、下旬後半になり河川全般に遊泳が見られ、5月に入ってからは、その数もかなり多くなってきたが、5月中旬に入って水田代かき水による濁りで稚魚の確認は不能となった。しかし、下旬後半には合流点より本流にかけてその稚魚を確認出来た。2/1無給餌稚魚を放流したので、この稚魚の追跡を2/22より実施。しかし、稚魚は一部が日名川と厚沢部川の合流点に認められるだけで、他は厚沢部川及び海に出た模様(河川水温約5.4 で)で、3/20のパトロールでは本川・支流ともに魚影は見えず、その後は3/27~3/31までの間に放流した給餌稚魚を対照に降下動向をパトロールする。給餌稚魚群は放流後10~15日位で日名川と厚沢部川の合流点に多数姿を見せ、早いもので15日位で厚沢部河口に達しているものも見受けられ、放流後20日で河川内には少数より見受けられず、25日目には河川にての発見は出来なかった(水温10.3 で)給餌群は放流後1ケ月で沿岸で見受けられ、これらが沿岸の雑定置に乗網することから、沿岸漁民及び漁協等に稚魚の保護を強く押し進めるよう依頼した。

動	状	况

るとともに、沿岸に立看板を立てPRにつとめた。

PRを実施。

製 PRにつとめるとともに、千歳川放流分については市の広報紙を利用して PRを実施。 めた。

. 4.

塵芥、水草その他障害物の除去及び支派流への迷入路封鎖を行なう。

登事業場では水路の漏水防止、頓別事業場では河床の堀下げ、徳志別事業場では石灰投棄による水路の

§ 15 稚魚飼育事業

昭和47年度は、当初計画した3魚種(さけ、さくらます、からふとます)の他にひめますを加え、4 魚種の飼育を実施し飼育実績(オ1表)に示したとおり計画を上回る成績を上げた。又、飼育実施値所も 前年の53個所(道及び民間を含む)を上回る62個所において実施された。

さけについては、全道 4 4 個所 (うち、道 1 個所、民間 1 0 個所) で実施し、飼育計画尾数 29 4,000 尾に対し 3 9 0,8 5 1 千尾 (飼育率 1 3 2.9 %) の飼育を行ない、 3 7 6,9 6 9 千尾の稚魚を放流した。

さくらますについては、根室、天塩、渡島支場管内 6 個所 (うち民間 1 個所) で飼育を行ない、飼育計画 2,000 千尾に対し 5,380千尾 (飼育率 269.0%) の飼育を行ない、4,199千尾を放流した。この放流尾数の中には、昨年まで千歳支場で実施している、さくらます拡大再生産事業の飼育数を含んで報告していたが、今年の飼育尾数の中には含まなかった。

又、からふとますについては、北見、根室、天塩、渡島支場管内11個所(うち民間3個所)で実施し 飼育計画13,000千尾に対し10,490千尾(飼育率80.7%)の飼育を実施し、10,197千尾の稚 魚を放流した。

この他に、今年よりひめますの飼育を実施した。この飼育は当初計画はされていなかったが、急拠 1,085千尾の稚魚を対象に行ない、1,009千尾の稚魚を生産し放流した。

これら 4 魚種で合計 3 9 2,3 7 4 千尾の飼育放流となり、総放流数 5 0 4.2 0 6 千尾に対し飼育放流率は 7 7.8%に値した。この飼育放流率は昨年の 6 6.1%に比較してかなり高い価を示している。

以上、各魚種別の飼育放流結果は分2、3、4、5表に示したが、飼育放流概要は次のとおりである。

(さ け)

294.000千尾(道立森支場分9.000千尾を含む)の飼育事業実施計画にもとづいて44個所で実施、計画を上回る390.851千尾(125.598.8 kg)の稚魚を対象に、48年1月22日より6月20日までの間給餌を行なった。本年度は特に民間収容場において積極的に飼育を行なった個所が多く認められ、成績の上でも担当事業場の適切な指導の結果、総体で昨年を上回る歩留を示し376,969千尾(356,737.8 kg)の稚魚を生産,各河川へそれぞれ移殖及還元放流を行つた。本年度のさけの総放流数は475.805.4 尾でこのうち飼育放流尾数は前記したとおり376,969千尾で総放流数に対する給餌放流率は79.2%(昨年度は75.6%)にあたり,年々給餌放流率は増加の傾向を示しつつある。

(さくらます)

当魚種の飼育は根室、天塩、渡島支場管内 6 個所 (うち民間 1 個所を含む) で 1 月 1 9 日より 6 月 3 0 日まで行なわれ、飼育計画 2,0 0 0 千尾に対して 5,3 8 0 千尾の飼育を行ない、 4.1 9 9 千尾の稚魚を生産 (歩留 7 8.0 %) し河川に放流された。この他に「さくらます拡大再生産事業」として千歳支場千歳事業場で、昭和 4 6 年度より継続実施されているさくらます周年飼育の結果については、後日別途報告の予定である。

[からふとます]

本年度当魚種の飼育は昨年同様十勝、千歳を除く4支場管内で実施されたが、飼育尾数では昨年を大きく下回る数字であった。これは昨年の大豊漁と異なり、本年は凶漁年にあたったためで、総飼育尾数10,490千尾を11個所(うち民間3個所を含む)で2月1日より6月10日までの間給餌を行ない、10,197千尾の稚魚を生産(歩留972%)各河川に放流された。

才1表 昭和47年度稚魚飼育計画および実績表

	魚			3	17			3 <	らます	
支	場場	the contract of the contract o	実施 事業 場数	計画数	放流数	飼 育 放流率	実施 事業 場数	計画数	放流数	飼 育 放流率
北		見	7 (1)	千尾 51,000	千尾 63,139 118,816	% 5 3.1		千尾	千尾 813	%
根		室	9	9 7,0 0 0	1 1 0,0 3 8	9 5.6	2	,:	1,5 3 4 3,4 9 3	43.9
+		膀	(4)	84.000	1 3 1,3 9 6	9 1.4				
天		塩	(2)	2 4.0 0 0	2 8,5 5 0	9 5.5	2 (1)		1,2 1 5 1,2 2 6	9 9.1
于		歳	3 (3)	2 0,0 0 0	2 5,7 2 8	7 5.6				
渡		島	.3	9,0 0 0	1 1,1 6 8	4 1.0	1	2,0 0 0	1,450	98.6
森		(道)	1	9,0 0 0	6,950	1 0 0.0				
	it		3 4 (10)	2 9 4,0 0 0	3 7 6,9 6 9 4 7 5.8 0 5	7 9.2	2 (1)	2,0 0 0	7,0 0 2	6 0.0

- 注 1) 実施事業場数の()内数字は民間個所数
 - 2) 放流数の上段は…… 飼育放流数
- 3) " 下段は…… 総放流数

	からふ	とます		14	ひめ	ます			合	計	
実施事業場数	計画数		飼 育 放流率	実施事業場数	計画数	放流数		実施事業場数	計画数	放流数	飼 育 放流率
3	千尾 7,000	千尾 4.822 11,240	4 2.9		千尾	千尾	%	1 0	千尾 58,000	千尾 67,961 130,869	% 5 1.9
1	3,0 0 0	5 9 8	1 7.2					1 2	100,000	1 1 2,1 7 0 1 2 2,1 2 0	9 1.9
		105						6 (4)	8 4.0 0 0	131,396	9 1.4
3 (3)	2,0 0 0	3,1 1 5	1 0 0.0				,	1 0	2 6,0 0 0	3 2,8 8 0	9 6.1
		800		1		1,009	1 0 0.0	4 (3)	2 0,0 0 0	2 6,7 3 7 3 5,8 2 8	7 4.6
1	1,0 0 0	1,662	1 0 0.0					5	1 2,0 0 0	1 4.2 8 0 3 0,4 0 2	47.0
						Щ		1	9,000	6,9 5 0 6,9 5 0	1 0 0.0
8 (3)	1 3,0 0 0	1 0,1 9 7	5 0,0	1		1,0 0 9	1 0 0.0	1	3 0 9,0 0 0	3 9 2,3 7 4 5 0 4,2 0 6	77.8

オ2表 さけ稚魚飼育成績

1					即月及積		-			4. 11		
13	支	事業場	餌 ;	料	給	餌	飼育	量	浮上:	魚体	へい死	放 流
±,	昜	争耒炀	給餌量	種類	期間	日数	尾 数	重量	体長	体重	尾 数	尾 数
		H = 01	Kg	此	4 1-5 00	5 0	干尾 2,0 0 0	К д 6 0 0.0	cm 3.10	g 0.30	千尾 25	千尾 1,975
		岩尾別	500	乾	4. 1~5.20	3.0	2,0 0 0	0 0 0 0 0	3.1 0	0.30	2.5	1,5 7 5
1		斜 里	4,5 1 0	"	3. 1~5.31	92	1 5,0 0 0	3,975.0	3.3 9	0.2 6	6.5	1 4.9 3 5
=	比	藻 琴	4 5 0	"	4. 1~5.10	40	2,2 3 0	7 1 3. 6	3.35	0.32	3 0	2,2 0 0
		網走	6 5 0	"	3.21~5.20	6 2	5,550	1,831.5	3.40	0.33	5 0	5,500
		湧 別	5,0 0 0	"	3. 1~5.31	92	1 7,1 0 7	5,246.0	3.64	0.3 1	136	1 6,9 7 1
		渚 滑	1,0 5 0	"	2. 9~5.14	9 5	9,800	3,2 43.0	3.3 2	0.33	5 2	9,748
		幌 内	1,600	"	3.11~5.31	8 2	7,7 7 0	2,486.4	3.3 0	0.32	470	7,300
1	見	(来運)	1,2 2 5	"	3. 1 5~5. 3 1	7 7	4,5 5 5	1,494.0		0.33	4 5	4.510
		本年度	1 4,9 8 5	"	2. 9~5.31		6 4.0 1 2	1 9, 5 8 9. 5		0.31	873	6 3,1 3 9
		前年度	1 4,4 0 0	"	2.1 1~5.2 6		4 6,1 9 4	1 4,9 79.6		0.3 2	705	4 5,4 8 9
1		羅臼	4.5 0 0	乾	3.25~5.20	5 7	1 1,8 7 5	4.2 75.0	3.70	0.3 6	3 4	1 1,8 4 1
		薫 別	1,2 0 0	"	4. 1~5.15	4 5	3,3 8 5	1,2 86.3	3.60	0.38	130	3,2 5 5
1	根	伊茶仁	5,600	"	3. 1 5~5. 1 5	6 2	2 3,4 5 4	6,988.0	3.50	0.3 0	382	2 3,0 7 2
		根室	1,6 4 0	"	4.20~5.23	3 4	7,8 9 7	2,5 27.0	3.5 9	0.3 2	3 0	7,867
		中標津	1,600	"	4. 6~5.15	40	6,9 2 4	2,1 46.0	3.3 7	0.3 1	9	6,915
		計根別	6,3 0 0	"	3. 1~5.15	7 6	1 0,8 9 9	3,5 74.9	3.3 3	0.33	3 4 2	1 0,5 5 7
		虹別	1 9.5 8 0	"	2.10~5.20	109	4 2,1 3 0	ι 0,220.1	3.1 2	0.24	3 0	4 2,1 0 0
		浜 中	1,0 0 0	"	3.15~5.15	6 2	3,1 6 1	969.0	3.4 5	0.3 1	1 5	3,1 4 6
V	室	厚床	5 0 0	"	4.18~5.22	3 5	1,300	4 4 2.0	3,50	0.34	1 5	1,285
		本年度	4 1,9 2 0	"	2.10~5.23		1 1 1,0 2 5	3 2, 4 28.3		0.29	987	1 1 0,0 3 8
		前年度	3 6,7 7 0	"	3. 1~5.31		1 5 9,0 9 2	5 1,5 55.0		0.32	5,896	1 5 3,1 9 6
1	+	釧路	6,7 0 0	乾	2.19~5.14	8 5	3 5,6 5 7	1 0, 6 9 7.1	3.6 0	0.30	269	3 5,3 8 8
	勝	鶴 居	3,2 0 0	"	3. 1~5.15	7 6	1 3,4 1 3	4,828.0	3.4 3	0.36	713	1 2,7 0 0

	量	放流	魚体		増	水	温				飼育		
重	量	体長	体重	歩留	重比	低~高	平均	PH	DO	水量	面積	備	考
1, 7	К <i>д</i> 7 5.0	- cm 4.10	9 0.90	% 9 8.7	3.00	°c 4.5 ~ 8.5	°c 7.6	6.5	PPM	600	m² 1 8 0		
1 6,8 (0 2.0	5.38	1.1 3	9 9.6	4.3 5	7.4 ~ 1 1.2	8.5	7.3	1 1.0	2 0,0 0 0	980		
1,1 4	44.0	4.50	0.52	9 8.6	1.63	6.5 ~ 8.6	7.0	6.9	1 0.0	1,200	151		
4.0	15.0	4.40	0.73	9 9.1	2.2 1	3.5 ~1 6.0	7.0	6.9		470	3 0 0		
1 2,90	0.00	4.8 7	0.7 6	9 9.2	2.4 5	3.5 ~ 9.5	5.8	6.7		800	1,1 1 0		
7,5 (0 6.0	5.00	0.77	9 9.5	2.3 3	6.3 ~ 7.4	6.5			1,800	670		
6,71	1 6.0	4.75	0.9 2	9 4.0	2.87	6.0 ~ 9.0	6.9	6.6~ 6.2		3,4 0 0	574		
4.5	5 5.0		1.0 1	9 9.0	3.0 6	7.0 ~ 8.7	7.5	6.8	1 1.8	9,0 0 0	443		
5 5, 4	1 3.0		0.88	9 8.6	2.84	3.5 ~ 1 6.0						,	
4 6,3 (0 4.7		1.0 2	9 8.5	3.1 9	3.0 ~ 1 5.5							
1 0,2	44.1	4.70	0.87	9 9.7	2.42	5.0 ~ 8.4	7.2	7.2	8.8	2,5 0 0	1,1 2 3		
2,3	43.6	4.2 5	0.7 2	9 6.2	1.8 9	4.4 ~1 0.6	7.7			500	420		
1 0, 7 9	93.0	4.20	0.46	9 8.4	1.5 3	3.6 ~ 1 7.0	1 0.1				1,3 7 7		
3,6	1 8.8	3.9 5	0.46	9 9.6	1.44	6.0 ~1 0.5	8.6	7.1	1 0.0	3,0 0 0	1,0 8 0		
4,9	78.8	4.3 8	0.72	9 9.9	2.3 2	3.5 ~1 4.5	7.5	6.8	6.5	1,8 0 0	612		
8,6 6	69.1	4.2 7	0.82	9 6.8	2.4 8	6.7 ~ 7.9	7.3			2,1 5 0	469		
4 3,2 9	9 5. 4	4.63	1.0 3	9 9.9	4.2 9	9.0 ~1 0.4	9.4	7.2		8,0 0 0	15,340		
2,1 9	95.0	4.30	0.68	9 9.5	2.1 9	2.5 ~1 4.0	8.3			1,600	3 7 6		
6 5	5 5. 4	3.90	0.51	9 8.8	1.60	2.0 ~ 8.5	6.5				3 9 0		
8 6, 7 9	9 3.2		0.79	9 9.1	2.7 2	2.0 ~17.0							
1 2 8.3	7 2.8		0.83	9 6.3	2.5 8	2.0 ~1 5.0							
2 4, 7	7 1.0	4.50	0.7 0	9 9.2	2.3 3	5.0 ~ 9.5	7.2	7. 5		400	3,2 4 9		
1 3,3 3	3 5.0	5.1 6	1.0 5	9 4.7	2.9 1	5.0 ~11.5	8.3	7.0		1,700	9,0 2 0		

勝 事業場	支	-	館	料	給	餌	飼育	量	. 浮上	魚体	へい死	放
	場	事業場	給餌量	種類	期間	日数	尾 数	重量	体長	体重	尾数	尾数
十 勝 3,100		幂 別	1		2.16~4.20	6 4				1		1
大 樹 2200	+	札内	7,4 0 0	"	2. 1~4.1	7 5	3 5,4 9 0	1 4.1 9 5,0	3.8 7	0.40	2,3 4 2	3 3,1 4 8
(茶 路) 250 " 4.15~5.11 27 1.040 332.8 3.50 0.32 40 1.000 (音 別) 550 " 4.10~5.11 32 2.580 851.0 3.40 0.33 80 2.500 (厚 内) 400 " 4. 4~4.27 24 1.500 542.9 3.60 0.36 100 1.400 (広 庭) 600 " 3. 6~5.10 71 5.164 1.497.0 2.80 0.29 4 5.160 勝 本年度 31.100 " 2. 1~5.15 135.545 48.758.6 0.36 4.149 131.396 前年度 33.400 " 2. 1~5.31 170.055 59.615.5 0.35 5.112 164.943		十 勝	3,1 0 0	"	2.20~5.14	8 4	1 0,3 8 0	3,736.8	3.60	0.3 6	380	1 0,0 0 0
(音 別) 550		大 檢	2,2 0 0	"	3.10~ 30	5 2	5,0 2 1	1,958.0	3.30	0.3 9	2 1	5,0 0 0
(原 内) 400 " 4. 4~4.27 24 1.500 542.9 3.60 0.36 100 1.400 (広 尾) 600 " 3. 6~5.10 71 5.164 1.497.0 2.80 0.29 4 5.160 勝 本年度 31.100 " 2. 1~5.15 135.545 48.758.6 0.36 4.149 131.396 前年度 33.400 " 2. 1~5.31 170.055 59.615.5 0.35 5.112 164.943 徳志別 3.564 乾 2. 1~5.10 99 6.650 2.194.5 3.50 0.33 50 6.600 天 敬 登 960 " 2.20~5.12 82 3.910 1.273.2 3.57 0.33 40 3.870 啦 別 2.350 " 2. 1~5.10 99 4.140 1.449.0 3.40 0.35 440 3.700 中 川 400 " 2. 1~4.30 89 6.300 1.890.0 3.50 0.30 1.900 4.400 天 塩 235 " 2. 1~5.20 109 2.200 758.0 3.55 0.34 70 2.130 (信 砂) 540 " 5.20~6.20 32 6.820 2.455.2 3.14 0.36 820 6.000 (増 毛) 234 " 4. 5~6. 4 30 1.965 491.3 2.93 0.25 115 1.855 地 本年度 8283 " 2. 1~6.20 31.985 10511.2 0.33 3.435 28.550 前年度 5.663 " 1.21~6.15 15.998 5.259.8 0.33 457 15.541 千 歳 2.657 乾 1.22~4.20 89 9.060 2.579.8 3.40 0.29 2.85 8.775 并 龄 内 1.160 " 2. 6~3.25 48 6.051 1.815.3 2.70 0.30 1.147 4.904 燉 生 1.487 " 1.22~3.31 69 4.648 1.640.0 3.45 0.35 178 4.471 (余 市) 1.800 " 2.15~5.22 97 3.779 1.107.0 3.40 0.29 310 3.469 橡 任 1.487 " 1.22~3.31 69 4.648 1.640.0 3.45 0.35 178 4.471 (余 市) 1.800 " 2.15~5.22 97 3.779 1.107.0 3.40 0.29 310 3.469 橡 任 1.487 " 1.22~3.31 69 4.648 1.640.0 3.45 0.35 178 4.471 (余 市) 1.800 " 2.15~5.22 97 3.779 1.107.0 3.40 0.29 310 3.469 橡 任 1.487 " 1.22~3.31 69 4.648 1.640.0 3.45 0.35 178 4.471 (余 市) 1.800 " 2.15~5.22 97 3.779 1.107.0 3.40 0.29 310 3.469 橡 任 1.487 " 1.22~3.31 69 4.648 1.640.0 3.45 0.35 178 4.471		(茶路	2 5 0	"	4. 1 5~5. 1	2 7	1,0 4 0	3 3 2.8	3.50	0.3 2	40	1,0 0 0
(広 尾) 600 " 3. 6~5.10 71 5,164 1,497.0 2.80 0.29 4 5,160 勝本年度 31.100 " 2. 1~5.15 135.545 48,758.6 0.36 4.149 131,396 前年度 33.400 " 2. 1~5.31 170.055 59.615.5 0.35 5.112 164.943 徳志別 3.5.64 乾 2. 1~5.10 99 6,650 2.194.5 3.50 0.33 50 6.600 天 敬 登 960 " 2.20~5.12 82 3.910 1,273.2 3.57 0.33 40 3.870 啞 別 2.350 " 2. 1~5.10 99 4.140 1,449.0 3.40 0.35 4440 3.700 中 別 400 " 2. 1~4.30 89 6,300 1,890.0 3.50 0.30 1,900 4.400 天 塩 235 " 2. 1~5.20 109 2.200 758.0 3.55 0.34 70 2,130 (信 砂) 540 " 5.20~6.20 32 6,820 2.455.2 3.14 0.36 820 6,000 (増 毛) 234 " 4. 5~6. 4 30 1,965 491.3 2.93 0.25 115 1.850 事年度 8.283 " 2. 1~6.20 31.985 10511.2 0.33 3.435 28,550 前年度 5,663 " 1.21~6.15 15.998 5.259.8 0.33 457 15,541 千 战 2.657 乾 1.22~4.20 89 9.060 2.579.8 3.40 0.29 2.85 8,775 并 龄 内 1.160 " 2. 6~3.25 48 6,051 1,815.3 2.70 0.30 1,147 4.904 燉 生 1,487 " 1.22~3.31 69 4,648 1,640.0 3.45 0.35 178 4.471 (余 市) 1,800 " 2.15~5.22 97 3,779 1,107.0 3.40 0.29 310 3,469 成 失 国) 450 " 4.20~5.28 39 775 232.5 3.50 0.30 44 3,365		(音 別	5 5 0	"	4.10~5.1	32	2,5 8 0	8 5 1.0	3.4 0	0.33	8 0	2,500
勝 本年度 31.100 " 2. 1~5.15		(厚内	400	"	4. 4~4.2	2 4	1,500	5 4 2.9	3.60	0.3 6	100	1,400
前年度 33,400 " 2. 1~5.31		(広 尾	600	"	3. 6~5.1	7 1	5,164	1,4 9 7.0	2.80	0.2 9	4	5,1 6 0
徳志別 3.5.64 乾 2. 1~5.10 99 6.650 2.194.5 3.50 0.33 50 6.600 聚 登 960 " 2.20~5.12 82 3.910 1.273.2 3.57 0.33 40 3.870 頓 別 2.350 " 2. 1~5.10 99 4.140 1.449.0 3.40 0.35 440 3.700 中 川 400 " 2. 1~4.30 89 6.300 1.890.0 3.50 0.30 1.900 4.400 天 塩 235 " 2. 1~5.20 109 2.200 758.0 3.55 0.34 70 2.130 (信 砂) 540 " 5.20~6.20 32 6.820 2.455.2 3.14 0.36 820 6.000 (増 毛) 234 " 4. 5~6. 4 30 1.965 491.3 2.93 0.25 115 1.850 塩 本年度 8.283 " 2. 1~6.20 31.985 10511.2 0.33 3.435 28.550 前年度 5.663 " 1.21~6.15 15.998 5.259.8 0.33 457 15.541 干 成 2.657 乾 1.22~4.20 89 9.060 2.579.8 3.40 0.29 2.85 8.775 千 龄 内 1.160 " 2. 6~3.25 48 6.051 1.815.3 2.70 0.30 1.147 4.904 敷 生 1.487 " 1.22~3.31 69 4.648 1.640.0 3.45 0.35 178 4.471 (余 市) 1.800 " 2.15~5.22 97 3.779 1.107.0 3.40 0.29 310 3.469 歳 (美 国) 450 " 4.20~5.28 39 775 232.5 3.50 0.30 30 745 (元浦河) 500 " 2.13~4.16 63 3.409 1.012.7 2.00 0.30 44 3.365	勝	本年度	3 1,1 0 0	"	2. 1~5.1	5	1 3 5, 5 4 5	4 8,7 5 8.6		0.3 6	4.1 4 9	13 1,3 9 6
天 歌 登 960 " 2.20~5.12 82 3,910 1,273.2 3.57 0.33 40 3.870 頓 別 2.350 " 2.1~5.10 99 4.140 1,449.0 3.40 0.35 440 3.700 中 川 400 " 2.1~4.30 89 6,300 1,890.0 3.50 0.30 1,900 4.400 天 塩 235 " 2.1~5.20 109 2.200 758.0 3.55 0.34 70 2,130 (信 砂) 540 " 5.20~6.20 32 6,820 2,455.2 3.14 0.36 820 6,000 (増 毛) 234 " 4.5~6.4 30 1,965 491.3 2.93 0.25 115 1.850 塩 本年度 8,283 " 2.1~6.20 31.985 10511.2 0.33 3,435 28,550 前年度 5,663 " 1.21~6.15 15.998 5,259.8 0.33 457 15,541 千 校 2.657 乾 1.22~4.20 89 9,060 2,579.8 3.40 0.29 2.85 8,775 并 鹶 内 1,160 " 2.6~3.25 48 6,051 1,815.3 2.70 0.30 1,147 4.904 敷 生 1,487 " 1.22~3.31 69 4.648 1.640.0 3,45 0.35 178 4.471 (余 市) 1,800 " 2.15~5.22 97 3,779 1,107.0 3,40 0.29 310 3,469 酸 (美 國) 450 " 4.20~5.28 39 775 232.5 3,50 0.30 30 745 (元浦河) 500 " 2.13~4.16 63 3,409 1,012.7 2.00 0.30 44 3,365		前年度	3 3,4 0 0	"	2. 1~5.3	L ₂	1 7 0, 0 5 5	5 9, 6 1 5. 5		0.35	5,1 1 2	1 6 4,9 4 3
順 別 2.3 50		徳志別	3.5 6 4	乾	2. 1~5.10	99	6,650	2,1 9 4.5	3.5 0	0.33	5 0	6,600
中川 400 " 2. 1~4.30 89 6,300 1,890.0 3.50 0.30 1,900 4,400 天塩 235 " 2. 1~5.20 109 2,200 758.0 3.55 0.34 70 2,130 (信砂) 540 " 5.20~6.20 32 6,820 2,455.2 3.14 0.36 820 6,000 (增毛) 234 " 4. 5~6. 4 30 1,965 491.3 2.93 0.25 115 1,850 本年度 8.283 " 2. 1~6.20 31,985 10511.2 0.33 3,435 28,550 前年度 5,663 " 1.21~6.15 15.998 5.259.8 0.33 457 15,541 千 歳 2,657 乾 1.22~4.20 89 9,060 2,579.8 3.40 0.29 285 8,775 静 内 1,160 " 2. 6~3.25 48 6,051 1,815.3 2.70 0.30 1,147 4,904 敷 生 1,487 " 1.22~3.31 69 4,648 1,640.0 3,45 0.35 178 4,471 (余 市) 1,800 " 2.15~5.22 97 3,779 1,107.0 3,40 0.29 310 3,469 碳 (美 国) 450 " 4.20~5.28 39 775 232.5 3,50 0.30 30 745 (元浦河) 500 " 2.13~4.16 63 3,409 1,012.7 2.00 0.30 44 3,365	天	歌登	9 6 0	"	2.20~5.12	8 2	3,910	1,273.2	3.5 7	0.33	4 0	3,870
天 塩 235 " 2. 1~5.20 109 2.200 7580 3.55 0.34 70 2.130 (信 砂) 540 " 5.20~6.20 32 6.820 2.455.2 3.14 0.36 820 6.000 (増 毛) 234 " 4. 5~6. 4 30 1.965 491.3 2.93 0.25 115 1.850 塩 本年度 8.283 " 2. 1~6.20 31.985 10511.2 0.33 3.435 28,550 前年度 5.663 " 1.21~6.15 15.998 5.259.8 0.33 457 15,541 千 歳 2.657 乾 1.22~4.20 89 9.060 2.579.8 3.40 0.29 2.85 8,775 并 静 内 1.160 " 2. 6~3.25 48 6,051 1.815.3 2.70 0.30 1.147 4.904 敷 生 1.487 " 1.22~3.31 69 4.648 1.640.0 3.45 0.35 178 4.471 (余 市) 1.800 " 2.15~5.22 97 3,779 1.107.0 3.40 0.29 310 3,469 歳 (美 国) 450 " 4.20~5.28 39 775 232.5 3.50 0.30 30 745 (元浦河) 500 " 2.13~4.16 63 3,409 1.012.7 2.00 0.30 44 3,365	1	頓別	2,3 5 0	"	2. 1~5.10	9 9	4.1 4 0	1,449.0	3.4 0	0.3 5	440	3,700
(信 砂) 540 " 5.20~6.20 32 6.820 2.455.2 3.14 0.36 820 6,000 (増 毛) 234 " 4.5~6.4 30 1,965 491.3 2.93 0.25 115 1.850 塩 本年度 8.283 " 2.1~6.20 31.985 10511.2 0.33 3.435 28,550 前年度 5,663 " 1.21~6.15 15.998 5.259.8 0.33 457 15,541 千 歳 2.657 乾 1.22~4.20 89 9,060 2.579.8 3.40 0.29 2.85 8,775 并 静 内 1.160 " 2.6~3.25 48 6,051 1.815.3 2.70 0.30 1.147 4.904 敷 生 1.487 " 1.22~3.31 69 4.648 1.640.0 3.45 0.35 178 4.471 (余 市) 1.800 " 2.15~5.22 97 3,779 1.107.0 3.40 0.29 310 3.469 歳 (美 国) 450 " 4.20~5.28 39 775 232.5 3.50 0.30 30 745 (元浦河) 500 " 2.13~4.16 63 3,409 1.012.7 2.00 0.30 44 3,365		中川	4 0 0	"	2. 1~4.30	8 9	6,3 0 0	1,890.0	3.50	0.30	1,900	4,400
(増 毛) 234 " 4.5~6.4 30 1,965 491.3 2.93 0.25 115 1.850 本年度 8.283 " 2.1~6.20 31.985 10511.2 0.33 3.435 28,550 前年度 5,663 " 1.21~6.15 15.998 5.259.8 0.33 457 15,541 千 歳 2.657 乾 1.22~4.20 89 9,060 2.579.8 3.40 0.29 2.85 8,775 静 内 1,160 " 2.6~3.25 48 6,051 1,815.3 2.70 0.30 1,147 4.904 敷 生 1,487 " 1.22~3.31 69 4.648 1.640.0 3.45 0.35 178 4.471 (余 市) 1,800 " 2.15~5.22 97 3,779 1.107.0 3.40 0.29 310 3,469 成 (美 国) 450 " 4.20~5.28 39 775 232.5 3.50 0.30 30 745 (元浦河) 500 " 2.13~4.16 63 3,409 1,012.7 2.00 0.30 44 3,365		天 塩	2 3 5	"	2. 1~5.20	109	2,200	7 5 8.0	3.5 5	0.34	7 0	2,130
塩 本年度 8.2 83 " 2. 1~6.20 31.9 85 10511.2 0.33 3.435 28.550 前年度 5,6 63 " 1.21~6.15 15.9 98 5.2 5 9.8 0.33 45 7 15.5 41 千 歳 2.6 5 7 乾 1.22~4.20 89 9.0 60 2.5 7 9.8 3.40 0.2 9 2 8 5 8,7 7 5 静 内 1.1 60 " 2. 6~3.2 5 48 6.0 5 1 1,8 1 5.3 2.7 0 0.3 0 1,1 4 7 4.9 0 4 敷 生 1.4 8 7 " 1.2 2~3.3 1 6 9 4.6 4 8 1.6 4 0.0 3.4 5 0.3 5 1 7 8 4.4 7 1 (余 市) 1.8 0 0 " 2.1 5~5.2 2 9 7 3,7 7 9 1.1 0 7.0 3.4 0 0.2 9 3 1 0 3,4 6 9 歳 (美 国) 4 5 0 " 4.2 0~5.2 8 3 9 7 7 5 2 3 2.5 3.5 0 0.3 0 3 0 7 4 5 (元浦河) 5 0 0 " 2.1 3~4.1 6 6 3 3,4 0 9 1,0 1 2.7 2.0 0 0.3 0 4 4 3,3 6 5		(信 砂	5 4 0	"	5.20~6.20	3 2	6,820	2,4 5 5.2	3.1 4	0.36	820	6,000
前年度 5.6 6 3 " 1.2 1~6.1 5 1 5.9 9 8 5.2 5 9 .8 0.3 3 4 5 7 1 5.5 4 1 千 歳 2.6 5 7 乾 1.2 2~4.2 0 8 9 9.0 6 0 2.5 7 9 .8 3.4 0 0.2 9 2 8 5 8,7 7 5 普 內 1,1 6 0 " 2.6~3.2 5 4 8 6,0 5 1 1,8 1 5 .3 2.7 0 0.3 0 1,1 4 7 4.9 0 4 敷 生 1,4 8 7 " 1.2 2~3.3 1 6 9 4.6 4 8 1.6 4 0.0 3.4 5 0.3 5 1 7 8 4.4 7 1 (余 市) 1.8 0 0 " 2.1 5~5.2 2 9 7 3,7 7 9 1,1 0 7 .0 3.4 0 0.2 9 3 1 0 3,4 6 9 蔵 (美 国) 4 5 0 " 4.2 0~5.2 8 3 9 7 7 5 2 3 2 5 3 5 0 0.3 0 3 0 7 4 5 (元浦河) 5 0 0 " 2.1 3~4.1 6 6 3 3,4 0 9 1,0 1 2 7 2.0 0 0.3 0 4 4 3,3 6 5	lder:	(增 毛	2 3 4	"	4. 5~6.	4 30	1,965	4 9 1.3	2.93	0.25	115	1,850
千 歳 2,657 乾 1.22~4.20 89 9,060 2.579.8 3.40 0.29 285 8,775 静 内 1.160 " 2.6~3.25 48 6,051 1.815.3 2.70 0.30 1.147 4.904 敷 生 1.487 " 1.22~3.31 69 4.648 1.640.0 3.45 0.35 178 4.471 (余 市) 1.800 " 2.15~5.22 97 3,779 1.107.0 3.40 0.29 310 3,469 蔵 (美 国) 450 " 4.20~5.28 39 775 232.5 3.50 0.30 30 745 (元浦河) 500 " 2.13~4.16 63 3,409 1.012.7 2.00 0.30 44 3,365	温			"							3,435	
千 静 内 1,160 " 2.6~3.25 48 6,051 1,815.3 2.70 0.30 1,147 4.904 敷 生 1,487 " 1.22~3.31 69 4.648 1.640.0 3.45 0.35 178 4.471 (余 市) 1,800 " 2.15~5.22 97 3,779 1.107.0 3.40 0.29 310 3,469 蔵 (美 国) 450 " 4.20~5.28 39 775 232.5 3.50 0.30 30 745 (元浦河) 500 " 2.13~4.16 63 3,409 1,012.7 2.00 0.30 44 3,365		前年度	5,6 6 3	"	1.21~6.1	5	1 5,9 9 8	5,2 5 9.8		0.33	457	1 5,5 4 1
數 生 1.487 " 1.22~3.31 69 4.648 1.640.0 3.45 0.35 178 4.471 (余 市) 1.800 " 2.15~5.22 97 3,779 1.107.0 3.40 0.29 310 3,469 成 (美 国) 450 " 4.20~5.28 39 775 232.5 3.50 0.30 30 745 (元浦河) 500 " 2.13~4.16 63 3,409 1,012.7 2.00 0.30 44 3,365		干战	2,6 5 7	乾	1.22~4.2	8 9	9,0 6 0	2,5 7 9.8	3.40	0.29	285	8,775
(余 市) 1.800 " 2.15~5.22 97 3,779 1.107.0 3.40 0.29 310 3,469 蔵 (美 国) 450 " 4.20~5.28 39 775 232.5 3.50 0.30 30 745 (元浦河) 500 " 2.13~4.16 63 3,409 1,012.7 2.00 0.30 44 3,365	1	静大	1,1 6 0	"	2. 6~3.2	5 48	6,0 5 1	1,815.3	2.70	0.30	1,147	4.904
蔵 (美 国) 450 " 4.20~5.28 39 775 232.5 3.50 0.30 30 745 (元浦河) 500 " 2.13~4.16 63 3,409 1,012.7 2.00 0.30 44 3,365		敷生	1,487	"	1.22~3.3	6 9	4,6 4 8	1,6 4 0.0	3.45	0.35	178	4,471
(元浦河) 500 " 2.13~4.16 63 3,409 1,012.7 2.00 0.30 44 3,365		(余 市	1.800	"	2.15~5.2	9 7	3,7 7 9	1,1 0 7.0	3.40	0.29	310	3,469
	蔵	(美国	4 5 0	"	4.20~5.2	3 9	7 7 5	2 3 2.5	3.50	0.30	3 0	7 4 5
		(元浦河	500	"	2.13~4.1	6 63	3,409	1,0 1 2.7	2.0 0	0.30	4 4	3,3 6 5
-166-				ě,		_	-1 6 6—					

流	量	放流	魚体		増	水	温 -				飼育	
	重量	体長	体重	歩留	重比	低~高	平均	PH	DO	水量	面積	備考
	Kg 4 0, 6 6 2.0	cm 5.5 8	9 1.62	% 9 9.2	4.0 5	3.0~1 2.3	% 8.5	6.8	PPM	10,000	m² 3,2 2 2	
	47,402.0	5.94	1.43	9 3.4	3.5 7	4.2~ 9.0	6.6	6.8		8,0 0 0	5,2 9 7	
	1 1,4 0 0.0	5.10	1.1 4	96.3	3.17	1.1~ 8.4	3.4	6.9		1,900	2,300	
	5,3 5 6.0	4.50	1.0 0	9 9.6	2.5 6	5.0~ 7.9	6.9	6.6	1 2,0	2.4 5 0	3 4 2	
	4 5 0.0	4.8 0	0.4 5	9 5. 5	1.41	2.5~ 4.0	3.0	6.8	9.2	400	288	,
	1,4 7 5.0	5.0 0	0.59	9 6.8	1.79	5.2~ 7.4	6.0	6.8	8.6	1,100	200	
	5 4 6.0	3.80	0.3 9	9 2.8	1.0 8	0.0~1 0.0	3.9	7.6		600	300	
	6,1 9 2.0	5.0 0	1.20	9 9.9	4.1 4	5.5~1 1,5	8.5	6.8	1 1.5	4.0 0 0	7 4 6	
	1 5 1, 5 8 9.0		1.1 5	9 6.6	3.1 9	0.0~1 2.3						
	2 0 2,3 7 9.3		1.2 3	9 7.0	3.49	3.3~1 3.8						
	9,636.0	5.83	1.4 6	9 9.2	4.4 2	4.5~ 7.0	5.9			1,500	2 5 9	
	2,6 7 0.0	4.3 0	0.69	9 9.0	2.0 9	2.4~ 5.8	4.4	5.8		1,100	3 5 3	
	6,1 4 2.0	6.20	1.6 6	8 9.4	4.74	5.8~ 9.0	7.3			800	3 4 8	
	3,8 2 8.0	4.70	0.8 7	6 9.8	2.90	3.5~ 6.4	4.9	7.4	9.2	200	522	
	9 2 1.6	3.8 9	0.43	9 6.8	1.2 6	2.5~ 6.0	6.5	6.5	1 1.0		3 3 2	
	4.92 0.0	3.71	0.8 2	8 8.0	2.28	5.2~1 0.5	7.6	7.1		750	850	
	6 4 7.5	3.3 9	0.3 5	9 4.1	1.40	2.0~ 8.2	5.9				2 1 5	
	2 8,7 6 5.1		1.0 1	8 9.3	3.0 6	2.0~1 0.5						
	22,679.1		1.4 6	97.1	4.44	3.5~ 8.8	. 4					
	5,3 1 1.2	4.8 2	0.60	9 6.9	2.0 7	6.5~ 8.7	7.4	6.7	5.4	2,8 0 0	792	
	3,2 3 2.8	4.3 0	0.65	8 1.0	2.17	7.8~ 9.0	8.4			1,200	483	
	5,3 9 0.0	4.8 0	1.2 4	9 6.2	3.54	8.8~ 9.0	8.9			1,500	162	
	2,0 8 5.0	4.50	0.60	9 1.8	2.0 7	3.0~ 9.0	6.0	6.9		1,4 4 0	400	
	5 9 6.0	4.5 0	0.80	9 6.1	2.67	5.5~ 8.6	7.0	6.8	11.53	600	100	
	2,4 8 3.0	4.0 0	0.74	9 8.7	2.4 7	3.0~ 9.0	6.0			4.400	3 3 9	

支	l	餌	料	給	餌	飼育	章 量	浮上	魚体	へい死	放
場	事業場	給餌量	種類	期間	日数	尾 数	重量	体長	体重	尾 数	尾 数
		Kg				千尾	Kg	cm		千尾	干尾
干	本年度	8,0 5 4	乾	1. 2 2~5. 2 8		2 7,7 2 2	8,387.3		0.30	1,994	2 5,7 2 8
歳	前年度	9.3 0 9	"	1.13~5.30		3 6,5 4 5	1 1,832.6		0.32	5,3 7 1	3 1,1 7 4
	八雲	1,585	乾	2.20~5.15	8 5	6,0 0 0	1,860.0	3.40	0.31	2 2 7	5,773
渡	利別	700	"	2. 1~4.20	7 9	2,550	867.0	3.5 0	0.34	5	2,5 4 5
	厚沢部	1,800	"	2. 1~4.27	8 6	2,8 9 5	1,100.0	3.68	0.38	4 5	2,850
島	本年度	4.0 85	"	2. 1~5.15		1 1,4 4 5	3,827.0		0.33	277	1 1,1 6 8
	前年度	3,9 1 0	"	2. 1~5.10		9,877	3,3 2 6.0		0.3 4	703	9,174
	森	1,4 6 3	乾	2.15~4.22		9,117	2,696.9	2.8 0	0.23	2,1 6 7	6,950
森	本年度	1,463	"	2.15~4.22		9,117	2,696.9		0.23	2,167	6,950
	前年度	2,659	"	2. 8~5.24		1 6,9 4 8	5,551.0		0.33	8 5 0	1 6,0 9 8
合	本年度	109,890	乾	1.22~6.20		3 9 0,8 5 1	125,598.8		0.32	1 3,8 8 2	3 7 6,9 6 9
計	前年度	106,111	"	1.13~6.15		4 5 4.7 0 9	152,119.5		0.33	1 9.0 9 4	4 3 5,6 1 5

岁3表	さく	5	ます稚魚飼育成	結

支		誀	料	給		餌	飼	育	Ĩ	量	浮上	魚体	へい死	放
場	事業場	給餌量	種類	期	間	日数	尾	数	重	量	体長	体重	尾数	尾 数
		kg						千尾		Kg	ст	g	干尾	干月
	根 室、	2,4 70	乾	1.19~5	. 2 2	124	1	1,2 9 5	3,1	0.0	3.10	0.24	150	1,1 4 5
根室	浜 中	200	"	3. 1 5~4	. 30	47		399	8	3 4.0	3.10	0.21	10	3 8 9
1	本年度	2,6 7 0	"	1.19~5	. 22		. 1	,694	3,9	9 4.0		0.23	160	1,53
	徳志別	4 4 6	乾	3. 2 1~5	. 2 4	6 4	1	,230	3,0	7.5	2.8 0	0.2 5	130	1,100
天	天塩	かとと 飼	"	2. 1~5	5.10			28		9.8		0.3 5	1 3	1 :
	(信 砂)	1 8 0	"	4. 1~6	3.3 0	9 1		1 2 8		46.1	3.1 4	0.3 6	28	100
1/2	本年度	6 2,6	"	2. 1~6	5.3 0		1	,386	3 (6 3.4		0.2 6	171	1,21
塩	前年度	1 2 0	"	1.21~5	5.30			174		5 3.6		0.31	18	156

流	量				増	水	温				飼育	lette de
	重量	体長	体重	歩留	重比	低~高	平均	PH	DO	水 量	面積	備考
ĺ	Kg 1 9.0 9 8.0	ст	9 0.74	97.8	2.47	3.0~ 9.0	°C		PPM	化/分	:n²	
	2 5,2 1 8.8		0.81	8 5.3	2.5 0	3.0~1 0.0						
	3,9 2 5.0	4.3 7	0.68	9 6.2	2.1 9	5.9~ 8.2	6.9	7.9			5 4 4	
	2,2 7 9.0	4.50	0.89	9 9.8	2.62	3.5∼ 9.2	6.5	7.8		760	214	
	5,7 4 8.0	6.45	2.1 4	9 8.4	5.63	1 1.1 ~1 2.0	11.4			5 3 6	212	
	1 1,9 5 2.0		1.0 7	97.6	3.24	3.5~1 2.0						
	1 1,0 0 1.7	-	1.20	9 2.9	3.5 3	2.0~1 1.8						
	3,1 2 7.5	3.90	0.0 5	7 6.2	1.96	8.2~1 1.0	9.0	6.8		4,500	1,0 0 0	
	3,1 2 7.5	3.90	0.45	7 6.2	1.9 6	8.2~1 1.0	9.0	6.8		4,500	1,000	
	8,0 4 9.0		0.5 0	9 5.0	1.5 2							
	3 5 6,7 3 7.8		0.9 5	9 6.4	2.9 7	1 7.0		,				
	4 4 4.0 0 5.0		1.0 2	9 5.8	3.0 5	1 5.5						

流	量	放流	魚体		增	水	温				飼育	
	重量	体長	体重	歩留	重比	低~高	平均	ЬН	DO	水量	面積	備考
	Kg	ст	g	%		τ	C		PPM	€/s>	m²	
	1.7 1 7.5	4.90	1.50	8 8.4	6.25	5.0~1 0.5	7.0	7.1	1 0.0	800	6 4	
	3 1 1.0	4.10	0.80	9 7.5	3.81	2.5~1 4.0	8.3	6.8		400	5 3	
	2,0 2 8.5		1.3 3	9 0.6	5.78	2.5~1 4.0	1.4.					
	5 6 1.0	4.0 0	0.51	8 9.4	2.0 4	1.2~ 9.0	5.4			300	1 3 0	
	1 0.1		0.67	5 3.6	1.91	2.5~ 6.0	3.5	6.5	1 1.0		1 6 6	
	1 2 0.0	4.41	1.20	7 8.1	3.33	2.2~1 5.0	6.6	7.1		500	60	
	6 9 1.1		0.5 7	8 7.7	2.1 9	1.2~1 5.0						
	3 7 4.4		2.40	8 9.7	7.79	5.5~ 6.7						

_			_											
支		餌	料	給	ì	餌	飼	育	Ť	量	浮上	魚体	へい死	放
場	事業場	給餌量	種類	期	間	日数	尾	数	重	量	体長	体重	尾数	尾 数
		Kg						千尾		hg	ст	g	千尾	干尾
渡	兒 別	1.0 2 0	乾	2,	8~5.20	102	2	2,3 0 0	5	2 9.0	3.4 5	0.23	8 5 0	1,450
,	本年度	1.0 2 0	"	2.	8~5.20		2	2,300	5	2 9.0		0.23	8 5 0	1,450
島	前年度	1.200	"	2.	1~5.26		1	,850	3	7 0.0		0.20	440	1,410
合	本年度	4.3 1 6	"	1.1	9~6.30		5	6,3 8 0	1,2	8 6.4		0.2 4	1,1 8 1	4.1 9 9
計	前年度	7.639	"	8.	1~7.31		2	2,4 6 3	3,4	8 1.0			619	1,5 8 3

オ 4表 からふとます稚魚飼育成	戈績
-------------------------	----

支		餌	料	給		餌	飼	育 量	浮上	魚体	へい死	放
場	事業場	給餌量	種類	期	間	日数	尾 数	重量	体長	体重	尾数	尾 数
		Кд					千尾	Kg	ст	д	干尾	干尾
北	岩尾別	200	乾	3. 1~	3. 3 1	3 1	2,0 0 0	4 0 0.0	2.30	0.20	2 0	1,980
1	斜 里	470	"	2. 1~	3. 2 0	48	2.0 0 0	3 3 8.0	3.20	0.17	3 0	1,970
	湧 別	5 0 0	"	2.12~	5. 5	8 3	969	1 7 4.0	3.20	0.17	9 7	872
	本年度	1,1 7 0	"	2. 1~	5. 5		4.969	912.0		0.18	1 4 7	4,822
見	前年度	2,4 0 0	"	2.11~	5. 5		1 0,7 3 8	2,1 8 2.4		0.20	151	1 0,587
根	浜 中	190	"	3.15~	4.14	3 1	606	1 2 1.0	3.20	0.20	8	598
	本年度	1 9 0	"	3.15~	4.14		606	1 2 1.0		0.20	8	598
室	前年度	3 3 0	"	3. 6~	4.30		2 4 0	5 7. 3		0.2 4	10	230
	徳志別	さけと同一 飼育	乾	2.10~	4.30	7 9	3 8 4	9 9.8		0.26	4	3 8 0
天	頓別	"	"	2. 1~	4.15	7 4	9 1	2 2.8		0.25	1	90
	天 塩	3 4 5	"	2. 1~	5.11	98	1,2 2 0	2 6 8. 4	2.92	0.22	2 0	1,200
	(信 砂)	2 1 0	"	5. 1~	6.10	4 1	826	2 0 6.5		0.25	5 6	770
	(増 幌)	1 4 0	"	4. 5~	5. 2 3	4 8	410	1 1 0.0	2.7 0	0.27	5	405
	(船 泊)	65	"	4.25~	6. 9	4 4	286	7 0.0	2.80	0.2 5	1 6	270
塩	本年度	7 6 0	"	2. 1~	6.10		3,2 1 7	7 7 7.5		0.24	102	3,1 1 5
	前年度	2,4 4 7	"	1.21~	6.10		2 8,0 7 0				1,400	2 6,6 7 0

	量	放流	魚体		増	水		温				飼育	
TEN	重量	体長	体重	歩留	重比	低~	,高	平均	РН	DO	水 量	面積	備考
_	Kg	cm	g	%		-	°C	'C		PPM	€ /5i}	m²	
	971.5	4.24	0.6 7	6 3.0	2.91	3.3~	9.8	5.9	7.4		3,0 0 0	3 3 6	
	9 7 1.5		0.67	6 3.0	2.9 1	3.3~	9.8						
	1,2 4 0.0		0.88	7 6.2	4.40	2.2~	9.6					*	
	3,6 9 1.1		0.87	7 8.0	3.6 2	1.2~1	5.0						
	1,682.4					5.							

流	嵐	放流	魚体		増	水	温				飼育	
	重量	体長	体重	歩留	重比	低~高	平均	PH	DO	水量	面積	備考
	kg	ст	д	%		°C	ъ.		PPM	l/si	m²	
	1,4 0 0.0	3.20	0.70	9 9.0	3.5 0	2.5~ 5.0	3.8	7.2		2,0 0 0	180	
	1,3 8 4.9	4.97	0.70	9 8. 5	4.1 1	7.4~ 8.2	7.8	7.3	1 1.0	2 0,0 0 0	980	
	4 6 0.0	4.5 5	0.53	9 0.0	3.1 1	3.7~ 7.8	5.5	6.6		900	6 0	
	3,2 4 4.9		0.6 7	9 7.0	3.7 2	2.5~ 8.2						
	8,3 4 5.8		0.79	9 8.6	3.8 8	3.0~ 8.4						
	2 9 9.0	3.90	0.50	9 8.7	2.5 0	2.5~1 0.0	6.3	6.8		3 5 0	ふ化槽 2	k14本 k11本
	2 9 9.0		0.50	9 8.7	2.5 0	2.5~1 0.0						
	1 7 1.3		0.74	9 5.8	3.1 2	6.7~ 9.6			-5			
	3 0 7.8	4.42	0.8 1	9 9.0	3.1 1	5.0~ 7.0	5.9			7 5 0	6 4 3	
	7 2.0		0.80	9 8.9	3.2 0							
	5 1 €.0	3.90	0.43	9 8.4	1.9 5	2.5~ 6.0	3.5	6.5	1 1.0		166	
	6 1 6.0	3.6 5	0.80	9 3.2	3.2 0	5.0~ 8.8	6.7	7.1		500	8 7	
	1 1 8.8	3.26	0.29	9 8.8	1.0 7	3.0~1 2.0	6.0			3 5 0	216	
	2 1 6.0	3.0 0	0.80	9 4.4	3.2 0	2.0~1 5.0	7.0			4 5 0	4 2	,
	1,846.6		0.59	9 6.8	2.4 6	2.0~1 5.0						
	7,8 3 9.5		0.29	9 5.0		3.2~1 3.5						

支		餌	料	給		餌	飼	育		量	浮上	魚体	へい死	放
場	事業場	給餌量	種類	朔	間	日数	尾	数	重	量	体長	体重	尾数	尾 数
		Kg						千尾		Кg	СТП	g	千尾	干尾
渡	八雲	7 2 5	乾	2.10~	4.30	80	1,	,698	3	3 9.0	2.90	0.20	3 4	1,662
	本年度	7 2 5	"	2.10~	4.30		1,	,698	3	3 9.0		0.20	3 4	1,662
島	前年度	3 9 0	"	2.14~	4.25		1,	,500	3	4 5.0		0.23	6	1,492
合	本年度	2,8 4 5	"	2. 1~	5. 1 0		1 0	,490	2,1	4 4.5		0.22	191	1 0,1 9 7
計	前年度	5,5 6 7	"	1. 1~	5.10		4 0,	,548					1,5 6 7	3 8,9 8 1

流	1	I.	放流	魚体		增	力	<	温					飼	育		
	重	量	体長	体重	歩留	重比	低	~ 高	平均	РН	DO	水	量	面	積	備	考
	1,3	К <i>д</i> 9 6.0	<i>cm</i> 4.5 0	9 0.8 4	97.9	4.20	5.6~	7.0	6.1	8.0	PPM		l/分 410	1	m² 7 2	2千月試験	毛 空除
-	1,3	9 6.0		0.84	9 7.9	4.20	5.6~	7.0								- 121	21/31
	9	1 1.3		0.61	9 9.6	2.6 5	5.8~	6.8									
F	6,7	8 6.5		0.6 7	97.2	3.3 5	2.0~	1 5.0									
	1 7,2	6 7. 9		0.44	9 6.1		3.0~	1 3.5									

. 3.

才5表 昭和47年度使用餌料成分

品質・形状		乾燥	配合餌料	
乾燥配合餌料	前期給餌用		~ 1.0 mm	
クランブル	後期給餌用	1. O mm	~ 1.5 mm	
成分	粗 蛋 白	4 8.0	~ 54.0%以上	
	租 脂 肪	4. 0	~ 7.0%	
	粗 繊 維	0. 2	~ 1.5%	
	粗 灰 分	1 0.0	~ 1 3.0 %	
** **	水 分	7. 0	~ 1 0.0 %	
配合原料		、混合ミネラル	开粉、血粉、酵母、脱脂ギル、混合ビタミン	分乳、小麦粉、
ビタミン含量	V · A 4.	4 0 0 I U	ナイアジン	4 5 0 mg
(1 169中の含有量)	В	3 0 mg	パントテン酸	2 0 0 1119
	В2	9 0 mg	パラアミン安息香酸	2 0 0 mg
	E	1 8 0 <i>iilg</i>	コリン。	4.0 0 0 mg
	B ₆	3 0 1119	イノシトール	6 0 0 mg
	B ₁₂	0.05 mg	ピチオン	2. 5 mg
	К 3	2 0 mg	葉	1 0 mg
		U I 0 0 C		. e
	C 1,	0 0 0 mg		

-174-

§ 16 昭和47年度調査研究結果

-175-

調査研究項目

1	增殖基礎調 查	1	7 9
,	1. さけ・ます卵の発生生理に関する調査	1	79
	(1) 不受精死卵の出現の原因に関する調査	1	7 9
	2. さけ・ます稚魚の生理・生態に関する調査	1	8 5
	(1) 降海期のさけ・ます稚魚の発育機能に関する調査	1	8 5
	(2) 河川の餌料条件に関する基礎調査	1	8 5
	(3) さくらます稚魚、幼魚の生態調査	. 1	9 4
	(4) さけ・ます稚魚の栄養条件調査	1	9 4
	3. さけ・ます親魚の生理・生態に関する調査	2	0 0
	(1) さけ親魚の利用率向上に関する調査	2	0 0
	(2) 同一系統群の品種改良試験調査	2	1 7
	4. さけ・ます資源の動態ならびに生物統計に関する調査	. 2	19
	(1) さけ・ます稚魚の標識放流試験調査		
	(2) 稚魚期における標識魚の回帰実態調査	2	19
	(3) さけ・ますの生物統計調査	2	21
	5. 環境条件ならびにその保全調査	2	2 5
	(1) 溶存窒素ガスならびに水温の変化が、さけ稚魚の発生に及ぼす影響調査	· 2	2 5
	(2) 釧路川の溶存アルミニウムの魚に対する影響調査	2	3 9
	6. 支笏湖の生物生産に関する調査	· 2	46
	(1) 支笏湖の生物生産に関する調査	. 2	46
	□ 沿岸水域調査	2	47
	1 公岸水域におけるさけ・すす稚魚の生能に関する調査	. 2	47

1 増殖基礎調査

1. さけ・ます卵の発生、生理に関する調査

(1) 不受精死卵の出現の原因に関する調査

さけ卵のふ化過程において、しばしば多量の不受精、発生停止を含む減耗卵が見られ、それら 原因について色々調査が行なわれてきた。前年度(昭和 4 6 年度)の湧別川における冬期間に特 に多く減耗卵が出ている最盛期(12月)、終期(1月)卵の試験の結果、各旬によりそれ程受 精率に極端な相違がなく、対照の事業卵においても後期採卵のものが悪いことは認められなかっ た。

このため、今年度は実際に事業的に実施している一連の採卵、受精、運搬などの操作方法をチェックして、事業実施上可能な方法で減耗卵を少なくすることを主眼とした比較平行試験の他に、 支場と共同で卵膜硬化試験を実施したのでその概要をのべる。

試験方法

試験実施に当り、それぞれの段階の取扱い方法を変えることによる効果を確認するため、同一条件の親魚を使用し、従来の事業的方法を経た卵と、取扱いを変えた試験方法を経た卵を比較した。受精後の死卵は収容翌日に死卵数を計数して傾向を見る一方、減耗、受精割合は受精後24時間固定による卵標本で検討し、発眼時までの死卵数の計数は各試験区一枚ずつのふ化盆を選定し、代表卵によって行なった。

標本卵及び発眼時における死卵に採用した語は下記のような意味で使った。

不受精卵:標本卵の内, 完全に胚盤が認められない卵

非分割卵:胚盤が形成されているが、 卵分割をしていない卵

減 耗 卵:不受精, 発生停止その他の原因による死卵を包合している

受 精 卵:発生が進行し、卵分割している生き残り卵

淘汰前死卵: 発眼期, 淘汰直前に採取した死卵

淘汰死卵:淘汰により白濁した死卵

今回の試験には親魚(雌雄を含め)の魚体はフォーク・レングスで $51.6 \sim 74.0 \, \mathrm{cm}$ 体重 $1.20 \sim 3.75 \, \mathrm{Kg}$ の範囲で、卵経は $5.0 \sim 7.5 \, \mathrm{mm}$ の範囲のものを使用した。魚体温も前年と変りなく、撲殺直後、採卵室に運ばれた魚体では、水温より $1\, \mathrm{C}$ 位高かった。

結 果

o 受精卵運搬時の圧力度合による比較試験

事業的に採卵, 受精, 吸水洗滌した卵を2個の運搬箱に詰め,2通りの圧力をかけて蓋をした。なお対照区として同日に採卵, 運搬された多くの運搬箱から開蓋前に1箱をとり比較した。加圧度合を正確に出したとしても実際に事業的に多量に取扱う場合, 応用の面で色々と困難性が伴なうので, まず予備的に圧力の差による相違がどれ位あるかを知るため, 大まかに次の3段階とした。

高圧:卵詰後、蓋の上に人が乗り、さらに締め機を使って蓋をする方法。

-179-

この方法は一昨年まで当採卵場で採用していた方法。

無圧:蓋の間に余裕をもって卵を盛り、中蓋と水で湿らせた毛布を乗せただけの方法。 事業圧(対照区):卵の動揺を防ぐ程度に軽く押しつけて蓋を締める方法で、今年度採用して いる方法。

収容翌日における各盆(約3.500粒盛り)の死卵数は次のとおりである。

ふ化盆の番号	高	圧	無	圧	事 業 圧
1		515粒		267 粒	211 粒
2		563		305	210
3		4 5 5		248	2 4 7
4		3 9 7		252	260
5		4 7 5		240	2 5 1
m†	- 2,	0 4 5	1,	312	1,179

高圧をのぞき、死卵数は各試験ともそれ程大きな差が認められない。しかし高圧は各盆でバラ ツキがあるが、他試験の死卵数の1.5~2.7倍の範囲で合計で約2倍弱であった。

受精 2 4 時間後の標本卵の受精率

区		分	时	效	減 耗 (非分割	率)	受	精	率
高		圧	1 2 0	粒	3 5.0	%	1	6 5.0	%
無		圧	112		4 1.1			5 8.9	
事	業	圧	9 5		4 4.2			5 5.8	

標本卵の受精率は全般的に悪く、この時点では事業圧が低く高圧が最も高い。次に、卵の胚盤 の陥没度合は高圧が最も高く、40.8%に達していた。なお陥没胚盤でも卵分割が進行している が、さらに発生が進む段階で発生停止或は奇形個体の出現につながるかについては明らかでない。 ふ化用水 9.5℃で受精卵が 8~16分割球まで発生が進行しているにかかわらず,24時間後 も分割が起らない非分割卵の, 詳細は組織観察によらなければならないが、 おそらく不受精卵と して減耗卵に含められるものと考える。

発眼時点までの死卵数の内訳

	項	目		死	èя	数	(%)		
			収容時卵数	다 사람들의 IT 모든 당시	発即	艮 時	## n	発眼卵数(%)	
X	分	分		収容翌日死卵	淘汰前死卵	淘汰死卵	<u> </u>		
高		圧	4,118	455(11.0)	550(134)	1,227(29.8)	2,232(54.2)	1,886 (45.8)	
無		圧	3,5 9 6	248(6.9)	1,080(30.0)	437(122)	1,765(49.1)	1,831 (50.9)	
事	業	圧	3,1 3 9	211(6.7)	382(122)	1,031(328)	1,624(51.7)	1,515(48.3)	

()内の%は収容時卵数に対する比率

発眼率は45.8~50.9%と顕著な差がみられず、この範囲の圧変化では発生停止に大きく影 響しているとは考えられない。しかし、死卵の出現時期を見た場合、高圧では採卵翌日までの死 卵が他に比較して多く、無圧では淘汰前死卵が多く出現し、淘汰による死卵数が少なかった。 受精24時間後の標本卵の受精率と比較してみると発眼までに出現した死卵のうち約80%は 非分割卵であったといえる。

なお、当採卵場で採卵された卵にみられる粘着性は圧の相違にかかわりなくみられた。 o媒精方法の相違による比較試験

1) 5尾混合精子

事業的に親魚8尾ずつ採卵した2盆の卵を混合した後再び均等に2分し、一方をあらか じめ5尾から採精した混合精子で、他方を事業的に2尾で媒精したところ、収容翌日死卵 数には差がなかった。また卵分割調査でも受精率90%以上の好成績であったが、5尾混 合精子の方が次表のように良い受精率であった。

受精 2 4 時間後の標本卵の受精率

区分	卵 数	不受精	非分割	減耗率	受 精 率
5 尾混合精子	130 粒	- %	1.8 %	1.8 %	9 8.2 %
2尾(事業的) 120	0.8	6.6	7.4	9 2.6

また、発眼時点では両者にほとんど差が認められず、良好な成績を示した。 発眼時点までの死卵数の内訳

5	項目		死	明	1	V.		
	, H	収容時卵数	収容翌日死卵	発 眼 時		計	発眼卵数%	
	区分		収容翌日死那	淘汰前死卵	淘汰死卵	= [
	5尾混合精子	3,583	53(1.5)	125(3.5)	22(0.6)	200(5.6)	3,383(944)	
	2尾(事業的)	3,5 0 6	58(1.7)	142(41)	20(0.6)	220(6.3)	3,286 (93.7)	

()内は収容時卵数に対する比率

2) 10尾混合精子, 圧力

上記1)と同様な方法で卵質を均等にして、両盆に10尾混合精子をもって媒精し、 吸水, 洗滌した後, 運搬時に前述試験の高圧と事業圧(軽圧)を加えて運搬した。収容翌 日の死卵数は前述の圧力試験同様。高圧の方が軽圧より多く、約1.74倍であった。

収容翌日の死卵数

(各盆約3,500粒盛り)

ふ化盆番号	高 圧	軽 圧
1	97粒	50粒
2	8 6	4 4
3	7 7	4 2
4	4 5	4 9
5	8 3	3.8
ät	388	223

受精24時間後の標本卵の受精率

K	分	卵 数	減 耗 卵 (非分割)	受精率
高	圧	116粒	0.9 %	9 9.1 %
軽	圧	1 3 0	0.8	9 9.2

発眼時点までの死卵数の内訳

	項目	収容時卵数	死	母母		数	(%)	
			विवर्तन्त्रच स्टब्स	発	眼	時	_	at:	発眼卵数(%)
区	分		収容翌日死卵	淘汰前死卵	淘汰死卵			គឺរ	
高	圧	3,512	97(28)	184(5.2)		3(0.1)		284(8.1)	3,228 (91.9)
軽	圧	3,679	50(14)	148(40)		2(0.1)		200(54)	3,479(94.6)

()内は収容時卵数に対する比率

両者共淘汰による死卵数が極めて少なく、ほぼ完全な受精をしたと考えてよい。

1), 2)試験及び前年度試験卵の結果より、混合精子による媒精が良好なことを示している。

o 媒精水,吸水,洗滌水の相違による比較試験

当採卵場において採卵、媒精された卵を運搬し、ふ化室で開蓋時に卵が粘着性をもち、地状現象がみられ、卵管理上少なからず障害になっているものと思われる。この卵膜の粘着性の原因が、 当採卵場で動力揚水している水にあることが考えられたため、採卵場で比較的手に入り易い水を 用いた卵膜の粘着度及び卵の発生状態を検討した。

なお、試験において 1)採卵場水とは採卵場で動力揚水している地下水であり、 2)河川水は捕獲装置を設置している地点で採水した湧別川の水 3) ふ化用水は湧別事業場第 3 ふ化室のふ 化用水である。河川水はこの時期にすでに $1 \sim 2$ でまで低下していたので試験には水温を 6 で \sim 8 でにして実施した。

この試験卵は事業的に採卵したものを抽出しておこなったもので、各試験の卵質は相互に違っている。

収容翌日の死卵数は "採卵場水 " が多く, " ふ化用水 " が少なかったが、全体として極だった 相違はみられなかった。

収容翌日の死卵数(各盆約3,500粒盛り)

媒精	河川水	ふ化用水	½:河川水 ½:採卵場水	採卵場水	採卵場水
ふ化盆番号源	河川水	ふ化用水	河川水	ふ化用水	採卵場水
, 1	154	1 4 5	2 3 5	178	211
2	190	., 164	210	168	210
3	211	142	2 3 5	191	2 4 7
4	118	155	216	210	260
5	198	172	206	140	2 5 1
計	871	778	1,102	887	1,179

註 "ふ化用水:媒精,採卵場水:吸水"及び河川水:媒精,吸水(Ⅱ)は別途,湧別事業場で実施したので上表にはのせていない。

受精 2 4 時間後の標本卵の受精率

	使	用	水	卵 数	不受精	非分割	減耗率	受精率
媒	精	水	吸水・洗滌水	4h 20	小文相	升 刀 刮	(成本七 2年3	又相华
12河川水+	- ½採卵	場水	河川水	1 0 4	- %	1 0.6 %	1 0.6 %	8 9.4 %
採卵	場	水"	ふ化用水	119	-	3 2.8	3 2.8	6 7.2
岛 化	用	水	採卵場水	1 2 1	-	3 3.9	3 3.9	6 6.1
	採	国阳	場水	9 5	-	4 4.2	4 4.2	5 5.8
	ئ	化	用水	105	-	2.9	2.9	9 7.1
	河	JI	水 (I)	1 2 2	1.6	7.4	9.0	9 1.0
	ýnj)[水 ([[)	1 2 8	-	4.7	4.7	9 5.3

上表より媒精水あるいは吸水、洗滌水のいずれかに採卵場水を使用した卵の受精率は、ふ化用 水、あるいは河川水だけを使用した場合よりすべて低く、採卵場水を使用する割合が多くなるに つれて受精率が低下する傾向がみられた。

また採卵場水を使用した試験卵には粘着性が残るが、ふ化用水だけを使用したものは粘着性がなく、吸水も約30分位で完全になり、卵膜に引力性を持った。粘着度は、ふ化用水<河川水<採卵場水・媒精・ふ化用水・吸水<%河川水+%採卵場・媒精・河川水吸水=採卵場水の順に高くなる傾向がうかがわれた。

発眼時点までの死卵数の内訳

frits	用水	- Administration of Republican	死	到	数 (%)		
使		収容時卵数	drawiesty en zu de	発	版 時	~1	発眼卵数	
媒精水	吸水,洗滌水		収容翌日死卵	淘汰前死卵	淘汰死卵	計		
5河川水 5採那場水	河川水	3.376	235(70)	418(124)	17(0.5)	670(19.8)	2,706(80.2)	
採卵場水	ふ化用水	3,677	168(4.6)	224 (6.1)	890(242)	1,282(34.9)	2,395(65.1)	
ふ化用水	採卵場水	3,807	372(98)	385(10.1)	1,558(40.9)	2315(60.8)	1,492(392)	
採り	17 場水	3,1 3 9	211(6.7)	382(122)	1,031(32.8)	1,624(51.7)	1,515(48.3)	
\$ 1	比 用 水	3,1 2 0	145(4.6)	88(- 28)	116(3.7)	349(11.2)	2,771(88.8)	
河丿	川水(I) .	3,106	154(5.0)	354(11.4)	27(0.9)	535(17.2)	2,571(828)	
河丿	□水(Ⅱ)	3,3 7 8	119(3.5)	64(1.9)	90(22.7)	273(8.1)	3,105(91.9)	

()内は収容時卵数に対する比率

発眼時点での発眼率をみても受精24時間後の標本の受精率と同様の傾向がみられた。

発眼率の低い試験区は受精 2 4 時間後の受精率が低く、淘汰による死卵数が多いことから、不受精卵の混入により全体の成績を下げていると考えられるが、不受精卵の発生と用水の関連については、さらに試験例を重ねると共に用水に対する色々な角度からの検討が必要とされる。

2. さけ・ます椎魚の生理、生態に関する調査

(1) 降海期のさけ・ます稚魚の発育機能に関する調査

さけ・ます稚魚の発育機能について昨年度に引続いて実験を行なった。

実験は断餌による体重減少の度合を測定する方法を用いた。

その結果、放流期の稚魚(体長 $3.6 \sim 4.0$ cm、平均体長 3.8 cm、体重 $0.29 \sim 0.43$ g、平均体重 0.35 g)は静水中で断餌 1 ケ月後には断餌前の体重の $29 \sim 28$ %位の減少のあることが知られた。これに対して成長に伴って体重の減少の度合が少さくなる傾向のあることが示され、平均体長 6.53 cm、平均体重 2.17 g では 23.72 %、平均体長 8.41 cm、平均体重 4.42 g では 18.78 %の減少、また平均体長 9.56 cm、平均体重 6.63 g では 12.07 %減少する結果が得られた。

このように放流期の稚魚の体重の減少が大きいことは、逆に代謝機能が旺盛であることを示し、 生長力が大きいことを、そして時期の推移にともなって代謝機能の低下は生長力の逓減を暗示する。

これらのことから稚魚期 (体長 3.5 ~ 5.0 cm)の餌料の条件がその生残りの度合と密接な関係のあることを裏書する。

(2) 河川の餌料条件に関する基礎調査

稚魚の降海時期における河川の餌料条件を調べるため、各支場 1河川で流下昆虫調査を実施 した。昭和47年春のデーターは別表のとおりである。

昭和47年春の調査はこれまで各河川で行なわれてきた調査結果を参考にして、より精度の高く、応用のきくデーターを得られるように各河川の採集方法を統一して実施した。

各支場で1河川を選定し、旬毎に午後3時~4時の1時間当りの流下昆虫を採集した。

今年度から採集方法を統一したが、サケ・マス稚魚の餌料生物として重要な種類の底生生物及び落下昆虫の流下状況を短時間で把握するためには時間帯、採集場所、採集器具などを検討する必要がある。このため、千歳川において、ユスリカの羽化時期における時間帯毎の流下昆虫量の変動及び流下昆虫の量的、種類別の垂直(層別)分布を明らかにするための生態面からの調査を実施した。

河		Ш		常	됨	JII		
地		点						
年	月	日	4 7.	2. 2 9	4 7.	3. 9	4 7.	3. 2 1
時		刻			1			
天		候						
気	温 (C)						
水	温 (°C)						
	РН							
瀘 适	水	量						
透	視	度						
流下	生物	景	個体数	重量(※19)	N	W (1119)	N	W (194)
	計		6.8	2 7 6.5	3 5	2 9 4.5	7 0	3 4 0
,			4 9	1 1 5	2 0	6 9	6 4	3 0 1.5
双	翅	目		24-36.5 9-40.5 16-38	ユスリカL "ロコ ガガンボ		ユスリカL " P ガガンボ	1 8 - 5 1 4 5 - 2 5 0 1 - 0.5
			4	9.5	. 1	1 7.5		
蜉	蝣	目	マダラカゲロウ ヒラタカゲロウ		マダラカゲロウ	1 - 1 7.5		,
襀	翅	Н		1				
			1 0	1 2 9.5	8	2 0 3.5	5	3 8
毛	翅	目	シマトビケラ	1 0 ~ 1 2 9.5	シマトピケラ	8 - 2 0 3.5	シマトピケラ	5 - 3 8
				1)			,	
陸」	足	虫						
			5	2 2.5	6	4.5	1	0.5
そ	0	他	ミズムシイトミミズ	1 - 1 5 4 - 7.5	ミズムシ ハリガネムシ イトミミズ		ミズムシ 1	- 0.5

		常	į	呂.	Щ		х,
						P	
4 7.	4.10	4 7.	5. 9	4 7	. 5. 2 2	4 7.	6. 5
		4					
					,		
-							
	- V						
N	W (mg)	N	w (mg)	И	W (194)	N	W (N4)
1 4 5	188	207	1 1 7	3	3 1	3 2	1 5.5
1 3 2	1 4 6.5	1 9 7	110	2	0.5	2 6	1 0.5
コスリカL	5 8 - 3 8 6 3 - 8 9.5 1 0 - 1 8 1 - 1		1 2 2 - 7 6 7 5 - 3 4	ユスリカP	2 - 0.5	ユスリカL ″ ₽	1 0 - 2.5 1 6 - 8
1	9.5	7	6.5	1	3 0.5	3	3.5
ヒラタカゲロウ	7 1 – 9.5	コカゲロウ マダラカゲロウ	5 - 6 2 - 0.5	マグラカゲロワ	ウ 1−30.5	コカゲロウ マダラカゲロ	
	7					×	
			7				
2	1 8.5	1	< 0.5				*
シマトビケラ トビケラP	1 - 4.5 1 - 1 4	シマトビケラ	1 -<0.5	To America			
2	4.5					1	0.5
アプA 戦組 A	1 - 3.5 1 - 1					半翅目A	1 - 0.5
8	9	2	0.5			2	1
ミズムシ ミズダニ イトミミズ	1 - 1 6 - 2.5 2 - 5.5		2 - 0.5	1		ミズダニ	1 - 1 1 -<0.5

河川	標	津	JII
地 点	中	標 津 大	橋
年 月 日	4 7. 3. 7	4 7. 3.1 6	4 7. 3.23
時 刻	1 5. 3 0 ~ 1 6. 3 0	1 5.00 ~ 1 6.00	1 5.1 0 ~ 1 6.1 0
天 候	вс	ВС	С
気 温 (℃)	- 1.5	3. 8	5. 5
水 温 (℃)	3. 5	5. 5	8. 0
PН	7. 0	6. 8	6. 9
DO (ppm)	1 2.5 4	1 2.3 6	1 1.5 5
瀘過水量(m°)	1 1 7	1 0 0	1 5 9
透 視 度(cm)	> 3 0	> 3 0	> 3 0
流下生物量	個体数 重量(====================================	N W (mg)	Й М (11194)
<u>\$</u> †	4 5 6 4	8 4 1 2 6.5	43 103
	3 7 5 2	6 2 9 1	2 6 3 1.5
双 翅 目	ユスリカL 33-38 "P 3-12.5 シギアプ 1-1.5	ユスリカL 59-78 # P 3-13	ユスリカL 26-31.5
	3 2.5	8 2.5	7 5 4.5
蜉蝣目	コカゲロウ 2-1.5 トビイロカゲロウ 1-1	ヒラタカゲロウ 4 − 0.5 マダラカゲロウ 2 − 1 トピイロカゲロウ 1 − 1 コカゲロウ 1 − <0.5	マダラカゲロウ 2-53 ヒラタカゲロウ 4-1 コカゲロウ 1-0.5
		6 1 4.5	6 11.5
積 翅 目		オナシカワゲラ 2-1 ミジカオカワゲラ 3-13 ミドリカワゲラ 1-0.5	オナシカワゲラ 3 - 2.5 ミジカオカワゲラ 1 - 3.5 クロカワゲラ 2 - 5.5
	4 8.5	7 18	3 5
毛 翅 目	シマトビケラ 1 - 0.5 ナガレトビケラ 1 - 6.5 エグリトビケラ 1 - 0.5 ヤマトビケラ 1 - 1	<i>エグ</i> リトピケラ 6 − 6 トピケラ₽ 1 − 1 2	エグリトビケラ 2-4 ヤマトビケラ 1-1
-	1 1		í 0.5
陸上昆虫	ユスリカA 1-1		粘管目 1-0.5
	·	1 0.5	
その他		アシナガドロムシ 1-0.5	

	札	内	J	11		ヌッ	プク川
	第	2 大	川林	(s		變	国 橋
4 7.	3. 6	4 7.	7. 3.1 6 4 7. 3.2 7 4 7.1				1.24
1 4.4 0~1 5.4 0		1 4.5 0 -	- 1 5.5 0	1 5.00	~ 1 6.0 0	1 6	. 2 5
							R
_	5. 5	-	5. 5	5. 0			3.0
	2. 7		2.7	5	5. 2		5. 5
	6.8		6.8	. 6	5. 8		6. 5
							8. 0
9	0	1 1	2	2 2 3	5		
						>	3 0
N	W (mg)	N	W (Mg)	N	W (M4)	N	W (mg)
3 0 6	5 2 3	4 3 3	6 6 6.5	8 0 4	1,280.5	3 7	2 7.5
2 7 7	4 4 9	3 4 8	483	658	1,0 0 9.5	3 3	26
" P 8	1 9 5 - 1 6 7 3 1 - 2 8 1.5 1 - 0.5		4 1 - 7 5 0 6 - 4 0 7.5 1 - 0.5	ユスリカL 2 " P 4 ブ ユ ガガンボ	3 4 - 2 1 1 2 4 - 7 9 8.5 2 - 4.5 3 - 1.5	ユスリカレ " P ガガンボ ブ ユ	28-15.5 1-0.5 2-9.5 2-0.5
9	4 2.5	. 7	2.5	7 4	1 4 6.5	3	0.5
マダラカゲロウロカゲロウ	2 - 2 0.5 3 - 2 0 4 - 2	コカゲロウ ヒラタカゲロウ		コカゲロウ ヒラタカゲロウ マダラカゲロウ	40-108.7	コカゲロウ トビイロカゲ	
1 3	2 7.5	7 1	173	4 9	110	1	. 1
クロカワゲラ	1 3 - 2 7.5	クロカワゲラ	71-173	クロカワゲラ ミジカオカワケラ オナシカワゲラ アミメカワゲラ ミドリカワゲラ	39 - 96.5 $2 - 8$ $5 - 3.5$ $1 - 1$ $2 - 1$	オナシカワゲ	7 1-1
3	1.5			2	2. 5		
シマトビケラカクスイトビク	2-1		,	エグリトピケラ	2 - 2.5		
2	1	6	7.5	1 1	5.5		
粘管目積翅目	1 - 0.5 1 - 0.5	粘管目積翅目	2 -<0.5 4 - 7.5	粘 管 目 襀 翅 目	6 - 0.5 5 - 5	,	
2	1.5	1	0.5	1 0	6.5		
ミズダニ	2 - 1.5	ミズダニ	1 - 0.5	ミズダニ ク モ	9 - 6 1 - 0.5		

河		111		-	+.)	勝	11		
地		点	十 勝	大 橋	千代田地	堤(右)	千代田堰	堤(左)	
年	月	B	4 7. 1	1. 2 4	4 7.1	1. 2 4	4 7.1 1.2 4		
時		刻	1 5.	1 5.5 0		1 3.3 5		2 0	
天		候	R		1	R		7	
気	温 (*	2)	2. 8		3.	6	3.	5	
水	温 ()	2)	4.	0	4.	2	3.	6	
	P.H		7. 0		6.	8	7.	1	
D	1qq) O	n)	1 2.4		1 1.	9	1 2.	1	
油层	過水	船							
透礼	見度 (cm)	> 3	0	> 3 0		> 3	0	
施	下生物	景	個体数	重量(mg)	N	W (mg)	N	W (19)	
	計		1 2	4.5	6	1 4.5	3	0.5	
			6	3.5	3	1.5	2	< 0.5	
双	翅	Ħ	ユスリカL "ロ プ ユ ガガンボ	1 - 0.5 1 - 1.5 2 - 0.5 2 - 1	ユスリカL ガガンポ	2 - 0.5 1 - 1	ユスリカレ	2 -< 0.5	
			3	0.5	1	1			
蜉	蝣	目	コカゲロウ ヒメヒラタカゲ	1 - 0.5 ロウ 2 - <0.5	コカゲロウ	1-1	,		
			1	<0.5					
襩	妞	目	ミドリカワゲラ	1 -<0.5					
			1	0.5	2	1 2			
毛	햿	目	シマトビゲラ	1 - 0.5	シマトビケラ トビケラP	1 - 0.5 1 - 1 1.5			
		-		1				1	
ik	上昆	虫							
		_	1	<0.5			1	0.5	
そ	Ø	他	ミズダニ・	1 -<0.5			9 =	1 - 0.5	

1	111			45		r I		
	勝川		于	歳		[]		
	岩橋		支		構			
4 7.1	1.24	4 7. 2.1 7		4 7.	2. 2 5	4 7.	3. 6	
1 1.	4 0	1 5.00 ~	1 6. 0 0	1 5. 0 0	~ 1 6.0 0	1 5. 0 0	~ 1 6.0 0	
(g .	C			O			
1.	9							
3.	0	3. 1		2	. 5		3. 2	
6.	8					,		
1 1.	9				,			
		6 4.4	$m^{\mathfrak s}$	7 5	m^{s}	6 6.6 m*		
2	0						4	
И	W (mg)	N	W (mg)	- N	W (#9)	N	W (mg)	
5	1 4	3 4	7.8.5	3 9	4 8.5	8 6	7 7	
3	0.5	8	1 0	1 2	8	2 1	5 2.5	
	2 -< 0.5 1 - 0.5	ユスリカL	8 - 1 0		1 1 - 7.5 1 - 6.5	ユスリカL " P	8 - 8.5 1 3 - 4 4	
				- -		×		
		9	6 0	6	1 1	4	1 0.5	
		マダラカゲロウ	9 - 6 0	マダラカゲロウ ヒラタカゲロウ		マダラカゲロリ	√ 4 − 1 0.5	
	,	ĺ	0.5	1	5			
		オナシカワゲラ	1 - 0.5	ミドリカワグラ	1 - 5			
1	0.5	4	2.5	1	1.5	6	٠ 2	
ヤマトビケラ	1 - 0.5	シマトピケラ エグリトピケラ	2 - 2 2 - 0.5	カクツットピケ	ラ 1-1.5	エグリトビケ	ラ 5 - 2 ケラ 1 - < 0.5	
		9	4.5	2	1 6.5	5 3	1 0.5	
	g 4 2	粘管目 A 鞘翅目 A 双翅目 A	6 - 1 1 - 2 2 - 1.5	粘管目 A 鞘翅目 A	1 - 0.5 1 - 1 6	粘管目 A 双翅目 A	5 1 - 9.5 2 - 1	
1	1 3	3	1	1 7	6.5	2	1.5	
ヒロバカゲロウ	L1-13	クモダニ	2 - 1 1 -<0.5	ミミズ ク モ 壊 脚類	4 - 5 1 - 0.5 1 2 - 1	ク モ ガンマルス	1 - 0.5 1 - 1	

時 天 (で) 大 (で) (で) (で) (で) (で) (で) (で) (で)	B C 1.0 0.1 6.7 (6.9) 1 1.0 6 2 7.0 0 2 6.0 4	47. 3.17 BC 3.0 2.0 7.0 (7.0) 11.45 8.64 21.0	47. 3.27 5.00~16.00 BC 3.4 2.2 6.7(6.9) 13.7 13.68 11.0	美深橋上流 1 5 4 7. 4. 7 0 C 4.4 3.8 6.5 (6.6) 1 2.2 7 6 3.0 0 1 3.0 1 1 3 1 4	9.6 9.6 5.6 6.5 (6.7 1 1.3 6 1 4 1.8 4 7.8 2 4
時 天 気温(℃) PH (RPH) DO (ppm) 減過視(m)) 透れ上の(m)) 透下エスゲワケケ昆(尾) カカト羽イそ合河 (地) の尾 利川 (本) の尾 利川 (本) の尾 利川 (本) の尾 利川 (本) の尾 の尾 の尾 の 日間 候	B C 1.0 0.1 6.7 (6.9) 1 1.0 6 2 7.0 0 2 6.0 4	1 B C 3.0 2.0 7.0 (7.0) 1 1.4 5 8.6 4 2 1.0 2	5. 0 0 ~ 1 6. 0 0 B C 3.4 2.2 6.7 (6.9) 1 3.6 8 1 1.0 2	C 4.4 3.8 6.5 (6.6) 1 2.2 7 6 3.0 0 1 3.0 11	9.6 5.6 6.5 (6.7 1 1.3 6 1 4 1.8 4 7.8 2 4
天 気温(℃) 水温(℃) PH (RPH) DO (ppm) 減過視度(cm) 満視度(cm) 満れ度(の) 満下生ス が ワ ビ (足) カカカト 羽 イ ケ ク 左 昆 ミ 他 と お 川	1.0 0.1 6.7 (6.9) 1 1.0 6 2 7.0 0 2 6.0	B C 3.0 2.0 7.0 (7.0) 1 1.4 5 8.6 4 2 1.0	B C 3.4 2.2 6.7 (6.9) 1 3.7 1 3.6 8 1 1.0 2	C 4.4 3.8 6.5 (6.6) 1 2.2 7 6 3.0 0 1 3.0 1 1	9.6 5.6 6.5 (6.7 1 1.3 6 1 4 1.8 4 7.8 2 4
気温(℃) 水温(℃) PH (RPH) DO (ppm) 濾過水量(㎡) 透視度(cm) 流スカリウ カワゲケラスログケラスログケクを見まる。 イトのに対している。 日間に対している。 大田のは、中田のは、中田のは、中田のは、中田のは、中田のは、中田のは、中田のは、中	1.0 0.1 6.7 (6.9) 1 1.0 6 2 7.0 0 2 6.0	3.0 2.0 7.0 (7.0) 1 1.4 5 8.6 4 2 1.0	3.4 2.2 6.7 (6.9) 1 3.7 1 3.6 8 1 1.0	4.4 3.8 6.5 (6.6) 1 2.2 7 6 3.0 0 1 3.0	9.6 5.6 6.5 (6.7 1 1.3 6 1 4 1.8 4 7.8 2 4
水温温 (℃) PH (RPH) D0 (ppm) 濾過水量 (㎡) 透視度 (cm) 洗下生物(尾) ユカガワゲケラ 羽トミミベートミミベート の尾 数 河川 名 点 日 日 日 日 天	0.1 6.7 (6.9) 1 1.0 6 2 7.0 0 2 6.0	2.0 7.0 (7.0) 1 1.4 5 8.6 4 2 1.0	2.2 6.7 (6.9) 1 3.7 1 3.6 8 1 1.0 2	3.8 6.5 (6.6) 1 2.2 7 6 3.0 0 1 3.0 1 1	5.6 6.5 (6.7 1 1.3 6 1 4 1.8 4 7.8 2 4
PH (RPH) DO (ppm) 濾過水量(m) 濾過水量(m) 透視度(cm) 流下生物(尾) カカウウラ トビケラ 羽化ミミベ 合計尾数 地尾 中月日 4 長時 長時 長時 長時 長時 長期	6.7 (6.9) 1 1.0 6 2 7.0 0 2 6.0	7.0 (7.0) 1 1.4 5 8.6 4 2 1.0	6.7 (6.9) 1 3.7 1 3.6 8 1 1.0 2	6.5 (6.6) 1 2.2 7 6 3.0 0 1 3.0	6.5 (6.7 1 1.3 6 1 4 1.8 4 7.8 2 4
DO (ppm) 濾過水量(㎡) 透視度(cm) 流下生物(尾) ユカカワグララ カワグララセ R 表 一月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	1 1.0 6 2 7.0 0 2 6.0	1 1.4 5 8.6 4 2 1.0	1 3.7 1 3.6 8 1 1.0 2	1 2.2 7 6 3.0 0 1 3.0	1 1.3 6 1 4 1.8 4 7.8 2 4
 濾過水量(㎡) 透視度(cm) 流下生物(尾) カカワウラー トアクラー トアクラー トアクラー トアクラー トアクラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 7.0 0 2 6.0 4	2 1.0	1 3.6 8 1 1.0 2 1 7 1 0	6 3.0 0 1 3.0	1 4 1.8 4 7.8 2 4
透視度 (cm) 流下生物(尾) カカワグワクラフター アイト の 尾 数	2 6.0	2 1.0	1 1.0 2 1 7 1 0	1 3.0	7.8
 流下生物(尾) カカカウカワゲララ ト羽イトラウ虫ズ 合計川 名 毎日間 天 候 	4	1 3	1 7 10	3	9
ユ ス リ カ ウ カ ウ ワ グ ラ カ ワ グ ケ ラ R 取 化 E ミ ス 他 A 合 計 川 点 日 B 地 月 日 4 B 天 條 B	4	1	1 7 1 0	3 1 4	9
カ ダ ロ ウ カ ワ グ ラ ト ビ 見 羽 化 ミ ミ ベ 合 計 尾 数 河 川 名 地 月 日 4 時 天 候	4	1	1 7 1 0	3 1 4	9
カワゲラ トピケラ 羽化 昆虫 イトミミベ 合計 尾数 一 一 一 一 一 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		3	7 10	1 4	3 3
トピケラ 羽化昆 イトミズ その他 合計尾数 河川名 塩月日日 4時間 天 候		3	7 10	1 4	3 3
羽 化 昆虫 イトミミズ そ の 他 合 計 尾 数 河 川 名 地 点 年 月 日 4 時 間 天 候		3	7 10	1 4	3 3
イトミミズ そ の 他 合 計 尾 数 河 川 名 地 点 年 月 日 4 時 間 天 候		3	7 10	1 4	3 3
その他 合計尾数 河川名 地点 年月日4 時間 天候			10	1 4	3 3
合計 組 河川 名 地点 点 年月日 4 時間 長 天候			10		
河 川 名 地 点 年 月 日 4 時 間 天 候			.):		
地 点 年月日日4 時間 天候	7. 3. 9	天 塩		合流占上流 1 0	
年 月 日 4 時 間 天 候	7. 3. 9		パンケナイ川	合流占上流10	
時 間 天 候	7. 3. 9		2 2 2 171	I DIMINICAL DILL TO	0 m
天 候		4 7. 3.2 1	4 7. 4. 1	4 7. 4.1 0	4 7: 4.2 0
		1	5.00~16.00		
気 温 (℃)	C	C	2	вс	O.
	0.0	- 3.0	- 9.0	4.8	7.8
水 温 (℃)	0.2	0.2	1.0	5.6	4.4
PH (RPH)	6.6 (6.8)	6.6 (6.8)	-	6.7 (6.9)	67.(6.8)
DO (ppm)	5.8 1	2.2 0	-	1 1.6 1	1 1.2 8
瀘過水量 (m²)	-	-	2 4.4 8	8 8.5 6	1 0 6.5 6
透 視 度 (cm)	-	-	-	2 1.5	1 0.0
流下生物(尾)	(採	集不可能)			
ユスリカ			3	3 3	18
カゲロウ			-	5	
カワゲラ		· '			1
トピケラ					1
羽化昆虫			1		
イトミミズ				7	2
その他			. 2		6
合計尾数			6	4 5	2 8

	天	塩	Ш	美 <i>浑</i> 橋	上流 1 5 0 m 地	1占
4 7. 4.2 4	4 7. 5. 8	4 7. 5.1 6	4 7. 5.2 7	4 7. 6. 7	4 7. 6.1 7	47. 6.27
			. 0 0 ~ 1 6.0			
С	C	C	С	ВС	C	ВС
1 2.5	1 6.8	1 7.0	9.8	2 8.2	2 2.0	2 6.1
6.0	1 0.5	1 3.5	1 3.1	1 9.6	1 6.3	1 9.6
6.6 (6.8)	6.7 (6.9)	6.7 (6.9)	6.7 (6.9)	7.8	6.9	6.7 (6.9)
1 1.2 8	1 0.4 5	9.1 9	7.4 4	1 0.7	8.4	7.2 7
1 6 7.1 7	1 7 6.0 4	5 7.9 6	4 8.2 4	4 6.8 0	4 0.3 2	3 4.9 2
2 0.0	1 4.9	1 5.6	1 5.0	2 9.1	1 7.5	1 8.1
2 0.0		1 0.0	1 0.0	2 3.1	11.0	1 0.1
30	2 9	2 4	1 0	1 4	10	7
1		2 1	10	1.4	10	
	1			1		
	1				-	
5	2	1 2				
3			2.4	7	. 1	5
2.6	9	4	3 4			
3 6	4 1	4 0	4 4	2 2	11	1 2
3 6			4 4 JI	2 2	1 1	
	天	4 0	4 4 川 バン	クナイ川合流点	上流 1 0 0 m	1 2
47. 4.29	4 1	4 0 塩 4 7. 5.2 0	4 4 リリ パン 4 7. 5.3 0	22 ケナイ川合流点 47. 6.12	1 1	
4 7. 4.2 9	4 1 天 4 7. 5.1 0	40 塩 47. 5.20 15.	44 リリ ベン 47. 5.30 00~16.00	22 ケナイ川合流点 47. 6.12	上流 1 0 0 m 4 7. 6.2 0	1 2
4 7. 4.2 9	4 1 天 4 7. 5.1 0	4 0 塩 4 7. 5.2 0 1 5.	4 4 JII XX 4 7. 5.3 0 0 0 ~ 1 6.0 0	22 ケナイ川合流点 47. 6.12 BC	11 上流 1 0 0 m 4 7. 6.2 0	1 2 4 7. 6.3 0
4 7. 4.2 9 G 2 0.0	4 1 天 4 7. 5.1 0 C 1 3.2	4 0 塩 4 7. 5.2 0 1 5. C 7.0	4 4 JII XX 4 7. 5.3 0 0 0 ~ 1 6.0 0 B C 1 2.7	クナイ川合流点 47. 6.12 BC 12.0	11 上流 1 0 0 m 4 7. 6.2 0 C 2 5.4	1 2 4 7. 6.3 0 C 2 3.0
4 7. 4.2 9 G 2 0.0 7.9	4 1 天 4 7. 5.1 0 C 1 3.2 1 0.4	4 0 塩 4 7. 5.2 0 1 5. C 7.0 1 1.0	4 4 JII XX 4 7. 5.3 0 0 0 ~ 1 6.0 0 B C 1 2.7 1 5.6	クナイ川合流点 47. 6.12 BC 12.0 15.0	1 1 上流 1 0 0 m 4 7. 6.2 0 C 2 5.4 1 9.0	1 2 4 7. 6.3 0 C 2 3.0 1 9.0
G 2 0.0 7.9 7.0 (6.8)	4 1 天 4 7. 5.1 0 C 1 3.2 1 0.4 6.7 (6.9)	4 0 塩 4 7. 5.2 0 1 5. C 7.0 1 1.0	4 4 JII XX 4 7. 5.3 0 0 0 ~ 1 6.0 0 B C 1 2.7 1 5.6 7.0 (6.9)	クナイ川合流点 47. 6.12 BC 12.0 15.0	11 上流 1 0 0 m 4 7. 6.2 0 C 2 5.4 1 9.0 6.9	1 2 4 7. 6.3 0 C 2 3.0 1 9.0 6.9
G 2 0.0 7.9 7.0 (6.8)	4 1 天 4 7. 5.1 0 C 1 3.2 1 0.4 6.7 (6.9)	4 0 塩 4 7. 5.2 0 1 5. C 7.0 1 1.0	4 4 JII 7.7 4 7. 5.3 0 0 0 ~ 1 6.0 0 R C 1 2.7 1 5.6 7.0 (6.9) 7.5 0	クナイ川合流点 47. 6.12 BC 12.0 15.0	1 1	1 2 4 7. 6.3 0 C 2 3.0 1 9.0 6.9
C 2 0.0 7.9 7.0 (6.8) - 8 3.8 8	4 1 天 4 7. 5.1 0 C 1 3.2 1 0.4 6.7 (6.9) 2.3 5 8 6.0 4	4 0 塩 4 7. 5.2 0 1 5. C 7.0 1 1.0 - - 9 7.9 2	4 4 JII XX 4 7. 5.3 0 0 0 ~ 1 6.0 0 B C 1 2.7 1 5.6 7.0 (6.9) 7.5 0 1 1 1.9 6	22 ケナイ川合流点 47. 6.12 BC 12.0 15.0 - 46.80	T 1 0 0 m 4 7. 6.2 0 C 2 5.4 1 9.0 6.9 2 8 4 6 2.2 8	1 2 4 7. 6.3 0 C 2 3.0 1 9.0 6.9
G 2 0.0 7.9 7.0 (6.8)	4 1 天 4 7. 5.1 0 C 1 3.2 1 0.4 6.7 (6.9)	4 0 塩 4 7. 5.2 0 1 5. C 7.0 1 1.0	4 4 JII 7.7 4 7. 5.3 0 0 0 ~ 1 6.0 0 R C 1 2.7 1 5.6 7.0 (6.9) 7.5 0	クナイ川合流点 47. 6.12 BC 12.0 15.0	1 1	1 2 4 7. 6.3 0 C 2 3.0 1 9.0 6.9
4 7. 4.2 9 C 2 0.0 7.9 7.0 (6.8) - 8 3.8 8	4 1 天 4 7. 5.1 0 C 1 3.2 1 0.4 6.7 (6.9) 2.3 5 8 6.0 4 2 3.4	4 0 塩 4 7. 5.2 0 1 5. C 7.0 1 1.0 - 9 7.9 2 2 4.0	4 4 JII XX 4 7. 5.3 0 0 0 ~ 1 6.0 0 B C 1 2.7 1 5.6 7.0 (6.9) 7.5 0 1 1 1.9 6 2 0.0	クナイ川合流点 47. 6.12 BC 12.0 15.0 - 46.80	T 1 0 0 m 4 7. 6.2 0 C 2 5.4 1 9.0 6.9 2.8 4 6 2.2 8 3 0.0	1 2 4 7. 6.3 0 C 2 3.0 1 9.0 6.9 - 9 1.4 4 3 0.0
G 2 0.0 7.9 7.0 (6.8) - 8 3.8 8 -	4 1 天 4 7. 5.1 0 C 1 3.2 1 0.4 6.7 (6.9) 2.3 5 8 6.0 4	4 0 塩 4 7. 5.2 0 1 5. C 7.0 1 1.0 - - 9 7.9 2	4 4 JII XX 4 7. 5.3 0 0 0 ~ 1 6.0 0 B C 1 2.7 1 5.6 7.0 (6.9) 7.5 0 1 1 1.9 6	22 ケナイ川合流点 47. 6.12 BC 12.0 15.0 - 46.80	T 1 0 0 m 4 7. 6.2 0 C 2 5.4 1 9.0 6.9 2 8 4 6 2.2 8	1 2 4 7. 6.3 0 C 2 3.0 1 9.0 6.9
4 7. 4.2 9 C 2 0.0 7.9 7.0 (6.8) - 8 3.8 8	4 1 天 4 7. 5.1 0 C 1 3.2 1 0.4 6.7 (6.9) 2.3 5 8 6.0 4 2 3.4	4 0 塩 4 7. 5.2 0 1 5. C 7.0 1 1.0 - 9 7.9 2 2 4.0	4 4 JII XX 4 7. 5.3 0 0 0 ~ 1 6.0 0 B C 1 2.7 1 5.6 7.0 (6.9) 7.5 0 1 1 1.9 6 2 0.0	22 ケナイ川合流点 47. 6.12 BC 12.0 15.0 - 46.80	T 1 0 0 m 4 7. 6.2 0 C 2 5.4 1 9.0 6.9 2.8 4 6 2.2 8 3 0.0	1 2 4 7. 6.3 0 C 2 3.0 1 9.0 6.9 9 1.4 4 3 0.0
G 2 0.0 7.9 7.0 (6.8) - 8 3.8 8 -	4 1 天 4 7. 5.1 0 C 1 3.2 1 0.4 6.7 (6.9) 2.3 5 8 6.0 4 2 3.4	4 0 塩 4 7. 5.2 0 1 5. C 7.0 1 1.0 - 9 7.9 2 2 4.0	4 4 JII XX 4 7. 5.3 0 0 0 ~ 1 6.0 0 B C 1 2.7 1 5.6 7.0 (6.9) 7.5 0 1 1 1.9 6 2 0.0	クナイ川合流点 47. 6.12 BC 12.0 15.0 - 46.80	11 上流 1 0 0 m 4 7. 6.2 0 C 2 5.4 1 9.0 6.9 2.8 4 6 2.2 8 3 0.0	1 2 4 7. 6.3 0 C 2 3.0 1 9.0 6.9 - 9 1.4 4 3 0.0
G 2 0.0 7.9 7.0 (6.8) - 8 3.8 8 -	4 1 天 4 7. 5.1 0 C 1 3.2 1 0.4 6.7 (6.9) 2.3 5 8 6.0 4 2 3.4	4 0 塩 4 7. 5.2 0 1 5. C 7.0 1 1.0 - 9 7.9 2 2 4.0	4 4 JII XX 4 7. 5.3 0 0 0 ~ 1 6.0 0 B C 1 2.7 1 5.6 7.0 (6.9) 7.5 0 1 1 1.9 6 2 0.0	22 ケナイ川合流点 47. 6.12 BC 12.0 15.0 - 46.80	T 1 0 0 m 4 7. 6.2 0 C 2 5.4 1 9.0 6.9 2.8 4 6 2.2 8 3 0.0	1 2 4 7. 6.3 0 C 2 3.0 1 9.0 6.9 9 1.4 4 3 0.0
47. 4.29 C 20.0 7.9 7.0 (6.8) - 83.88 - 29 2	4 1 天 4 7. 5.1 0 C 1 3.2 1 0.4 6.7 (6.9) 2.3 5 8 6.0 4 2 3.4	4 0 塩 4 7. 5.2 0 1 5. C 7.0 1 1.0 - 9 7.9 2 2 4.0	4 4 JII XX 4 7. 5.3 0 0 0 ~ 1 6.0 0 B C 1 2.7 1 5.6 7.0 (6.9) 7.5 0 1 1 1.9 6 2 0.0	22 ケナイ川合流点 47. 6.12 BC 12.0 15.0 - 46.80	11 上流 1 0 0 m 4 7. 6.2 0 C 2 5.4 1 9.0 6.9 2.8 4 6 2.2 8 3 0.0	1 2 4 7. 6.3 0 C 2 3.0 1 9.0 6.9 9 1.4 4 3 0.0
47. 4.29 C 20.0 7.9 7.0 (6.8) - 83.88 - 29 2	4 1 天 4 7. 5.1 0 C 1 3.2 1 0.4 6.7 (6.9) 2.3 5 8 6.0 4 2 3.4	40 塩 47. 5.20 15. C 7.0 11.0 - 97.92 24.0	4 4 JII XX 4 7. 5.3 0 0 0 ~ 1 6.0 0 R C 1 2.7 1 5.6 7.0 (6.9) 7.5 0 1 1 1.9 6 2 0.0	22 ケナイ川合流点 47. 6.12 BC 12.0 15.0 - 46.80	11 Lim 1 0 0 m 47. 6.20 C 25.4 19.0 6.9 2.84 62.28 30.0	1 2 4 7. 6.3 0 C 2 3.0 1 9.0 6.9 9 1.4 4 3 0.0
47. 4.29 C 20.0 7.9 7.0 (6.8) - 83.88 - 29 2	4 1 天 4 7. 5.1 0 C 1 3.2 1 0.4 6.7 (6.9) 2.3 5 8 6.0 4 2 3.4	4 0 塩 4 7. 5.2 0 1 5. C 7.0 1 1.0 - 9 7.9 2 2 4.0	4 4 JII XX 4 7. 5.3 0 0 0 ~ 1 6.0 0 B C 1 2.7 1 5.6 7.0 (6.9) 7.5 0 1 1 1.9 6 2 0.0	22 ケナイ川合流点 47. 6.12 BC 12.0 15.0 - 46.80	11 上流 1 0 0 m 4 7. 6.2 0 C 2 5.4 1 9.0 6.9 2.8 4 6 2.2 8 3 0.0	1 2 4 7. 6.3 0 C 2 3.0 1 9.0 6.9 9 1.4 4 3 0.0

(3) さくらます稚・幼魚の生態に関する調査

1) 目名川における調査

本年度の調査は前2年のそれのほぼ繰返して、既往の知見をより確かにすることが主目的であった。えられた結果については、すでに研究報告27号にのせられているが、要録すれば次の通りである。

稚魚の放流に当っては本流上流の田下に標識魚10万を放した他 上目名川上流に1日ずらして無標識魚9万と標識魚5万を放し、先住優位の現象を調べた。他の支川には無標識魚を放した。夏期には本流と支川の定点で生息尾数の定量を行うと共に、標識魚の混入状態から魚の分散についての知見をえた。

前年度までと同様,目名川本・支流にはm当り(s t 2 を除き) $0.3 \sim 3.4$ 尾の密度で 7 月末には生息していた。それから,s t 9 で放した魚は 7 月末までに約半数が生き残ったと推定された。放流点下方にダムのある貝殻沢川と下賀老川に放した魚は本年は本流まで降下せず,支川内に止まったと推定されたが,そのことから,支流内での生残りは良くなかったことが示唆された。

1971年の方が1972年にくらべて本流と上目名川放流の魚の分散範囲が広かったが、これは、放流時刻に関係があるらしく、夕刻になってから放したものは分散範囲が広いのではないかと推測された。

先往優位の現象については前年までと同様、先立って放した方が定着密度が高い、または生長が良いという現象がみられた。水量の少ない支川ではその差は密度にあらわれ、大きなふちや瀬のある本流では、少なくとも生長にそれが現われた。それが生長に現われた理由は、社会的順位が発生するようなある広さ以上の空間があったことと関係していると判断された。本年は1970年度に放した群が回帰した年で、沿岸、河川を含めて標識魚の再補の体制がとられた。それについては1971、72年放流のものの結果がでてから詳しい分析がされる予定だが、河川内での再補結果では、全体の漁獲数 2 1、210、 3 655の内標識魚は 3 168尾、 3 153尾、 3 25こみで17%であった。(放流尾数 3 23万,標識魚 3 0万

2) 天塩パンケナイ川における調査

(13%))

前年度には二股支流に全稚魚を放した結果。極めて低い生き残りしかえられなかった。本年度は、再度そのような事態が起るか否かを見ることにした。ただし稚魚の大半はパンケナイ本川の上、中流の2点に放し、標識した1,300尾のみを二股支流に放した。結果は研究報告27号にのせた。要録すれば、次の通りである。

8月上旬の生息密度は平均n3 り 0.4 尾とかなり高く、生き残りも 40~50%と推定され、前年の低い値とは大きく異った。

3) 根室地方河川における調査

分散放流した稚魚は放流点をふくめ下流によく分散していた。

(4) さけ・ます稚魚の栄養条件に関する調査

放流用さけの飼育餌料としては、さけが特殊な生態をもつことから、海水移行時に死亡の少な

いものでなければならないと考えられる。

このような観点から本年は1表 2表および3表に示した試験区分ならびに添加量により、Fe, Cu, Zn, Co 各成分の添加効果ならびに相互関係を明らかにすることを主目標として、飼育実験をおこなった。この結果のうち現在までに整理されたものを1970年の結果と併せて報告する。

1表 一般無機成分添加量(餌1Kg当り)

MgSO4		5. 4	8	0 mg
NaCl		1, 7	4	0 mg
Na ₂ HPO ₄		3. 4	8	8 <i>mg</i>
CaHFO ₄		5, 4	3	2 119
K ₃ PO		9, 5	9	2 mg
Ca-Lactets	1	3, 0	8	0 mg

2表 徴量無機成分添加量(餌1Kg当り)

Fe	3 0 0 mg	
Cu	2 5 mg	
Zn	1 0 0 1119	これら各成分の添加については第3表
Со	2 114	の試験区分表に従う。
Mn	1 0 0 1119	
I	1 0 mg	

3表 添加微量無機質の効果試験実施のための実験区設定表

実験区	Fe	Cu	Zn	Со	Mn	I
1	0	0	0	0	0	0
2	×	0	0	0	0	0
3	0	\times	0	0	0	0
4	. 0	\times	×	0	0	0
5	0	0	×	0	0	0
6	. 0	0	0	×	0	0
7	0	0	×	×	0	0
8	0	×	×	X	0	0
9	×	×	×	×	0	0
1 0	0	0	0	0	×	0
1 1	0	0	0	0	0	×

註1:○印は,添加成分を,×印は無添加成分をそれぞれ表わす。

註2:各成分の添加量は第2表に従う。

結果および考察

1970年および1972年の飼育結果をそれぞれ4,5表および6,7表に表示する。すなわち4表に示した1970年の結果については、目的がビタミン(K,C)無添加による障害を知るものであったため、あまり比較にはならないが、対照区を含めて海水移行時の死亡が極めて著しかったことが知られる。(5表)

4表 1970年飼育試験結果(増肉係数)

供試魚 ; 干才支場西越採卵場で得られた卵のうち支場ふ化室で最後に ふ化したもの

計於期間 試験開始	対	田岳	C WE	添加	K #	添加
試験期間 微の日数	ねり餌	固型餌	ねり餌	固型餌	ねり餌	固型血
4/15~27	1.91	2.8 3	1.4 3	1.9 6	1.9 1	2.8 3
~5/7	1.1 0	2.2 7	1.21	2.9 2	1.1 0	2.2 7
~5/18	1.63	3.2 0	1.37	3.3 3	1.6 3	3.2 (
~5/29	1.3 0	1.7 2	_	1.81	1.30	1.7
~6/8	1.91	2.2 4	2.2 5	1.8 5	1.9 1	2.2
~6/18	1.4 5	1.31	1.3 6	1.8 7	1.4 5	1.3
~6/29	1.9 4	1.7 1	1.8 2	1.51	1.9 4	1.7
~7/10	2.0 2	1.78	1.7 7	1.5 6	2.0 2	1.7
a ~ a						
~8/8	2.2 8	1.9 4	2.2 0	1.8 7	2.2 8	1.9
~8/18	2.50	1.89	1 2.1 2 *	2.81*	2.5 0	1.8
~8/28	2.8 7	2.8 1	4.4 4	4.9 6	2.8 7	2.8
~9/11	3.32	2.6 1	5.3 1	5.4 8	3.3 2	2.6

*, 湾曲症状の魚出現

5表 海水移行による死亡と体重の減少(1970)

試験月日(測定日数)		7/11 (26hr)	8/28	(29hr)		9/11(26hr)
飼育開始	後の日数		8 6	1	3 5		1 4	9
4-1 F77	ねり	餌	50%	60%	(-19.4%)	40%	(-17.3%
対 照	固型	餌	3 0''	2 0	(- 1 0.6)	2 0	(- 2 2.6
- m - L.	ねり	餌	1 0	0	(-1 2.1)	2 0	(+ 2.4
C無添加	固型	餌	7 0	20	(-1 3.8)	3 0	(+ 2.8
v mi zetm	ねり	餌	3 0	3 0	(- 2 2.2)	1 0	(-28.1
K無添加	固型	餌	4 0	7 0	(-1 7.7)	0	(- 2 5.5

表中左の数値は死亡率を、同じく右()内の数値は海水移行による体重の減少率を表わす。

増肉係数は全般にニジマスのように良い値が得られなかった。この理由については給餌する人が不慣れなことや給餌回数が少ない(3回/日)などが原因とも考えられる。また1970年には10日毎に1972年は約15日毎に計量したが、計量法としては、全数をザルで充分に水を切った後、再度木綿の布をしいたザルの中に入れて水気をとるようにしたので、そのことが影響したことも考えられる。

なお 6 表に示した 1 9 7 2 年の実験中 8 月 1 8 日の測定時に増肉係数が悪く出た原因については、その期間の初めに飼育場所を別棟のふ化室に移し替えたが、その影響も強く受けていることが推察される。

6表 1972年飼育試験結果(増肉係数)

	1	3 111 30 7									
		採卵月日	1	9	7	1	1	1		2	8
		発眼日	1	9	7	2		1		3	0
供試魚	;	ふ化日		,	,			3		1	0
		試験前の飼育		/	,		4,	/2	5~	-6,	/2(38日間)

試験開始の体重 0.689

期 試跡日数+	問試驗飼育	6/3~6/16	~7/2	~ 7/18	~8/3	~8/18	~9/3
	日数	14+38=52	30+38=68	46+38=84	62+38=100	77+38=115	93+38=131
対	照	2.0 0	1.8 4	1.6 0	1.78	5.4 7	2.3 2
Fe MF 8	忝 加	0.94	1.6 4	1.5 7	1.66	3.0 7	1.99
Cu	"	1.2 4	1.68	1.5 1	1.9 2	7.7 2	1.9 2
Cu · Zn	"	1.6 6	1.5 2	1.68	1.9 4	2.5 8	2.4 4
Zn ,	ii .	1.1 8	1.4 9	1.7 1	1.6 5	2.7 0	2.4 0
Co	"	1.1 8	1.8 5	1.6 2	1.9 1	2.7 4	1.85
Co · Zn	,,	1.1 8	1.4 3	1.5 4	1.8 3	4.2 8	2.1 2
Cu · Zn · C	00 #	.1.1 3	1.88	1.54	1.8 3	2.7 4	2.0 3
Fe · Cu · Z	Zn·Co″	1.2 7	1.3 8	1.4 2	2.0 1	2.7 5	1.9 1
Mn	"	1.1 4	1.69	1.6 0	2.0 0	2.8 9	1.8 6
I ,	"	1.2 1	1.9 7	1.4 8	1.8 2	2.6 9	1.81

表の値は開始時の飼育量に対して4%の餌を毎日与えた場合の結果である。

いずれにしても、1972年の微量金属の添加の必要性については、浮上直後の魚を入手することが出来なかったことから充分に明らかにすることが出来なかったが、この実験での結果では柏木、佐藤らの報告のとおり飼育日数の少ない魚で海水移行時の死亡が多く、またFe、Cu 2nなどを添加しなかった餌料区でより多く死亡していることが知られた。

しかし、この海水移行による死亡は、魚を絶食状態におくと防止出来るようにもみうけられる (7表 1972年 9月18日)。

7表 海水移行による死亡と体重減少(1972)

試験月日 飼育開始後の日数	7/3~5(42.20時間)68	8/3~6 (27.15時間) 100	9 / 4 ~ 5 (27.36時間)	9/18~19 (24時間) 左より14日絶食後
対照	24 % (19.6%)	10% (15.5%)	0 % (8.1 %)	0 % (5.8%)
Fe 無 添 加	21 (19.5)	25 (19.0)	0 (8.1)	0 (5.9)
Cu	15 (14.2)	5 (11.5)	5* (13.6)	0 (8.6)
Cu·Zn	5 (13.3)	15 (15.1)	11 (15.6)	5 (8.6)
Zn	30 (23.6)	25 (17.3)	18** (23.0)	0 (9.3)
Co	20 (16.6)	0 (11.6)	11 (19.1)	0 (6.9)
Co·Zn	3 5 (1 9.4)	5 (14.1)	5 (13.7)	0 (6.4)
Cu·Zn·Co	5 (10.8)	0 (12.2)	0 (11.1)	0 (6.3)
Fe -Cu · Zn · Co	20 (16.7)	0 (13.6)	0 (11.3)	0 (4.2)
Mn	10 (14.6)	0 (11.0)	0 (11.2)	0 (4.3)
I	10 (14.3)	0 (7.9)	0 (8.2)	0 (6.0)

*, 死后湾曲 ; **, 死后波状に変形


表中左の数値は死亡率を、同じく右()内の数値は海水移行による体重の減少率を表わす。

以上、海水移行による死亡と餌との関係については、大変複雑な関係にあることが改ためて確認された。

そして1972年の結果では、海水移行により体重の減少が激しいものほど海水移行時に死亡し 易いことが知られ、このような無は1図(×印)からも知られるとおり細長い感じのする魚で体型上 からも死亡し難い魚と区別出来そうである。

したがって、今後は浸透圧調節機能を正常に維持させるために必要な要素の解明も必要と思われる。

1図 海水移行実験後の試験魚の体重と体長との関係 (7月5日測定分)



3. さけ・ます親魚の生理・生態に関する調査

(1) サケ親漁の利用率向上に関する調査

初期群や小河川にそ上する親魚の有効な利用は、サケ資源の拡大のうえで重要なことと考えられる。しかしながらこれらの親魚は蓄養中の死亡率が著しく高くその改善が望まれるところである。

以上のことから、本調査では初期そ上群の死亡原因の解明を計るために、環境要因が生理機能にどのように影響するかを血清蛋白質の組成、量ならびに血清のポーラロ蛋白液の波高など血液生理上の要素への影響から検討した。また蓄養魚の利用率を蓄養期間の短縮によって改善するため、アユ、タイ、ウナギなどで効果が知られている性ホルモン処理による排卵促進試験を行った。以下にその結果の概要を報告する。

Ⅰ 材料および方法

1. 供試魚および実験時期

供試魚には1971年の実験では1表に示した静内川にそ上し河口の捕獲場で9月20日,10月29日に採捕されていたもの、および千才川にそ上し、千歳市内の西越捕獲場で9月27日および10月5日採捕されていたものを用いた。また1972年の実験ではユーラップ川にそ上し、河口にある遊楽部捕獲場で10月19日、30日および12月23日に採捕されていたもの、および1971年の結果との比較のため千歳川の西越補獲場で11月22日に採捕されていたものを用いた。なお実験に際しては蓄養実験に必要な量の補獲直後の魚が得られないことがあったため、実験開始の数日前から河川内の生簀に捕獲魚を仮収容し、これらの魚の中でより未熟なものと思われるものから漸次取上げて試験魚に供した。また実験室内の小型ガラス水槽で飼育されていた浮上後1年7ヶ月のサケ(FL20cm)を用いて若令時における血液性状の比較用供試魚とした。

2. 生殖腺刺激ホルモン*

ホルモン剤としては家畜用として市販されている妊婦尿から抽出された胎盤性性腺刺激ホルモン剤のゴナトロピン(Gonatropin:LHに似た作用を有する),妊馬の血清から抽出された血清性性腺刺激ホルモン剤のセロトロピン(Serotropin:主にFSHに似た作用を有する)なよびこれらホルモンの混合製剤であるシナホリン(Synahorin:脳下垂体前葉性性腺刺激ホルモンと胎盤性性腺刺激ホルモンとの比が1:9の割合で作られたもので、LH:FSHの比は1:3と云われている)を用いた。

* LH(黄体形成ホルモン):脳下垂体前葉から産出され雌性動物に対してFSH(卵胞刺激ホルモン):同じく脳下垂体の前葉から産出され、雌性動物に対しては卵巣の幼若なろ胞に作用してこれを発達させると共に、ろ胞から雌性ホルモン分泌を促す。

胎盤性性 帳刺激 ホルモン (chorionic gonadotropon:LHと類似した作用をする。

3. 成熟促進のための試験区の設定

a 予備実験として次の通り5系統群9区の試験区分を設けた。

ゴナトロピン(G)群

L H 剤の試験ではアユにおける最適量は 1,000 I U とされていることから、3 kgのサケに相等する量(但しアユの体重を 45 g とした)約20,000 I U およびその 2 倍量の 40,00 I Uの 2 つの試験区を設けた。

セロトロピン(8)群

G 剤とS 剤とは一般に混合して使用されることが多くその比はS: 1 とされている。本 実験における混合比も一般使用例に準じたためS 剤の相乗効果の判定を補正する意味で G 剤の物を用いた 2 つの試験区を設けた。

ゴナトロピン、セロトロピン混合(G+S)群

シナホリン(sy)群

syについては 3 3 5 9 のクロダイでは 6 2 RUの注射量で効果が認められたとされている。したがってサケでは 1 尾の最低注射量を 8 0 0 RU (この値はクロダイの使用量から換算するとサケの体重は 4.3 Kgに相等する)とし、その 1 0 倍量および 3 0 倍量を注射した 3 つの試験区を設けた。

対照(C)群

異物の注射による影響を考慮するため、全ての対照魚には生理的食塩水を注射したものを 用いた。

b 本実験における試験区の設定

本実験では、S 剤単独の試験は中止し、その他の群は予備実験の結果を参考にして、1尾当り20,000 IU(G)、同じく20,000 IU(G)+2,500 IU(S)同じく25,000 RU(Sy)および対照群の各群1区とした。

4. 薬剤の調整および注入量

ゴナトロピン(G)は予備実験では $10.000 \, \text{MU}$ のものを $5 \, \text{m} \, \ell$ の生理的食塩水にとかし、その $3.3 \, \text{m} \, \ell$ を $10 \, \text{m} \, \ell$ 容の注射器に入れたのち再び生理的食塩水で $10 \, \text{m} \, \ell$ まで稀釈したものを $20.000 \, \text{U}$ 団 (M0=3 IUとした)とし、同じく $66 \, \text{m} \, \ell$ をとって $10 \, \text{m} \, \ell$ としたものを $40.000 \, \text{U}$ 団 量とした。また本実験では $10.000 \, \text{MU}$ のもの 2 管を同じく $9 \, \text{m} \, \ell$ にとかし、その $3 \, \text{m} \, \ell$ を $5 \, \text{m} \, \ell$ の注射器にとったのち同じく $5 \, \text{m} \, \ell$ まで稀釈 したものを $20.000 \, \text{U}$ 日 量とした。

セロトロピン(S)については、1.000IUのものを $1 m \ell$ の生理的食塩水にとかし、その $2.5 m \ell$ および $5 m \ell$ をとったのち、生理的食塩水で $10 m \ell$ したものをそれぞれ2.500IU最および5.000IU最とした。

ゴナトロビンとセロトロビンの混合区では、前述のゴナトロビンおよびセロトロビンの溶液をそれぞれ $3.3\,\mathrm{m}\,\ell$ および $2.5\,\mathrm{m}\,\ell$ とったのち生理的食塩水で $1.0\,\mathrm{m}\,\ell$ としたもの、同じくそれぞれ $6.6\,\mathrm{m}\,\ell$ および $5\,\mathrm{m}\,\ell$ とったものを $2.0,0\,0.0\,0$ (G) + $2.5\,0.0\,$ (S) I U量および

40,000(G)+5,000(S)IU量とした。

また本実験ではゴナトロピンの溶液としては 2 0,0 0 0 M U / 9 m ℓ のものを用いてその 3 m ℓ を 1 0 m ℓ の注射器にとり,次いで 1,0 0 0 I U / 1 m ℓ のセロトロピン液 2.5 m ℓ をとって混合したものを 2 0,0 0 0 (G) + 2,5 0 0 (S) I U量とした。

シナホリン(Sy)は、予備実験では10,000マウス子宮重量単位のものを25mℓの生理的食塩水にとかし、その0.2mℓ、2mℓおよび6mℓをとって生理的食塩水で10mℓとしたものをそれぞれ800RU量(1マウス子宮重量単位=10RUとした)、8,000RU量および24,000RU量とした。また本実験では10,000マウス子宮重量単位のものを20mℓにとかし、その5mℓをとって25,000RU量とした。

対照魚には予備実験では $10m\ell$,本実験では $5m\ell$ の生理的食塩水をそれぞれ注入した。

5. 薬剤注入ならびに採血

薬剤の注入、採血ならびに魚体測定に際しては全て約1/1.5万濃度のトリカイン(MS 222) による麻酔処理をおこなった。

薬剤は最初に背側の筋肉内への注入を試みたが、注射針の挿入孔より漏出したため、以後は全て胸鰭の基部より腹腔内へ注入した。また測定用の血液は $5 \text{ m} \ell$ の注射器を用いて直接心臓より約 $4 \text{ m} \ell$ 採取した。

6. 血液性状の測定

生理実験用の血清は採血から適当な時間経過した血液から遠心分離されたものを用い、血清 蛋白量はエルマ手持屈折計, ヘマトクリト値はクボタ製作所製の測定装置, 血清蛋白質の組成 は常光産業製のアセテート膜用泳動装置により分離した。

ボーラロ蛋白波は柳本製p8ポーラログラフ装置により支持塩には1uteo塩を用いて測定した。また測定時の最終震度については第一反応では1%,この時の血清濃度を基準にして血清蛋白量か2 θ 相当になるようにそれぞれ稀釈調整した。

なお1971年の実験では血屑の最終濃度を0.17%にしたときコバルト波の現われるところに特徴のある極小波が現われたことから、1972年の実験では血清の最終濃度が0.17%のものについても測定した。次に第2反応(瀘漏反応)は1971年には常法にしたがって最終のサンブル濃度が血清に換算して1.92%のもの、1反応と同様濃度を基準にして血清蛋白質が29/d1相等になるまで稀釈されたものについて測定した。

しかし第1反応と同様に1971年の実験時には測定時における試料濃度が血清に換算して1.92%の50時に特徴のある極小値が現われたため1972年の実験では測定時の試料濃度が血清に換算じて0.96%のものについても測定した。ボーラロ波高の測定は全て温度25℃、水銀柱70cmの条件下で行い、この時の毛細管特性はm=1,787 m/sec、 $\tau=7.5$ secであった。

支持電解液の組成

0.001M Luteo 1 0.1 N NH4 cl 1 0.2 N NH4 oH 3

使用に際して混合調査

結果および考察

1971年の実験では1表に示した場所および時期の魚を用い、そ上時期の違いや蓄養が血清蛋白質の量、組成ならびに血清のボーロラ波高にどのように影響するかを調べ、1972年の実験では2表に示した場所および試験区分によって親魚に性ホルモン処理を行い、血液性状の変化や成熟・排卵に性ホルモンの処理がどのように影響するかを検討した。

第1表 1971年の実験場所,時期,供試魚の状態

+ 株田元	41.	9		11月					
捕獲場所	性	2 0	2 7	1	5	8	1 8	2 9	4
(静内川河口)	우	4 =		(2) =	>	> ①(朱)2=	⇒②(完)	3 完2= 未1	⇒① (完)
(静 内)	8	6 ==		⇒ ⑥ =	>	> ④(完)=	⇒②(完)	3 完=	⇒(3)
(千歳川)	우		5						
(西越)	8		完 3 未 2		完2 ① 3未1				

表中の数字は魚の数を表わし記号⇒ および○内の数字はそれぞれ血液性状の変化を実験的に 観察するため実験水槽による蓄養および生残って実験に供した魚の数を表わす。また() の文字および数字は成熟状態およびその数を表わす。

および供試魚の状態 時期 2年の実験場所, 2 6 2表


20,000 I U G 40,000 I U G 40,000 I U G 40,000 I U G 5,000 I U G 40,000 I U G	* 7 4	ン処理	1 0 月	^	1 1 月			12月
C		X	9		8 8	2 1	2 2	2 3
2,500 1 1 (29日末, 発) (2,000 1 1 (2,000 1 1 1 (2,000 1 1 1 (2,000 1 1 1 (2,000 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 1 1 (2,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1		н	→(20日末,死)		11) 今(1)			
S 2,500			⇒(29日末,死)	317861)				
S 5,000			7 (3					
(2 6 日光) (3 + S) (4 + S) (5 6 日光) (6 + S) (7 6 日光) (8 0 0 (G) H 5,0 0 (G) " 2 (S 6 日光) (S 7 (S 6 日光) (S 8 日	CC CC		(2)					
(2) 日本3 40.000(9.45,000(8) " 2 (26 日来 死) 3 (26 日来 死)		0(8)	⇒(26日完)	(Z)	[1] 一(1)			
8 y 2 6 日 株 3 (2 6 日 株 3 (2 8 日 株 3 (2 6 日 株 3 (2 8 日 株 4 (2 8 日 * 4)))))))))	v: +	(8)	(28 日光) (26 日完					
Sy 24,000 " 3 ⇒ (28 日	000		(26日末) (28日末)					
Sy 24,000 " 3 ⇒> (26 日彩 死) 25,000 " 4 世 的 食 墒 水 6 ⇒> (26 日完 死) 25,000 " 5 世 章 次 6 ⇒> (26 日完 3) 5 世 章 次 7 世 章		٠	(29 日午 死)	(光)				
25,000 " 任理的食物水 6 → (26円元3) = 1	>		(23 B552 26 B35		1) (3(末1)			
C1. 生 埋 的 食 塩 水 6 =>(26日完3) C2. 無 処 理 な aph 水槽で飼育したふ化後 2	2 5,0		4	④(完)				
C2 無 処 理 な 越 " ♀ な内水槽で飼育した。AC後 ♀	并	的食塩	6 =>(26日完3)		(3)			
の2 無 処 理 製 の 選 が 安々水槽で飼育したる化後	0.1	"		(元) (元)	⇒ ③ (完)			
越安内水槽で飼育したる化後	1	開						6(況)4
安内水槽で飼育したる化後	no.		OL.				5(完)	
		室内水槽で飼育したる化後 1年7ヶ月の魚	7.5	The second secon		2 2		

-204-

字および記号(文字は1表を参照) コナトロピン セロトロピン シナホリン 対照区 事業用完熟魚 表中の数字法 G S S J C C 1

1. 血清蛋白量およびヘマトクリット値について

第1図 血清蛋白量ならびにヘマトクリット値のそ上・成熟との関係



上段の図は1972年の結果を示し、下段は1971年の結果を 図示したものである。

図中の記号〇および・は雌魚および雄魚を表わし、実績は血清蛋白量 を, 点線はヘマトリック値を表わす。

血清蛋白量は第1図に示したように蓄養および成熟にともなって著しく減少し、過去に知られている結果とほぼ同様な傾向を示した。しかし1972年のホルモン処理を行った実験魚では、シナホリンを注入した区の2尾(y335,y338)および対照として生理的食塩水を注入した区の1尾(y785)で完熟時に著しく血清蛋白量が増加した。

またヘマトクリット値も血清蛋白量の変化と同様な傾向を示し、成熟につれて減少した。 この場合、血清蛋白量が完熟時に異常に増加した魚ではヘマトクリット値も同様に異常に大きな値を示すことが知られた。これらのことから屈折計による血清蛋白量測定にあたって時々見られる異常に大きな値については、その一つの原因として考えられている可溶性無機成分の血液中への増加だけではないことが示唆される。なおヘマトクリット値は一般に赤沈値と逆相関にあり、また赤沈値は血清蛋白量と相関関係にあることが1962年および1963年の実験から知られている。したがって1971年および1972年のそ上サケ親魚のヘマトクリット値や血清蛋白量に見られる血液上の変化は、1962年および1963年に石狩川にそ上したサケで知られた血液上の変化と同様な傾向を示しているものと推察される。

また、1971年に測定した魚の血清蛋白量およびヘマトクリット値は西越で得られた魚を含めて全て大きいため、これらの指標は1967年の報告で述べたとおり回帰親魚の内的な条件が年によって異なることを表わすものと考えられる。


2. ポーラロ蛋白波の蓄養・成熟にともなう変化

ポーラロ蛋白波の蓄養・成熟にともなう波高の変化については、血清そのものを用いたもの(以下第1反応と呼ぶ)、変性血清の瀘液を用いたもの(同じく第2反応)いずれも、第2、第3、第4、第5図に示したように血清蛋白量の変化と同様にその波高が蓄養・成熟にしたがって増加することが知られた。そしてこの波高の変化については第一反応では1971年および1972年とも完熟後に波高の増加がゆるやかとなった。また第2反応では1971年の結果によるとむしろ完熟後は減少する傾向にある事が知られた。しかしながら1972年における第2反応では予備実験。本実験いずれの場合もその平均波高は著しく増加した。またこのボーラロ蛋白波については、1971年の結果からみて波高に地域的な相違ないし特性はないものと推察される。


しかしながらこのボーラロ蛋白波については、西越で捕獲された魚の測定結果によると、1972年の第1反応の波高は1971年の値に較べて著しく大きな値を示した。また1971年には血清を稀釈して測定時の血清の最終濃度を0.17%前後にした時コバルト波のところで特徴のある極小現象が見られた。しかし1972年には血清の最終濃度を0.17%にしても極小現象は見られなかった。以上のことからボーラロ蛋白波の第1反応の波高に関与する活性物質の濃度は調査年次によって異なることが推察される。

なお、ボーラロ第1反応についてはガン患者血清のS H活性化能が正常血清に比して低下していること、および第1反応の波高が蛋白分子中のS H 基、S - S 基にもとずくことからボーラロガン反応として初め臨床上に応用されたものである。しかしガンの血清で見られる波高の低下がS H 活性の真の低下か、ガンの時に見られる低蛋白血症に由来するか不明と云うことで利用されなくなっている。したがってサケの血清のボーラロ蛋白波に見られる蓄養にともなう波高の増加が第1図から知 F れる蛋白量の低下に起因するかどうかを知るため、測定時の試料中


第2図 血清ポーラロ波高のそ上・成熟との関係(1971年)




図中の記号○および△は雌魚および雌魚を表わし、実線および点線はそれぞれ測定時の最終血清 濃度 1 %および血清濃度を基準にして蛋白量 2 g/d 1 相等にまで稀釈した時の波高を表わす。



実線および点線は測定時の試料濃度が血清に換算して192%およびこの時の試料濃度を基準にして 血清蛋白量が2g/d1相等になるまで稀釈した時の波高を表わす。その他の記は1図を参照



0.1



-210-

た。その結果第2および第4図に示したとおり蛋白量の補正をしないものと同じ傾向を示した。 この波高の増加は血清中の蛋白含量とは無関係であることが推察される。

の蛋白量を完熟時のほぼ最低である29/ α1相当になるまで稀釈してその波高の変化を調べ

次に第2反応の波高については年次による大きい違いはなく、1971年に較べてむしろ 1972年の方が小さな値を示した。このことから第2反応の波高に関与する活性物質の濃度 の年変動はあまりなかったものと推察される。

なお、完熟時に血清蛋白量が著しく増加した個体 y 3 3 5, y 3 3 8 および y 7 8 5 (1972 年 1 1 月 8 日 測定)では、いずれも第 2 反応の波高が著しく増加した。すなわち、同時期の他の 5 個体の平均波高が第 1 波の波高で 9 8 2 ± 1 1.5 xxxであったのに較べ同じく y 3 3 5 では 1 2 4.7 xxx, y 3 3 8 では 1 5 1.8 xxx, y 7 8 5 では 1 5 2.7 xxxであった。しかしながら 1 9 7 2 年 1 1 月 2 2 日に千歳川西越採卵場で採取した完熟魚 5 尾のうち N - 1 は y 3 3 5, y 3 3 8 および y 7 8 5 と同様に血清蛋白量が他の 4 尾 (3.6 ± 0.5 9 / d 1)に較べて y 3 3 5, y 3 3 8 および y 7 8 5 と同様に査し付金の 4 尾 (8 1 9 / d 1)にもかかわらず、第 1 波の波高で第 2 反応の波高は他の 4 尾の平均が 8 3 2 ± 6 5 xxxであるに対して N 1 は同じく 4 3 3 xxxxと遊楽部の魚とは逆に著しく小さい値を示した。

この第2反応の波高の増加および減少にみられた異常は血液の泳動像のうえにも異常がみられている。

なお若年魚として用いた飼育サケ1年7ケ月のポーラロ 波 高は第4 図、第5 図に示したとおり、未熟魚でありながら第1 反応および第2 反応ともにその波高が高く、とりわけ第2 反応の波高は先にのべたとおり完熟魚の第1 波の波高が98.2 ± 11.5 800 であったのに較べ雌魚では同じく113.0 800 なよび129.0 800 0, 雄魚では同じく123.2 800 なよび129.8 800 0と異常に高い値を示した。

ところで変性血清濾液のボーラロ蛋白(第2反応)は、血清蛋白の一分画であるムコ蛋白という一種の糠蛋白質に起因する現象とされ、このものがガン血清中で著しく増加するためガン診断の一方法として古くは利用されたものである。しかしこの第2反応のボーラロ蛋白波については結核、化膿炎症、肋膜炎、肺炎、腎炎、ネフローゼ、ストレスなど色々な疾患又は不極当な環境条件下におかれた時もガン血清同様に高い波を出すため現在のところ我国ではガンの診断には利用されていない。しかしこの血清瘟液のボーラロ蛋白波については前記の疾病以外に、高度な栄養障害や流行性肝炎、肝硬変症、肝萎縮、薬物中毒など肝臓に病変の生じる疾患にあたっては特異な異常に低い波を出すことが知られている。

以上のことから蓄養によるボーラ波の増加はムコ蛋白が一種の糖蛋白でありまた 腺刺激ホルモンが一種の糖蛋白であることから、成熟にともなって分泌される性ホルモンに起因する増加も考えられ、また飼育魚が波高が著しく高いことから、蓄養中あるいは飼育中のストレスに起因することも考えられる。

3. ホルモン処理による成熟促進について

蓄養による第2反応のポーラロ波高の増加についてはその原因の1つとして前項に述べたようにホルモンの増加ないしは活性化が考えられ、またこのことから性ホルモン処理による成熟 促進の可能性が示唆される。したがって1972年には10月19日に予備実験として2表に 示した区分によって各種ホルモン注入してまず効果の確認を行い、10月30日から本実験として予備実験でいくらかは効果があったと思われたホルモン量を注入し、ホルモン処理による成熟促進効果ならびに血清蛋白の組成ならびにボーラロ波高との関係を調べた。

なお、補獲された親魚が採卵可能な状態にまで成熟するに必要な日数は第1図から知られると おり血清蛋白量の多い魚ほど多く、血清蛋白量は成熟度合を知る一つの指標にまでされている。 しかしからホルモン処理時の親魚の成熟度合は血清蛋白量から見てまちまちである。このため 効果の判定法としては、第6図に示したように実験開始時の血清蛋白量と完熟までの日数との関 係がホルモン処理によってどのように変るかを調べることにした。

その結果、シナホリンを24,000~25.000RU注入した親魚はいずれも生理的食塩水を注入したものより実験開始時の血清蛋白量は多いのに、完熟するまでの日数は少ない傾向にあることが知られた。このことからシナホリン24,000RUの注入は完熟時期を促進させる効果のあることが推察される。また同様にゴナトロピンとセロトロピンを併用した場合もいくらかは成熟ないし排卵を促進させる効果があったように見うけられる。

4. そ上および蓄養とポーラロ波高との関係について


サケ血清のボーラロ波の蓄養にともなう増加については、成熟と相関関係が見られることから2項に述べたように性ホルモンの活性他と関係することが考えられる。しかしながらこの増加は、飼育魚の波高とりわけ第2反応の波高が高かったことから蓄養中のストレスに起因する現象とも考えられる。

これらのことからサケ血清におけるポーラロ波高の増加は、成熟現象による生理的反応なの か環境に起因する生理的反応ないしは保障現象なのか明らかでない。そこでホルモン処理によ る成熟促進試験の結果を整理し、蓄養時に現われる波高の増加と成熟との関係を検討した。 その結果を第7図および第8図に示した。


すなわち、ボーラロ被高は第7図および8図に示したように第1反応および第2反応とも成熟状態とは無関係な値を示し、シナホリン注入区および対照区で第2反応の波高が異常に増加していることが知られた。


以上のことから、第2反応の波高の増加は性ホルモンではなく蓄養にともなうストレスが主因のように思われる。しかしこの増加が成熟促進効果の見られたシナホリン注入区と生理的食塩水を注入した対照区で主に見られたことについてはその原因が明らかでなく、今後に問題を提起するものと考える。しかしながら第2反応の増加が一般に云われているとお)ムコ蛋白の増加と考えられることから、このものの増加は環境の悪化またはその条件によって生じた魚体の保障機能の現われとも考えられ、このものの多かはその時の環境条件を良否を判定する1つの要素になることが示唆される。

なお、第2反応の波高と第1反応の波高との関係については、種々の疾病において逆相関にあることが知られている。しかしながらサケ血清における第1反応の波高は第7図および第8図から知られるとおり特別な関係は認められない。したがって、サケ血清のボーラロ第1反応に見られる波高は、先にのべたように西越の魚の波高が年次によって著しく異ったことから、この生体反応は海洋での生残りないしは環境条件を推測するための独立した1つの手段になる可能性を提起するものと考えられる。



-212-





第8図 変性血清戸液ポーラコ放高の蓄養にともなう変化とホルモン処理との関係 図中の処理魚の記号は6図を参照

要

- 1. シナホリンの 2 4,0 0 0 R U注入は未熟なさけ雌魚の成熟を促進させる効果のあることが認められた。
- 2. 血清蛋白量ならびにヘマトクリス値から見た血液性状の成熟にともなう変化については1962年および1963年の結果と同様な傾向を示した。またこれらの値は1967年の報告で述べたとおり魚体の生理上の内的条件が回帰年次によって違うことを意味するものと考えられる。
- 3. 血清のボーラロ反応において、第1反応および第2反応はともに蓄養中に増加することが知られた。
- 4. 蓄養中のポーラロ波高の第2反応に見られる増加については、主にその魚がおかれている環境に支配されているように思われるが、その原因については明らかではない。しかし環境条件の良否やそれによって生じる内的条件の変化(例えば疾病など)を知るための1つの指標になることも示唆された。
- 5. 血清のボーラロ第1反応の波高ならびに稀釈時に現われる特種な極小波の出方は回帰年次によって著しくことなり、海洋生活時の生残り、また環境条件を知るための手段になる可能性のあることが示唆された。

(2) 同一系統群の品種改良試験調査

北海道の河川にそ上するさけ成熟魚は 4 年を主群に $3\sim5$ 年の年令から構成されている。さけの数量を増大する目的では、そ上してくる各年級魚をとりまぜて採卵、受精をおこなわなければならない現状にある(若令雄魚は使用しないようにしている)。しかしある河川起源の種族魚群の減少を防ぎ、維持あるいは変えるような場合、また必要とする大きさと年級群の樹立及び大きな形態を持つ早熟魚群の育成などの質的改良もまた数量共々に今後の重要な課題であろう。

それゆえ同種間のこれら品種改良の基礎資料を得るため、遊楽部川にそ上してくる魚の中から低令成熟群(3年魚)及び高令成熟群(5年)の雌雄による交配をおこなった。すなわち交配稚魚を放流して回帰してくる成熟魚の年令がある程度遺伝的要素を継承するものか、あるいは稚魚、幼魚時代の生育の良否による生長度合によって決まるものかを調査するためである。

前年度試験は諸種の要因により経験上から魚体の大小によって低令、高令を区分したため、高令群(5×5)と低令群(3×3)に4年魚が混入してしまったので、本年は交配 卵 作 成前に検鱗装置で鱗の年令を確認し、まぎらわしい年令の魚は取りのぞくなど精度をあげた。

(経過)

試験に使用した魚の雌、雄を混合した魚体測定は次表(I)のように 5×5 群のフォーク・レングスは $75.0 \sim 87.5$ cmに対し、 3×3 群 $54.8 \sim 68.0$ cm、の平均で5 年旬が3 年魚の1.28 倍に当る。

(1)

<i>i</i> = 4		GI TU		魚 体	測気	Ė	
組合せ	尾数	性別	体 重	全 長	フォーク	体 長	頭 長
	3 6	2+3	Kq 4.5~8.1 (6.3 7)	cm 7 5.0~9 1.0 (8 3.8 4)	cm 7 5.0~8 7.6 (8 0.7 6)	cm 6 9.0~8 2.0 (7 5.8 5)	cm 1 4.5~2 2.7 (1 9.9 3)
5×5	11	8	5.2~8.1 (6.58)	7 8.4~9 1.0 (8 4.1 9)	7 6.0~8 7.6 (8 0.9 6)	7 1.6~8 2.0 (7 6.1 7)	2 1.5~2 5.0 (2 1.8 1)
	2 5	· - 2	4.5~7.8 5 (6.2 3)	7 5.0~8 7.8 (8 3.4 9)	73.0~79.4 (80.56)	6 9.0~7 9.4 (75.5 2)	1 4.5~2 0.1 (1 8.0 6)
	165	2+3	1.5 5~3.9 (2.5 9)	58.0~72.0 (64.85)	5 4.8~6 8.0 (6 2.4 0)	5 1.2~6 8.2 (5 7.7 6)	1 1.9~1 7.3 .(1 4.9 0)
3×3	6 4	8	1.5 5~3.9 (2.3 4)	58.0~69.2 (62.06)	5 4.8~6 5.6 (6 0.2 3)	51.2~63.2 (55.10)	1 2.1~1 7.3 (1 5.8 4)
	101	2	2.0~3.6 (2.84)	5 9.4~7 2.2 (6 7.6 4)	58.8~68.0 (64.56)	5 5.0~6 8.2 (6 0.4 2)	1 1.9~1 6.1 (1 3.9 5)

註:()は平均値

 5×5 , 3×3 各群の雌雄別の計測範囲は、それほど差がないが、前者ではフォーク・レングスで雄が大きいのに反し、後者では雌の方が多少大きい。雌雄を含めた高令魚の体重は、低令魚の約 2.4 倍、フォーク・レングスでは 1.2 倍であった。

年令は高令群では凡て5年魚であったのに反し、低令群中に1.82%の疑問魚が含まれたが、

魚体の大きさから3年魚に入れた。

交配卵は、高令群は10月23日~12月11日の間に88.000粒, 低令群は、10月28日~12月18日の間に253.000粒を作成した。

次に代表標本による卵径範囲は、高令群卵が大きく $7.3 \sim 9.5$ 畑であるのに対し、低令群では $6.0 \sim 7.5$ 畑で, 平均では前者は 8.02 畑、後者は 6.64 畑であった。これは前回の卵より、高令群平均は大きく、低令群では小さかった。

両組合せ卵より孵出直後の稚魚、前期仔魚の魚体測定を下表(2)に示したように、全長、体重、 頭長ともに高令群稚魚の方が低令群稚魚より僅か大きかった。

(2)

組合せ	全 長	頭長	全 体 重	卵 黄 部	卵黄をとった 魚体重
3 × 3	1.8~2.1 (2.0 9)	0.35 (0.35)	0.17~0.21 (0.20)	9 0.1 3~0.1 6 (0.1 5)	9 0.0 2 5 ~0.0 3 9 (0.0 3 5)
5×5	1.9~2.2 (2.1 0)	0.3 ~ 0.4 (0.3 6)	0.26~0.29	0.20~0.24	0.0 3 3~0.0 4 3

以上より高令魚群の卵は低令魚群のものより大きく、稚魚の魚体範囲も大きい傾向がある。 これから成魚として回帰してくる時の両組合せ群を識別するために高令交配稚魚には脂びれ、 左腹びれ及び低令交配に脂びれ、右腹びれにそれぞれ標識して48年4月14日・29日の 2回に分け高令群稚魚60,000尾、低令群103,000尾を放流した。

4. さけ・ます資源動態ならびに生物統計に関する調査

(1) さけ・ます稚魚の標識放流試験調査

さけ、ます稚魚の標識放流試験は下記の通り夫々の目的にそって行なった。

魚	種	河川名	放流時期	放流尾数	標識部位	目的
			1973. 2	万尾 20	脂でれ	######################################
さ	け	千歲川	// 3	2 0	左腹びれ	放流時期の相異による回帰 効果の確認
			″ 4	2 0	右腹びれ	
さ	H	遊楽部川	1973. 4	1 0.4	脂びれ, 左腹	3 × 3 5 × 5 } 優良品種の育成
	1)	MINCHARLES III	" 4	1 0.3	″ 右腹	5×5
からよ	is E	湧 別 川	1973. 4	9.8	脂びれ, 左腹	放流場所の相異による回帰
幸	す	粉 加 川	″ 4	1 0:1	" 右腹	効果の比較

(2) 稚魚期における標識魚の回帰実態調査

放流時期あるいは飼育効果の検討のため稚魚期に標識して放流しているが、そのうち1972年に 回帰したものは次の通りであった。

• 遊楽部川より放流したさけの再捕結果

飼育効果の検討のため1969年春遊楽部川より標識放流を行なったが、4年魚としてその一部が1972年秋に回帰した。その結果は次の通りである。

D 放 流

放流河川	放流時期	放流数	標識部位	飼育状況	目	的
游楽部川	1969.4月上旬	万尾 15.5	左腹びれ	無飼育	飼育効果の	☆ ∋+
近架部川	// 5月上旬	1 5.5	右腹びれ	飼 育	即自如木の	突出)

o 再捕結果

4315 344 42.	河川	内	八雲	沿岸	長万部	沿岸	計	1
標識魚	尾数	比	尾 数	比	尾 数	比	尾数	比
左腹(無飼育)	10	倍 1	6	倍 1	48	倍 1	6 4	倍· 1
右腹(飼育)	2 5	2.5	1 0	1.7	104	2.2	139	2.2

以上の通り河川内、沿岸域における無飼育群と飼育群との回帰効果は異なっており、飼育群の方

が2.2 倍の効果がみられた。しかしながら放流時期が1ヶ月程度のづれがあり、直ちに飼育効果と 判断するのは難かしく、放流時期の差異によることも考えられるので今後検討を要する課題である。 しかし、現時点では1969年の春の環境条件下では4月に無飼育放流よりも飼育することによっ て放流時期を若干遅らすことが回帰効果を高めることになったということは認められる。

• 遊楽部川より放流したからふとますの再捕結果

同一発生時期の群の飼育期の差異による回帰効果の検討のため**1971**年春遊楽部川より標識放 流を行なった。

○ 放 流

放流河川	放流時期	放流数	標識部位	飼育状況	目 的
遊楽部川	1 9 7 1. 3.1 6 " 4.1 0 " 5. 5	万尾 1 0.5 1 0.4 1 0.5	脂 び れ 左腹びれ 右腹びれ	39日間 0.29 64日間 0.47 89日間 0.82	飼育期間の差 (放流時期の差)

o 再捕結果

+785	55h	4.		河)	11	内	八	雲	沿	岸	長	万音	部沿	岸		Ē	it	
標	識	,魚		尾	数	比	率	尾	数	比	率	尾	数	比	率	尾	数	比	率
脂ぴれ	(39	日間飼育)		3 2		% 5.4		1 0		9.3		1		4.4		4 3		5.9
左腹びれ	(64	")	1	3 0	2	1.8		20	1	8.7		3	1	3.0	- 1	5 3	2	1.1
右腹びれ	(89	")	4	3 3	7	2.8		7 7	7	2.0		19	8	2.6	5	29	7	3.0

以上の通り、約3ヶ月間飼育して体重で他の2群の2倍以上の大きさで5月5日に放流した群が 圧倒的に高い回帰効果(39日間飼育・3月16日放流群の12.3倍,64日間飼育・4月10日 放流群の3.5倍)を示したが、これは飼育による魚体の大型化によるものか、それに加えて放流期 の環境条件がよかったかそのいずれとも判断出来ない。

しかし、少なくとも 1.9.7 1 年の環境条件下では飼育による魚体の健全大型化して 5 月上旬に放流したものがこのように回帰効率が高かったことは注目に価しよう。

(3) さけ・ますの生物統計調査

昭和47年度の北海道沿岸河川えのアキサケ来遊量及び主要河川の年令組成は下記の通りである。

• アキサケの来遊量

尾 数(単位 千尾)

1	每区名		オホーツク	根 室	エリモ以東	エリモ以西	日本海	計
沿	ŧ		3,2 4 8.8	1,6 8 4.1	1,0 8 3.4	3 0 5.5	2 1.1	6,3 4 2.9
河	J	П	2 1 5.0	9 6.4	2 3 4.9	3 7.1	3 0.8	6 1 4.2
	計		3,4 6 3.8	1,7 8 0.5	1,3 1 8.3	3 4 2.6	5 1.9	6,9 5 7.1
溯	上图	枢	6.2	% 5.4	1 7.8	1 0.8	% 5 9.4	% 8.8

1972年(S·47) アキサケ年令組成

¥- E- 4			4.	W. D.I	A	年	令 組	成	
海区名	70]	Л] :	名	性別	2	3	4	5	標本数
				우		1 8	8	3	2 9
	岩月	宒 別	Ш	8		1 0	2	6	18
				計		28 (5 9.6)	10(21.3)	9 (1 9.1)	4 7
				우		5 3	2 7	1 1	9 1
オ	斜	理	Ш	8		5 9	2 3	2	8 4
				計		1 1 2 (6 4.0)	5 0 (2 8.6)	13(7.4)	175
ホ				우	1	8 5	4 5	1 5	1 4 5
	網	走	Ш	8	5	115	3 3	6	159
1				計	5 (1.6)	200 (65.8)	78 (25.7)	21 (6.9)	3 0 4
				2	1	179	1 2 5	5 9	3 6 3
ツ	湧	別	Щ	8	1	2 4 4	9 1	2 1	3 5 7
				計	1 (0.1)	4 2 3 (5 8.8)	216 (30.0)	80 (11.1)	7 2 0
1				우		4 7	188		2 3 5
	徳元	ま 別	Ш	8	3	90	140	1	2 3 4
海				計	3 (0.6)	1 3 7 (2 9.2)	3 2 8 (7 0.0)	1 (0.2)	469
				우		196	6 9	5	270
区	幌	別	Ш	8	1 7	4 4 9	1 2 5	1 0	6 0 1
				計	17(2.0)	6 4 5 (7 4.0)	194 (22.3)	15(1.7)	871
				우		4	18	1	2 3
	屯	别	Ш	8	3	11	8	,	2 2
				計	3 (6.7)	15 (3 3.3)	26 (57.8)	1 (2.2)	4 5

海区名	্যান্য বিশ্ব	101	Þ	性別			年	令 組	成	
供区石	(11)]]]	石	生加	2		3	4	5	標本数
				우	,		10	5 0	. 2	6 2
	羅	日	H	8	3		2 0	3 0	1	5 4
				計	3 (2	.6)	3 0 (2 5.8)	80 (6 9.0)	3 (2.6)	116
				우			2 4	3 7	4 8	109
根	蒸	別][]	8	2		22	2 5	2 6	75
仗				計	2 (1	.1)	46 (25.0)	62 (33.7)	7 4 (4 0.2)	184
				9			3 9	163	18	2 2 0
室	伊茶	: 仁	J\$}	8			130	4 0	3	173
				計			169 (43.0)	203(51.7)	21 (5.3)	3 9 3
				우			4 1	6 0	4 1	1 4 2
海	標	津	Ш	8			104	6 7	4 1	212
				計			1 4 5 (4 1.0)	1 2 7 (3 5.9)	82 (23.1)	3 5 4
区				우			1 3 1	8 1	12	2 2 4
	西	别	111	8			189	4 8	9	2 4 6
				計			3 2 0 (6 8.1)	129(27.4)	21 (4.5)	470
				9			2 9	18	3	5 0
	風	蓮	Ш	8			3 4	1 3	3	- 50
,				計			63 (63.0)	31 (31.0)	6 (6.0)	100
				우				103	6 5	168
	別寒	辺出	-111	8			2	1 3 2	4 1	175
エ				計			2 (0.6)	2 3 5 (6 8.5)	106 (30.9)	3 4 3
1)				4			5 3	212	6 1	3 2 6
モ	釧	路	Ш	8	13		2 5 1	197	19	480
以		,		計	13(1.	6)	3 0 4 (3 7.7)	409 (50.7)	80 (10.0)	806
				우	1.0		5	175	6 6	246
東海	+	勝)11	8	7		9 0	1 4 7	5 1	295
				計	7 (1.	3)	95 (17.6)	3 2 2 (5 9.5)	117 (21.6)	5 4 1
区	-			9			11			1 1
	歷	册	Ш	8			2 7	^	1	2.7
				計			38 (100.0)			3 8

海区名	河川名	性別		年	令 組	成	
1442-14	15 /11 44	12.77.3	2	3	4	5	標本数
		2		91	3 8 7	2 5	5 0 3
	遊樂部川	8	8	302	2 3 0	15	5 5 5
エ		計	8 (0.8)	3 9 3 (3 7.1)	6 1 7 (5 8.3)	40 (3.8)	1,0 5 8
1)		2		138	3 1 9	4 8	5 0 5
モ	茂辺地川	8	1 3 6	2 4 3	203	17	5 9 9
以		計	1 3 6 (1 2.3)	3 8 1 (3 4.5)	5 2 2 (4 7.3)	65 (5.9)	1,1 0 4
西西		9	9 1	3 2	267	60	359
海	亀. 川	8	2 6	117	1 4 4	28	3 1 5
区		計	26(3.9)	1 4 9 (2 2.1)	4 1 1 (6 1.0)	88 (1 3.0)	674
12.		4		1	2 1	6	2 8
	知 内 川	8		1	1 7	1	. 19
٠		計		2 (4.3)	38 (8 0.8)	7 (1 4.9)	4 7
		우		6 2	2 4 4	. 5	311
	石 狩 川	8		134	207	7	3 4 8
		計		196 (29.8)	451 (68.4)	12(1.8)	6 5 9
		9		4	2 8	8	4 0
日	天 塩 川	8		11	4 8		5 9
		計		15 (15.1)	7 6 (7 6.8)	8 (8.1)	9 9
	y	2		A	211		2 1 1
本	暑寒別川	8		2	2 2 3		2 2 5
	ŝ	計		2 (0.5)	434 (99.5)		4 3 6
		2			3		3
海	増 幌 川	8		·	4	1	4
	,	計			7 (100.0)		7
		9		47	198	26(271
区	利別川	8	7	107	1 5 5	15	284
		計	7 (1.3)	154 (27.7)	353 (63.6)	41 (7.4)	5 5 5
		2		1 3 0	155	2, 4	287
,	厚沢部川	8	4	205	8.5	2	296
		計	4 (0.7)	3 3 5 (5 7.5)	240(41.1)	2 (0.4)	583

• 来遊状況

今年度のアキサケの来遊は695万尾であり昨年度に次ぐ豊漁であった。そして、各海区とも好漁に恵まれたが特にオホーツク海区が著しかった。各海区の来遊状況は次の通りである。

① オホーツク海区

この海区は346万尾と前例のない多くの来遊がみられた。そして紋別以西への回帰群は4年 魚が主群であり、数量的に多い湧別以西の回帰群は3年魚が主群であり、1969年度にこの海 区より1億尾と多くの種魚の放流を行なったにもかかわらず回帰効率は低下しなかった。

② 根 室 海 区

この海区は180万尾の来遊があり好漁であった。知床半島部では来遊量の多かったオホーツ ク海区系を多獲し、標津沿岸では標津川、伊茶仁川系が多く回帰したためであり、標津川系は3 年魚、5年魚の来遊が例年より多かった。野付半島以南域では根室半島部は好漁であったが別海 沿岸は不振であり、この海区の大河川の一つである西別川系は3年魚が主群であった。

③ エリモ以東海区

この海区は132万尾の来遊があり昨年度には及ばないが好漁であった。この海区の代表河川の十勝川系は例年より3年魚,4年魚の回帰魚は少いが5年魚は多く、釧路川は3年魚の回帰が多かった。

④ エリモ以西海区

この海区は34万尾とこの地区系が多く回帰したにもかかわらず昨年度を下廻った。これはエリモ以東海区系が日高沿岸域えあまり回遊しなかったためである。また,遊楽部州,茂辺地川系はともに若令魚の出現が多かった。

⑤ 日本海区

この海区は 5 万尾と昨年度を上廻りその主群は 4 年魚であり,石狩川系は 3 年魚の出現も比較的多かった。

5. 環境条件ならびにその保全調査

(1) 溶存窒素ガスならびに水温の変化がさけ仔魚の発生に及ぼす影響についての調査

中川事業場において昭和42年以来数次に亘って発生したさけ仔魚の死亡については、用水に窒素ガスが多量に含まれていた事から溶存窒素ガスによるガス病(ガス血栓症)に起因した死亡事故と推定されてきた。また同様に幕別事業場や民営の元浦川ふ化場に発生したふ化仔魚の死亡についても、用水中のガス量や温度にそれぞれ急激な変化が見られた事から溶存ガスのガス圧変化によるガス病が原因とも考えられてきた。このため用水中に多量の窒素ガスを含む札内事業場の自噴水を用いて実験的に用水中の窒素ガス量を制御し、ふ化仔魚の発生に及ぼす影響を観察したのでその結果を報告する。なおこの実験では化学物質の人為的な注入による水質の制御とは異なり、天然水に含まれるガス体を天然の水を用いての制御であるため今後のこの種実験への参考として実験法の可否についても考察すると共に、附随的に生じた各試験の温度の差が仔魚の発生にどのように影響するかについて検討し

~ 方法および結果 ~~

1. 溶存ガスの測定法

た。

溶存酸素および窒素の定量には菅原、小山、た伯²)らによる炭酸ガスによる誘出法を用いた。との場合、試薬の調整、濃度量あるいは実験操作の練度などに起因する誤差を出来るだけ少なくするように測定法に若干の改良を加えたものを用いた³。しかしこの方法では炭酸ガスの発生に際して反応を促進させるために試水瓶を温湯で加温したり、またその他の反応にともなってガスビューレット内のガスの温度が上昇するため、読みとられたガス量は試水中の正確な溶存ガス量を表わさない。とのため溶存量の測定にあたってはビューレットのガスが溜った部分の器壁に水銀温度計をあてがって水銀柱に変化がみられなくなった時の温度を読みとり、内部のガスの温度を出来るだけ正確に知るようにし、測定時におけるガス体の温度による誤差を下式により補正した。

$$V CC/\ell = \frac{(273 + t_1)b}{273 + t_2}$$
 但し $t_1 C =$ 試水の水温 $t_2 C =$ 測定時のガス $= -$ 般には室温 $= t_2 C$ の時のガス体精

なおガスビューレットについては製作上の目盛りの付方あるいは管経の不均一さなどから、内容 積が極めて不正確であるうえにこの方法が質量分析法であることからメトローム社製のメカニカル ピューレットを標準品として目盛の補正を行なった。


2. 試供卵ならびに実験月日

試験用のさけ卵は19.72年12月16日千代田採卵場で得られ、のち札内事業場に収容された

もので、1973年1月9~10日頃発眼したものである。またこの実験は1973年1月31日から同年3月16日までの44日間にわたって行なった。

3. 試験水の調整

試験用水は1表に示した自噴水とメム川の川水を1図に示した装置により混合調整した。また流量の調整は全て先を細めたガラス管の先端の孔径を変化させて行なった。



1 図 ガス実験用飼育装置

I …実験水槽 II …自噴水 II …川水 №…混合槽(1 ℓ ボリ瓶) V …自噴水 VI…川水 VI …ボンブ VII…実験水槽の温度調整用注入管

1 表 試験用原水の溶存ガス量

測定月日		1 9 6 8.	1. 3 1	1 9 6 8.	3. 1 5
用 水 名		自噴水	川水	自 噴 水	- 川 水
水 温℃		1 5.9 → 1 2.1	3.2 → 6.9	1 6.0 → 1 2.9	3.8 → 7.1
溶存量 CC./ℓ	N	2 1.7	1 7.3	2 0.8	1 7.4
俗仔里はノと	02	0.1	8.9	0.2	8.4
飽和度 CC. %	N	151	1 0 8	1 4 6	109
起和及 以 %	02	2	104	3	9 9

註 水温中→印は自噴水は川水で、川水は自噴水でそれぞれ温度処理を行なった前後の値を示し、飽和度は全て温度処理後の水温条件における値を示す。

なおことで用いた原水には著しい温度の差があったため、それぞれ一旦ふ化槽に溜めたのち、軟質ビニール管を用いて互い違いに前述のふ化槽中に導びいて温度差の減少を計った。そして試験水はこのような用水の混合によって調整しようとしたが自噴水が無酸素状態であったため、まずこのような水の混合で、どのような酸素溶存量の試水が調整出来るかを計算した。この結果2表に示したように4区および5区では、溶存酸素が著しく欠乏することが知られたので、これらのガス濃度の試験区では金魚飼育用のエアーストンを用いて通気し、酸素の補給を計った。その結果得られた各試験区の溶存酸素量および窒素量を3表に示した。

2表 自噴水と川水の混合による水質の変化(推算値)

試	水		昌	CC/分	rk	温 ℃	溶	存	量の	C./l	飽	和	度	%
験	731		2002	CIC 75	73.	una C	1	12.		0 2	D	1 2	C	2
	1/3	3 1	3/	15	1 /21	2 /1 5	1 /21	2 /15	1 /2 1	2 /1 5	1 /2 1	3/15	1 /2 1	2 /1 5
X	自噴水	川水	自噴水	川水	1/31	3/13	1/31	3/13	1/31	3/13	1/31	3/13	1/31	3/13
1	200	648	145	350	8.12	8.80	18.33	18.40	6.84	5.99	117.9	119.6	82.5	73.5
2	240	510	168	300	8.56	9.18	18.70	18.63	6.10	5.45	120.9	122.0	74.5	67.5
3	290	348	228	215	9.26	10.09	19.29	19.15	4.92	4.18	126.5	127.7	61.0	52.8
4	480	230	370	135	10.42	11.35	20.27	19.88	2.96	2.39	135.4	132.8	37.6	31.1
5	694	90	520	110	11.50	11.89	21.19	20.19	1.12	1.63	145.2	139.4	14.6	21.4

3表 自噴水と川水の混合による水質の変化(実測値)

試		-tr	79		飽和	度 %		
験		水	温	N	2	0 2		
X	1/31	3/15	期間内平均 X ± t O ₅ ·SE	1/31	3/15	1/31	3/15	
対照	6.9	7.1	6.4 ± 0.1	1 0 8.0	1 0 9.3	1 0 4.4	9 8.7	
1	8.1	8.4	7. 4 ± 0. 2	1 1 7.5	1 1 6.6	8 3.0	7 4.8	
2	8.6	9.5	8.0 ± 0.2	1 2 0.9	1 2 2.7	7 7.6	6 3.0	
3	9.4	9.9	9.0 ± 0.3	1 2 3.2	1 1 9.3	7 1.4	6 7.5	
4	1 0.2	1 0.6	9.8 ± 0.3	1 3 0.4	1 1 6.8	5 5.0	6 6.0	
5	1 1.3	1 1.4	10.7 ± 0.3	1 3 3.9	1 2 1.0	4 2.7	5 1.1	

なお実験中自噴水を導通した水槽およびバイブ内には著しくノロが発生し、流量調整用のノズル

に附着して流量が減少した。このため実験開始23日以降には装置の清掃を行い実験を続行した。 しかしこの際通気量調整用の予備のエアストンを誤って投入したため、4区、5区での答存窒素量 は3表に示した通り著しく減少した。

~~ 結果および考察 ~~

1. 実験条件の検討

実験期間中に窒素ガスの溶存状態を推定するため、3表に2月2日から3月15日までの水温を 測定し、その変化を信頼巾で示した。そしてその結果によれば先に述べた2表および3表の値から みて実験期間中の自噴水と川水との混合比には大きな変化が生じなかったことを示唆するものと共 に実験方法としてほぼ満足すべきものと考えられる。

2. ふ化と死亡

しかし、この日数と水温との関係は、3 図から知られる通りより簡単な一次の式でも表わされる。 そしてこの式から、水温の変動が1日につき1 であった場合ふ化までの日数は、およそ1.2日の割で増減することが推察される。また、このことから、温度率化によるふ化日数の変化は簡単に予測可能とかり、発眼卵の輸送時にけしげしば発生している温度上昇に起因したふ化促進が原因の死亡事故を予測し、かつ防止することが可能にかるものと考えられる。


なお対照区では、3図からも知られるように日数と水温との関係が回帰線から著しくずれ、逆に ふ化が促進されたような結果となった。この原因については不明であるが、対照区の水温が供試卵 が最初におかれていたところの水温 (9.9.C)り著しく低かったため、冷ショックの様な作用が1つ の原因になったことも考えられる。

次に今回の実験期間内(44日間)における仔魚の死亡については4表に示したとおり4区で多量に発生した以外、特別なものはみられなかった。

4表 実験中の死卵数および死魚数

試	験	区	対 照	1	2	3	4	5
\$	化	前	0	3	0	0	0	0
\$	化	後	0	. 0	5	3	5 9	4

2図 実験開始後の経過日数とふ化率との関係



図中の記号は実験区を表わす

· · · · 対照区

○··· 1 区


□ … 2 区

△ … 3 区

X ... 4 🗵

1

3 図 ふ化率が 8 0 % および 9 0 % の時の水温と実験開始後の経過日数との関係



図中の記号・印はふ化率90%, ×印は同じく80%の時の関係表わす。

I ... $D = -1.22\theta + 16.5$ $\gamma = -0.9946$ II ... $D = -1.23\theta + 16.0$ $\gamma = -0.98907$ III ... $De^{0.05125\theta} = 61.66$ $\gamma = -0.8016$ $\rightarrow log D = -0.118\theta + 1.7901$ IV ... $De^{0.06171\theta} = 88.55$ $\gamma = -0.98886$ $\rightarrow log D = -0.1421\theta + 1.9472$

そしてこの異常を死亡については26日目に川水用の送水ポンプの停止事故があったため、川水による酸素の供給が停止して試験水中の酸素が欠乏したためと考えられる。なか5区で死魚の発生を見なかったのは前述のとおり通気用のエアストンが4区より多かったことから、通気量の差によるものと考えられる。

以上の結果から、今回の実験においては溶存窒素ガスによる仔魚の死亡はなかったものと考えられる。そして3表に示した結果から、さけの仔魚はふ化から44日間と云う卵黄吸収直前の状態の時まで少なくとも2区およぶ3区まで測定された121~123%およぶ123~119%と云う溶存窒素の条件下で飼育されても、窒素ガスに起因する死亡は起らないものと考えられる。また窒素ガスの溶存条件が清掃時の手違いによって明らかに通気量が変更された時(2月23日)までほぼ1月31日の設定時の状態を維持していたとすれば、4区および5区にガス病の兆候が認められなかったことから、さけの仔魚は4・5区のような高濃度の窒素溶存条件下(130%および134%)にふ化完了から17日および18日間おかれても、ガス病による死亡は起らないものと考えられる。しかし中川事業場や元浦川ふ化場で発生した死亡事故については、今回の実験結果と異なり、たしかに江草らの報告に見られるようなガス血栓症状が見られていたこと、および用水に比較的多量の溶存窒素が測定されていたことなどから、溶存窒素による血栓症が直接の死亡原因と考えられている。したがって、過去の死亡事故については窒素ガス以外の別の生物学的要素、例えば死亡した仔魚が移殖卵とか終漁期のそれも酷寒時に得られたもので、ふ化後の仔魚の発育になんらかの支障のあるような卵質で、血管の形成が悪く、これらの条件が高濃度の窒素ガスと相乗して発生させたことも考えられる。

すなわち後期卵のような受精後に発生不良卵を出し易い卵にあっては環境やその他卵の取扱いなど色々な条件の影響を受け易く、溶存窒素の多寡にも著しく影響される可能性のあることを示唆するものと考える。

3. 仔魚の発育と水温との関係

飼育水の温度は先に述べたように直接ふ化時期に著しく影響する。そとでとの水温の違いがふ化後後の仔魚の発育にどのように影響するかを知るため、5表に示した実験終了時における各試験区の 仔魚の発育状態と環境条件との関係を実験期間の事均水温を用いて検討した。

なお仔魚の発育を制御する主を要因としては時間(日数)と温度が考えられる。また、この時間 と温度は積算温度として一元化することが出来ると同時に、実務的に見て最も有効な推算基準であ ると考えられている。したがって積算温度を用いて仔魚の発育に対する水温の影響を検討すること にした。

しかし、最も水温の高かった5区では卵黄吸収の極めて不良なものが多く混在し、また後述のように積算温度との関係が他区と著しく異かったことなどから、5区で得られた結果は一応検討資料から除外することにした。

5表 実験終了時の体重,体長および卵黄吸収度合と水温との関係

試 験 区	水温。	体 重 g	フォーク長 cm	卵黄重 体重 ×100(%)
対 照	6.4 ± 0.1	0.39 ± 0.04	3.29 ± 0.13	1 9.1
1	7.4 ± 0.2	0.39 ± 0.04	3.2 8 ± 0.01	1 6.2
2	8.0 ± 0.2	0.40 ± 0.04	3.39 ± 0.10	1 3.9
3	9.0 ± 0.3	0.37 ± 0.04	3.3 5 ± 0.08	1 0.9
4	9.8 ± 0.3	0.39 ± 0.03	3.35 ± 0.10	9.3
5	1 0.7 ± 0.3	0.36 ± 0.04	3.15 ± 0.10	1 2.8

すなわち、仔魚の大きさならびに卵黄の吸収度合は4図に示したように積算温度と密接な関係に あることが知られ, これらの関係は次に示したようにふ化日数と水温との間で知られている $T = \overset{\checkmark \theta}{=} K$ の式が成立つことが知られた。

重; Σ θ ∈ 107314 W = 1.212 × 10

長; ΣθΘ¹³⁰⁶²L $= 3.296 \times 10^{\circ}$

卵黄吸収度合 ; $\Sigma \theta e^{0.009592} = 6.219 \times 10^2$

但し Σθ = 積算温度 °C

₩ = 体 重 (8)

 $L = 7 \pi - 0 (cm)$


R = (残存卵黄重/体重)×100%

なお, これらの関係については, 先に述べた日数と温度との関係でも得られたと同様同じ精度で 一次の式で表わすことが出来る(4図)。またこの一次式の方が水温の影響を予測するうえでより 簡便なものと考えられる。"


したがってふ化後の仔魚の発育に対する水温の影響については一次の関係から推論することにす 30

すなわち、体重は一般には5図に示したように卵黄が吸収消費されるまでは時間の経過にともな って増加するとされている。しかしながら今回の実験では4図に示した卵黄の吸収度合との関係式 から卵黄の吸収は積算温度の増加によって促進され、水温1℃の上昇で30日間に体重に対して約 19%もより多く消費されることが推算される。しかし、体重は6図に示したように先に述べた一 般的傾向に反して高温区では残存卵黄量の少ない実験区ほど少なくなり、体長はいくらか増加する


の関係 펦 積算 N 40 极 T. * 0 魚 の任 浚 X



び実線は水温の違いによるる化時期の違いを補正したも で、 34 上段の図は積算温度を整数で表わし,下段は同じく対数で表わしたものである。 ので,ふ化率 9 0%時以後の極算温度との関係を表わす。



6 図 卵黄の吸収と体重,体長との関係



卵黄の体重に対する割合 (R)

図中の記号は2図参照

W = 0.00096R + 0.375 r = 0.345299 L = -0.0076P + 34.4 r = 0.65225

傾向がみられることから相対的に瘠せた体型になることが推察される。この水温の影響については、低温区でなお卵黄の残存量がかなりあることを考慮すると体型に著しい差の生じることが推察される。

以上のことから、環境水の温度上昇は卵黄の吸収を促進させて浮上を早めるけれども、必要以上にエネルギーの消費を促進させて瘠せた 魚に し、場合によっては浮上時の魚の健康に悪影響を及ぼす可能性のあることも示唆される。またこのことから、ふ化促進のためにふ化用水の温度を上昇させる場合には、浮上後の飼育や放流などその後の事業の遂行のために、浮上時の魚体の大きさや健康の良否なども充分考慮する必要があるものと考えられる。

4. 仔魚の発育に及ぼす内的要因について

仔魚の発育にともなう体重の変化については、一般的には卵黄の吸収について増加するが、水温の上昇など環境要因の変化によっては浮上時期や体型に著しい影響を及ぼすことは先に述べたとおりである。しかしながら、このさけ仔魚の発育過程でみられた浮上時期や魚体型の差異については環境水の温度以外にも生物学的な内的要因にも支配されているようである。

すなわち、7図に示したように同じ時期及び場所で得られた卵を用いた今回の実験では、個々の

仔魚の体重とその残存卵黄重との関係は全て正の相関関係を示し、一般的な通念に反している。との現象は8回に示したように、卵黄の吸収度合の著しい(残存卵黄量の少ない)仔魚ほど魚体重が少ないことから、同じ群の卵であっても卵黄に蓄積されているエネルギーの再同化効率に差があることを示唆するものと考えられる。そして同じ群の中で卵黄の吸収が早くて浮上の早い仔魚は浮上時の体重が少なく瘠せた体型になることが推察される。

~ 要 約 ~

環境水中の溶存窒素ガスや温度の違いがさけ卵のふ化や仔魚の発育にどのように影響するかを調べ と。

- 1. 試験水は札内事業場のボーリング水およびメム川の水を混合して調整した。またこれら用水には 著しい温度差があったため、実験にあたってはそれぞれの用水中にバイブを用いて互い違いに導水 し、温度差の軽減を計った。
- 2. さけ仔魚に対する溶存窒素の影響については、飽和度にして $121\sim123$ %の溶存条件下に卵黄の吸収直前(残存卵黄量が体重に対して9% が、の状態までおいても異常は認められない。また、ふ化した仔魚が、窒素ガスの溶存条件が $130\sim134\%$ (水温 $9.8\sim10.7\%$)のところ、に、ふ化後 $17\sim18$ 日までおかれても、窒素ガスによるガス病が起因の死亡は起らないものと推察される。

また過去に発生した中川事業場において仔魚の死亡は用水中の溶存窒素ガスの濃度以外に,卵自 体にも何か原因があったことも推察される。


- 3. さけ卵のふ化までに要する日数(T)は水温(θ)の影響を受け易く、水温の変化がふ化近くであっても、変化した水温とその時からのふ化までに要する日数との間には一般に田内・日暮の式として知られている ${\rm Te}^{\alpha\theta}={\rm K}$ の関係が成り立つととが知られた。ここでもは自然対数の底、 α は魚種によって異る恒数である。
- 4. 環境水の温度変化に上るふ化日数の短縮と水温との関係は簡単な一次式で表わすこともでき、温度 1 C/日 の増加はふ化をおよそ 1.2 H 日促進させることが推察された (3 図参照)。

またこのことから発眼卵輸送時にふ化が始まって死亡する事故を予測することが可能と考えられる。

- 5. 用水の温度の高低は発育過程にある仔魚に著しい影響を与え、高い水温下で発育した仔魚は低温 下におかれた仔魚より卵黄の吸収が早く瘠せた体型になり易い。
- 6. 同じ群から得られた卵であっても卵黄の吸収速度は異なり、吸収速度は異なり、吸収速度の早い 仔魚は浮上時期が早くかつ小型の稚魚になり易い。

◇ 参 考 文 献 ◇


- 1) 河出書房:化学実験学第1部·地球化学第3版(1943)P559~563
- 2) 佐伯有常:水産増殖(1957)5(1) P19~25
- 3) さけ・ますふ化場:さけ・ます人工ふ化事業実施要領(1970)参考4-9-10



-237-



00



-238-

(2) 釧路川の溶存アルミニウムの魚に対する影響調査

この報告では、これまでの結果から

- 1. 溶存アルミニウムの排出場所
- 2. 溶存量は過去よりも増加しているだろうか
- 3. 増加したとすればいつ頃からか
- 4. アルミニウムの魚に対する毒性はどうだろうか
- 5. この溶存アルミニウムの毒性の影響はどの範囲(流域)まで及ぶか
- 6. 溶存アルミニウムの性質と測定方法(測定時)の問題点
- などを検討したのでその結果を述べる。

釧路川のアルミニウムは1表に示したように近年湯川を経て屈針路湖へ排出される川湯温泉中のアルミニウム量が増加しているため、釧路川へのアルミニウムの排出量は2表に示したとおり近年急激に増加したものと推察される。

なお溶存アルミニウムの毒性については3表に示した魚および実験条件で測定した結果1図および4表に示したように、モノマー態の時に強い毒性があり、2表に示したとおり時には、1972年のように溶存量が非常に多く当別川の合流後にようやく安全濃度にまで減少することが知られた。そしてこのアルミニウムの排出は2図および3図に示したように戦後の経済の発展に伴って行なわれた温泉の開発により急激に増加したものと推定される。

1表 湯川より流入する Fe と Al の過去と現在の比

採	水年月日	1927/10.7	1938/7 · 31	196	8/9 · 6
流	量 m³/sec	(8月) 0.773			0.65
Fe	濃 度 mg/ l	1 2.9 4	2 5.2		4 7
T.A.	流下量 9/sec	1 0 0.0	1 9.5		3 0.6
Al	濃 度 mg/l		4 4.1		7 7
AI	流下量 8/sec		3 4.1		4 6.2
流	Fe	1	:		0.3 1
下量		,	, 1	:	1.5 7
比	Al		1	:	1.3 5

そしてこの開発は前後3回,大規模に行なわれているが,昭和40年,41年に行なわれた最後の開発直後に死魚の発見されたことは,興味あることと考える。そしてこの釧路川におけるアルミニウ

ムについては、このものの排出機構からみてその影響は今後共下流域へと移動していくものと考えられる。

2表 Al 濃度の流下にともなう変化

	s	t·.	N6.	川口からの	1 9	6 8		1 9 6 9)	1970	1971	1 5	9 7 2
	場	<u>1</u>	所	距 (Km)	4.19	9.5	3.2 5	4.1 1	5.7	4.2 0	5.7	4	27 28
][[(1)		0		2.9 3 (2.60)							
		(2)		2.1		2.6 2							
	美	(3) 豊	}!{	6.6		tr							
1	美	(4) 留 和	橋	7.2		2.0 (0.95)							
	美留	(5) 和川合	流前	1 0.7	1.6		1.89	1.5 4	1.75	1.9 0 (0.17)	2.3 2 (0.30)	1.98(0.5 2.04(51→0.34) →0.41)
	美	(6) 留 和][]	1 0.7	0.11	0.08							
	美留	(7) 里橋(合	流後)	1 0.9	1.6	1.5 5 (0.27)	1.8 9	1.6 6	1.58	1.2 5 (0.04)	1,82 (0.11)	2.04(0.3 2.10(34→0.15) →0.21)
	札	(8) 友 内	橋	1 3.2						1.1 7 (0.05)			6→0.11) →0.17)
	病	(9) 院	裏	2 0.8	1.5	1.16 (tr)				0.60 (tr)	1.5 0 (0.02)		06→0.02) →0.02)
	駅	(10)	前	2 2.2		0.80 (tr)				1.01 (0.01)	1.5 2 (0.02)	1.84(0.0	7→0.03)
	当	(1 1) 另(]	111	2 2.6		0.36 (tr)							
	放	(12) 流	点	2 4.7 ~2 4.9	0.4	0.37 (tr)				1.0 2 (0.08)	1.01	2.03(0.0	3→ tr)
	st.	. 71におり	ナる生物	加試験死亡率		%/5h /24h	7 6.3 %,		PH5	< 1/3/	24 h	6 0.9%	5/24h

()内はモノマー態 A1の量を表わし、1972年の \rightarrow 印は、モノマー態 A1溶存量の採水から測定までの時間経過にともなう変化を示したもので \rightarrow 印後の値は、ほぼ1971年以前の測定条件での濃度を表わし、 \rightarrow 印の前の値は採水直後の濃度を表わす。

3表 致死濃度測定に用いたさけ稚魚の大きさ

 $(\bar{x} \pm t.05 SE)$

実	験	I	п	Ш.
ВW	д	0.28 ± 0.01	0.3 2 ± 0.0 2	0.44 ± 0.02
FL	mm	3 3.9 ± 0.7	3 6.3 ± 0.9	3 9.6 ± 0.8

実 験 条 件

実	験	I	П	. Ш
W.T	24 h	9.0 0 ± 0.1 1	8.9 7 ± 0.1 6	9.00 ± 0.08
°C	48 h	8.9 0 ± 0.1 0	8.9 4 ± 0.1 0	8.9 6 ± 0.0 6
D 0 %	24 h	9 3.1 ± 0.8	9 2.5 ± 1.9	
2 4	h 平均	5.0 2 ± 0.1 0	5.05 ± 0.07	4.9 2 ± 0.0 7
1 🗵		$4.89 \pm 0.29 \rightarrow 5.19 \pm 0.93$	4.9 6±0.2 2→5.1 9±0.2 4	4.7 9±0.2 2→5.0 5±0.2 0
P H 48	h 平均	4.8 9 ± 0.0 8	5.05 ± 0.04	4.95 ± 0.07
1 🗵		4.7 7±0.2 0→5.1 6±0.2 6	$4.97\pm0.11 \rightarrow 5.16\pm0.12$	4.8 4±0.2 0→5.0 5±0.1 7
	1	1.145 ± 0.275	0.653 ± 0.097	0.606 ± 0.008
	2	0.977 ± 0.171	0.567 ± 0.038	0.5 0 3 ±, 0.0 1 7
Al	3	0.7 4 8 ± 0.1 0 2	0.3,94 ± 0.022	0.377 ± 0.017
	4	0.494 ± 0.107	0.300 ± 0.044	0.277 ± 0.016
mg/L	5	0.3 2 1 ± 0.1 2 3	0.1 3 4 ± 0.0 2 7	0.130 ± 0.006
	6	0.1 2 5 ± 0.0 7 1	0.049 ± 0.023	0.049 ± 0.004
	7	± 0	± 0	

4表 半数致死濃度および安全濃度

(PPM)

実験	I - 2 4 h	II-2 4 h	Ⅲ—24 h	Ⅲ — 4 8 h
T L M 値	0.416	0.3 9 4	0.277	0.1 7 8
	0.3 0 8	0.3 6 8	0.1 3 0	0.130
$(\bar{x} \pm sd)$		0.276	0.1 0 4	0.104
	(0.352 ±	0.059)	(0.170±0.093)	(0.137±0.038)
安全濃度			0. 0	2 7

安全濃度は、Hart, Doudoruff 及び Greenbankの式

$$C = \frac{48h T L M \times 0.3}{(24TLM / 48TLM)^2}$$
 より算

1.0

X


-242-

庚


5 0

-243-





3 図



-244-

6. 支笏湖の生物生産に関する調査

(1) 支笏湖の生物生産に関する調査

支笏湖のひめますの生産構造解明のための資料蓄積を主体にした生物統計調査(漁獲量の推定,漁 獲物の組成),生育環境調査(理化学的条件,餌料生物)を行なった。

漁獲量の推定,並びに年令組成については現在整理分析中である。

湖の水温条件は 6 月中旬には表面が $9\sim1$ 0 \mathbb{C} となり、水深 1 $2\sim1$ 3 m に弱い躍層が出現し、水深 1 5 m以下は $4.5\sim6$ \mathbb{C} の条件となる。そして 7 月、8 月には曜層の発達も著しくなる。

ひめますの生活水深は漁探並びに釣などにより、6月には表層生活であることが知られ、7月、8 月と時期の推移にともなって躍層下の深層に移動する。なお、躍層下の生活層も時期によって若干の 深浅移動がうかがわれた。

また、湖内の魚群の分布についても、7月には密度の大小はあるが、湖岸、湖心をとわず魚の分布が認められるが、8月以降魚の成熟にともなって産卵場のあるボロビナイ、元山、湖畔と湖の北測の水域の湖岸周辺への移行が認められる。

産卵場の大きさは現在明らかでないが、産卵場の地域は従来から指摘されていた地区であることが 魚探で明らかにされた。

湖の餌料条件について

定点はふ化場沖、ボロビナイ沖、モーラップ沖の3ヶ点で、25cm口径の目合 $\times \times 13$ のプランクトンネットを用いて水深 100mからの垂直採集を行なった。

出現種は1971年,72年と比べて大きな変化がなく,ダフニャとアカンソデアプトマスが優勢であった。沈澱量は次のとおりである。

沈 澱 量(平均値 mℓ)	沈	澱	量(平均值	ml)
---------------	---	---	----	-----	-----

月		1971年		1972年	
3	月		$m\ell$	0. 3	$m \ell$
6		0. 9		0. 8	
7				1. 9	
8				2. 6	
9		2. 8	2		
10		5. 6		3.3 ~ 3.9	-

Ⅱ 沿岸水域調査

1. 沿岸水域におけるサケ・マス稚魚の生態調査

網走, 斜里地区を中心としたオホーック海東部のサケ資源の増大は近年著しい。これらの原因は人工 ふ化放流の充実・拡大と考えられるが, 網走湾内の稚魚期の生育環境条件も大きく関与しているものと 推察される。これら問題について従来から色々と論議され, その解明を強く要望されていたが, ようや く47年度より網走, 斜里の沿岸域の稚魚に関する調査が着手された。その結果概要を報告する。

調査は常呂川河口から斜里川河口までの間,定点10ヶ所(斜里川口,廣釣沼,止別川口,原生花園, 鱒浦,網走海岸町,能取岬,能取湖,常呂港東,常呂川口)において水深5m,15m線での稚魚の移 動,分布密度,餌料環境,また水温,塩分,透視度などの海洋条件についても調査した。

水理学的環境について

網走湾内の水温条件は能取,常呂方面と顕著な相違が見られ,4月下旬には常呂,能取方面では底層・表層の水温は5℃前後で,温度差も極めて小さいのに対して網走湾内は水温2~3℃と低く,湾内に水温の低い水が滞留していることが5かがわれる。

5月下旬,6月下旬において水温の上昇が見られ、湾内と湾外の温度差は次第に小さくなるとはいえ、明らかに水温の違う水の存在が示された。

一方,塩分について4月下旬には湾内の塩素量は表層 $15\sim16.5\%_0$,5 m 層 $17.5\sim17.9\%_0$ と、能取、常呂方面 ($18\sim18.3\%_0$)に比べて低く、明らかに低塩分の水が15 m 以桟の沿岸帯に滞留していることが知られた。

5月、6月と時期の推移に伴って湾内の塩分濃度の上昇が若干認められ、また能取方面との差も小さくなるが、常呂方面に比べて低い傾向が示された。

このような湾内の低水温,低塩分の水の存在が湾内の生物生産にどのように反映しているか,今の所 未だ充分に明らかでないが,これらの現象は湾という地形的な物理的条件と流氷,海流などの諸条件に 大きく関係するものと考えられる。

サケ・マス稚魚分布状態

網走川への稚魚の放流は3月中旬より5月下旬の間で,さけ稚魚1,800万尾,からふとます800万尾である。稚魚の沿岸域での分布調査は5月下旬,6月下旬の2回行なったが,この時期の稚魚の分布は5月には何れも5m以浅の極みて限定された地域で生活し,6月には15m~25m水深の沖合に生活域を広げ,噴火湾内で観察されたと全く同一の型が示された。稚魚の分布密度については現在分析

中であるが、6月下旬の網走湾においては水深 $10\sim15m$ 水域に濃厚な群も認められるなど、滞留後期の稚魚の生活は能取、常呂域とは若干異る傾向があることがうかがわれた。また6月下旬には斜里の前浜で稚魚の分布がなく、他の地区に比べて大きな相違が示された。また、からふとます稚魚はさけ稚魚と混合して生活していることが示された。

生長については、5 月には 3.6~8.3 cm、平均 4.4~6.6 cmと平均値のバラツキも大きいが、網走川を中心とした地域が小さい傾向が示された。6 月においては、稚魚体長(F.L)は平均値で 5.5~6.8 cmと全般的に生長していることが示された。

稚魚の摂餌状況について、全般によく摂餌している傾向が示された。胃の内容量は採集時間による差も考慮されなければならないが、空胃の個体は比較的少なく、5月のさけでは1尾当り摂餌量の平均は15mg~62mg、6月には28mg~48mg、からふとますでは5月:9mg~33mg、6月:37mg~63mgと示され、一般的に6月の摂餌量の増大が示された。これらの標本分析の範囲では摂餌量は体重に対して10%という高い値を示すものもあるが、平均して2%~3%前後の摂餌量であった。

摂餌内容は噴火湾と同様,他魚種の稚幼魚(コナゴ類),アミ類,端脚類(テミスト,ガンマルス), 撓脚類(カラヌス類),尾虫類,陸上昆虫と極めて雑多な食性が示された。特に6月下旬においては止 別沖ではアプラムシ類,また能取岬では尾虫類の捕食が極めて顕著で,時期,地区による餌条件に特徴 のあることがらかがわれた。

二資料の刊行二

※ 1971年度(昭和46年度)の北海道沿岸・河川域へのアキサケの来遊状況, ならびに
 1972年度(昭和47年度)の来遊予報 昭和47年8月
 ※ 魚 と 卵 139~140 昭和47年8月~48年2月
 ※ ふ化場研究報告 27 昭和48年2月
 ※ 資料117,本場・支場・事業場所在地案内(含む捕獲採卵場) 昭和47年10月
 ※ 資料118,内水面漁業調整規則資料 昭和47年12月