

## 令和 7（2025）年度マイワシ太平洋系群の 管理基準値等に関する研究機関会議資料

### 水産研究・教育機構

水産資源研究所 水産資源研究センター（古市 生・由上龍嗣・上村泰洋・  
西嶋翔太・井須小羊子・伊澤雄登・東口胤成・渡部亮介）

参画機関：北海道立総合研究機構釧路水産試験場・函館水産試験場、青森県産業技術センター水産総合研究所、岩手県水産技術センター、宮城県水産技術総合センター、福島県水産海洋研究センター、茨城県水産試験場、千葉県水産総合研究センター、東京都島しょ農林水産総合センター、神奈川県水産技術センター、静岡県水産・海洋技術研究所、愛知県水産試験場漁業生産研究所、三重県水産研究所、和歌山県水産試験場、徳島県立農林水産総合技術支援センター水産研究課、大阪府立環境農林水産総合研究所、香川県水産試験場、高知県水産試験場、愛媛県農林水産研究所水産研究センター、大分県農林水産研究指導センター水産研究部、宮崎県水産試験場、鹿児島県水産技術開発センター、漁業情報サービスセンター、海洋生物環境研究所

## 提 案

### 管理基準値

- 目標管理基準値は、MSY を実現する親魚量（SBmsy）で 143.2 万トン
- 限界管理基準値は、MSY の 60%を実現する親魚量（SB0.6msy）で 53.0 万トン
- 禁漁水準は、MSY の 10%を実現する親魚量（SB0.1msy）で 5.3 万トン

### 漁獲管理規則

- 親魚量が限界管理基準値を下回ると漁獲圧を下げる規則を適用する。
- 漁獲圧の上限は SBmsy を維持する漁獲圧（Fmsy）に調整係数  $\beta$  を乗じたものとする。

### 調整係数 $\beta$

- 将来の加入として、通常加入期の中でも近年観察された良好な加入が継続すると仮定した場合、 $\beta$  が 1.0 以下であれば 5 年後および 10 年後のいずれでも親魚量は目標管理基準値を 50%以上の確率で上回ると推定された。
- 一方で、通常加入期の再生産関係に従った加入が継続すると仮定した場合に、10 年後に 50%以上の確率で目標管理基準値を上回るためには、 $\beta$  は 0.9 以下とする必要がある。
- 今後、加入量が通常加入期の再生産関係から予測される水準になる可能性や、親魚量の推定の不確実性を考慮すると、 $\beta$  の値は 0.9 以下にすることが望ましい。

#### 提案に用いた管理規則

- 「令和 7（2025）年度漁獲管理規則および ABC 算定のための基本指針（FRA-SA2025-ABCWG02-01）」（水産研究・教育機構 2025a）で示された 1A 資源の管理規則

#### 提案に用いた再生産関係

- 再生産関係式には、通常加入期（1988～2024 年）において自己相関は考慮しないホッケー・スティック型再生産関係式を適用し、パラメータ推定には最小二乗法を用いた。

#### その他

- $SB_{msy}$  は直近年（2024 年）の親魚量の 0.53 倍である。 $SB_{msy}$  を維持する漁獲圧（ $F_{msy}$ ）は現状の漁獲圧（2022～2024 年の平均）の 0.61 倍である。

#### English title (authors)

Scientific meeting report on reference points for the management for Japanese sardine of the Pacific stock (fiscal year 2025).

(Sho Furuichi, Ryuji Yukami, Yasuhiro Kamimura, Shota Nishijima, Sayoko Isu, Yuto Izawa, Kazunari Higashiguchi, Ryosuke Watanabe)

文中で引用する補足資料、図表番号の後に（SC 図 1-2）（SC 表 4-3）などの記載があるものは本資料と同時に公開した資源評価報告書の該当番号の図表を参照してください。

## 1. 再生産関係

### 1-1) 使用するデータセット

本資源の再生産関係式の設定は「令和 7（2025）年度漁獲管理規則および ABC 算定のための基本指針（FRA-SA2025-ABCWG02-01）」（水産研究・教育機構 2025a）に従い、以下のデータセットを使用して実施した。解析には R パッケージ `frasyr`（コミット番号: @05eacac）を用いた。`frasyr` で用いた式の詳細は「再生産関係の推定・管理基準値計算・将来予測シミュレーションに関する技術ノート（令和 7 年度研究機関会議版）（FRA2025-ABCWG02-04）」（水産研究・教育機構 2025b）を参照のこと。

| データセット  | 基礎情報、関係調査等                       |
|---------|----------------------------------|
| 資源量・親魚量 | 令和 7（2025）年度マイワシ太平洋系群の資源評価（水産機構） |

再生産関係の推定には 1976～2024 年の加入量および親魚量を用いた。

### 1-2) 再生産関係の検討

本系群の管理基準値案の算出および将来予測の計算に使用する再生産関係として、ホッケ・スティック型再生産関係（HS）、リッカー型再生産関係（RI）、およびベバートン・ホルト型再生産関係（BH）を仮定した場合について検討した（補足資料 1）。最適化方法として、最小二乗法および最小絶対値法を検討した。また、残差の自己相関を考慮したモデルと考慮しないモデルを検討した。自己相関の推定は同時推定法（自己相関パラメータもモデルに組み込み、再生産関係式のパラメータと自己相関パラメータを同時に推定する手法）を用いた。使用するデータは、資源評価で推定された 1976～2024 年の全期間の加入量および親魚量を用いた。直近の情報も取り入れるために、2024 年の情報も用いている。

本系群では、全期間でひとつの再生産関係とするモデルに加え、2 つの期間に分けてそれぞれ再生産関係を求めるモデルについても検討した。マイワシ太平洋系群の資源量は、数十年スケールの地球規模の気候～海洋生態系の構造の転換（レジームシフト）と同期して大きく変動することが知られている（Kawasaki 1992, Klyashtorin 1998, Chavez et al. 2003）。資源量は、1976/77 年のレジームシフト（Yasunaka and Hanawa 2002）と同期して増大し、1980 年代は 1,000 万トン以上の高い水準で推移した。その後、1988/89 年のレジームシフトと同期して 1988～1991 年に低い再生産成功率が連続し（Watanabe et al. 1995）、加入量および資源量が激減した。海洋環境などの変化は、環境収容力や加入の成否などに影響し（Tanaka 2003, Yatsu et al. 2005, Furuichi et al. 2020）、再生産関係も変化する可能性が考えられる。全期間のデータに再生産関係を当てはめたときに、加入量の残差に自己相関が見られたことも、期間によって再生産関係が異なることに起因するかもしれない。そこで、1976～2024 年の期間の加入量水準に基づいて、再生産関係が通常加入期（1988～2024 年）と高加入期（1976～1987 年）の二種類の様態に分けられると仮定した場合の再生産関係について検討した。この場合、自己相関は考慮していない。再生産関係が切り替わる時期は、マイワシの資源変動と海洋環境との関係に関する既往の研究成果をもとに決定した（Yatsu et al. 2005, Takahashi et al. 2009, Kurota et al. 2020）。検討した再生産関係を表 1a に示す。

### 1-3) 再生産関係の候補

再生産関係の型に関わらず、期間により再生産関係を分けた場合の方が、全期間でひとつの再生産関係とした場合よりも、補正赤池情報量規準(AICc)は低い傾向であったため、期間により分けて再生産関係を求めるモデルを候補とした。期間で分けた再生産関係の中では、最適化手法として最小絶対値法を用いた方が AICc は低かったが、パラメータの推定が不安定であり、また最小二乗法を用いた場合と推定されたパラメータに大きな差はなかったため、最小二乗法を最適化手法の候補とした。最小二乗法を用いて BH 型、RI 型および HS 型の 3 種の再生産関係を求めた際の AICc は、BH 型で相対的に高く、HS 型と RI 型の間での差は小さかった。そこで、簡易的な MSE (Management Strategy Evaluation、管理戦略評価)により、RI 型と HS 型の間で再生産関係を誤って適用して漁獲管理をした場合の資源減少のリスクおよび漁獲機会損失のリスクについてそれぞれ検討した(補足資料 4)。この結果、本系群では、実際とは異なる再生産関係を想定して管理を行った場合でも、どちらのタイプの再生産関係を用いても資源減少のリスクは小さかった。一方で、実際の再生産関係が HS 型であったときに誤って RI 型を想定した管理を行った場合は、漁獲機会損失のリスクがわずかに高くなっていた。本系群では、これまで使用されてきた再生産関係が HS 型であったことも踏まえ、HS 型の再生産関係を仮定したモデルを候補とした(図 1(SC 図 4-9))。

以上より、本系群の再生産関係としては、再生産関係を通常加入期と高加入期で分けた場合の、最小二乗法にもとづく HS 型再生産関係を候補として提案する。本資源は、近年良好な加入が続いており、高加入期に移行している可能性も考えられるが、現在の環境は過去の高加入期とは異なる点が多く、現在の環境において過去の高加入期と同規模の加入が生じるかはかなり不確実であると考えられる。このため、1988 年以降現在まで、また当面の将来においても、通常加入期が継続すると想定し、1988～2024 年の親子関係から推定された再生産関係を管理基準値の計算および将来予測に用いた。資源高水準期は特定の環境状態においてみられ、長期的に持続できる状態でないといみなされていることから(伊東 1961、1991)、通常加入期の再生産関係を長期的な目標である管理基準値の計算に用いることは妥当だと考えられる。なお、真の再生産関係が期を通じてひとつの再生産関係であったときに誤って通常加入期の再生産関係を適用した場合(とその逆)、および、真の再生産関係が高加入期であったときに誤って通常加入期を適用した場合(とその逆)の資源減少のリスクおよび漁獲機会損失のリスクについても評価し、補足資料 5 および 6 にまとめた。

## 2. 管理基準値

### 2-1) データセットおよび計算方法

最大持続生産量(MSY)に対応する管理基準値案等の算出、および将来予測は、「令和 7 (2025) 年度漁獲管理規則および ABC 算定のための基本指針(FRA-SA2025-ABCWG02-01)」(水産研究・教育機構 2025a)の 1 系資源の管理規則に従い、1-3)で候補とした再生産関係と、令和 7 年度の資源評価における将来予測計算に用いた各種設定(自然死亡係数、成熟率、年齢別平均体重)を使用して実施した(表 1-b、表 2)。今回の解析では現状の漁獲圧( $F_{current}$ 、図 2)には 2022～2024 年の漁獲係数( $F$ )の平均値を用いた(図 2、表 2)。本系群では、平均世代時間(3.7 年)の 20 倍の年数のシミュレーション期間後を平衡状態と仮定し、その際の平均漁獲量が最大化される  $F$  値を  $F_{msy}$ 、その  $F_{msy}$  で漁獲した場合の

平衡状態での平均親魚量を  $SB_{msy}$  とした。

## 2-2) 管理基準値案と禁漁水準案

目標管理基準値 ( $SB_{target}$ ) として  $MSY$  水準における親魚量 ( $SB_{msy}$  : 143.2 万トン)、限界管理基準値 ( $SB_{limit}$ ) として  $MSY$  の 60%の漁獲が得られる親魚量 ( $SB_{0.6msy}$  : 53.0 万トン)、禁漁水準 ( $SB_{ban}$ ) として  $MSY$  の 10%の漁獲が得られる親魚量 ( $SB_{0.1msy}$  : 5.3 万トン) を用いることを提案する。これらの基準値案について、漁業がなかった場合を仮定した初期親魚量 ( $SB_0$ ) に対する比、対応する漁獲圧の下での平衡状態における平均漁獲量、対応する漁獲圧の現状の漁獲圧に対する比などを表 3 に示す。目標管理基準値として提案する  $SB_{msy}$  は  $SB_0$  の 44%に相当し、その親魚量において期待できる漁獲量の平均値 ( $MSY$ ) は 47.0 万トンである。また、目標管理基準値案に対応する漁獲圧 ( $SB_{msy}$  を維持する漁獲圧 :  $F_{msy}$ ) の、現状の漁獲圧に対する比 ( $F_{msy}/F_{current}$ ) は 0.61 で、その時の漁獲割合 ( $U_{msy}$ ) は 19%である。限界管理基準値として提案する  $SB_{0.6msy}$  は  $SB_0$  の 16%、禁漁水準として提案する  $SB_{0.1msy}$  は  $SB_0$  の 2%である。

様々に  $F$  値を変えた場合の平衡状態における親魚量、およびこれに対する年齢別漁獲量の平均値を図 3 (SC 補足図 3-2) に示す。親魚量が  $SB_{limit}$  以下では 0~3 歳魚が殆どを占めている。しかし、親魚量が増加するにつれて高齢魚の比率が高くなる傾向がみられる。

## 2-3) 神戸プロット

目標管理基準値案である  $SB_{msy}$  と、その時の漁獲圧  $F_{msy}$  を基準にした神戸プロットを図 4 (SC 補足図 3-1) に示す。本系群の親魚量は、1993~2014 年は限界管理基準値案を下回っていたが、2015 年に限界管理基準値案を上回り、2019 年以降は目標管理基準値案も上回って推移している。本系群における 1988 年以降 (通常加入期) の漁獲圧は、1998 年を除き、 $F_{msy}$  を上回っている。

## 2-4) 漁獲管理規則案

本資料で提案する漁獲管理規則は、限界管理基準値案および禁漁水準案となる親魚量を閾値として漁獲管理の基礎となる漁獲係数 ( $F$  値) を変えるルールであり、親魚量が限界管理基準値案を下回ると禁漁水準案まで直線的に漁獲圧を下げる。 $F$  値の上限は  $F_{msy}$  に調整係数  $\beta$  を乗じたものである。漁獲管理規則案における親魚量と漁獲係数の関係を図 5a に、この漁獲管理規則案で漁獲した場合に期待できる平均的な漁獲量との関係を図 5b に示す。図に例示した漁獲管理規則案は、いずれも  $\beta$  に標準値である 0.8 を用いた。

## 2-5) 漁獲管理規則案に基づく資源の将来予測

### (1) 調整係数 $\beta$ に標準値を用いた場合

限界管理基準値案と禁漁水準案に標準値を用いて、 $\beta$  を 0.8 とした漁獲管理規則案で将来予測した場合の、資源量、親魚量、漁獲量、加入量、および努力量の増減率の推移を図 6 に示す。なお今回の将来予測では、漁獲管理規則案による漁獲制御は 2026 年から開始し、2025 年の漁獲量は予測される資源量と現状の漁獲圧 ( $F_{2022-2024}$ ) から仮定した。 $F_{2022-2024}$  は、2022~2024 年の  $F$  値の単純平均とした。将来予測には、補足資料 2 に示した。

将来予測に際しては、本資源で観察されている近年の良好な加入が当面は継続すると考え、再生産関係式からの予測値と過去の加入量観測値との残差を、時期を区切ってリサンプリングするバックワードリサンプリング法を適用した（補足資料 2）。

予測される 2026 年の親魚量は限界管理基準値案を上回っているため、漁獲管理規則案に従い、 $\beta F_{msy}$  での漁獲が行われる。 $\beta=0.8$  の場合、 $\beta F_{msy}$  での漁獲圧は、現在の漁獲努力量の 0.48 倍の漁獲圧に相当する。中長期的には、 $\beta F_{msy}$  での漁獲の継続により漁獲量および親魚量は平均的には MSY 水準へ向かって推移していくと予測される。

## （2）調整係数 $\beta$ を変えた場合

漁獲管理規則案を用いた将来予測について、調整係数  $\beta$  を 0.0～1.0 の間で変えた場合の親魚量が目標管理基準値案を上回る確率、限界管理基準値案を上回る確率、禁漁水準案を上回る確率、親魚量平均値の推移、および漁獲量平均値の推移を表 4～8 に示した。それぞれの表には、現状の漁獲圧（F2022-2024）で漁獲を継続した場合の結果も比較のため示した。なお将来予測には、近年の良好な加入の傾向を反映させたバックワードリサンプリングを適用した（補足資料 2）。近年の良好な加入が継続すると仮定した場合、本資源の親魚量は、 $\beta$  が 1.0 以下であれば漁獲管理規則案での漁獲開始から 10 年後の 2036 年に 100% の確率で限界管理基準値、目標管理基準値案および禁漁水準案を上回ると予測された（表 4、表 5、表 6、SC 補足表 4-1）。2026 年以降は  $\beta$  が低いほど親魚量は多くなり、漁獲量は少なくなった（表 7、表 8、SC 補足表 4-2、SC 補足表 4-3）。

表 9 に、上述の結果を要約したものを示すとともに、親魚量の減少や漁獲量変動の増大および想定外の漁獲圧の増大に係るリスクについて評価した結果を示した。 $\beta$  を 0.8 とした場合、親魚量が 10 年間で限界管理基準値案を下回ることや漁獲圧が  $F_{msy}$  を上回ることはないと考えられ、また 10 年間における漁獲量の平均年変動は 7% と見積もられた。

## （3）将来予測の追加シナリオ

漁獲管理規則を用いた将来予測には、様々な不確実性が存在する。これらの不確実性を考慮した将来予測は漁獲管理規則を決定する際に有用な情報となる。

本資源の将来予測には、近年の良好な加入の傾向が当面は継続すると想定しバックワードリサンプリング法を適用したが、今後、加入が通常加期の再生産関係程度で推移する可能性も考えられる。そこで、加入量の予測において、加入量の誤差が、バックワードリサンプリングではなく、再生産関係推定の際に求められた誤差分布（対数正規分布）に従うと仮定した将来予測を行った（補足資料 7）。この場合は、バックワードリサンプリングを適用した場合に比べ、目標管理基準値や限界管理基準値を上回る確率は低下した。 $\beta$  が 0.8 であれば漁獲管理規則案での漁獲開始から 10 年後の 2036 年に 63% の確率で目標管理基準値案を上回ると予測された（補足表 7-1）。 $\beta$  が 0.9 以下であれば、2036 年には 50% 以上の確率で目標管理基準値案以上に親魚量を維持できると予測されたが、 $\beta$  が 1.0 の場合には親魚量が目標管理基準値案を上回る確率が 50% を下回った。

加えて、ABC 対象年における資源量予測の不確実性（ABC 計算の不確実性）を考慮した将来予測も実施した（補足資料 8）。ABC 計算の不確実性を考慮した将来予測は、通常の将来予測よりも漁獲量の平均年変動や漁獲圧増加のリスクはやや大きくなるものの、平

均漁獲量や平均親魚量、管理基準値を上回る確率に大きな違いは見られなかった（補足表 8-1）。

本資源では、特に 2018 年以降に体重の低下が観察されている。このため、将来予測の際には、2010 年以降のデータに基づき年齢別資源尾数と年齢別体重との間で負の非線形関係を推定し、年齢別資源尾数に対応して年齢別体重が変化することを仮定した（詳細は令和 7 年度資源評価（FRA-SA2025-SC08-1）補足資料 5 を参照）。このように将来の体重が変化することを組み込んだ将来予測を行っていることを鑑みて、仮定する体重に誤差を与えた将来予測も実施した（補足資料 9）。体重の誤差を考慮した将来予測は、通常の将来予測よりも漁獲量の平均年変動や漁獲圧増加のリスクはやや大きくなるものの、平均漁獲量や平均親魚量、管理基準値を上回る確率に大きな違いは見られなかった（補足表 9-1）。なお、年齢別成熟率に関しては、2016 年以降で一定と仮定しているが、2018 年以降、年齢別体重が減少する傾向が見られており、それに伴って成熟率の低下も生じている可能性がある。成熟率が本年度評価の仮定より低かった場合、資源量および親魚量は過大に推定されている可能性もあることに注意する必要がある（FRA-SA2025-SC08-1 補足資料 10）。

### 3. まとめ

本資源は、海洋環境の影響を受けて資源量が大きく変動すると考えられており、期間を通常加入期と高加入期に分けて再生産関係を求めた場合の方が、全期間でひとつの再生産関係を求めた場合よりも AICc が低かったことから、前者の再生産関係を提案する。また、通常加入期（1988～2024 年）の加入量および親魚量に基づき、再生産関係モデルとして自己相関を考慮しない HS 型再生産関係式を適用し、そのパラメータを最小二乗法により推定することを提案する。

目標管理基準値案は MSY を実現する資源水準と定められていることから、上記の再生産関係から推定される SBmsy（143.2 万トン）とすることを提案する。限界管理基準値案、禁漁水準案には、標準値である SB0.6msy（53.0 万トン）、SB0.1msy（5.3 万トン）をそれぞれ提案する。また、F 値の上限は Fmsy には調整係数  $\beta$  を乗じたものとし、親魚量が限界管理基準値案を下回ると禁漁水準案まで直線的に漁獲圧を下げる漁獲管理規則を併せて提案する。

現在の本系群の親魚量は目標管理基準値案以上にあると考えられる。SBmsy を維持する漁獲割合は 19%、漁獲圧は  $F_{current}$  の 0.61 倍である（表 3）。近年の良好な加入が継続すると仮定した場合、 $\beta$  が標準値の 1.0 以下であれば、10 年後の親魚量は 50%以上の確率で SBmsy を上回ると予測される。一方で、今後、加入の水準が通常加入期の再生産関係の予測値レベルである場合では、管理開始の 10 年後に 50%以上の確率で親魚量が SBmsy を上回るためには、 $\beta$  は 0.9 以下とする必要がある。また、ABC 計算の不確実性や将来予測で仮定する体重の不確実性を考慮したシミュレーションのもとでは目標達成確率やリスクはほとんど変わらなかったため、上記の漁獲管理方策はこれらの不確実性に対して頑健であった。

Fmsy に乗ずる調整係数  $\beta$  は、今後、加入量が通常加入期の再生産関係から予測される水準になる可能性や、近年の体重の低下に伴って成熟率が低下していれば親魚量が過大推定されている可能性も考慮すると、 $\beta$  の値は 0.9 以下にすることが望ましい。

#### 4. 今後の検討事項

本資源は、過去の知見および情報量基準によるモデル選択により、再生産関係を高加入期と通常加入期に分けるモデルを採用した。また、1988年以降現在まで通常加入期にあると考え、管理基準値の推定や将来予測には通常加入期の再生産関係を用いることを提案した。ただし近年、再生産関係から予測される平均値より高い加入が観察されることが多く、再生産関係を期間で分けたものの、分けられた各期間の中でも加入に自己相関がある可能性について十分対処できていないことが考えられる。再生産関係を期間で分けた場合における自己相関の取り扱いや、再生産関係の切り替わりの検出やタイミングの判別手法の開発については検討する必要がある。

#### 5. 引用文献

- Chavez, F.P., J. Ryan, S.E. Lluch-Cota, C.M. Niquen (2003) From anchovies to sardines and back: multidecadal change in the Pacific Ocean. *Science* **299**, 217–221.
- Furuichi, S., Niino, Y., Kamimura, Y. and R. Yukami (2020) Time-varying relationships between early growth rate and recruitment in Japanese sardine. *Fish. Res.*, **232**, 105723.
- 古市 生・由上龍嗣・上村泰洋・西嶋翔太・井須小羊子・伊澤雄登・東口胤成・渡部亮介 (2025) 令和7(2025)年度マイワシ太平洋系群の資源評価. FRA-SA2025-SC08-1.
- 伊東祐方 (1961) 日本近海におけるマイワシの漁業生物学的研究. 日水研年報, (9), 1-227.
- 伊東祐方 (1991) 日本のマイワシ—その生活と資源. 「魚油とマイワシ」松下七郎編著, 恒星社厚生閣, 東京, 191-255.
- Kawasaki, T. (1992) Climate-dependent fluctuations in far eastern sardine population and their impacts on fisheries and society. In: *Climate variability, climate change and fisheries*, ed. Glantz, M.H., Cambridge University press, Cambridge, pp. 325-354.
- Klyashtorin, L. B. (1998) Long-term climate change and main commercial fish production in the Atlantic and Pacific. *Fish. Res.*, **37**, 115-125.
- Kurota, H., C.S. Szuwalski, M. Ichinokawa (2020) Drivers of recruitment dynamics in Japanese major fisheries resources: Effects of environmental conditions and spawner abundance. *Fish. Res.* **221**, 105353.
- 水産研究・教育機構 (2025a) 令和7(2025)年度漁獲管理規則およびABC算定のための基本指針. FRA-SA2025-ABCWG02-01, 水産研究・教育機構, 横浜.
- 水産研究・教育機構 (2025b) 再生産関係の推定・管理基準値計算・将来予測シミュレーションに関する技術ノート(令和7年度研究機関会議版). FRA-SA2025-ABCWG02-04, 水産研究・教育機構, 横浜.
- 水産研究・教育機構 (2025c) 再生産関係の決定に関するガイドライン. FRA-SA2025-ABCWG02-05, 水産研究・教育機構, 横浜.
- Takahashi, M., Y. Watanabe, A. Yatsu, H. Nishida (2009) Contrasting responses in larval and juvenile

- growth to a climate-ocean regime shift between anchovy and sardine. Can. J. Fish. Aquat. Sci. **66**, 972–982.
- Tanaka E (2003) A method for estimating dynamics of carrying capacity using time series of stock and recruitment. Fish. Sci., **69**, 677-686.
- Watanabe, Y., H. Zenitani and R. Kimura (1995) Population decline of the Japanese sardine *Sardinops melanostictus* owing to the recruitment failures. Can. J. Fish. Aquat. Sci., **52**, 1609-1616.
- Yasunaka, S. and K. Hanawa (2002) Regime shifts found in the northern hemisphere SST field. J. Meteor. Soc. Japan, **80**, 119-135.
- Yatsu, A., T. Watanabe, M. Ishida, H. Sugisaki, L.D. Jacobsen (2005) Environmental effects on recruitment and productivity of Japanese sardine *Sardinops melanostictus* and chub mackerel *Scomber japonicus* with recommendations for management. Fish. Oceanogr. **14**, 263–278.




図 1. 再生産関係 (SC 図 4-9)

再生産関係には、高加入期（1976～1987 年）と通常加入期（1988～2024 年）で再生産関係が切り替わる、自己相関を考慮しないホッケ－・スティック（HS）型再生産関係式を用い、最小二乗法によりパラメータ推定を行った。再生産関係の分析には令和 7 年度評価時の 1976～2024 年の親魚量と加入量を使用しており、青線および青丸は高加入期の再生産関係とその推定に使用したデータ点、赤線および赤丸は通常加入期の再生産関係とその推定に使用したデータ点である。再生産関係式の上下の点線は、仮定されている再生産関係において観察データの 90%が含まれると推定される範囲である。白抜き丸（直近 5 年は赤丸）は、今回の評価により更新された親魚量と加入量の値である。図中の数字は加入群の年級（生まれ年）を示す。




図 2. 年齢別の漁獲係数 (F 値)

2018 年以降の各年の年齢別 F 値を示す。黒線は 2022～2024 年の F 値の単純平均 (F<sub>current</sub>) である。




図 3. 管理基準値案および禁漁水準案と年齢別漁獲量曲線の関係 (SC 補足図 3-2)





図4. 神戸プロット (SC 補足図 3-1)

縦軸は各年の漁獲圧  $F$  の  $F_{msy}$  との比である。図中の目標管理基準値案、限界管理基準値案、および禁漁水準案には、それぞれ  $SB_{msy}$ 、 $SB_{0.6msy}$ 、 $SB_{0.1msy}$  を用いた。

a) 縦軸を漁獲圧にした場合



b) 縦軸を漁獲量にした場合




図 5. 漁獲管理規則案

目標管理基準値 (SBtarget) 案は HS 再生産関係に基づき算出した  $SB_{msy}$  である。限界管理基準値案 (SBlimit) および禁漁水準案 (SBban) には、それぞれ標準値を用いている。調整係数  $\beta$  には標準値である 0.8 を用いた。




図 6. 管理基準値案に基づく漁獲管理規則案を用いた将来予測（赤色）と現状の漁獲圧（F2022-2024）で漁獲を続けた場合の将来予測（緑色）の比較

太実線は平均値、網掛けはシミュレーション結果の 90%が含まれる予測区間、細線は 5 通りの将来予測の例示である。親魚量の図の緑破線は目標管理基準値案、黄一点鎖線は限界管理基準値案、赤点線は禁漁水準案を示す。漁獲量の図の黒破線は最大持続生産量 MSY を、漁獲割合の図の黒破線は目標管理基準値案を維持する漁獲割合の水準 (Umsy) を示す。漁獲管理規則案での調整係数  $\beta$  には 0.8 を用いた。2025 年の漁獲量は予測される資源量と現状の漁獲圧 (F2022-2024) により仮定した。

表 1. 再生産関係式の検討候補と選択した再生産関係のパラメータ推定値

## a) 再生産関係の候補

## 全期間の場合

| 再生産関係式             | 最適化法   | 自己<br>相関 | 期間        | AICc  | ΔAICc | 順位 |
|--------------------|--------|----------|-----------|-------|-------|----|
| ホッケー・スティック<br>リッカー | 最小二乗法  | 有        | 1976~2024 | 114.7 | 0.0   | 1  |
| ベバートン・ホルト          | 最小二乗法  | 有        | 1976~2024 | 116.7 | 2.1   | 3  |
| ベバートン・ホルト          | 最小二乗法  | 有        | 1976~2024 | 116.4 | 1.7   | 2  |
| ホッケー・スティック<br>リッカー | 最小二乗法  | 無        | 1976~2024 | 133.5 | 18.9  | 7  |
| ベバートン・ホルト          | 最小二乗法  | 無        | 1976~2024 | 133.8 | 19.2  | 8  |
| ベバートン・ホルト          | 最小二乗法  | 無        | 1976~2024 | 135.4 | 20.7  | 9  |
| ホッケー・スティック<br>リッカー | 最小絶対値法 | 無        | 1976~2024 | 130.5 | 15.8  | 4  |
| ベバートン・ホルト          | 最小絶対値法 | 無        | 1976~2024 | 132.9 | 18.2  | 5  |
| ベバートン・ホルト          | 最小絶対値法 | 無        | 1976~2024 | 133.1 | 18.5  | 6  |

自己相関の推定は、再生産関係のパラメータと同時に推定する同時推定法を用いた。この場合、残差の正規性を仮定した方が妥当なため、最適化法には最小二乗法を用いた。

## 期間で分けた場合

| 再生産関係式     | 最適化法       | 自己<br>相関 | 加入<br>期 | 期間                                   | AICc         | ΔAICc      | 順位       |
|------------|------------|----------|---------|--------------------------------------|--------------|------------|----------|
| ホッケー・スティック | 最小<br>二乗法  | 無        | 通常<br>高 | <b>1988~2024</b><br><b>1976~1987</b> | <b>113.4</b> | <b>3.1</b> | <b>4</b> |
| リッカー       | 最小<br>二乗法  | 無        | 通常<br>高 | 1988~2024<br>1976~1987               | 112.6        | 2.3        | 3        |
| ベバートン・ホルト  | 最小<br>二乗法  | 無        | 通常<br>高 | 1988~2024<br>1976~1987               | 117.9        | 7.6        | 5        |
| ホッケー・スティック | 最小<br>絶対値法 | 無        | 通常<br>高 | 1989~2024<br>1976~1987               | 112.1        | 1.8        | 2        |
| リッカー       | 最小<br>絶対値法 | 無        | 通常<br>高 | 1988~2024<br>1976~1987               | 110.3        | 0.0        | 1        |
| ベバートン・ホルト  | 最小<br>絶対値法 | 無        | 通常<br>高 | 1988~2024<br>1976~1987               | 118.3        | 7.9        | 6        |

表 1. (続き)

## b) 選択した再生産関係のパラメータ推定値

| 再生産<br>関係式 | 最適化法       | 加入期 | 自己<br>相関 | a     | b         | S.D. | $\rho$ |
|------------|------------|-----|----------|-------|-----------|------|--------|
| HS 型       | 最小<br>二乗値法 | 通常  | 無        | 0.027 | 1,197,721 | 0.75 | -      |

a は原点から折れ点までの傾き (尾/g)、b は折れ点での親魚量 (トン)、S.D. は加入のばらつきの大きさをあらわす指標 (対数残差の標準偏差)、 $\rho$  は自己相関係数である。

表 2. MSY 管理基準値等の算出および将来予測計算に用いた各種設定

| 年齢    | 自然死亡<br>係数 | 成熟率 | 平均体重 (g) |         | 選択率  | 現状の漁獲圧<br>( $F_{current}$ ) |
|-------|------------|-----|----------|---------|------|-----------------------------|
|       |            |     | 平均       | 四分位範囲   |      |                             |
| 0 歳   | 0.4        | 0.0 | 20       | 18 – 22 | 0.35 | 0.30                        |
| 1 歳   | 0.4        | 0.2 | 46       | 42 – 49 | 0.28 | 0.24                        |
| 2 歳   | 0.4        | 1.0 | 66       | 59 – 72 | 0.55 | 0.47                        |
| 3 歳   | 0.4        | 1.0 | 77       | 71 – 81 | 0.73 | 0.62                        |
| 4 歳   | 0.4        | 1.0 | 89       | 85 – 92 | 1.00 | 0.85                        |
| 5 歳以上 | 0.4        | 1.0 | 96       | 94 – 98 | 1.00 | 0.85                        |

$F_{current}$  は 2022～2024 年の F 値の年齢別平均値である。

近年観察されている体重の低下と資源尾数との間には負の相関関係が認められたため、2010 年以降のデータに基づき年齢別資源尾数と年齢別体重との間で負の非線形関係を推定し、年齢別資源尾数に対応して年齢別体重が変化することを将来予測計算の際に適用した (詳細は令和 7 年度資源評価 (FRA-SA2025-SC08-1) 補足資料 5 を参照)。

表 3. 各種管理基準値案における平衡状態のときの平均親魚量、直近（2024 年）の親魚量に対する比、漁業がなかった場合を仮定した初期親魚量（SB0）に対する比、期待できる平均漁獲量、%SPR 換算した漁獲圧、漁獲割合、現状の漁獲圧（2022～2024 年の漁獲圧）に対する漁獲圧の比、および SBmsy を維持する漁獲圧における年齢別漁獲係数（Fmsy）

| 管理<br>基準値案                                 | 親魚量<br>(万トン) | 現状の<br>親魚量に<br>対する比 | 初期<br>親魚量に<br>対する比                                                      | 期待できる<br>平均漁獲量<br>(万トン) | 漁獲圧<br>(%SPR) | 漁獲<br>割合<br>(%) | 現状の<br>漁獲圧に<br>対する比 |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 目標管理<br>基準値                                |              |                     |                                                                         |                         |               |                 |                     |
| 最大持続生産量<br>MSY を実現する<br>親魚量(SBmsy)         | 143.2        | 0.53                | 0.44                                                                    | 47.0                    | 43.6          | 18.7            | 0.61                |
| 限界管理<br>基準値                                |              |                     |                                                                         |                         |               |                 |                     |
| MSY の 60%の<br>漁獲が得られる<br>親魚量<br>(SB0.6msy) | 53.0         | 0.20                | 0.16                                                                    | 28.2                    | 30.2          | 26.2            | 1.01                |
| 禁漁水準                                       |              |                     |                                                                         |                         |               |                 |                     |
| MSY の 10%の<br>漁獲が得られる<br>親魚量<br>(SB0.1msy) | 5.3          | 0.02                | 0.02                                                                    | 4.7                     | 19.1          | 35.0            | 1.63                |
| SBmsy を<br>維持する<br>漁獲圧<br>(Fmsy)           |              |                     |                                                                         |                         |               |                 |                     |
|                                            |              |                     | (0 歳, 1 歳, 2 歳, 3 歳, 4 歳, 5+歳)<br>=(0.18, 0.14, 0.28, 0.37, 0.51, 0.51) |                         |               |                 |                     |

表 4. 将来の親魚量が目標管理基準値案を上回る確率 (%) (SC 補足表 4-1a)

| $\beta$ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.0     | 100  | 100  | 100  | 99   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.9     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.8     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.7     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.6     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.5     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.4     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.3     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.2     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.1     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.0     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 現状の漁獲圧  |      |      | 92   | 90   | 90   | 90   | 88   | 84   | 77   | 72   | 73   | 72   |

$\beta$  を 0～1.0 で変更した場合の将来予測の結果を示す。2025 年の漁獲量は現状の漁獲圧（F2022-2024）から予測される 110.2 万トンとし、2026 年から漁獲管理規則案による漁獲とした。比較のため現状の漁獲圧（F2022-F2024、 $\beta = 1.65$  に相当）で漁獲を続けた場合の結果も示した。

表 5. 将来の親魚量が限界管理基準値案を上回る確率 (%) (SC 補足表 4-1b)

| $\beta$ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.0     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.9     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.8     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.7     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.6     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.5     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.4     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.3     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.2     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.1     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.0     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 現状の漁獲圧  |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

$\beta$  を 0.0～1.0 で変更した場合の将来予測の結果を示す。2024 年の漁獲量は現状の漁獲圧（Fcurrent）から予測される 110.2 万トンとし、2026 年から漁獲管理規則案による漁獲とした。比較のため現状の漁獲圧（Fcurrent、 $\beta = 1.65$  に相当）で漁獲を続けた場合の結果も示した。

表 6. 将来の親魚量が禁漁水準を上回る確率 (%)

| $\beta$ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.0     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.9     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.8     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.7     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.6     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.5     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.4     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.3     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.2     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.1     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.0     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 現状の漁獲圧  |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

$\beta$  を 0.0～1.0 で変更した場合の将来予測の結果を示す。2024 年の漁獲量は現状の漁獲圧 ( $F_{\text{current}}$ ) から予測される 110.2 万トンとし、2026 年から漁獲管理規則案による漁獲とした。比較のため現状の漁獲圧 ( $F_{\text{current}}$ 、 $\beta = 1.65$  に相当) で漁獲を続けた場合の結果も示した。

表 7. 将来の平均親魚量 (万トン) (SC 補足表 4-2)

| $\beta$ | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  | 2036  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.0     | 204.3 | 187.0 | 210.3 | 234.9 | 248.5 | 255.5 | 254.8 | 244.6 | 237.7 | 233.4 | 232.2 | 230.5 |
| 0.9     |       |       | 214.6 | 243.5 | 260.1 | 268.9 | 269.1 | 259.0 | 251.9 | 247.3 | 245.9 | 244.0 |
| 0.8     |       |       | 219.1 | 252.6 | 272.4 | 283.4 | 284.7 | 274.9 | 267.7 | 262.8 | 261.1 | 259.1 |
| 0.7     |       |       | 223.7 | 262.1 | 285.6 | 299.1 | 301.8 | 292.5 | 285.2 | 280.0 | 278.1 | 275.9 |
| 0.6     |       |       | 228.4 | 272.0 | 299.7 | 316.1 | 320.6 | 312.0 | 304.8 | 299.3 | 297.2 | 294.8 |
| 0.5     |       |       | 233.3 | 282.4 | 314.7 | 334.7 | 341.3 | 333.6 | 326.7 | 321.1 | 318.8 | 316.3 |
| 0.4     |       |       | 238.3 | 293.4 | 330.8 | 354.8 | 364.1 | 357.9 | 351.5 | 345.9 | 343.5 | 340.8 |
| 0.3     |       |       | 243.4 | 304.9 | 348.1 | 376.9 | 389.5 | 385.2 | 379.7 | 374.3 | 371.9 | 369.1 |
| 0.2     |       |       | 248.7 | 317.0 | 366.6 | 400.9 | 417.7 | 415.9 | 411.9 | 407.1 | 405.0 | 402.2 |
| 0.1     |       |       | 254.1 | 329.7 | 386.5 | 427.4 | 449.1 | 450.9 | 449.0 | 445.3 | 443.8 | 441.4 |
| 0.0     |       |       | 259.7 | 343.0 | 407.9 | 456.4 | 484.4 | 490.7 | 491.9 | 490.2 | 489.9 | 488.2 |
| 現状の漁獲圧  |       |       | 184.5 | 187.1 | 187.8 | 188.1 | 184.9 | 175.4 | 170.2 | 167.7 | 167.4 | 166.2 |

$\beta$  を 0.0～1.0 で変更した場合の将来予測の結果を示す。2025 年の漁獲量は現状の漁獲圧 ( $F_{2022-2024}$ ) から予測される 110.2 万トンとし、2026 年から漁獲管理規則案による漁獲とした。比較のため現状の漁獲圧 ( $F_{2022-2024}$ 、 $\beta = 1.65$  に相当) で漁獲を続けた場合の結果も示した。

表 8. 将来の平均漁獲量（万トン）（SC 補足表 4-3）

| $\beta$ | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.0     | 110.3 | 66.1 | 70.9 | 77.5 | 81.5 | 82.5 | 81.8 | 79.8 | 78.1 | 76.8 | 75.7 | 74.9 |
| 0.9     |       | 60.3 | 65.9 | 73.0 | 77.5 | 78.9 | 78.6 | 76.9 | 75.3 | 73.9 | 72.9 | 72.1 |
| 0.8     |       | 54.4 | 60.5 | 67.9 | 72.8 | 74.7 | 74.7 | 73.3 | 71.9 | 70.6 | 69.6 | 68.8 |
| 0.7     |       | 48.3 | 54.7 | 62.3 | 67.5 | 69.9 | 70.2 | 69.1 | 67.8 | 66.6 | 65.6 | 64.9 |
| 0.6     |       | 42.0 | 48.5 | 56.0 | 61.4 | 64.1 | 64.8 | 64.1 | 63.0 | 61.8 | 60.9 | 60.3 |
| 0.5     |       | 35.5 | 41.8 | 49.0 | 54.4 | 57.4 | 58.4 | 57.9 | 57.1 | 56.1 | 55.3 | 54.7 |
| 0.4     |       | 28.9 | 34.6 | 41.2 | 46.3 | 49.4 | 50.6 | 50.5 | 49.9 | 49.1 | 48.5 | 48.0 |
| 0.3     |       | 22.0 | 26.8 | 32.5 | 37.1 | 40.0 | 41.3 | 41.5 | 41.2 | 40.6 | 40.1 | 39.7 |
| 0.2     |       | 14.9 | 18.5 | 22.8 | 26.4 | 28.8 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 30.0 | 29.7 | 29.4 |
| 0.1     |       | 7.6  | 9.6  | 12.0 | 14.1 | 15.7 | 16.5 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.5 |
| 0.0     |       | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 現状の漁獲圧  |       | 99.7 | 96.3 | 97.5 | 97.8 | 95.8 | 93.5 | 90.6 | 88.6 | 87.6 | 86.5 | 85.5 |

$\beta$  を 0.0～1.0 で変更した場合の将来予測の結果を示す。2025 年の漁獲量は現状の漁獲圧（F2022-2024）から予測される 110.3 万トンとし、2026 年から漁獲管理規則案による漁獲とした。比較のため現状の漁獲圧（F2022-F2024、 $\beta = 1.65$  に相当）で漁獲を続けた場合の結果も示した。

表 9. 管理方策案のパフォーマンス評価の概要

| $\beta$ | 2026 年の平均漁獲量<br>(万トン) | 2027-2035 年の平均漁獲量<br>(万トン) | 2031 年に親魚資源量が目標管理基準値案を上回る確率 | 2036 年に親魚資源量が目標管理基準値案を上回る確率 | 親魚資源量が 10 年間で限界管理基準値案を下回る平均年数 | 漁獲圧が 10 年間で $F_{msy}$ を上回る平均年数 | 2026-2035 年の漁獲量の平均年変動 | 2036 年の平均親魚量(万トン) |
|---------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.0     | 66.0                  | 78.4                       | 100%                        | 100%                        | 0.00                          | 0.00                           | 6.2%                  | 230.8             |
| 0.9     | 60.2                  | 74.9                       | 100%                        | 100%                        | 0.00                          | 0.00                           | 6.5%                  | 244.4             |
| 0.8     | 54.3                  | 70.8                       | 100%                        | 100%                        | 0.00                          | 0.00                           | 6.8%                  | 259.5             |
| 0.7     | 48.2                  | 66.1                       | 100%                        | 100%                        | 0.00                          | 0.00                           | 7.2%                  | 276.3             |
| 0.6     | 42.0                  | 60.6                       | 100%                        | 100%                        | 0.00                          | 0.00                           | 7.7%                  | 295.3             |
| 0.5     | 35.5                  | 54.2                       | 100%                        | 100%                        | 0.00                          | 0.00                           | 8.3%                  | 316.8             |
| 0.4     | 28.8                  | 46.7                       | 100%                        | 100%                        | 0.00                          | 0.00                           | 9.0%                  | 341.4             |
| 0.3     | 21.9                  | 37.9                       | 100%                        | 100%                        | 0.00                          | 0.00                           | 9.7%                  | 369.8             |
| 0.2     | 14.9                  | 27.5                       | 100%                        | 100%                        | 0.00                          | 0.00                           | 10.5%                 | 403.0             |
| 0.1     | 7.5                   | 15.0                       | 100%                        | 100%                        | 0.00                          | 0.00                           | 11.4%                 | 442.2             |
| 0.0     | 0.0                   | 0                          | 100%                        | 100%                        | 0.00                          | 0.00                           |                       | 489.2             |

### 補足資料 1 再生産関係式のモデル診断結果について

最大持続生産量（MSY）を実現する親魚量の算出および将来予測計算に使用する再生産関係として、ホッケー・スティック（HS ; Clark et al., 1985）型、ベバートン・ホルト（BH ; Beverton and Holt 1957）型、およびリッカー（RI ; Ricker 1954）型の再生産関係式を検討した。 $R_y$  を  $y$  年の加入量、 $B_y$  を  $y$  年当初の親魚量、 $A_{min}$  を加入年齢（本系群の場合は  $A_{min}$  は 0 歳）としたときのそれぞれの再生産関係式の数式は以下の通りである；

$$R_y = \begin{cases} ab & \text{if } B_{y-A_{min}} > b \\ aB_{y-A_{min}} & \text{if } B_{y-A_{min}} \leq b \end{cases} \quad (\text{Hockey stick, HS})$$

$$R_y = \frac{aB_{y-A_{min}}}{(1 + bB_{y-A_{min}})} \quad (\text{Beverton Holt, BH})$$

$$R_y = aB_{y-A_{min}} \exp(-bB_{y-A_{min}}) \quad (\text{Ricker, RI})$$

いずれの再生産関係式でも、推定するパラメータは  $a$  および  $b$  の 2 つである。HS 型の場合、 $a$  は折れ点までの再生産曲線の傾き（尾/トン）、 $b$  は折れ点となる親魚量（トン）を示す。再生産関係の検討の際には、推定された再生産曲線からの加入量の残差標準偏差（S.D.）も併せて算出した。

全期間（1976~2018 年）データを使用する場合、ホッケー・スティック型（HS）、リッカー型（RI）、ベバートン・ホルト型（BH）の再生産関係式を、最適化手法として最小二乗法および最小絶対値法を用いてそれぞれ求めた。自己相関は、自己相関パラメータ  $\rho$  もモデルに組み込み、再生産関係式のパラメータと自己相関パラメータを同時に推定する同時推定法を用いた。この場合、残差の正規性を仮定した方が妥当なため、最適化法には最小二乗法を用いた。推定された各再生産関係を補足図 1-1 に、パラメータを補足表 1-1 に示す。再生産関係式によらず、残差に自己相関を考慮したモデルの方が、補正赤池情報量規準（AICc）は低かった。

マイワシ太平洋系群は、数十年スケールの地球規模の大気～海洋生態系の構造の転換（レジームシフト）と同期して大きく資源変動することが知られている（Kawasaki 1992、Klyashtorin 1998、Chavez et al. 2003）。海洋環境などの変化は、環境収容力や加入成功などに影響し（Tanaka 2003、Yatsu et al. 2005、Furuichi et al. 2020）、再生産関係も変化する可能性が考えられる。全期間のデータに再生産関係を当てはめたときに、加入量の残差に自己相関が見られたことも、期間によって再生産関係が異なることに起因するかもしれない。そこで、1976~2024 年の加入量水準に基づいて、再生産関係が通常加入期と高加入期の二種類の様態に分けられるとし、高加入期から通常加入期に切り替わったと仮定した。再生産関係が切り替わる時期は、マイワシの資源変動と海洋環境との関係に関する既往の研究成果をもとに 1988 年とした（Yatsu et al. 2005、Takahashi et al. 2009、Kurota et al. 2020）。

再生産関係の型に関わらず、通常加入期と高加入期に分けた場合の方が、全期間でひとつの再生産関係とした場合よりも、AICc は低かった（補足表 1-2）。期間で分けた再生産関係の中では、最適化手法として最小絶対値法を用いた方が AICc は低かったが、パラメータの推定が不安定であり、また最小二乗法を用いた場合と推定されたパラメータに大きな差はなかったため、最小二乗法を最適化手法の候補とした。最小二乗法を用いて求め

た再生産関係の中では、AICc 等は BH 型で相対的に高く、HS 型および RI 型の間での差は小さかった。

本系群の再生産関係として提案する、再生産関係を期間で分けた場合の最小二乗法にもとづく HS 型再生産関係式のモデル診断を行った。残差トレンドと自己相関プロットを補足図 1-2 に示す。残差の時系列に着目すると、近年の加入量の残差は正に偏っており、残差の自己相関が見られた。加えて、再生産関係モデルに対する残差の正規性について、Shapiro-Wilk 検定および Kolmogorov-Smirnov 検定により検討すると、Shapiro-Wilk 検定において正規分布からの有意な逸脱が検出された（補足図 1-3）。これらは、再生産関係を期間で分けたものの、加入に自己相関がある可能性について十分対処できていないことが原因として考えられる。再生産関係を期間で分けた場合における自己相関の取り扱いや、再生産関係の切り替わりの検出やタイミングの判別手法の開発については今後の課題である。


パラメータの推定における個々のデータの影響を、データを 1 年ずつ除くジャックナイフ解析で検討した。高加入期のデータは少なかったが、高加入期の再生産関係式のパラメータ推定において、影響の大きいデータは 1 点（1979 年）だけであった（補足図 1-4 および 1-5）。一方、通常加入期の再生産関係においては、各パラメータの推定値に大きな変化は見られず、推定された再生産関係は頑健であった（補足図 1-4 および 1-5）。また、残差のノンパラメトリックブートストラップを 1000 回行ったところ、すべてのパラメータでほとんどバイアスは見られなかった（補足図 1-6 および 1-7）。加えて、パラメータ a、b を変化させた場合のプロファイル尤度は、推定値で最大になっていることが確認された（補足図 1-8）。

## 引用文献

- Beverton R. J. H., and S. J. Holt (1957). On the dynamics of exploited fish populations. Her Majesty's Stationary Office, London.
- Chavez, F.P., J. Ryan, S.E. Lluch-Cota, C.M. Niquen (2003) From anchovies to sardines and back: multidecadal change in the Pacific Ocean. *Science* **299**, 217–221.
- Clark C. W., A. T. Charles, J. R. Beddington, and M. Mangel (1985). Optimal capacity decisions in a developing fishery. *Mar. Resour. Econ.*, 2, 25-53.
- Furuichi, S., Niino, Y., Kamimura, Y. and R. Yukami (2020) Time-varying relationships between early growth rate and recruitment in Japanese sardine. *Fish. Res.*, **232**, 105723.
- Kawasaki, T. (1992) Climate-dependent fluctuations in far eastern sardine population and their impacts on fisheries and society. In: *Climate variability, climate change and fisheries*, ed. Glantz, M.H., Cambridge University press, Cambridge, pp. 325-354.
- Klyashtorin, L. B. (1998) Long-term climate change and main commercial fish production in the Atlantic and Pacific. *Fish. Res.*, 37, 115-125.
- Kurota, H., C.S. Szuwalski, M. Ichinokawa (2020) Drivers of recruitment dynamics in Japanese major fisheries resources: Effects of environmental conditions and spawner abundance. *Fish.*


- Res. 221, 105353.
- Ricker W. E. (1954). Stock and recruitment. J. Fish. Res. Board Can., **11**, 559–623.
- 水産研究・教育機構 (2025) 再生産関係の推定・管理基準値計算・将来予測シミュレーションに関する技術ノート(令和 7 年度研究機関会議版). FRA-SA202x-ABCWG02-04.
- Takahashi, M., Y. Watanabe, A. Yatsu, H. Nishida (2009) Contrasting responses in larval and juvenile growth to a climate-ocean regime shift between anchovy and sardine. Can. J. Fish. Aquat. Sci. **66**, 972–982.
- Tanaka E (2003) A method for estimating dynamics of carrying capacity using time series of stock and recruitment. Fish. Sci., **69**, 677-686.
- Yatsu, A., T. Watanabe, M. Ishida, H. Sugisaki, L.D. Jacobsen (2005) Environmental effects on recruitment and productivity of Japanese sardine *Sardinops melanostictus* and chub mackerel *Scomber japonicus* with recommendations for management. Fish. Oceanogr. **14**, 263–278.

(a) 全期間のデータに当てはめた場合 | 最小二乗法




(b) 期間で分けた場合 | 最小二乗法

黒丸・点線：高加入期、白丸・実線：通常加入期




(c) 期間で分けた場合 | 最小絶対値法

黒丸・点線：高加入期、白丸・実線：通常加入期




補足図 1-1. 各モデルにおける再生産関係式

(a) 全期間のデータに当てはめた場合（自己相関は同時推定）、(b) 期間で分け、最小二乗法で最適化した場合、(c) 期間で分け、最小絶対値法で最適化した場合。ホッケー・スティック型（HS）、リッカー型（RI）、ベバートン・ホルト型（BH）の再生産関係式がそれぞれ書かれている。丸印は分析に使用した親魚量・加入尾数（1976～2024 年）である。図中の数字は年級群を示す。




補足図 1-2. ホッケー・スティック型を仮定し再生産関係期間で分けたモデルを最小二乗法で当てはめた場合の残差トレンド（左図）、自己相関プロット（中央図）、および Ljung-Box 検定における P 値（右図）

標準化残差の時系列の図中の赤線は平滑化された曲線、垂直方向の青色の点線は再生産関係が切り替わる時点を表している。コレログラムの図中の青色の点線は 95%信頼区間を、Ljung-Box 検定における P 値の図中の青色の点線は 5%水準を表している。




補足図 1-3. ホッケー・スティック型を仮定し再生産関係期間で分けたモデルを最小二乗法で当てはめた場合の標準化残差のヒストグラムと正規性テスト結果（左図）、残差の累積確率密度のヒストグラム（中央図）、および一様分布を仮定した QQ プロット（右図）


残差のヒストグラムの右上の数値は Shapiro-Wilk 検定（SW）と Kolmogorov-Smirnov 検定（KS）の結果である。どちらも、帰無仮説は「正規分布に従っている」である。QQ プロットの赤線は理論値を示している。



補足図 1-4. ホッケー・スティック型を仮定し再生産関係期間で分けたモデルを最小二乗法で当てはめた場合のジャックナイフ解析での推定結果  
赤線は全データの推定値、青線は各年のデータを除外した場合の推定値である。分析に使用した親魚量・加入尾数を丸印で示す。左図は高加入期（Regime0）、右図は通常加入期（Regime1）の結果を示す。




補足図 1-5. ホッケー・スティック型を仮定し再生産関係期間で分けたモデルを最小二乗法で当てはめた場合のジャックナイフ解析でのパラメータ別の影響  
上段は高加入期（Regime0）、下段は通常加入期（Regime1）の結果を示す。青色の点線は再生産関係が切り替わる時点を表している。




補足図 1-6. ホッケー・スティック型を仮定し再生産関係期間で分けたモデルを最小二乗法で当てはめた場合の残差ブートストラップ解析の結果  
 赤線は元データでの推定値、青線はノンパラメトリックブートストラップでの推定値である。分析に使用した親魚量・加入尾数を丸印で示す。左図は高加入期 (Regime0)、右図は通常加入期 (Regime1) の結果を示す。


## 高加入期



## 通常加入期



補足図 1-7. ホッケー・スティック型を仮定し再生産関係期間で分けたモデルを最小二乗法で当てはめた場合の残差ブートストラップ解析での中央値（緑点線）と 80%信頼区間（青線）  
赤線はパラメータの点推定値である。上段は高加入期（Regime0）、下段は通常加入期（Regime1）の結果を示す。



補足図 1-8. ホッケー・スティック型を仮定し再生産関係期間で分けたモデルを最小二乗法で当てはめた場合の推定パラメータのプロファイル尤度  
 ×印は推定されたパラメータ値における尤度に相当する。左図は高加入期 (Regime0)、右図は通常加入期 (Regime1) の結果を示す。

補足表 1-1. MSY 管理基準値算出に使用した再生産関係式における各パラメータ推定値

## a) 全期間のデータに基づく再生産関係式における各パラメータ推定値

| 再生産<br>関係式     | 最適化法       | 自己<br>相関 | 推定<br>法 | a     | b        | S.D. | $\rho$ | R0     | h    | データ<br>数 |
|----------------|------------|----------|---------|-------|----------|------|--------|--------|------|----------|
| ホッケー・<br>スティック | 最小<br>二乗法  | 有        | 同時      | 0.033 | 1819245  | 0.71 | 0.61   | 60867  | 0.71 | 49       |
| リッカー           | 最小<br>二乗法  | 有        | 同時      | 0.034 | 1.59E-07 | 0.72 | 0.58   | 76816  | 0.54 | 49       |
| ベバートン・<br>ホルト  | 最小<br>二乗法  | 有        | 同時      | 0.043 | 5.23E-07 | 0.72 | 0.63   | 63297  | 0.52 | 49       |
| ホッケー・<br>スティック | 最小<br>二乗法  | 無        | -       | 0.029 | 2471571  | 0.72 | 0      | 72249  | 0.66 | 49       |
| リッカー           | 最小<br>二乗法  | 無        | -       | 0.031 | 1.32E-07 | 0.73 | 0      | 85463  | 0.50 | 49       |
| ベバートン・<br>ホルト  | 最小<br>二乗法  | 無        | -       | 0.032 | 2.30E-07 | 0.73 | 0      | 95039  | 0.45 | 49       |
| ホッケー・<br>スティック | 最小<br>絶対値法 | 無        | -       | 0.026 | 5989909  | 0.76 | 0      | 156475 | 0.62 | 49       |
| リッカー           | 最小<br>絶対値法 | 無        | -       | 0.025 | 3.50E-08 | 0.76 | 0      | 267468 | 0.43 | 49       |
| ベバートン・<br>ホルト  | 最小<br>絶対値法 | 無        | -       | 0.025 | 4.06E-08 | 0.76 | 0      | 385816 | 0.39 | 49       |

補足表 1-1. (続き)

## b) 再生産関係式を期間で分けたモデルにおける各パラメータ推定値

| 再生産関係式         | 最適化<br>法       | 期間            | 加入<br>期 | a     | b         | S.D. | $\rho$ | R0     | h    | データ<br>数 |
|----------------|----------------|---------------|---------|-------|-----------|------|--------|--------|------|----------|
| ホッケー・<br>スティック | 最小<br>二乗法      | 1988~<br>2024 | 通常      | 0.027 | 1,197,721 | 0.75 | 0      | 32770  | 0.73 | 49       |
|                |                | 1976~<br>1987 | 高       | 0.036 | 5,612,630 | 0.46 | 0      | 201433 | 0.64 |          |
| リッカー           | 最小<br>二乗法      | 1988~<br>2024 | 通常      | 0.031 | 2.68E-07  | 0.76 | 0      | 41737  | 0.50 | 49       |
|                |                | 1976~<br>1987 | 高       | 0.052 | 9.68e-08  | 0.44 | 0      | 168786 | 0.76 |          |
| ベバートン・<br>ホルト  | 最小<br>二乗法      | 1988~<br>2024 | 通常      | 0.035 | 7.94E-07  | 0.82 | 0      | 31219  | 0.47 | 49       |
|                |                | 1976~<br>1987 | 高       | 0.064 | 2.23e-07  | 0.43 | 0      | 243615 | 0.62 |          |
| ホッケー・<br>スティック | 最小<br>絶対値<br>法 | 1988~<br>2024 | 通常      | 0.024 | 1,375,575 | 0.76 | 0      | 33227  | 0.59 | 49       |
|                |                | 1976~<br>1987 | 高       | 0.038 | 5,613,207 | 0.46 | 0      | 210570 | 0.74 |          |
| リッカー           | 最小<br>絶対値<br>法 | 1988~<br>2024 | 通常      | 0.026 | 2.34E-07  | 0.77 | 0      | 40542  | 0.43 | 49       |
|                |                | 1976~<br>1987 | 高       | 0.063 | 1.08e-07  | 0.45 | 0      | 168202 | 0.88 |          |
| ベバートン・<br>ホルト  | 最小<br>絶対値<br>法 | 1988~<br>2024 | 通常      | 0.027 | 4.73E-07  | 0.84 | 0      | 36396  | 0.41 | 49       |
|                |                | 1976~<br>1987 | 高       | 0.075 | 2.34e-07  | 0.45 | 0      | 283550 | 0.65 |          |

選択した再生産関係式を太字とした。S.D.は加入のばらつきの大きさをあらわす指標で、対数残差の標準偏差（Standard Deviation、平均二乗誤差の平方根）である。加入残差の自己相関を考慮した場合は、自己相関パラメータ  $\rho$  についても示した。R0 は SB0 のときの平均加入尾数である。h（スティープネス）は再生産関係の密度保障効果の程度を示す指標であり、RI 型および BH 型の場合は 0.2SB0 のときの平均加入尾数を R0 で割った値、HS 型の場合は  $1-SBhs/SB0$ （SBhs は HS の折れ点）となる値である。

## 補足資料 2 将来予測の計算方法

資源尾数や漁獲量の予測は、統計ソフトウェア R (version 4.1.1) 用計算パッケージ frasyr (コミット番号: @05eacac) を用いて実施した。将来予測における加入量は、本資料において提案された通常加入期のホッケー・スティック型再生産関係と年々推定される親魚量から求めた。最大持続生産量 (MSY) に対応する管理基準値案等の算出においては、加入量の誤差は対数正規分布を仮定した。将来予測においては、残差のバックワードリサンプリングによって加入量の誤差を与えた。本資源では、2010 年以降、通常加入期の再生産関係から予測される平均値より高い加入量が生じることが多く、今後も（少なくとも短期的には）良好な加入が継続することは十分に想定されるため、この加入量の良好な傾向を取り入れた将来予測を行った。具体的には、2025 年以降の加入量を、観測値と再生産関係式の残差のランダムなリサンプリングによって与え、後ろ向きに時代を区切って残差のリサンプリングを行った（補足図 2-1、2-2）。

将来予測における漁獲係数  $F$  は、「令和 7 (2025) 年度 漁獲管理規則および ABC 算定のための基本指針 (FRA-SA2025-ABCWG02-01)」における 1 系資源の管理規則に基づき算出される値を用いた。将来予測における選択率や漁獲物平均体重等の値には、MSY 管理基準値等の算出に用いた各種設定を用いた (表 2)。これらは再生産関係と同じく、令和 7 (2025) 年度の資源評価 (FRA-SA2025-SC08-1) に基づく値である。

資源尾数の予測には、コホート解析の前進法 ((1) 式) を用いた。

$$N_{a+1,y+1} = N_{a,y} \exp(-F_{a,y} - M) \quad \text{※} a < 4 \text{ の場合} \quad (1a)$$


$$N_{5+,y+1} = (N_{5+,y} + N_{4,y}) \exp(-F_{4,y} - M) \quad \text{※最高齢グループ} \quad (1b)$$

漁獲尾数は上記で求めた資源尾数と各漁獲シナリオから仮定される  $F$  値をもとに (2) 式により求めた。


$$C_{a,y} = N_{a,y} \{1 - \exp(-F_{a,y})\} \exp\left(-\frac{M}{2}\right) \quad (2)$$

## 引用文献

古市 生・由上龍嗣・上村泰洋・西嶋翔太・井須小羊子・伊澤雄登・東口胤成・渡部亮介  
(2025) 令和 7 (2025) 年度マイワシ太平洋系群の資源評価. FRA-SA2025-SC08-1.  
水産研究・教育機構 (2025) 令和 7 (2025) 年度 漁獲管理規則および ABC 算定のための基本指針. FRA-SA2025-ABCWG02-01, 水産研究・教育機構, 横浜.



補足図 2-1. バックワードリサンプリングの概念図（SC 補足図 5-1）



補足図 2-2. 加入量の予測値に対する観測値の残差（1988～2024 年）と将来予測において用いられた残差（SC 補足図 5-2）

### 補足資料 3 再生産関係式と MSY 管理基準値推定の感度試験

再生産関係による MSY 管理基準値の違いを把握するため、3 通りの再生産関係と最適化方法の組み合わせで、それぞれ通常加入期（1988～2024 年）における MSY 管理基準値を推定した。比較対象とした再生産関係は、HS 型再生産関係、RI 型再生産関係、および BH 型再生産関係で、いずれも最小二乗法で当てはめた場合である。残差の自己相関は推定しなかった。各再生産関係から推定された MSY 管理基準値を補足表 3-1 に示す。




SBmsy は RI 型で一番高く、SB0.6msy と SB0.1msy は HS 型が高かった。Fmsy は HS 型で一番高く、MSY も高くなっていた。RI 型および BH 型を適用した場合、HS 型に比べて、本資源の漁獲圧は Fmsy をより高く上回って推移していると判断される（補足図 3-1）。

参考までに、高加入期（1976～1987 年）における HS 型再生産関係、および再生産関係が期を通じてひとつの場合の HS 型再生産関係から推定された MSY 管理基準値を示す（補足表 3-1）。高加入期の再生産関係は、高い加入量を想定するため、通常加入期の HS 型に比べて管理基準値や Fmsy が高くなり、MSY が大きくなる。一方で、期を通じてひとつの再生産関係では、通常加入期の HS 型に比べて管理基準値は高くなったが、Fmsy は低くなっていた。

補足表 3-1. 各再生産関係から求められる MSY 管理基準値

| 加入様態          | 通常加入期     | 通常加入期     | 通常加入期     | 高加入期      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 再生産関係         | HS 型      | RI 型      | BH 型      | HS 型      |
| 最適化方法         | 最小二乗法     | 最小二乗法     | 最小二乗法     | 最小二乗法     |
| SBmsy         | 143.2 万トン | 168.6 万トン | 110.0 万トン | 654.1 万トン |
| SB0.6msy      | 53.0 万トン  | 49.5 万トン  | 28.8 万トン  | 272.7 万トン |
| SB0.1msy      | 5.3 万トン   | 4.3 万トン   | 2.4 万トン   | 28.9 万トン  |
| MSY           | 47.0 万トン  | 43.7 万トン  | 29.5 万トン  | 248.6 万トン |
| Umsy          | 0.19      | 0.15      | 0.16      | 0.21      |
| Fmsy/Fcurrent | 0.61      | 0.47      | 0.48      | 0.72      |

| 加入様態          | 期を通じて1つ   |
|---------------|-----------|
| 再生産関係         | HS 型      |
| 最適化方法         | 最小二乗法     |
| SBmsy         | 262.9 万トン |
| SB0.6msy      | 74.1 万トン  |
| SB0.1msy      | 6.2 万トン   |
| MSY           | 65.3 万トン  |
| Umsy          | 0.15      |
| Fmsy/Fcurrent | 0.45      |



補足図 3-1. 通常加入期の管理基準値にもとづいた神戸プロット

(上図) HS 型、(中図) RI 型、(下図) BH 型

縦軸は各年の漁獲圧  $F$  の  $F_{msy}$  との比、横軸は各年の親魚量  $SSB$  と  $SB_{msy}$  との比である。参考として横軸には  $SB_{0.6msy}$ 、 $SB_{0.1msy}$  の比も示した。

#### 補足資料 4 通常加入期の HS 型の資源減少リスクの評価


HS 型の再生産関係は、RI 型の再生産関係に比べ、 $F_{msy}$  がわずかに高い特徴がある（補足表 3-1）。そのため、RI 型の再生産関係が正しい時に HS 型の再生産関係を誤って適用した場合、漁獲可能量を過大に予測し、資源が減少するリスクが考えられる。逆に、HS 型の再生産関係が正しい時に RI 型の再生産関係を誤って適用した場合、漁獲可能量を過小に予測し、漁獲機会を損失するリスクが考えられる。

そこで、簡易的な MSE により、通常加入期において①真の再生産関係が RI 型であるときに、HS 型の再生産関係を適用して管理した場合、②真の再生産関係が HS 型の再生産関係であるときに、RI 型の再生産関係を適用して管理した場合について、資源減少のリスクを評価した。なお、MSE 実施時の  $\beta$  は 0.8 とした。


①真の再生産関係が RI 型の再生産関係であるときに、HS 型の再生産関係を適用して管理した場合は、漁獲圧が高く、親魚量が管理開始 10 年後に RI 型の目標管理基準値を上回る確率は 50%を下回ったが、限界管理基準値を上回る確率は 96%以上であった（補足図 4-1、4-2）。漁獲量の減少は見られなかった。

②真の再生産関係が HS 型の再生産関係であるときに、RI 型の再生産関係を適用して管理した場合は、漁獲圧が低いため、親魚量は高い水準で維持される予測となった（補足図 4-3、4-4）。2026 年および管理開始 5 年後、10 年後にわたって平均漁獲量は 2~8 万トン低く推定され、漁獲機会損失のリスクを示唆された。


以上のように、真の再生産関係が RI 型であった場合に HS 型を誤って採用した場合には、親魚量の減少リスクが多少生じるが、現状の資源状態においては HS 型の再生産関係を適用することに大きな問題はないと判断した。




補足図 4-1. 通常加入期において真の再生産関係が RI 型であるときに、HS 型の再生産関係を適用した場合の加入尾数、親魚量、漁獲量、漁獲圧の比の将来予測  
目標管理基準値案、限界管理基準値案は真の再生産関係である RI 型の管理基準値案を示す。**simple** は真の再生産関係が RI 型であるときに、HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、**projection** は真の再生産関係が RI 型であるときに、RI 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、**backward** は **simple** と同じだが ABC 計算時に加入量の誤差に残差のバックワードリサンプリングを適用した場合の将来予測を示す。



補足図 4-2. 通常加入期において真の再生産関係が RI 型であるときに、HS 型の再生産関係を適用した場合の 2026 年、2031 年、2036 年の平均親魚量、目標管理基準値案を上回る確率、平均漁獲量、限界管理基準値案を上回る確率  
 目標管理基準値案、限界管理基準値案は真の再生産関係である RI 型の管理基準値案を示す。simple は真の再生産関係が RI 型であるときに、HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、projection は真の再生産関係が RI 型であるときに、RI 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、backward は simple と同じだが ABC 計算時に加入量の誤差に残差のバックワードリサンプリングを適用した場合の将来予測を示す。



補足図 4-3. 通常加入期において真の再生産関係が HS 型であるときに、RI 型の再生産関係を適用した場合の加入尾数、親魚量、漁獲量、漁獲圧の比の将来予測  
目標管理基準値案、限界管理基準値案は真の再生産関係である HS 型の管理基準値案を示す。simple は真の再生産関係が HS 型であるときに、RI 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、projection は真の再生産関係が HS 型であるときに、HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、backward は simple と同じだが ABC 計算時に加入量の誤差に残差のバックワードリサンプリングを適用した場合の将来予測を示す。



補足図 4-4. 通常加入期において真の再生産関係が HS 型であるときに、RI 型の再生産関係を適用した場合の 2026 年、2031 年、2036 年の平均親魚量、目標管理基準値案を上回る確率、平均漁獲量、限界管理基準値案を上回る確率  
 目標管理基準値案、限界管理基準値案は真の再生産関係である HS 型の管理基準値案を示す。simple は真の再生産関係が HS 型であるときに、RI 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、projection は真の再生産関係が HS 型であるときに、HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、backward は simple と同じだが ABC 計算時に加入量の誤差に残差のバックワードリサンプリングを適用した場合の将来予測を示す。

### 補足資料 5 加入期間の分割に対する資源減少リスクの評価


通常加入期（1988～2024 年）の再生産関係に基づく管理基準値案は、全期間（1976～2024 年）の再生産関係に基づく管理基準値案に比べて低くなり、親魚量が少ない場合の漁獲圧は高くなる（表 3 および補足表 3-1）。全期間の再生産関係が正しい時に通常加入期の再生産関係を誤って適用した場合、漁獲可能量を過大に予測し、資源が減少するリスクが考えられる。逆に、通常加入期の再生産関係が正しい時に全期間の再生産関係を誤って適用した場合、漁獲可能量を過小に予測し、漁獲機会を損失するリスクが考えられる。

そこで、簡易的な MSE により、①真の再生産関係が全期間の HS 型であるときに、通常加入期の HS 型の再生産関係を適用して管理した場合、②真の再生産関係が通常加入期の HS 型の再生産関係であるときに、全期間の HS 型の再生産関係を適用して管理した場合について、資源減少や漁獲機会損失のリスクを評価した。なお、MSE 実施時の  $\beta$  は 0.8 とした。


①真の再生産関係が全期間の HS 型であるときに、通常加入期の HS 型の再生産関係を適用して管理した場合は、漁獲圧が高く、親魚量が管理開始 10 年後に全期間の HS 型の目標管理基準値を上回る確率は 31～34%、限界管理基準値を上回る確率は 78～81%であり、親魚量の平均値は目標管理基準値をわずかに下回る水準で維持されると予測された（補足図 5-1、5-2）。一方で、漁獲量の減少は見られなかった。加入様態の仮定の選択が誤っていた場合に生じる資源量の減少のリスクを抑えるためには、 $\beta$  を小さくする必要がある。

②真の再生産関係が通常加入期の HS 型の再生産関係であるときに、全期間の HS 型の再生産関係を適用して管理した場合は、漁獲圧が低いため、親魚量は高い水準で維持される予測となった（補足図 5-3、5-4）。2026 年および管理開始 5 年後、10 年後にわたって平均漁獲量は 5～7 万トン低く推定され、漁獲機会損失のリスクが示唆された。

通常加入期の HS 型を誤って採用した場合、真の再生産関係が全期間の HS 型であっても親魚量の減少リスクは軽度であると考えられることから、HS 型の再生産関係の適用に大きな問題はないと判断した。




補足図 5-1. 真の再生産関係が全期間の HS 型であるときに、通常加入期の HS 型の再生産関係を適用した場合の加入尾数、親魚量、漁獲量、漁獲圧の比の将来予測  
目標管理基準値案、限界管理基準値案は真の再生産関係である全期間の HS 型の管理基準値案を示す。simple は真の再生産関係が全期間の HS 型であるときに、通常加入期の HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、projection は真の再生産関係が全期間の HS 型であるときに、全期間の HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、backward は simple と同じだが ABC 計算時に加入量の誤差に残差のバックワードリサンプリングを適用した場合の将来予測を示す。




補足図 5-2. 真の再生産関係が全期間の HS 型であるときに、通常加入期の HS 型の再生産関係を適用した場合の 2026 年、2031 年、2036 年の平均親魚量、目標管理基準値案を上回る確率、平均漁獲量、限界管理基準値案を上回る確率

目標管理基準値案、限界管理基準値案は真の再生産関係である全期間の HS 型の管理基準値案を示す。simple は真の再生産関係が全期間の HS 型であるときに、通常加入期の HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、projection は真の再生産関係が全期間の HS 型であるときに、全期間の HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、backward は simple と同じだが ABC 計算時に加入量の誤差に残差のバックワードリサンプリングを適用した場合の将来予測を示す。



補足図 5-3. 真の再生産関係が通常加入期の HS 型であるときに、全期間の HS 型の再生産関係を適用した場合の加入尾数、親魚量、漁獲量、漁獲圧の比の将来予測  
目標管理基準値案、限界管理基準値案は真の再生産関係である通常加入期の HS 型の管理基準値案を示す。simple は真の再生産関係が通常加入期の HS 型であるときに、全期間の HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、projection は真の再生産関係が通常加入期の HS 型であるときに、通常加入期の HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、backward は simple と同じだが ABC 計算時に加入量の誤差に残差のバックワードリサンプリングを適用した場合の将来予測を示す。



補足図 5-4. 真の再生産関係が通常加入期の HS 型であるときに、全期間の HS 型の再生産関係を適用した場合の 2026 年、2031 年、2036 年の平均親魚量、目標管理基準値案を上回る確率、平均漁獲量、限界管理基準値案を上回る確率

目標管理基準値案、限界管理基準値案は真の再生産関係である通常加入期の HS 型の管理基準値案を示す。simple は真の再生産関係が通常加入期の HS 型であるときに、全期間の HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、projection は真の再生産関係が通常加入期の HS 型であるときに、通常加入期の HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、backward は simple と同じだが ABC 計算時に加入量の誤差に残差のバックワードリサンプリングを適用した場合の将来予測を示す。

## 補足資料 6 高加入期であった場合の漁獲機会損失のリスク評価


現在の環境は過去の高加入期とは異なる点が多く、現在の環境において過去の高加入期と同規模の加入が生じるかはかなり不確実と考えられる。ただし、近年良好な加入が続いており、今後、過去の高加入期と同規模の高い加入が生じる可能性は否定できない。高加入期（1976～1987 年）の再生産関係に基づく管理基準値案は、通常加入期（1988～2024 年）の再生産関係に基づく管理基準値案に比べて高く、 $F_{msy}$  も高い（表 3 および補足表 3-1）。通常加入期の再生産関係を想定した管理を行うことには、もし実際には高加入期であった場合に、漁獲可能量を過小に予測し、漁獲機会を損失するリスクが考えられる。逆に、通常加入期の再生産関係が正しい時に高加入期の再生産関係を誤って適用した場合、漁獲可能量を過大に予測し、資源を減少させるリスクが考えられる。

そこで、簡易的な MSE により、①真の再生産関係が高加入期の HS 型であるときに、通常加入期の HS 型の再生産関係を適用して管理した場合、②真の再生産関係が通常加入期の HS 型の再生産関係であるときに、高加入期の HS 型の再生産関係を適用して管理した場合について、資源減少や漁獲機会損失のリスクを評価した。なお、MSE 実施時の  $\beta$  は 0.8 とした。また、通常加入期を想定した管理のシミュレーションでは、通常加入期通りの加入を想定した場合と、バックワードリサンプリングを適用した場合の 2 通りについて検討した。

①真の再生産関係が高加入期の HS 型であるときに、通常加入期の HS 型の再生産関係を適用して管理した場合は、漁獲圧が低いため、親魚量は高い水準で維持される予測となった（補足図 6-1、6-2）。予測される平均漁獲量は、2026 年では高加入期を適用した場合と同程度かそれより多く推定されたが、管理開始 5 年後では 29～31 万トン低く、10 年後では 15～22 万トン低く推定された。バックワードリサンプリングを適用した場合の方が、平均漁獲量は高く推定され、高加入期を適用した場合に近くなっていた。真の再生産関係が高加入期の HS 型であるときに、通常加入期の HS 型の再生産関係を適用して管理した場合、長期的には漁獲機会損失のリスクが生じるが、10 年後には 190 万トン前後の漁獲可能量になると推定された。また、バックワードリサンプリングを適用することで、漁獲機会損失のリスクをやわらげることができた。


②真の再生産関係が通常加入期の HS 型の再生産関係であるときに、高加入期の HS 型の再生産関係を適用して管理した場合は、通常加入期を想定して管理した場合と同じ水準で平均親魚量および平均漁獲量が維持されたものの、漁獲量の予測区間が明瞭に大きくなった（補足図 6-3、6-4）。2026 年に予測される平均漁獲量は高く推定されたが、管理 5 年後および 10 年後は通常加入期の管理基準値を適用して管理した場合と同程度であった。漁獲量の予測区間が大きいのは、親魚量が高加入期の限界管理基準値である 272.7 万トンを下回る年が大半である影響で、漁獲圧は  $0.8F_{msy}$  より低い値で変動しており、年々の漁獲圧が異なることにより、漁獲量の振れ幅が大きくなっていることが考えられる。

真の再生産関係が高加入期の HS 型であるが、通常加入期の HS 型を誤って採用した場合、長期的には漁獲機会損失のリスクが生じるが、管理 10 年後には 190 万トン前後の漁獲可能量が推定された。また、漁獲機会損失のリスクはバックワードリサンプリングを適用することである程度緩和できた。




補足図 6-1. 真の再生産関係が高加入期の HS 型であるときに、通常加入期の HS 型の再生産関係を想定して管理を行った場合の加入尾数、親魚量、漁獲量、漁獲圧の比の将来予測

目標管理基準値案、限界管理基準値案は真の再生産関係である高加入期の HS 型の管理基準値案を示す。simple は真の再生産関係が高加入期の HS 型であるときに、通常加入期の HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、projection は真の再生産関係が高加入期の HS 型であるときに、高加入期の HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、backward は simple と同じだが ABC 計算時に加入量の誤差に残差のバックワードリサンプリングを適用した場合の将来予測を示す。




補足図 6-2. 真の再生産関係が高加入期の HS 型であるときに、通常加入期の HS 型の再生産関係を想定して管理を行った場合の 2026 年、2031 年、2036 年の平均親魚量、目標管理基準値案を上回る確率、平均漁獲量、限界管理基準値案を上回る確率。目標管理基準値案、限界管理基準値案は真の再生産関係である高加入期の HS 型の管理基準値案を示す。simple は真の再生産関係が高加入期の HS 型であるときに、通常加入期の HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、projection は真の再生産関係が高加入期の HS 型であるときに、高加入期の HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、backward は simple と同じだが ABC 計算時に加入量の誤差に残差のバックワードリサンプリングを適用した場合の将来予測を示す。



補足図 6-3. 真の再生産関係が通常加入期の HS 型であるときに、高加入期の HS 型の再生産関係を想定して管理を行った場合の加入尾数、親魚量、漁獲量、漁獲圧の比の将来予測

目標管理基準値案、限界管理基準値案は真の再生産関係である通常加入期の HS 型の管理基準値案を示す。simple は真の再生産関係が通常加入期の HS 型であるときに、高加入期の HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、projection は真の再生産関係が通常加入期の HS 型であるときに、通常加入期の HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、backward は simple と同じだが ABC 計算時に加入量の誤差に残差のバックワードリサンプリングを適用した場合の将来予測を示す。




補足図 6-4. 真の再生産関係が通常加入期の HS 型であるときに、高加入期の HS 型の再生産関係を想定して管理を行った場合の 2026 年、2031 年、2036 年の平均親魚量、目標管理基準値案を上回る確率、平均漁獲量、限界管理基準値案を上回る確率。目標管理基準値案、限界管理基準値案は真の再生産関係である通常加入期の HS 型の管理基準値案を示す。simple は真の再生産関係が通常加入期の HS 型であるときに、高加入期の HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、projection は真の再生産関係が通常加入期の HS 型であるときに、通常加入期の HS 型の再生産関係を適用した場合の将来予測、backward は simple と同じだが ABC 計算時に加入量の誤差に残差のバックワードリサンプリングを適用した場合の将来予測を示す。

## 補足資料 7 バックワードリサンプリングを用いない場合の将来予測

本資源の加入量は、2010 年以降、通常加入期の再生産関係から予測される平均値より高い傾向がある。そのため、将来予測において近年の良好な加入の傾向を反映させるため、残差のバックワードリサンプリングを適用した。ただし今後、加入水準が落ち着き、通常加期の再生産関係から予測される水準になることも可能性は否定できない。そこで、加入量の予測において、加入量の誤差が、バックワードリサンプリングでなく、対数正規分布に従うと仮定した将来予測を行った。

加入量の誤差が対数正規分布に従うと仮定すると、バックワードリサンプリングを適用した場合に比べ、予測される加入量は低くなった。それにともない、親魚量と漁獲量も低く予測された。バックワードリサンプリングとの差は、時間が経つに小さくなっていった（補足図 7-1）。

$\beta$  が 0.8 であれば漁獲管理規則案での漁獲開始から 10 年後の 2036 年に 63%の確率で目標管理基準値案を上回ると予測された（補足表 7-1）。 $\beta$  が 0.9 以下であれば、2036 年には 50%以上の確率で目標管理基準値案以上に親魚量を維持できると予測されたが、 $\beta$  が 1.0 の場合には親魚量が目標管理基準値案を上回る確率が 50%を下回った。なお、 $\beta$  が 1.0 であっても親魚量が限界管理基準値案を上回る確率は 90%以上で維持された（補足表 7-2）。2026 年以降は、 $\beta$  が低いほど親魚量は多くなり、また漁獲量は少なくなった（補足表 7-3、7-4）。



補足図 7-1. 加入量の誤差にバックワードリサンプリングを適用した将来予測と対数正規分布を適用した将来予測

バックワードリサンプリングを適用した場合の将来予測（赤色）と対数正規分布を適用した場合の将来予測結果。網掛けは予測結果の 90%が含まれる予測区間を示す。

補足表 7-1. 加入量の誤差に対数正規分布を仮定した場合の将来予測における、将来の親魚量が目標管理基準値案を上回る確率 (%)

| $\beta$ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.0     | 100  | 100  | 63   | 55   | 53   | 51   | 49   | 47   | 47   | 46   | 45   | 45   |
| 0.9     |      |      | 68   | 61   | 59   | 58   | 56   | 55   | 54   | 54   | 54   | 54   |
| 0.8     |      |      | 73   | 67   | 66   | 65   | 64   | 63   | 62   | 63   | 63   | 63   |
| 0.7     |      |      | 78   | 73   | 72   | 73   | 71   | 71   | 70   | 71   | 72   | 72   |
| 0.6     |      |      | 83   | 79   | 78   | 80   | 79   | 79   | 78   | 79   | 79   | 80   |
| 0.5     |      |      | 88   | 84   | 84   | 85   | 86   | 86   | 85   | 86   | 86   | 87   |
| 0.4     |      |      | 92   | 88   | 89   | 90   | 90   | 91   | 91   | 91   | 92   | 92   |
| 0.3     |      |      | 95   | 93   | 93   | 94   | 94   | 95   | 95   | 95   | 96   | 96   |
| 0.2     |      |      | 97   | 96   | 96   | 97   | 97   | 98   | 98   | 98   | 98   | 99   |
| 0.1     |      |      | 99   | 98   | 98   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 100  | 100  |
| 0.0     |      |      | 100  | 99   | 99   | 99   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 現状の漁獲圧  |      |      | 37   | 25   | 20   | 17   | 15   | 13   | 11   | 10   | 9    | 9    |

$\beta$  を 0～1.0 で変更した場合の将来予測の結果を示す。2025 年の漁獲量は現状の漁獲圧（F2022-2024）から予測される 103.0 万トンとし、2026 年から漁獲管理規則案による漁獲とした。比較のため現状の漁獲圧（F2022-F2024、 $\beta = 1.65$  に相当）で漁獲を続けた場合の結果も示した。

補足表 7-2. 加入量の誤差に対数正規分布を仮定した場合の将来予測における、将来の親魚量が限界管理基準値案を上回る確率 (%)

| $\beta$ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.0     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   |
| 0.9     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 99   | 100  |
| 0.8     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.7     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.6     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.5     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.4     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.3     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.2     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.1     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.0     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 現状の漁獲圧  |      |      | 100  | 100  | 98   | 94   | 89   | 84   | 80   | 76   | 73   | 71   |

$\beta$  を 0.0～1.0 で変更した場合の将来予測の結果を示す。2024 年の漁獲量は現状の漁獲圧（Fcurrent）から予測される 103.0 万トンとし、2026 年から漁獲管理規則案による漁獲とした。比較のため現状の漁獲圧（Fcurrent、 $\beta = 1.65$  に相当）で漁獲を続けた場合の結果も示した。

補足表 7-3. 加入量の誤差に対数正規分布を仮定した場合の将来予測における、将来の平均親魚量（万トン）

| $\beta$ | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  | 2036  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.0     | 204.3 | 177.7 | 162.7 | 159.1 | 155.6 | 153.4 | 152.2 | 149.6 | 148.1 | 146.8 | 146.0 | 146.5 |
| 0.9     |       |       | 166.5 | 165.6 | 163.6 | 162.5 | 162.0 | 159.9 | 158.8 | 157.9 | 157.4 | 158.2 |
| 0.8     |       |       | 170.4 | 172.5 | 172.2 | 172.2 | 172.5 | 170.9 | 170.2 | 169.6 | 169.4 | 170.4 |
| 0.7     |       |       | 174.4 | 179.7 | 181.3 | 182.6 | 183.7 | 182.7 | 182.4 | 182.0 | 182.0 | 183.3 |
| 0.6     |       |       | 178.5 | 187.3 | 191.1 | 193.9 | 195.9 | 195.5 | 195.5 | 195.4 | 195.6 | 197.1 |
| 0.5     |       |       | 182.7 | 195.3 | 201.6 | 206.1 | 209.2 | 209.4 | 209.9 | 210.1 | 210.5 | 212.1 |
| 0.4     |       |       | 187.1 | 203.7 | 212.9 | 219.4 | 223.9 | 224.9 | 225.9 | 226.4 | 226.9 | 228.7 |
| 0.3     |       |       | 191.6 | 212.6 | 225.1 | 233.9 | 240.1 | 242.1 | 243.8 | 244.7 | 245.5 | 247.5 |
| 0.2     |       |       | 196.2 | 222.1 | 238.2 | 250.0 | 258.2 | 261.6 | 264.3 | 265.7 | 266.9 | 269.1 |
| 0.1     |       |       | 201.0 | 232.0 | 252.5 | 267.7 | 278.5 | 283.8 | 287.8 | 290.1 | 291.9 | 294.6 |
| 0.0     |       |       | 205.9 | 242.6 | 268.0 | 287.4 | 301.4 | 309.2 | 315.1 | 318.8 | 321.6 | 325.0 |
| 現状の漁獲圧  |       |       | 140.7 | 123.6 | 113.2 | 105.6 | 100.1 | 94.3  | 89.9  | 86.2  | 83.0  | 80.9  |

$\beta$  を 0.0～1.0 で変更した場合の将来予測の結果を示す。2025 年の漁獲量は現状の漁獲圧（F2022-2024）から予測される 103.0 万トンとし、2026 年から漁獲管理規則案による漁獲とした。比較のため現状の漁獲圧（F2022-F2024、 $\beta=1.65$  に相当）で漁獲を続けた場合の結果も示した。

補足表 7-4. 加入量の誤差に対数正規分布を仮定した場合の将来予測における、将来の平均漁獲量（万トン）

| $\beta$ | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.0     | 103.0 | 56.2 | 53.0 | 52.4 | 51.1 | 50.3 | 49.7 | 49.1 | 48.6 | 48.4 | 48.1 | 48.0 |
| 0.9     |       | 51.4 | 49.5 | 49.6 | 48.9 | 48.5 | 48.2 | 47.8 | 47.4 | 47.3 | 47.1 | 47.1 |
| 0.8     |       | 46.4 | 45.6 | 46.5 | 46.2 | 46.2 | 46.1 | 45.9 | 45.7 | 45.7 | 45.6 | 45.6 |
| 0.7     |       | 41.2 | 41.4 | 42.9 | 43.1 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 |
| 0.6     |       | 35.9 | 36.8 | 38.8 | 39.4 | 40.0 | 40.3 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.5 |
| 0.5     |       | 30.4 | 31.9 | 34.2 | 35.1 | 35.9 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 36.9 |
| 0.4     |       | 24.7 | 26.5 | 28.9 | 30.1 | 31.0 | 31.6 | 31.9 | 32.0 | 32.2 | 32.2 | 32.3 |
| 0.3     |       | 18.9 | 20.6 | 23.0 | 24.2 | 25.2 | 25.8 | 26.2 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 26.7 |
| 0.2     |       | 12.8 | 14.3 | 16.3 | 17.4 | 18.3 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 19.7 |
| 0.1     |       | 6.5  | 7.4  | 8.6  | 9.4  | 10.0 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.0 |
| 0.0     |       | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 現状の漁獲圧  |       | 84.2 | 70.0 | 62.7 | 57.5 | 53.7 | 50.9 | 48.3 | 46.2 | 44.5 | 42.9 | 41.7 |

$\beta$  を 0.0～1.0 で変更した場合の将来予測の結果を示す。2025 年の漁獲量は現状の漁獲圧（F2022-2024）から予測される 103.0 万トンとし、2026 年から漁獲管理規則案による漁獲とした。比較のため現状の漁獲圧（F2022-F2024、 $\beta=1.65$  に相当）で漁獲を続けた場合の結果も示した。

## 補足資料 8 ABC 計算の不確実性の考慮


令和 7 (2025) 年度の資源評価の結果に基づき 2026 年の ABC を計算しようとする場合、利用可能な最新データである 2024 年の資源量推定値を用いて 2025 年と 2026 年の将来予測を実施し、漁獲管理規則から与えられる漁獲圧によって得られる 2026 年の漁獲量の分布の平均値を求めて ABC とする (水産研究・教育機構 2025)。このように計算された ABC は 2025 年と 2026 年に平均的な加入が起こるとした決定論的な将来予測から計算された漁獲量とほぼ一致する (市野川ほか 2022)。しかし、現実には 2 年続けて平均的な加入が得られるとは限らない。そのため、予測した ABC と現実の個体群動態と漁獲管理規則に基づく漁獲係数から得られる漁獲量とがどの程度乖離し得るのか (すなわち ABC 計算の不確実性) を評価することは、管理基準値や漁獲管理規則を議論する上で有効な情報となる (市野川ほか 2022)。ABC 計算における時間遅れは、加入変動が大きく、若齢の選択率が高く、かつ 1 歳以下で成熟する資源で大きく影響する (市野川ほか 2022)。本資源はそれらに条件に該当すると考えられるため、ABC 計算の不確実性を評価した。

計算方法は市野川ほか (2022) によった。ここで、ABC 年の前年の漁獲係数にも仮定が必要だが、本シミュレーションでは、単純化のため、ABC 年の前年の漁獲係数には真の個体群動態で実現される真の漁獲係数を用いた (市野川ほか 2022)。将来予測本体の計算回数は加入の誤差を考慮した 5000 回とし、ABC 計算における時間遅れによる誤差を組み込むための 2 年分の将来予測における加入は決定論的に決まるものとした。

ABC 計算における時間遅れによる誤差を組み込んだ将来予測の平均値の推移は通常の将来予測と大きく違わなかった。しかし、親魚量や漁獲圧の予測区間が通常の将来予測より広がった (補足図 8-1)。この影響による管理性能に係るリスク評価の結果は補足表 8-1 に示している。

## 引用文献

- 水産研究・教育機構 (2025) 再生産関係の推定・管理基準値計算・将来予測シミュレーションに関する技術ノート(令和 7 年度研究機関会議版). FRA-SA2025-ABCWG02-04, 水産研究・教育機構, 横浜.
- 市野川桃子・西嶋翔太・向 草世香・黒田啓行・大下誠二 (2022) 改正漁業法下での様々な代替管理規則の検討：マイワシ 2 系群を例に. 日本水産学会誌, **88**, 239-255.



補足図 8-1. ABC 計算の不確実性を考慮した MSE に基づく将来予測

通常将来予測（赤色）と ABC 計算の不確実性を考慮した場合の将来予測結果。網掛けは予測結果の 90%が含まれる予測区間を示す。


補足表 8-1. 管理方策案のパフォーマンス評価の概要、(a)：通常の将来予測に基づくケース、(b)：ABC 計算の不確実性を考慮した将来予測に基づくケース

| $\beta$ | 2026 年の平均漁獲量<br>(万トン) |      | 2027-2035 年の平均漁獲量<br>(万トン) |      | 2031 年に親魚資源量が目標管理基準値案を上回る確率 |      | 2036 年に親魚資源量が目標管理基準値案を上回る確率 |      | 親魚資源量が 10 年間で限界管理基準値案を下回る平均年数 |      | 漁獲圧が 10 年間で $F_{msy}$ を上回る平均年数 |      | 2026-2035 年の漁獲量の平均年変動 |       | 2036 年の平均親魚量(万トン) |       |
|---------|-----------------------|------|----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|--------------------------------|------|-----------------------|-------|-------------------|-------|
|         | (a)                   | (b)  | (a)                        | (b)  | (a)                         | (b)  | (a)                         | (b)  | (a)                           | (b)  | (a)                            | (b)  | (a)                   | (b)   | (a)               | (b)   |
| 1.0     | 66.0                  | 67.6 | 78.4                       | 78.6 | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 4.64 | 6.2%                  | 13.4% | 230.8             | 246.9 |
| 0.9     | 60.2                  | 61.7 | 74.9                       | 75.1 | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 1.69 | 6.5%                  | 13.2% | 244.4             | 260.4 |
| 0.8     | 54.3                  | 55.6 | 70.8                       | 71   | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.27 | 6.8%                  | 13.0% | 259.5             | 275.4 |
| 0.7     | 48.2                  | 49.4 | 66.1                       | 66.2 | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.03 | 7.2%                  | 12.8% | 276.3             | 292.2 |
| 0.6     | 42.0                  | 42.9 | 60.6                       | 60.7 | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.00 | 7.7%                  | 12.7% | 295.3             | 311.1 |
| 0.5     | 35.5                  | 36.3 | 54.2                       | 54.4 | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.00 | 8.3%                  | 12.7% | 316.8             | 332.6 |
| 0.4     | 28.8                  | 29.5 | 46.7                       | 46.9 | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.00 | 9.0%                  | 12.8% | 341.4             | 357.2 |
| 0.3     | 21.9                  | 22.5 | 37.9                       | 38   | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.00 | 9.7%                  | 12.9% | 369.8             | 385.7 |
| 0.2     | 14.9                  | 15.2 | 27.5                       | 27.6 | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.00 | 10.5%                 | 13.2% | 403.0             | 419.1 |
| 0.1     | 7.5                   | 7.7  | 15.0                       | 15.1 | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.00 | 11.4%                 | 13.6% | 442.2             | 458.5 |
| 0.0     | 0.0                   | 0    | 0                          | 0    | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.00 |                       |       | 489.2             | 505.8 |

## 補足資料 9 将来予測における体重の不確実性の考慮

将来予測で仮定する体重に誤差を与え、体重の不確実性の影響を評価した。本系群の将来予測では、各齢で資源尾数と体重の対数を取り単回帰することで資源尾数－体重の関係を推定し、その推定された回帰式から年々の各齢の体重を予測している。ここでは、回帰で推定された残差の標準偏差を用いて体重の予測値に対数正規誤差を与え、年齢別体重を確率的に発生させた。

体重の予測に誤差を組み込んだ将来予測の平均値の推移は通常将来予測と大きく違わなかった。しかし、親魚量や漁獲量の予測区間が通常将来予測よりわずかに広がった（補足図 9-1）。通常将来予測と比較すると、漁獲量の変動が大きくなっていた。それ以外は通常将来予測と大きな違いはなかった。この影響による管理性能に係るリスク評価の結果は補足表 9-2 に示している。



補足図 9-1. 体重の誤差を考慮した将来予測に基づく将来予測

通常将来予測（赤色）と体重の誤差を考慮した場合の将来予測結果。網掛けは予測結果の 90%が含まれる予測区間を示す。

表 9-1. 管理方策案のパフォーマンス評価の概要、(a)：通常の将来予測に基づくケース、(b)：体重の誤差を考慮した将来予測に基づくケース

| $\beta$ | 2026 年の平均漁獲量<br>(万トン) |      | 2027-2035 年の平均漁獲量<br>(万トン) |      | 2031 年に親魚資源量が目標管理基準値案を上回る確率 |      | 2036 年に親魚資源量が目標管理基準値案を上回る確率 |      | 親魚資源量が 10 年間で限界管理基準値案を下回る平均年数 |      | 漁獲圧が 10 年間で $F_{msy}$ を上回る平均年数 |      | 2026-2035 年の漁獲量の平均年変動 |       | 2036 年の平均親魚量(万トン) |       |
|---------|-----------------------|------|----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|--------------------------------|------|-----------------------|-------|-------------------|-------|
|         | (a)                   | (b)  | (a)                        | (b)  | (a)                         | (b)  | (a)                         | (b)  | (a)                           | (b)  | (a)                            | (b)  | (a)                   | (b)   | (a)               | (b)   |
| 1.0     | 66.0                  | 65.9 | 78.4                       | 78.3 | 100%                        | 99%  | 100%                        | 98%  | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 6.32 | 6.2%                  | 16.8% | 230.8             | 230.2 |
| 0.9     | 60.2                  | 60.2 | 74.9                       | 74.8 | 100%                        | 100% | 100%                        | 99%  | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 2.73 | 6.5%                  | 16.7% | 244.4             | 243.7 |
| 0.8     | 54.3                  | 54.3 | 70.8                       | 70.7 | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.48 | 6.8%                  | 16.7% | 259.5             | 258.8 |
| 0.7     | 48.2                  | 48.2 | 66.1                       | 66   | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.02 | 7.2%                  | 16.7% | 276.3             | 275.6 |
| 0.6     | 42.0                  | 41.9 | 60.6                       | 60.5 | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.00 | 7.7%                  | 16.7% | 295.3             | 294.5 |
| 0.5     | 35.5                  | 35.5 | 54.2                       | 54.2 | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.00 | 8.3%                  | 16.9% | 316.8             | 315.9 |
| 0.4     | 28.8                  | 28.8 | 46.7                       | 46.7 | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.00 | 9%                    | 17.1% | 341.4             | 340.4 |
| 0.3     | 21.9                  | 21.9 | 37.9                       | 37.9 | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.00 | 9.7%                  | 17.5% | 369.8             | 368.8 |
| 0.2     | 14.9                  | 14.8 | 27.5                       | 27.5 | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.00 | 10.5%                 | 18.0% | 403.0             | 401.9 |
| 0.1     | 7.5                   | 7.5  | 15.0                       | 15.0 | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.00 | 11.4%                 | 18.6% | 442.2             | 441.0 |
| 0.0     | 0.0                   | 0    | 0                          | 0    | 100%                        | 100% | 100%                        | 100% | 0.00                          | 0.00 | 0.00                           | 0.00 |                       |       | 489.2             | 487.8 |



## 令和 7（2025）年度マイワシ太平洋系群の資源評価

### 水産研究・教育機構

水産資源研究所 水産資源研究センター（古市 生・由上龍嗣・上村泰洋・  
西嶋翔太・井須小羊子・伊澤雄登・東口胤成・渡部亮介）

参画機関：北海道立総合研究機構釧路水産試験場・函館水産試験場、青森県産業技術センター水産総合研究所、岩手県水産技術センター、宮城県水産技術総合センター、福島県水産海洋研究センター、茨城県水産試験場、千葉県水産総合研究センター、東京都島しょ農林水産総合センター、神奈川県水産技術センター、静岡県水産・海洋技術研究所、愛知県水産試験場漁業生産研究所、三重県水産研究所、和歌山県水産試験場、徳島県立農林水産総合技術支援センター水産研究課、大阪府立環境農林水産総合研究所、香川県水産試験場、高知県水産試験場、愛媛県農林水産研究所水産研究センター、大分県農林水産研究指導センター水産研究部、宮崎県水産試験場、鹿児島県水産技術開発センター、漁業情報サービスセンター、海洋生物環境研究所


### 要 約

本系群の資源量について、資源量指標値をチューニング指数として用いたコホート解析により計算した。資源量は、1980年代は1千万トン以上の高い水準で推移したが、1990年代に入って急減し、2002年以降2009年まで10万トン前後の低い水準で推移した。その後、比較的良好な加入が続いたこと、および漁獲圧が低下したことにより資源量は増加し、2014年には100万トンを上回った。その後も良好な加入が続いたことにより資源量はさらに増加して、2021年は500万トンを上回った。しかしその後、加入が減少傾向にあり資源はわずかに減少し、2024年の資源量は399.8万トンと推定された。親魚量は2002年以降10万トンを下回る水準で推移したが、2011年以降増加し、2020年には200万トンを上回った。その後は200万～300万トン台で推移し、2024年の親魚量は269.9万トンと推定された。

令和7年度の「管理基準値等に関する研究機関会議資料」において、本系群の再生産関係には通常加入期（1988～2024年）のホッケー・スティック型が適用されており、これに基づき推定された最大持続生産量（MSY）を実現できる水準の親魚量（SB<sub>msy</sub>）は143.2万トンである。この基準に従うと、本系群の2024年の親魚量は、MSYを実現する水準を上回る。また、本系群に対する2024年の漁獲圧はSB<sub>msy</sub>を維持する漁獲圧（F<sub>msy</sub>）を上回る。親魚量の動向は直近5年間（2020～2024年）の推移から「横ばい」と判断される。

本系群では、管理基準値や将来予測など、資源管理方針に関する検討会の議論をふまえて最終化される項目については、管理基準値等に関する研究機関会議資料において提案された値を暫定的に示した。

## 要 約 図 表



| 最大持続生産量(MSY)、親魚量の水準と動向、および ABC                                                                        |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MSY を実現する水準の親魚量 (SBmsy)                                                                               | 143.2 万トン                 |
| 2024 年の親魚量の水準                                                                                         | MSY を実現する水準を上回る(1.89 倍)   |
| 2024 年の漁獲圧の水準                                                                                         | SBmsy を維持する水準を上回る(2.14 倍) |
| 2024 年の親魚量の動向                                                                                         | 横ばい                       |
| MSY                                                                                                   | 47.0 万トン                  |
| 2026 年の ABC                                                                                           | -                         |
| コメント:<br>・ABC は、本系群の漁獲シナリオが「資源管理方針に関する検討会」で取り纏められ、「水産政策審議会」を経て定められた後に算定される。<br>・ABC は、外国船による漁獲も合わせた値。 |                           |

| 直近 5 年と将来 2 年の資源量、親魚量、漁獲量、F/Fmsy、および漁獲割合 |              |              |              |        |             |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| 年                                        | 資源量<br>(万トン) | 親魚量<br>(万トン) | 漁獲量<br>(万トン) | F/Fmsy | 漁獲割合<br>(%) |
| 2020                                     | 491.3        | 227.7        | 103.4        | 1.72   | 21          |
| 2021                                     | 534.1        | 234.9        | 107.8        | 1.61   | 20          |
| 2022                                     | 590.3        | 260.2        | 112.5        | 1.53   | 19          |
| 2023                                     | 555.3        | 338.2        | 135.5        | 1.88   | 24          |
| 2024                                     | 399.8        | 269.9        | 137.6        | 2.14   | 34          |
| 2025                                     | 390.0        | 204.3        | 110.3        | 1.65   | 28          |
| 2026                                     | 373.2        | 187.0        | —            | —      | —           |
| ・ 2025、2026 年の値は将来予測に基づく平均値である。          |              |              |              |        |             |

## English title (authors)

Stock assessment and evaluation for Japanese sardine of the Pacific stock (fiscal year 2025).  
 (Sho Furuichi, Ryuji Yukami, Yasuhiro Kamimura, Shota Nishijima, Sayoko Isu, Yuto Izawa,  
 Kazunari Higashiguchi, Ryosuke Watanabe)

## 1. データセット

本件資源評価に使用したデータセットは以下のとおり。

| データセット                                            | 基礎情報、関係調査等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年齢別・年別漁獲<br>尾数                                    | 漁業・養殖業生産統計年報(農林水産省)<br>主要港水揚量(北海道～鹿児島(20)道府県)<br>体長組成調査(水産機構、北海道～鹿児島(20)道府県、JAFIC):<br>市場測定<br>体長一体重調査・体長一年齢測定調査(水産機構、北海道～鹿児島<br>(20)道府県、JAFIC):市場測定、調査漁獲物<br>中国漁船の体長組成(2020～2022 年)<br>北太平洋漁業委員会(NPFC)統計による中国・ロシアの漁獲量情報<br>( <a href="https://www.npfc.int/summary-footprint-japanese-sardine-fisheries">https://www.npfc.int/summary-footprint-japanese-sardine-fisheries</a> 、<br>2025 年 7 月) |
| 資源量指数<br>・産卵量<br>・0、1 歳魚資源量指<br>標値<br><br>・資源量指標値 | 卵稚仔調査(周年、水産機構、関係都道府県):ノルパックネット*<br>移行域幼稚魚調査(5、6 月、水産機構):中層トロール、計量魚探<br>北西太平洋北上期浮魚類資源調査(6～7 月、水産機構):中層トロー<br>ル、計量魚探*<br>北西太平洋秋季浮魚類資源調査(9、10 月、水産機構):中層トロール、<br>計量魚探*<br>房総～常磐海域大中型まき網漁況に基づく未成魚越冬群指数(千葉<br>水総研、茨城水試)<br>北部太平洋まき網 CPUE(単位努力量あたり漁獲量)および漁場分布に<br>基づく資源量指数(JAFIC)                                                                                                                      |
| 自然死亡係数(M)                                         | 年当たり $M=0.4$ を仮定(田中 1960)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 漁獲努力量                                             | 北部太平洋まき網漁獲努力量(JAFIC、漁場別漁獲状況調査)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

\*はコホート解析 (Virtual Population Analysis, VPA) におけるチューニング指数である。

本系群の漁期は 1 月～12 月であり、年齢の起算日は 1 月 1 日としている。

## 2. 生態

### (1) 分布・回遊

本系群は、北西太平洋の本邦沿岸から沖合まで広く分布する(図 2-1)。幼稚魚の分布・回遊は、生育初期の海流による移送のされ方によって大きく 2 つの様式に分けられる。黒潮周辺でふ化後、沿岸域への流れにとりこまれて本邦沿岸域で成長し、沿岸漁場でシラス～幼魚期から漁獲対象となるもの(以下、「沿岸加入群」という)、および黒潮によって東方へ移送され、本邦近海から東経 165～170 度に及ぶ黒潮親潮移行域で成長して道東～千島列島東方沖の亜寒帯域で夏季の索餌期を過ごし、秋冬季に南下して漁場に参加するもの

(以下、「沖合加入群」という)がある(川端ほか 2011、Sakamoto et al. 2019)。沖合加入群の分布範囲は海流の移送に依存するため、加入量の多寡を反映せず、加入量が低くても広域に分布する。沿岸と沖合のいずれの加入群になるかは、産卵場周辺の海況条件に因って偶然に決まると考えられる。また、両者にはふ化日組成に違いがみられ、沿岸加入群には、長期間にわたる産卵期を反映して、様々なふ化日の個体が出現するが(落合 2009、長谷川・日越 2011)、沖合加入群には、稚仔魚期が春季ブルーミング時期と一致する3~5月(4月中心)にふ化した個体が出現する(落合 2009、高木ほか 2010、須原ほか 2014)。ただし資源量の増加した近年、特に2013年以降、沖合加入群において3月上旬以前にふ化した個体が増加しており、早期ふ化個体の増加と資源量・加入量の増大との関連が注目され、研究が進められている(Niino et al. 2021)。沿岸加入群と沖合加入群は独立した群ではないが、主たる発生時期や生育場が異なり、加入動向は必ずしも一致しない。

1歳以上では、黒潮周辺で越冬、産卵後、夏秋季には黒潮周辺の沿岸域で滞留あるいは小規模な索餌回遊を行うもの、および北方へ索餌回遊するものがある。北方への索餌回遊範囲は資源量水準によって大きく変化する。1980年代の高水準期には、三陸~道東沖から千島列島東方沖の天皇海山付近~西経域に達する広大な亜寒帯域を回遊した(伊東 1991、黒田 1991)。資源量が減少し100万トンを下回った1990年代には、三陸北部~道東沖の親潮域までに回遊範囲は縮小し、さらに50万トンを下回った2000年代には、常磐海域の黒潮続流周辺から三陸南部の親潮の南縁付近までに回遊範囲は縮小した。最近では2010年の高い加入量によって資源量が増加し、2011年以降、三陸北部~道東沖まで回遊がみられている。また近年、沖合域への分布拡大も見られている。6~7月の北西太平洋北上期浮魚類資源調査において、2018年以降、東経170度付近まで1歳以上のマイワシの分布が確認され、2021年以降は西経域においても1歳魚の分布が確認されている。加えて、9~10月の北西太平洋秋季浮魚類資源調査においても、2019年以降、千島列島沖で1歳以上のマイワシの分布が確認されている。

## (2) 年齢・成長

寿命は7歳程度、最大体長(被鱗体長)は22~24 cm程度である。年齢と体長の関係は、海域による違いもあるが、資源水準により大きく変化する。親潮域を索餌回遊するものでは、1980年代の高水準期には1歳以上の成長速度が低下し、各満年齢時でおおむね1歳:14~15 cm、2歳:15~16 cm、3歳:17~18 cm、4歳:18~19 cm、5歳:19~20 cm、6歳:20 cm以上であったが、2000年代の低・中水準期では、1歳:15~16 cm、2歳:18~19 cm、3歳以上:20 cm以上であった。直近3年間(2022~2024年)の年齢別平均体長と体重を図2-2に示した。2018年以降、年齢別平均体重が低下する傾向が見られており(補足表2-1、補足図10-1)、資源の増加に伴って密度依存的に成長が悪くなっていると考えられている(Kamimura et al. 2022)。資源量と成長の関係には今後も注意する必要がある。

## (3) 成熟・産卵

年齢と成熟割合の関係を図2-3に示す。資源高水準期には成長速度が低下して成熟が遅れたが、1990年代後半以降は1歳で成熟が始まり、2歳ではほとんどの個体が成熟する。本評価では、1998~2015年の年齢別成熟割合を1歳:50%、2歳以上:100%とした。2016

年以降の成熟割合は、近年の資源量の増加を考慮し、レジームシフト後に親魚量が一時的に回復した 1994～1997 年に等しい 1 歳：20%、2 歳以上：100%とした。ただし 2018 年以降、年齢別平均体重が低下する傾向が見られており、それに伴って成熟率の低下も生じている可能性がある。成熟率が本年度評価の仮定より低かった場合、親魚量の過大推定につながる。資源評価の精度向上のためにも、成熟率についての情報の収集が喫緊の課題となっている（補足資料 10）。

卵の出現分布状況から、産卵期は 11 月～翌年 6 月、盛期は 2～4 月である。産卵場は、資源水準によって変化してきた。資源の少なかった 1950～1960 年代は日向灘から関東近海にかけての各地の黒潮内側域に形成された（黒田 1991）。資源が増加し始めた 1970 年代前半は土佐湾とその周辺や関東近海での産卵が増加した。1976 年からは薩南海域にも産卵場が形成され、1980～1990 年頃の高水準期には薩南から紀伊半島沖にかけての黒潮域に大規模な産卵場が形成された。1990 年代の資源の減少に伴い、薩南海域の産卵場は消滅し、これ以降は四国沖から関東近海の各地の黒潮内側域に形成されている（図 2-1）。2010 年以降は潮岬以東で産卵量が増加している一方で、1980 年代および 1990 年代のような紀伊水道以西における産卵量の増加は見られていない。

#### （4）被捕食関係

仔稚魚期は小型の動物プランクトンを捕食し、成長に伴いより大きい動物プランクトンを捕食するようになる。成魚は鰓耙が発達し、動物プランクトンに加えて珪藻類も濾過摂餌する。中・大型の魚類やイカ類、海産ほ乳類、海鳥類などに捕食される。ヒゲクジラ類の胃内容には、マイワシ資源高水準期の 1980 年代にマイワシが多く出現しており、主要な餌生物であった（Kasamatsu and Tanaka 1992）。1990 年代以降は資源減少とともに出現しなくなっていたが（Tamura and Fujise 2002）、2012 年以降に胃内容物におけるカタクチイワシの出現が減少する一方で、さば類およびマイワシの出現が増加しており、特にイワシクジラでは 2014～2016 年にマイワシが主要な餌となっていた（Konishi et al. 2017）。マイワシの分布量がヒゲクジラ類の捕食対象となるまで増加したと考えられる。

#### （5）特記事項

本系群は、数十年スケールの地球規模の大気～海洋生態系の構造の転換（ ジームシフト）と同期して大きく資源変動することが知られている（Kawasaki 1992、Klyashtorin 1998、Chavez et al. 2003）。資源量は、1976/77 年の ジームシフト（Yasunaka and Hanawa 2002）と同期して増大し、1980 年代は 1 千万トン以上の高い水準で推移した。その後、1988/89 年のレジームシフトと同期して 1988～1991 年の連続した再生産成功率の低下がみられ（Watanabe et al. 1995）、加入量および資源量が激減したとされる。海洋環境などの変化は、環境収容力や加入過程などに影響し（Tanaka 2003、Yatsu et al. 2005、Furuichi et al. 2020）、再生産関係も変化している可能性が考えられる。

### 3. 漁業の状況

#### （1）漁業の概要

主要漁業は、幼魚～成魚を対象とする大中型まき網、中型まき網、定置網である。船び

き網等によってシラスも漁獲される。総漁獲量の 6～9 割は三重県以東海域（太平洋北・中区）における漁獲である。和歌山県以西海域（太平洋南区、瀬戸内海区）における漁獲は、三重県以東海域に比べ少ない（図 3-1、表 3-1）。房総以北海域の大中型まき網（北部まき網）による漁獲が資源水準にかかわらず多くを占める。1980 年代の資源高水準期には、常磐～三陸海域のほか、夏秋季の道東海域で大規模な漁場が形成され、200 万トン以上が漁獲された。1990 年代に入ると資源の減少に伴って索餌回遊範囲が縮小し、道東漁場は 1994 年以降、形成されなくなった。高い漁獲圧によって 2000 年代にはさらに資源が減少したため、三陸北部海域でも漁場がほとんど形成されなくなり、房総～常磐海域での 0、1 歳魚を主な対象とした漁獲が中心となった。2010 年以降は、資源が増加して索餌回遊範囲が拡大し、2012 年以降は道東海域で漁場が形成されるようになった。道東海域における漁獲量は、2012 年の 6 千トンから 2023 年は 25.0 万トンに増加したが、2024 年は 20.6 万トンに減少した。2014 年以降、ロシア水域および公海域において外国漁船による漁獲が見られるようになり、特に 2020 年以降、外国漁船による漁獲が急増している。

## (2) 漁獲量の推移

本評価の漁獲量には、漁業・養殖業生産統計年報の北海道太平洋側～宮崎県並びに瀬戸内海区の合計値に、太平洋各区以外に所属する漁船による太平洋海域における漁獲量を加え、さらに太平洋各区に所属する漁船による太平洋海域以外での漁獲量（漁獲成績報告書による）を差し引いた値、および北太平洋漁業委員会（NPFC）へ報告された外国漁船による漁獲量を用いた（図 3-1、表 3-1）。日本の漁獲量は、1975 年は 50 万トンを下回っていたが、その後増加し、1983～1989 年は 250 万トンを超える極めて高い水準で推移した。しかし、1990 年以降に減少し、1993 年には 100 万トンを下回り、1995～2001 年は 10 万～30 万トン台で推移した。2002～2010 年は 10 万トンを下回る低い水準で推移したが、2011 年以降は増加傾向に転じて 10 万トン以上に増加し、2019 年は 50 万トンを上回った。その後は 50 万～60 万トン前後で推移しており、2024 年は 52.2 万トンであった。2014 年以降、資源が増加して回遊範囲が拡大したことにより、ロシアおよび中国による漁獲が増えている（図 3-1、表 3-1）。NPFC への報告によると、2024 年のロシアによる漁獲量は 59.3 万トン、中国による漁獲は 26.1 万トンとなっている。

年齢別漁獲尾数の推移を図 3-2 に示した。資源量が極めて低い水準となった 2000 年代は 0、1 歳魚が漁獲の主体であり、漁獲物に占める 2 歳以上の割合は低かったが、資源が増加するにつれ様々な年齢が漁獲されるようになり、2016 年以降は 2 歳以上の割合も高くなっている（図 3-2、補足表 2-1）。

## (3) 漁獲努力量

漁業情報サービスセンター（JAFIC）による北部まき網の年間有効努力量および各月の有効努力量の推移を図 3-3 および図 3-4 に示した（道東海域は含まない）。2000 年以降、資源量の減少に伴い努力量は年々減少する傾向にあったが、2009 年以降は資源の増加に伴って増加している（図 3-3）。月別の有効努力量は、2000 年以降では、いずれの年も春～夏季を中心に高くなる傾向がみられる（図 3-4）。ただし、2023 年は 1 月から有効努力量は高くなっていた。

#### 4. 資源の状態

##### (1) 資源評価の方法

本系群では外国船による漁獲を考慮して、公海域を含めた北太平洋全体の資源を対象として資源計算を行っており、将来予測における漁獲量や ABC にも外国船による漁獲を含んでいる。資源評価のフロー図を補足資料 1 に示した。関係試験研究機関による資源評価調査（補足資料 7）で収集された漁獲量、漁獲物の体長組成、体長－体重関係、体長－年齢関係の解析データより、1976 年以降の年齢別漁獲尾数を求め、チューニング VPA（コホート解析）を行った（補足資料 2）。チューニング指数には、2005 年以降の北西太平洋北上期浮魚類資源調査による 0 歳魚および 1 歳魚の標準化 CPUE（catch per unit effort、単位努力量あたりの漁獲量）、北西太平洋秋季浮魚類資源調査による秋季亜寒帯 0 歳魚現存量、潮岬以東海域の産卵量を用い（図 4-1、4-2、補足資料 7）、これらチューニング指数に適合するよう 2023 年の年齢別 F を探索的に求めた。計算に用いたデータ数値、および資源量等の推定結果は表 3-1、および補足表 2-1 に示した。

##### (2) 資源量指標値の推移

親魚量の指標となる産卵量は、親魚量の極めて少なかった 2000 年代前半には太平洋側全体で 100 兆粒を下回る低い水準であったが、2010 年代以降、親魚量の増加に伴って増加し、特に潮岬以東で顕著に増加した（図 4-1、補足表 2-2、補足表 7-1）。一方で、1980 年代に見られた紀伊水道～日向灘における産卵量の増加は、親魚量が近年では高い水準まで回復した 2020 年以降も見られていない。2024 年の産卵量は 2010 年代前半の水準にまで減少した。

加入量の指標となる各種調査による資源量指標値を図 4-2、補足表 2-2、および補足表 7-2、7-3、に示した（調査内容は補足資料 7）。いずれの指標値も、2010 年以降に比較的高い値を示している。なお、未成魚越冬群指数は、越冬期（12 月～翌年 4 月）のまき網漁況に基づいており、2000 年以前は当時の高い漁獲圧を反映して 2001 年以降の動向よりも全体的に高い値を示していると考えられる。そのため、2000 年以前と漁獲圧が低下している 2001 年以降を直接比較することは出来ない。

これらの指標値のうち、移行域幼稚魚調査や、北西太平洋北上期浮魚類資源調査、北西太平洋秋季浮魚類資源調査など沖合の調査による指数は、沖合の生育場～索餌場における調査のため、前述の沖合加入群だけを指標する。例えば 2008 年は、沿岸でのシラス漁獲量や定置網等の幼魚の漁獲量が多かったが、沖合の調査による指数は高くなく、加入量は沿岸加入群では多かったが沖合加入群では特に多くはなかったと推定された。反対に 2010 年は、沿岸加入群は少なく、沖合加入群が卓越して多かった。

##### (3) 資源量と漁獲圧の推移

資源量は 1970 年代に増加し、1980 年代は 1 千万トン以上の高い水準で推移したが、1990 年代に入って減少した（図 4-3、表 3-1、補足表 2-1）。1994 年に 100 万トンを下回り、1999 年まで 70 万～90 万トン程度で推移した。その後さらに減少し、2002 年以降 2009 年まで 10 万トン前後の低い水準で推移した。しかし 2010 年以降、比較的良好な加入が続いたこ

とと漁獲割合が低下したことにより資源量は増加し、2014 年には 100 万トンを上回った。その後も良好な加入が続いたことにより資源量はさらに増加して、2021 年は 500 万トンを上回った。しかしその後、加入が減少傾向にあり資源はわずかに減少し、2024 年の資源量は 399.8 万トンと推定された。親魚量は 2002 年以降 10 万トンを下回る水準で推移していたが、2011 年以降増加し、2020 年には 200 万トンを上回った。その後は 200 万～300 万トン台で推移し、2024 年の親魚量は 269.9 万トンと推定された（図 4-3、表 3-1、補足表 2-1）。

漁獲割合は、努力量の推移と対応して 1990 年代から 2000 年代始めにかけて 40～50% 台まで高くなり、資源量の減少につながった（図 4-3、表 3-1）。その後は、2007 年に 58% と高まったのを除けば低下傾向となり、2010 年代は比較的低い水準で推移していた。しかし近年、外国船による漁獲が増加し、2019 年以降、漁獲割合は増加傾向にある。漁獲係数  $F$  は、すべての年齢において変動が大きく、増減を繰り返しながら経年変化していた（図 4-4）。2010 年代は、0 歳魚および 1 歳魚の  $F$  は比較的低い値で安定していたが、2021 年以降増加している。

加入量と再生産成功率（RPS）の推移を図 4-5、表 3-1 に示した。RPS は、1976～1981 年において、1979 年を除き、36.0～65.6 尾/kg と高く、加入量とともに親魚量が増大した。1982～1987 年は 20 尾/kg 前後で推移し、高い親魚量によって高水準の加入が続いた。レジームシフト直後の 1988～1991 年は 0.9～1.7 尾/kg と極めて低く、加入量水準が大きく低下して親魚量が急激に減少した。1992 年以降 2000 年代前半までは、1999 年に 5.4 尾/kg と低く、1996 年に 60.7 尾/kg と高かった他は 12～24 尾/kg の範囲で推移した。2000 年代後半以降は、30 尾/kg を上回る RPS の高い年の頻度が高くなっている。ただし、2023 年および 2024 年の RPS は近年の高い水準に比べると低く、2023 年の RPS は 9.8 尾/kg、2024 年の RPS は 20.9 尾/kg であった。

コホート解析における自然死亡係数  $M$  の感度解析として、 $M$  を本評価で仮定する 0.4 から 0.3 と 0.5 にそれぞれ変化させた場合の 2023 年の資源量、親魚量を推定した（図 4-6）。 $M$  を大きく（小さく）設定すると資源量、親魚量は大きく（小さく）推定された。 $M$  が 0.3 および 0.5 のとき、資源量は  $M$  が 0.4 の場合の 86% および 118%、親魚量は 88% および 113% となった。

なお、昨年度（2024 年度）の資源評価との各種推定値の比較は補足資料 11 にまとめている。

#### （4）加入量当たり漁獲量（YPR）、加入量当たり親魚量（SPR）および現状の漁獲圧

選択率の影響を考慮して漁獲圧を比較するため、加入量あたり親魚量（SPR）を基準に、その漁獲圧が無かった場合との比較を行った。図 4-7 に、年ごとに漁獲が無かったと仮定した場合の SPR に対する、漁獲があった場合の SPR の割合（%SPR）の推移を示す。%SPR は漁獲圧が低いほど大きな値となる。1980 年代末から 1990 年代、2000 年代始めにかけては、%SPR は低下し、資源量の減少とともに漁獲圧が上昇するという、資源を減少させるような関係がみられた。2000 年代後半に %SPR は増加し、2010 年代は比較的高い水準で推移した。しかし、2019 年以降、%SPR は減少傾向にあり、2024 年の %SPR は 24.3% となった。現状の漁獲圧として直近 3 年間（2022～2024 年）の平均  $F$  値から %SPR を算出すると

27.7%となった。2019 年以降の漁獲圧の増加傾向には、近年増加している外国船による漁獲が影響していると考えられる。

最大持続生産量  $MSY$  を実現する親魚量水準 ( $SB_{msy}$ ) を維持する  $F$  ( $F_{msy}$ ) に対する  $YPR$  と  $\%SPR$  の関係を図 4-8 に示す。ここでの  $F$  の選択率としては令和 7 年 8 月に公開された「管理基準値等に関する研究機関会議報告書」において  $F_{msy}$  の推定に用いた値 (古市ほか 2025) を使用した (補足表 5-1)。また、年齢別平均体重および成熟割合についても  $F_{msy}$  算出時の設定および値を使用した。 $F_{msy}$  は  $\%SPR$  に換算すると 43.6%に相当する。現状の漁獲圧 ( $F_{2022-2024}$ ) は、 $F_{30\%SPR}$  および  $F_{0.1}$ 、 $F_{msy}$  を上回る。

#### (5) 再生産関係

上述の「管理基準値等に関する研究機関会議資料」において、本系群の親魚量 (重量) と加入量 (尾数) との関係 (再生産関係) にはホッケー・スティック (HS) 型再生産関係式が用いられている (図 4-9、古市ほか 2025)。再生産関係のパラメータ推定に使用されたデータは、本年度の資源評価に基づく親魚量・加入量であり、最適化手法には最小二乗法が用いられている。加入量の残差の自己相関は考慮されていない。再生産式の各パラメータを補足表 6-1 に示す。

#### (6) 現在の環境下において $MSY$ を実現する水準

令和 7 年 8 月に公開された管理基準値等に関する研究機関会議資料 (古市ほか 2025) で示された現在 (1988 年以降) の環境下における最大持続生産量  $MSY$ 、 $MSY$  を実現する親魚量 ( $SB_{msy}$ )、および  $SB_{msy}$  を維持する  $F$  ( $F_{msy}$ ) を補足表 6-2 に示す。

#### (7) 資源の水準・動向および漁獲圧の水準

本系群における 2024 年の親魚量は  $MSY$  を実現する親魚量 ( $SB_{msy}$ ) および  $MSY$  の 60% の漁獲量が得られる親魚量 ( $SB_{0.6msy}$ ) を上回る (図 4-10)。2024 年の親魚量は  $SB_{msy}$  の 1.89 倍である (補足表 6-3)。また、2024 年の漁獲圧は、 $SB_{msy}$  を維持する漁獲圧 ( $F_{msy}$ ) を上回っており、 $F_{msy}$  の 2.14 倍である。なお、神戸プロットに示した漁獲圧の比 ( $F/F_{msy}$ ) とは、各年の  $F$  の選択率の下で  $F_{msy}$  の漁獲圧を与える  $F$  を  $\%SPR$  換算して求めた値と、各年の  $F$  値との比である。親魚量の動向は、直近 5 年間 (2020~2024 年) の推移から横ばいと判断される。本系群の親魚量は 1988~2018 年には  $SB_{msy}$  を下回っていたが、2010 年以降、比較的良好な加入が続いたこと、および漁獲圧が低下し  $F_{msy}$  に近い水準で維持されたことにより、2019 年以降の親魚量は  $SB_{msy}$  を上回る水準に回復・維持されている。

### 5. 資源評価のまとめ

本系群の資源量は、1980 年代は 1 千万トン以上の高い水準で推移したが、1990 年代に入って急減し、2002 年以降 2009 年まで 10 万トン前後の低い水準で推移した。その後、比較的良好な加入が続いたこと、および漁獲圧が低下したことにより資源量は増加し、2014 年には 100 万トンを上回った。その後も良好な加入が続いたことにより資源量はさらに増加して、2021 年は 500 万トンを上回った。しかしその後、加入量が減少傾向にあり資源はわずかに減少し、2024 年の資源量は 399.8 万トンと推定された。親魚量は 2002 年以降 10

万トンを下回る水準で推移していたが、2011 年以降増加し、2020 年には 200 万トンを上回った。その後は 200 万～300 万トン台で推移し、2024 年の親魚量は 269.9 万トンと推定された。

漁獲圧は 2000 年代後半に減少し、2010 年代は SBmsy を維持する水準 (Fmsy) をわずかに上回る水準で推移していた。それにともない親魚量は増加し、2019 年以降は MSY を実現する水準 (SBmsy) を上回っている。親魚量の動向は直近 5 年間 (2020～2024 年) の推移から「横ばい」と判断される。2019 年以降は外国船による漁獲が増加し漁獲圧が増加傾向にあり、加えて、2023 年および 2024 年の再生産成功率は近年の高い水準に比べると低い可能性があり、今後の資源動向については注意が必要である。

## 6. その他

北太平洋漁業委員会 (NPFC) に中国およびロシアから北西太平洋公海域およびロシア水域におけるマイワシ漁獲量が報告されたことをうけて、これらの漁獲量を考慮した資源量推定を行い、将来予測における漁獲量や ABC にも外国船の漁獲を含めている。資源計算においては、中国の漁獲物の体長組成および体長・体重関係のデータは利用できたが、ロシアの漁獲物の組成について十分な情報が得られていない。そのため、様々な仮定を置いた上での資源評価となっている。資源評価の精度向上のために、漁獲量の値のみならず年齢組成等の情報が必要であり、これらについても報告されるように継続して働きかける必要がある。

マイワシ太平洋系群において、全ての個体が成熟する年齢は 2 歳と推定されていることから、資源の増加または維持に必要である一定水準以上の親魚量の確保のために、未成魚に過大な漁獲圧がかからないような年齢別の漁獲方策を検討することも必要と考えられる。過去の経緯をみると、資源高水準期への移行は、海洋生態系の変化を伴っており、また、水産業等社会への影響も大きかったことから、いつ資源高水準期へ移行するのかが、早期に把握されることが望ましい。現在の調査体制により、当年の加入量をある程度の確度で把握できていることから、それが主たる漁獲対象となる数年先の資源動向についてもある程度予測可能と考えられる。さらなる予測精度の向上や資源変動機構の解明のためにも、引き続き関連調査研究を進展させるとともに、環境の変化とそれに伴う加入群の大発生や急激な減少など資源の動向を注視していく必要がある。

## 7. 引用文献

- Chavez, F.P., Ryan, J., Lluch-Cota, S.E. and C.M. Niquen (2003) From anchovies to sardines and back: multidecadal change in the Pacific Ocean. *Science* **299**, 217-221.
- Furuichi, S., Niino, Y., Kamimura, Y. and R. Yukami (2020) Time-varying relationships between early growth rate and recruitment in Japanese sardine. *Fish. Res.*, **232**, 105723.
- 古市 生・由上龍嗣・上村泰洋・西嶋翔太・井須小羊子・伊澤雄登・東口胤成・渡部亮介 (2025) 令和 7 年度の管理基準値等に関する研究機関会議資料. FRA-SA2025-BRP02-01.
- 長谷川雅俊・日越貴大 (2011) 駿河湾西部における春季から初夏のマイワシ仔稚幼魚の出現. *黒潮の資源海洋研究*, **12**, 125-130.
- 伊東祐方 (1991) 日本のマイワシーその生活と資源. 「魚油とマイワシ」松下七郎編著, 恒

星社厚生閣, 東京, 191-255.

- Kamimura, Y., K. Tadokoro, S. Furuichi, and R. Yukami (2022) Stronger density-dependent growth of Japanese sardine with lower food availability: Comparison of growth and zooplankton biomass between a historical and current stock-increase period in the western North Pacific. *Fish. Res.* **255**, 106461.
- Kasamatsu, F. and S. Tanaka (1992) Annual changes in prey species of minke whales taken off Japan 1948-87. *Nippon Suisan Gakkaishi*, **54**, 637-651.
- 川端 淳・西田 宏・高木香織・高橋正知・中神正康・巢山 哲・上野康弘・納谷美也子・山下夕帆 (2011) 北西太平洋におけるマイワシ 0～1 歳魚の季節的分布回遊. 平成 21 年度資源評価調査成果報告書・第 59 回サンマ等小型浮魚資源研究会議報告, 東北区水産研究所, 189-194.
- Kawasaki, T. (1992) Climate-dependent fluctuations in far eastern sardine population and their impacts on fisheries and society. In: *Climate variability, climate change and fisheries*, ed. Glantz, M.H., Cambridge University press, Cambridge, pp. 325-354.
- Klyashtorin, L. B. (1998) Long-term climate change and main commercial fish production in the Atlantic and Pacific. *Fish. Res.*, **37**, 115-125.
- Konishi, K., T. Isoda, and T. Tamura (2017) Overview of stomach content analyses for sei, Bryde's and common minke whales under the offshore component of JARPNII, and temporal changes in feeding habits. *TEPER-ICR*, **1**, 44-57.
- 黒田一紀 (1991) マイワシの初期生活期を中心とする再生産過程に関する研究. 中央水研研報, **3**, 25-278.
- Niino, Y., Furuichi, S., Kamimura, Y. and R. Yukami (2021) Spatiotemporal spawning patterns and early growth of Japanese sardine in the western North Pacific during the recent stock increase. *Fish. Oceanogr.*, **30**, 643-653.
- 落合伸一郎 (2009) マイワシとウルメイワシ当歳魚の比較生態学的研究. 東京大学農学生命研究科修士論文, 95 pp.
- Sakamoto, T., Komatsu, K., Shirai, K., Higuchi, T., Ishimura, T., Setou, T., Kamimura, Y., Watanabe, C. and A. Kawabata (2019). Combining microvolume isotope analysis and numerical simulation to reproduce fish migration history. *Methods Ecol. Evol.*, **10**, 59-69.
- 須原三加・川端 淳・久保田洋・高木香織・本田 聡・渡邊千夏子・加賀敏樹・山下紀生・巢山 哲・中神正康 (2014) 黒潮親潮移行域以北に出現するマイワシ太平洋系群当歳魚の孵化日組成と成長. 黒潮の資源海洋研究, **15**, 109.
- 高木香織・高橋素光・西田 宏 (2010) マイワシ太平洋系群・資源低水準期における稚魚の生態特性. 平成 20 年度資源評価調査成果報告書・第 58 回サンマ等小型浮魚資源研究会議報告, 東北区水産研究所, 172-178.
- Tamura, T. and Fujise, Y. (2002) Geographical and seasonal changes of the prey species of minke whale in the northwestern Pacific. *ICES J. Mar. Sci.*, **59**, 516-528.
- Tanaka, E. (2003) A method for estimating dynamics of carrying capacity using time series of stock and recruitment. *Fish. Sci.*, **69**, 677-686.
- 田中昌一 (1960) 水産生物の Population Dynamics と漁業資源管理. 東海水研報, **28**, 1-200.

- Watanabe, Y., H. Zenitani and R. Kimura (1995) Population decline of the Japanese sardine *Sardinops melanostictus* owing to the recruitment failures. Can. J. Fish. Aquat. Sci., **52**, 1609-1616.
- Yasunaka, S. and K. Hanawa (2002) Regime shifts found in the northern hemisphere SST field. J. Meteor. Soc. Japan, **80**, 119-135.
- Yatsu, A. and M. Kaeriyama (2005) Linkages between coastal and open-ocean habitats and dynamics of Japanese stocks of chum salmon and Japanese sardine. Deep-Sea Res. II, **52**, 727-737.




図 2-1. 分布域と産卵場




図 2-2. 年齢と成長 (2022～2024 年漁獲物平均)




図 2-3. 年齢と成熟割合




図 3-1. 漁獲量の推移




図 3-2. 年齢別漁獲尾数の推移




図 3-3. 北部まき網の有効努力量と漁獲量、資源量指数の推移

努力量=投網数、資源量指数= $\Sigma$  緯度経度 30 分単位メッシュの CPUE、有効努力量=漁獲量/資源密度指数、資源密度指数=資源量指数/有漁メッシュ数（JAFIC 集計値、道東含まず）。




図 3-4. 北部まき網の有効努力量の経月変化（JAFIC 集計値、道東含まず）




図 4-1. 産卵量の推移（卵稚仔調査協議会による前年 10 月から当年 9 月までの集計値）  
2025 年は 6 月までの暫定値。太平洋側全域は同協議会の区分の海区Ⅰ～Ⅳ、紀伊水道  
～土佐湾～日向灘は海区Ⅲ、東北～関東近海～潮岬は海区Ⅰ・Ⅱの値。




図 4-2. 資源量指数の推移

上図は加入量の指数、下図は 1 歳魚資源尾数の指数（補足資料 7 を参照）。





図 4-3. 資源量、親魚量および漁獲割合の推移

図 4-4. 年齢別漁獲係数  $F$  の推移




図 4-5. 加入量および再生産成功率（RPS）の推移




図 4-6. 自然死亡率  $M$  と資源量、親魚量の関係  
 $M$  の変化に対する 2024 年の推定値の感度解析。




図 4-7. %SPR の推移

%SPR は、漁獲がないときの親魚量に対する漁獲があるときの親魚量の割合を示し、 $F$  が高い（低い）と %SPR は小さく（大きく）なる。




図 4-8.  $F_{msy}$  に対する YPR（破線）と %SPR（黒線）の関係




図 4-9. 親魚量と加入量の関係（再生産関係）

再生産関係には、高加入期（1976～1987 年）と通常加入期（1988～2024 年）で再生産関係が切り替わる、自己相関を考慮しないホッケー・スティック（HS）型再生産関係式を用い、最小二乗法によりパラメータ推定を行った。再生産関係の分析には令和 7 年度評価時の 1976～2024 年の親魚量と加入量を使用しており、青線および青丸は高加入期の再生産関係とその推定に使用したデータ点、赤線および赤丸は通常加入期の再生産関係とその推定に使用したデータ点である。再生産関係式の上下の点線は、仮定されている再生産関係において観察データの 90%が含まれると推定される範囲である。白抜き丸（直近 5 年は赤丸）は、今回の評価により更新された親魚量と加入量の値である。図中の数字は加入群の年級（生まれ年）を示す。





図 4-10. 最大持続生産量 (MSY) を実現する親魚量 (SBmsy) と SBmsy を維持する漁獲圧 (Fmsy) に対する過去の親魚量および漁獲圧の関係 (神戸プロット)

表 3-1. 漁獲量とコホート解析結果

| 年    | 漁獲量 (万トン) |      |      |          |           |            | 資源量<br>(万トン) | 親魚量<br>(万トン) | 加入量<br>(億尾) | 漁獲<br>割合<br>(%) | 再生産<br>成功率<br>(尾/kg) |
|------|-----------|------|------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|----------------------|
|      | 太平洋<br>合計 | ロシア  | 中国   | 日本<br>合計 | 三重県<br>以東 | 和歌山<br>県以西 |              |              |             |                 |                      |
| 1975 | 43.0      |      |      | 43.0     | 40.0      | 3.0        |              |              |             |                 |                      |
| 1976 | 75.6      |      |      | 75.6     | 67.7      | 7.9        | 386.2        | 85.2         | 559         | 19.6            | 65.6                 |
| 1977 | 99.1      |      |      | 99.1     | 93.4      | 5.6        | 555.3        | 177.4        | 923         | 17.8            | 52.0                 |
| 1978 | 114.9     |      |      | 114.9    | 97.5      | 17.4       | 744.0        | 262.0        | 942         | 15.5            | 36.0                 |
| 1979 | 108.9     |      |      | 108.9    | 93.3      | 15.6       | 864.7        | 421.9        | 419         | 12.6            | 9.9                  |
| 1980 | 144.5     |      |      | 144.5    | 128.6     | 15.9       | 1,336.6      | 561.3        | 2,930       | 10.8            | 52.2                 |
| 1981 | 229.6     |      |      | 229.6    | 212.9     | 16.7       | 1,541.5      | 532.5        | 1,978       | 14.9            | 37.1                 |
| 1982 | 241.9     |      |      | 241.9    | 215.8     | 26.1       | 1,583.0      | 815.8        | 1,562       | 15.3            | 19.2                 |
| 1983 | 272.5     |      |      | 272.5    | 253.9     | 18.6       | 1,515.1      | 914.0        | 1,802       | 18.0            | 19.7                 |
| 1984 | 287.0     |      |      | 287.0    | 258.9     | 28.1       | 1,441.9      | 836.8        | 2,128       | 19.9            | 25.4                 |
| 1985 | 264.4     |      |      | 264.4    | 239.7     | 24.7       | 1,739.2      | 807.9        | 2,479       | 15.2            | 30.7                 |
| 1986 | 268.5     |      |      | 268.5    | 247.1     | 21.4       | 1,888.1      | 1,049.9      | 2,600       | 14.2            | 24.8                 |
| 1987 | 291.6     |      |      | 291.6    | 269.6     | 22.0       | 1,954.2      | 1,132.2      | 1,565       | 14.9            | 13.8                 |
| 1988 | 283.8     |      |      | 283.8    | 259.3     | 24.4       | 1,777.4      | 1,335.5      | 228         | 16.0            | 1.7                  |
| 1989 | 252.4     |      |      | 252.4    | 228.0     | 24.3       | 1,250.7      | 1,175.4      | 194         | 20.2            | 1.7                  |
| 1990 | 216.2     |      |      | 216.2    | 191.6     | 24.6       | 798.1        | 760.9        | 69          | 27.1            | 0.9                  |
| 1991 | 172.4     |      |      | 172.4    | 154.4     | 18.0       | 454.6        | 444.0        | 53          | 37.9            | 1.2                  |
| 1992 | 124.0     |      |      | 124.0    | 108.9     | 15.2       | 246.5        | 181.9        | 273         | 50.3            | 15.0                 |
| 1993 | 79.1      |      |      | 79.1     | 67.5      | 11.6       | 146.7        | 56.9         | 121         | 53.9            | 21.3                 |
| 1994 | 42.5      |      |      | 42.5     | 35.7      | 6.8        | 87.9         | 48.7         | 119         | 48.3            | 24.4                 |
| 1995 | 33.2      |      |      | 33.2     | 27.7      | 5.5        | 75.6         | 31.0         | 73          | 43.9            | 23.6                 |
| 1996 | 18.1      |      |      | 18.1     | 15.0      | 3.1        | 80.5         | 22.1         | 134         | 22.5            | 60.7                 |
| 1997 | 25.5      |      |      | 25.5     | 22.8      | 2.7        | 91.6         | 36.0         | 78          | 27.9            | 21.6                 |
| 1998 | 14.2      |      |      | 14.2     | 12.4      | 1.8        | 72.7         | 42.9         | 74          | 19.5            | 17.2                 |
| 1999 | 30.8      |      |      | 30.8     | 28.1      | 2.7        | 70.1         | 47.3         | 26          | 43.9            | 5.4                  |
| 2000 | 13.9      |      |      | 13.9     | 12.2      | 1.7        | 41.1         | 23.1         | 48          | 33.8            | 21.0                 |
| 2001 | 17.7      |      |      | 17.7     | 16.2      | 1.5        | 30.5         | 19.9         | 25          | 57.9            | 12.4                 |
| 2002 | 4.9       |      |      | 4.9      | 4.3       | 0.6        | 15.7         | 8.7          | 12          | 31.1            | 14.1                 |
| 2003 | 5.1       |      |      | 5.1      | 4.6       | 0.5        | 12.1         | 7.5          | 11          | 42.0            | 15.0                 |
| 2004 | 4.8       |      |      | 4.8      | 4.1       | 0.7        | 10.9         | 6.3          | 9           | 44.1            | 14.3                 |
| 2005 | 2.5       |      |      | 2.5      | 1.6       | 0.9        | 8.7          | 3.5          | 19          | 28.7            | 55.4                 |
| 2006 | 4.9       |      |      | 4.9      | 4.0       | 1.0        | 13.1         | 6.2          | 12          | 37.5            | 20.1                 |
| 2007 | 6.5       |      |      | 6.5      | 4.2       | 2.3        | 11.2         | 5.6          | 14          | 57.9            | 25.4                 |
| 2008 | 2.7       |      |      | 2.7      | 1.8       | 0.9        | 9.9          | 2.8          | 24          | 27.3            | 87.4                 |
| 2009 | 4.9       |      |      | 4.9      | 4.6       | 0.3        | 12.8         | 5.8          | 13          | 38.4            | 22.2                 |
| 2010 | 6.5       |      |      | 6.5      | 6.2       | 0.3        | 30.7         | 7.5          | 68          | 21.1            | 90.9                 |
| 2011 | 13.2      |      |      | 13.2     | 12.2      | 1.0        | 44.3         | 14.9         | 57          | 29.7            | 38.4                 |
| 2012 | 10.2      |      |      | 10.2     | 9.2       | 0.9        | 49.2         | 23.2         | 65          | 20.6            | 28.1                 |
| 2013 | 13.0      |      |      | 13.0     | 12.4      | 0.6        | 59.3         | 32.1         | 73          | 21.8            | 22.8                 |
| 2014 | 18.6      | 0.0  |      | 18.6     | 17.2      | 1.4        | 101.0        | 40.6         | 202         | 18.4            | 49.8                 |
| 2015 | 27.1      | 0.0  |      | 27.0     | 17.5      | 9.5        | 128.2        | 63.6         | 222         | 21.1            | 34.9                 |
| 2016 | 32.7      | 0.7  |      | 32.0     | 28.1      | 3.9        | 168.6        | 77.2         | 241         | 19.4            | 31.2                 |
| 2017 | 47.0      | 1.7  | 1.0  | 44.4     | 42.1      | 2.3        | 223.0        | 107.5        | 449         | 21.1            | 41.8                 |
| 2018 | 54.3      | 6.3  | 2.6  | 45.3     | 43.2      | 2.2        | 332.2        | 114.2        | 801         | 16.3            | 70.2                 |
| 2019 | 72.6      | 13.3 | 4.6  | 54.7     | 52.0      | 2.6        | 420.2        | 163.3        | 658         | 17.3            | 40.3                 |
| 2020 | 103.4     | 31.5 | 9.3  | 62.6     | 55.4      | 7.1        | 491.3        | 227.7        | 831         | 21.0            | 36.5                 |
| 2021 | 107.8     | 25.6 | 23.7 | 58.5     | 54.2      | 4.3        | 534.1        | 234.9        | 1,086       | 20.2            | 46.2                 |
| 2022 | 112.5     | 28.8 | 26.7 | 57.0     | 55.1      | 2.0        | 590.3        | 260.2        | 943         | 19.1            | 36.3                 |
| 2023 | 135.5     | 54.4 | 23.3 | 57.8     | 56.0      | 1.8        | 555.3        | 338.2        | 332         | 24.4            | 9.8                  |
| 2024 | 137.6     | 59.3 | 26.1 | 52.2     | 50.6      | 1.6        | 399.8        | 269.9        | 564         | 34.4            | 20.9                 |

## 補足資料 1 資源評価の流れ



※ 点線枠内は資源管理方針に関する検討会における管理基準値や漁獲管理規則等の議論をふまえて作成される。

## 補足資料 2 計算方法

### (1) 年齢別漁獲尾数の推定

年齢別漁獲尾数は以下のように推定した。北海道～宮城県太平洋側における主要港における体長測定データを道県別・月別・漁業種別に集計し、道県別・年別に集計した精密測定データから求めた体長・体重関係を用いて、道県別・月別・漁業種別漁獲量に一致するように引き延ばした。体長測定データが欠測した道県・月・漁業種については、担当者の判断で尤もらしいデータ（他漁業種、前後の月、隣県など）を参照した。一方で、年齢査定結果を静岡県以北と愛知県以西の 2 海域に分けて、4 半期別に集計して Age-Length-Key を作成し、先に求めた道県別・月別・漁業種別体長組成データに充てて年齢別漁獲尾数を求めた。年齢査定結果が欠測した海域・4 半期については、近年の平均的な値を充てた。

ロシア漁船による漁獲物の年齢組成や年齢別体重は、情報が得られていないため不明であるが、操業海域・時期およびマイワシの回遊経路等を考慮し、宮城県以北のまき網の 7～12 月の漁獲物と等しいと仮定した。中国漁船による漁獲物については、2020～2022 年の体長組成および体長－体重関係のデータが NPFC に提供されており、このデータを使用した。データのない 2017～2019 年および 2023、2024 年においては、2020～2022 年の年齢組成の平均を充てた。情報が得られていない Age-Length-Key については日本と同じものを使用した。中国漁獲物のデータは予備的なものであり不確実性は大きいものの、尾数では 10 cm 前後が多いという特徴があった。なお、中国の生物データの提供は中国をはじめとする NPFC 参画国および NPFC 事務局の協力により実現しており、ここに謝意を表する。

### (2) 資源計算方法

チューニング VPA（コホート解析）により年齢別漁獲係数、資源尾数、資源重量を推定した（結果は補足表 2-1 に示す）。生活史と漁獲の季節性から 1 月を起点とし、0～4 歳、および 5 歳以上をまとめた最高齢グループ（5+歳、プラスグループ）の年齢構成で行った。産卵期は秋季～春季にわたるが、y-1 年秋季～y 年春季に産卵する親魚は y 年の親魚とした。計算には Pope (1972) の近似式を用いた。最高齢グループの計算については平松 (1999) の方法を用いた。自然死亡係数 (M) は、田中 (1960) の示した式： $M=2.5/\text{寿命}$ と寿命 7 歳から 0.4 とした。

年齢別年別資源尾数は (1) 式により計算した。

$$N_{a,y} = N_{a+1,y+1} \exp(M) + C_{a,y} \exp\left(\frac{M}{2}\right) \quad (1)$$

ここで、 $N_{a,y}$  および  $C_{a,y}$  は、y 年における a 歳魚のそれぞれ資源尾数、漁獲尾数。ただし、最近年 (Y 年、ここでは 2024 年)、および最高齢グループ（添え字 p、ここでは 5+歳）、最高齢-1 歳魚 (p-1、ここでは 4 歳) の資源尾数はそれぞれ (2～4) 式によった。

$$N_{a,Y} = \frac{C_{a,Y} \exp\left(\frac{M}{2}\right)}{1 - \exp(-F_{a,Y})} \quad (2)$$

$$N_{p,y} = \frac{C_{p,y}}{C_{p,y} + C_{p-1,y}} N_{p,y+1} \exp(M) + C_{p,y} \exp\left(\frac{M}{2}\right) \quad (3)$$

$$N_{p-1,y} = \frac{C_{p-1,y}}{C_{p,y} + C_{p-1,y}} N_{p,y+1} \exp(M) + C_{p-1,y} \exp\left(\frac{M}{2}\right) \quad (4)$$

漁獲係数  $F$  の計算は、最近年および最高齢グループ以外は (5) 式によった。

$$F_{a,y} = -\ln\left\{1 - \frac{C_{a,y}}{N_{a,y}} \exp\left(\frac{M}{2}\right)\right\} \quad (5)$$

最高齢グループの  $F$  は、全ての年で最高齢-1 歳の  $F$  に等しいとした (平松 1999、(6) 式)。

$$F_{p,y} = F_{p-1,y} \quad (6)$$

最近年の 0~4 歳の  $F$  (ターミナル  $F$ ) をチューニングによって探索的に求めた。本系群の年齢別選択率の年変動が大きく、「近年の年齢別選択率が安定している」という仮定の下でのターミナル  $F$  の設定では正確な評価を行うことができないこと (平松 2009) 等の指摘がされており、選択率が安定しているという仮定をおかず、2024 年の 0~4 歳の  $F$  の値をそれぞれ探索的に推定している。チューニングに用いた指数と対応する推定値は以下の 4 つとした (補足表 2-2)。指数と適合させる期間は、秋季浮魚類調査が開始された 2005 年以降とした。

- ① 2005~2024 年の北西太平洋北上期浮魚類資源調査の中層トロール 0 歳魚標準化 CPUE・0 歳魚資源尾数
- ② 2005~2024 年の北西太平洋北上期浮魚類資源調査の中層トロール 1 歳魚標準化 CPUE・1 歳魚資源尾数
- ③ 2005~2024 年の北西太平洋秋季浮魚類資源調査の秋季亜寒帯域 0 歳魚現存量・0 歳魚資源尾数
- ④ 2005~2025 年の潮岬以東海域 (海区 I・II) における産卵量・親魚量

ターミナル  $F$  の推定値を安定化させるために、リッジ VPA (Okamura et al. 2017) をコホート解析に適用した。これは、(7) 式で表されるように残差平方和にペナルティ項を加えた関数を最小化することでターミナル  $F$  を求める手法であり、ペナルティの大きさはレトロスペクティブバイアス (Mohn's  $\rho$ , Mohn 1999) を最小にするよう決められる。ペナルティ項は、最新年の年齢別  $F$  と直近 3 年 (2021~2023 年) の平均の年齢別  $F$  との差の二乗和としている。

$$(1 - \lambda) \sum_{k=1}^4 \sum_y [\ln(I_{k,y}) - \ln(q_k X_{k,y}^{b_k})]^2 + \lambda \sum_{a=1}^4 \left( F_{a,2024} - \frac{1}{3} \sum_{y=2021}^{2023} F_{a,y} \right)^2 \quad (7)$$

$\lambda$  はリッジ回帰におけるペナルティの大きさを表し、0 から 1 の間の値をとる。 $I_{k,y}$  は指標  $k$  の  $y$  年の値をそれぞれ表す。 $q_k$  は指標  $k$  の比例定数であり、 $X_{k,y}$  はコホート解析から計算される  $y$  年における指標  $k$  の対象（加入量、1 歳魚資源尾数、親魚量）の値であり、 $b_k$  は指標値と VPA の推定値の関係における非線形性を表す係数である。 $q_k$  および  $b_k$  は、それぞれ以下の (8) 式で推定した。

$$q_k = \exp \left\{ \frac{1}{n_k} \sum_y \ln \left( \frac{I_{k,y}}{X_y^{b_k}} \right) \right\} \quad (8a)$$

$$b_k = \frac{\text{Cov}[\ln(I_k), \ln(X_k)]}{V[\ln(X_k)]} \quad (8b)$$

ここで  $n_k$  はチューニングに使用した指標  $k$  の年数であり、 $V$  と  $\text{Cov}$  はそれぞれ分散と共分散を表す。北上期調査の 0 歳魚標準化 CPUE ( $k=1$ ) および 1 歳魚標準化 CPUE ( $k=2$ )、秋季調査の亜寒帯域 0 歳魚現存量 ( $k=3$ ) については、非線形性を仮定し ( $b_k \neq 1$ )、産卵量 ( $k=4$ ) については、親魚量とおおよそ比例関係を示したため、 $b_k=1$  に固定した。各指標値の残差プロットについては補足図 2-1 に、各指標値と予測値の関係については補足図 2-2 に示した。それぞれにおいて問題のある残差傾向は見られないと判断し、指標値と予測値の仮定も問題ないと判断された。

レトロスペクティブバイアス (Mohn's  $\rho$ ) は、最新の資源評価の最終年  $Y$  までの (2024 年) までのフルデータに対する各年の推定値と、最新データを  $i$  年分落とした場合の最終年 ( $Y-i$  年) の推定値との相対値の平均値である。データを遡る年数は 5 年とした。リッジペナルティの重み  $\lambda$  は、Okamura et al. (2017) に倣い、資源量のレトロスペクティブバイアスが最小となる値を使用した。レトロスペクティブバイアスが最小となる  $\lambda$  を 0.01 刻みで探索した結果、 $\lambda=0.92$  となった。

5 年間の レトロスペクティブ解析により、データの追加・更新が行われることで  $F$  の値や資源量推定値に生じる変化を確認した (補足図 2-3)。各指標値のレトロスペクティブバイアスは比較的小さく、問題ないと判断された。

推定された資源量、親魚量、加入量の不確実性をノンパラメトリックブートストラップ法により評価した (補足図 2-4)。チューニング時の観測値と予測値の残差をリサンプリングすることで、新たな資源量指標値を作成し、それを使って VPA を繰り返し計算した。計算は 5,000 回繰り返し、信頼区間を求めた。2024 年のそれぞれの推定値の 90% 信頼区間は、加入量 (億尾) [424.9, 1039.4]、資源量 (万トン) [401.8, 590.8]、親魚量 (万トン) [273.2, 391.8]、 $F_0$  [0.14, 0.38]、 $F_1$  [0.18, 0.44]、 $F_2$  [0.32, 0.63]、 $F_3$  [0.49, 0.77]、 $F_4$  [0.70, 0.93] であった。

## 引用文献

平松一彦 (1999) VPA の入門と実際. 水産資源管理談話会報, **20**, 9-28.

平松一彦 (2009) マイワシ太平洋系群の資源評価に用いられる VPA の信頼性の検討. 日水

誌, **75**, 661-665.

Mohn, R. (1999) The retrospective problem in sequential population analysis: an investigation using cod fishery and simulated data. *ICES J. Mar. Sci.*, **56**, 473-488.

Okamura, H., Y. Yamashita and M. Ichinokawa (2017) Ridge virtual population analysis to reduce the instability of fishing mortalities in the terminal year. *ICES J. Mar. Sci.*, **74**, 2427-2436.

Pope (1972) An investigation of the accuracy of virtual population using cohort analysis. *Res. Bull. inst. Comm. Northw. Atlant. Fish.*, **9**, 65-74.

田中昌一 (1960) 水産生物の Population Dynamics と漁業資源管理. 東海水研報, **28**, 1-200.

年齡別漁獲尾数 (百万尾)

年齢別漁獲量 (千トン)

年齡別漁獲係數 (F)、%SPR、 $F/F_{msy}$ 年齡別資源尾数 (百万尾)

年齢別資源量（千トン）、親魚量（千トン）、再生産成功率（RPS、尾/kg）

年齢別平均体重 (g)

[illegible]

補足表 2-1. (続き)

年齢別漁獲尾数 (百万尾)

| 年齢\年 | 1984   | 1985   | 1986   | 1987   | 1988   | 1989   | 1990   | 1991   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0歳   | 9,656  | 16,152 | 2,612  | 13,293 | 1,857  | 4,733  | 1,831  | 482    |
| 1歳   | 12,952 | 12,648 | 16,897 | 7,413  | 12,465 | 1,176  | 2,798  | 775    |
| 2歳   | 8,377  | 8,947  | 8,340  | 13,945 | 12,176 | 6,865  | 2,632  | 944    |
| 3歳   | 13,665 | 10,192 | 8,256  | 12,206 | 8,351  | 11,210 | 6,753  | 1,373  |
| 4歳   | 6,671  | 6,217  | 5,976  | 6,746  | 6,310  | 7,801  | 9,491  | 5,685  |
| 5歳以上 | 2,958  | 2,039  | 2,452  | 2,929  | 3,073  | 4,185  | 4,655  | 8,525  |
| 計    | 54,278 | 56,194 | 44,531 | 56,532 | 44,231 | 35,970 | 28,160 | 17,784 |

年齢別漁獲量 (千トン)

| 年齢\年 | 1984  | 1985  | 1986  | 1987  | 1988  | 1989  | 1990  | 1991  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0歳   | 77.2  | 290.7 | 26.1  | 79.8  | 22.3  | 47.3  | 9.2   | 1.9   |
| 1歳   | 531.0 | 505.9 | 709.7 | 348.4 | 610.8 | 52.9  | 114.7 | 23.2  |
| 2歳   | 452.4 | 438.4 | 492.1 | 753.0 | 706.2 | 405.0 | 152.6 | 82.1  |
| 3歳   | 929.2 | 682.8 | 619.2 | 817.8 | 626.3 | 840.8 | 533.5 | 133.2 |
| 4歳   | 560.3 | 516.0 | 555.7 | 600.4 | 561.6 | 725.5 | 863.7 | 562.8 |
| 5歳以上 | 319.4 | 210.0 | 281.9 | 316.4 | 310.4 | 452.0 | 488.8 | 920.7 |
| 計    | 2,870 | 2,644 | 2,685 | 2,916 | 2,838 | 2,524 | 2,162 | 1,724 |
| 漁獲割合 | 19.9% | 15.2% | 14.2% | 14.9% | 16.0% | 20.2% | 27.1% | 37.9% |

年齢別漁獲係数 (F)、%SPR、F/Fmsy

| 年齢\年   | 1984  | 1985  | 1986  | 1987  | 1988  | 1989  | 1990  | 1991  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0歳     | 0.06  | 0.08  | 0.01  | 0.11  | 0.10  | 0.35  | 0.39  | 0.12  |
| 1歳     | 0.14  | 0.12  | 0.14  | 0.05  | 0.18  | 0.11  | 0.47  | 0.36  |
| 2歳     | 0.17  | 0.17  | 0.14  | 0.21  | 0.15  | 0.17  | 0.49  | 0.36  |
| 3歳     | 0.56  | 0.42  | 0.30  | 0.38  | 0.24  | 0.24  | 0.32  | 0.68  |
| 4歳     | 0.96  | 0.71  | 0.61  | 0.57  | 0.45  | 0.47  | 0.43  | 0.66  |
| 5歳以上   | 0.96  | 0.71  | 0.61  | 0.57  | 0.45  | 0.47  | 0.43  | 0.66  |
| %SPR   | 42.46 | 44.66 | 50.87 | 47.25 | 48.89 | 39.11 | 22.46 | 33.98 |
| F/Fmsy | 1.06  | 0.95  | 0.72  | 0.85  | 0.82  | 1.16  | 1.98  | 1.43  |

年齢別資源尾数 (百万尾)

| 年齢\年 | 1984    | 1985    | 1986    | 1987    | 1988    | 1989    | 1990    | 1991   |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 0歳   | 212,801 | 247,911 | 259,954 | 156,475 | 22,847  | 19,437  | 6,923   | 5,308  |
| 1歳   | 117,844 | 134,739 | 152,955 | 172,114 | 94,005  | 13,794  | 9,154   | 3,142  |
| 2歳   | 64,528  | 68,389  | 79,963  | 88,695  | 109,303 | 52,808  | 8,283   | 3,845  |
| 3歳   | 39,056  | 36,396  | 38,518  | 46,773  | 48,037  | 63,299  | 29,778  | 3,398  |
| 4歳   | 13,228  | 14,992  | 16,053  | 19,060  | 21,359  | 25,363  | 33,252  | 14,432 |
| 5歳以上 | 5,866   | 4,916   | 6,586   | 8,276   | 10,402  | 13,608  | 16,310  | 21,641 |
| 計    | 453,324 | 507,343 | 554,029 | 491,392 | 305,952 | 188,309 | 103,701 | 51,765 |

年齢別資源量 (千トン)、親魚量 (千トン)、再生産成功率 (RPS、尾/kg)

| 年齢\年 | 1984   | 1985   | 1986   | 1987   | 1988   | 1989   | 1990  | 1991  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 0歳   | 1,702  | 4,462  | 2,600  | 939    | 274    | 194    | 35    | 21    |
| 1歳   | 4,832  | 5,390  | 6,424  | 8,089  | 4,606  | 621    | 375   | 94    |
| 2歳   | 3,485  | 3,351  | 4,718  | 4,790  | 6,340  | 3,116  | 480   | 335   |
| 3歳   | 2,656  | 2,439  | 2,889  | 3,134  | 3,603  | 4,747  | 2,352 | 330   |
| 4歳   | 1,111  | 1,244  | 1,493  | 1,696  | 1,901  | 2,359  | 3,026 | 1,429 |
| 5歳以上 | 633    | 506    | 757    | 894    | 1,051  | 1,470  | 1,713 | 2,337 |
| 計    | 14,419 | 17,392 | 18,881 | 19,542 | 17,774 | 12,507 | 7,981 | 4,546 |
| 親魚量  | 8,368  | 8,079  | 10,499 | 11,322 | 13,355 | 11,754 | 7,609 | 4,440 |
| RPS  | 25.4   | 30.7   | 24.8   | 13.8   | 1.7    | 1.7    | 0.9   | 1.2   |

年齢別平均体重 (g)

| 年齢\年 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0歳   | 8    | 18   | 10   | 6    | 12   | 10   | 5    | 4    |
| 1歳   | 41   | 40   | 42   | 47   | 49   | 45   | 41   | 30   |
| 2歳   | 54   | 49   | 59   | 54   | 58   | 59   | 58   | 87   |
| 3歳   | 68   | 67   | 75   | 67   | 75   | 75   | 79   | 97   |
| 4歳   | 84   | 83   | 93   | 89   | 89   | 93   | 91   | 99   |
| 5歳以上 | 108  | 103  | 115  | 108  | 101  | 108  | 105  | 108  |

補足表 2-1. (続き)

| 年齢別漁獲尾数 (百万尾)                            |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年齢\年                                     | 1992   | 1993   | 1994   | 1995   | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   |
| 0歳                                       | 4,003  | 2,806  | 3,517  | 1,973  | 2,948  | 725    | 451    | 61     |
| 1歳                                       | 1,190  | 8,933  | 2,089  | 2,533  | 651    | 2,638  | 993    | 2,606  |
| 2歳                                       | 363    | 317    | 1,788  | 1,231  | 336    | 449    | 490    | 1,108  |
| 3歳                                       | 738    | 321    | 319    | 193    | 128    | 139    | 148    | 421    |
| 4歳                                       | 768    | 329    | 125    | 42     | 28     | 30     | 142    | 174    |
| 5歳以上                                     | 8,352  | 932    | 328    | 60     | 12     | 10     | 71     | 59     |
| 計                                        | 15,414 | 13,637 | 8,168  | 6,033  | 4,103  | 3,990  | 2,295  | 4,428  |
| 年齢別漁獲量 (千トン)                             |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 年齢\年                                     | 1992   | 1993   | 1994   | 1995   | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   |
| 0歳                                       | 72.1   | 16.8   | 38.7   | 66.8   | 99.9   | 20.3   | 10.8   | 2.2    |
| 1歳                                       | 64.3   | 544.9  | 117.0  | 123.3  | 31.7   | 168.8  | 51.7   | 155.6  |
| 2歳                                       | 30.1   | 25.1   | 168.1  | 103.8  | 28.3   | 44.4   | 38.7   | 85.0   |
| 3歳                                       | 70.9   | 35.9   | 38.3   | 22.8   | 15.1   | 16.1   | 14.9   | 39.9   |
| 4歳                                       | 76.0   | 44.1   | 16.9   | 6.1    | 3.9    | 4.0    | 16.6   | 17.6   |
| 5歳以上                                     | 927.1  | 124.0  | 46.0   | 9.4    | 1.8    | 1.5    | 8.7    | 7.6    |
| 計                                        | 1,240  | 791    | 425    | 332    | 181    | 255    | 142    | 308    |
| 漁獲割合                                     | 50.3%  | 53.9%  | 48.3%  | 43.9%  | 22.5%  | 27.9%  | 19.5%  | 43.9%  |
| 年齢別漁獲係数 (F)、%SPR、F/Fmsy                  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 年齢\年                                     | 1992   | 1993   | 1994   | 1995   | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   |
| 0歳                                       | 0.20   | 0.33   | 0.45   | 0.40   | 0.31   | 0.12   | 0.08   | 0.03   |
| 1歳                                       | 0.62   | 1.29   | 0.58   | 0.94   | 0.28   | 0.67   | 0.30   | 1.19   |
| 2歳                                       | 0.36   | 0.41   | 1.56   | 1.15   | 0.37   | 0.40   | 0.31   | 0.90   |
| 3歳                                       | 0.69   | 0.84   | 1.45   | 0.92   | 0.41   | 0.32   | 0.27   | 0.62   |
| 4歳                                       | 1.68   | 1.09   | 1.45   | 1.05   | 0.39   | 0.19   | 0.85   | 0.81   |
| 5歳以上                                     | 1.68   | 1.09   | 1.45   | 1.05   | 0.39   | 0.19   | 0.85   | 0.81   |
| %SPR                                     | 23.71  | 10.51  | 13.65  | 10.74  | 31.28  | 29.68  | 43.59  | 22.57  |
| F/Fmsy                                   | 2.20   | 3.45   | 3.75   | 3.74   | 1.50   | 1.54   | 1.00   | 2.48   |
| 年齢別資源尾数 (百万尾)                            |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 年齢\年                                     | 1992   | 1993   | 1994   | 1995   | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   |
| 0歳                                       | 27,329 | 12,127 | 11,889 | 7,312  | 13,445 | 7,777  | 7,388  | 2,580  |
| 1歳                                       | 3,163  | 15,042 | 5,832  | 5,090  | 3,286  | 6,599  | 4,619  | 4,583  |
| 2歳                                       | 1,472  | 1,146  | 2,769  | 2,199  | 1,338  | 1,669  | 2,263  | 2,283  |
| 3歳                                       | 1,805  | 690    | 509    | 392    | 466    | 622    | 752    | 1,116  |
| 4歳                                       | 1,153  | 605    | 200    | 80     | 104    | 207    | 303    | 383    |
| 5歳以上                                     | 12,546 | 1,716  | 524    | 114    | 46     | 68     | 152    | 131    |
| 計                                        | 47,467 | 31,326 | 21,722 | 15,185 | 18,685 | 16,942 | 15,478 | 11,076 |
| 年齢別資源量 (千トン)、親魚量 (千トン)、再生産成功率 (RPS、尾/kg) |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 年齢\年                                     | 1992   | 1993   | 1994   | 1995   | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   |
| 0歳                                       | 492    | 73     | 131    | 248    | 455    | 218    | 177    | 91     |
| 1歳                                       | 171    | 918    | 327    | 248    | 160    | 422    | 241    | 274    |
| 2歳                                       | 122    | 91     | 260    | 185    | 113    | 165    | 179    | 175    |
| 3歳                                       | 173    | 77     | 61     | 46     | 55     | 72     | 76     | 106    |
| 4歳                                       | 114    | 81     | 27     | 11     | 15     | 28     | 36     | 39     |
| 5歳以上                                     | 1,393  | 228    | 73     | 18     | 7      | 11     | 19     | 17     |
| 計                                        | 2,465  | 1,467  | 879    | 756    | 805    | 916    | 727    | 701    |
| 親魚量                                      | 1,819  | 569    | 487    | 310    | 221    | 360    | 429    | 473    |
| RPS                                      | 15.0   | 21.3   | 24.4   | 23.6   | 60.7   | 21.6   | 17.2   | 5.4    |
| 年齢別平均体重 (g)                              |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 年齢\年                                     | 1992   | 1993   | 1994   | 1995   | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   |
| 0歳                                       | 18     | 6      | 11     | 34     | 34     | 28     | 24     | 35     |
| 1歳                                       | 54     | 61     | 56     | 49     | 49     | 64     | 52     | 60     |
| 2歳                                       | 83     | 79     | 94     | 84     | 84     | 99     | 79     | 77     |
| 3歳                                       | 96     | 112    | 120    | 118    | 118    | 116    | 101    | 95     |
| 4歳                                       | 99     | 134    | 135    | 143    | 143    | 134    | 118    | 102    |
| 5歳以上                                     | 111    | 133    | 140    | 156    | 150    | 154    | 122    | 127    |

補足表 2-1. (続き)

| 年齢別漁獲尾数 (百万尾)                            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 年齢\年                                     | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  |
| 0歳                                       | 1,071 | 753   | 24    | 152   | 375   | 260   | 172   | 750   |
| 1歳                                       | 255   | 1,466 | 471   | 410   | 399   | 101   | 464   | 430   |
| 2歳                                       | 377   | 564   | 137   | 127   | 71    | 22    | 43    | 206   |
| 3歳                                       | 320   | 196   | 50    | 73    | 13    | 35    | 23    | 20    |
| 4歳                                       | 235   | 103   | 27    | 31    | 9     | 46    | 13    | 7     |
| 5歳以上                                     | 89    | 71    | 17    | 12    | 5     | 22    | 3     | 3     |
| 計                                        | 2,347 | 3,154 | 725   | 804   | 872   | 486   | 718   | 1,416 |
| 年齢別漁獲量 (千トン)                             |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 年齢\年                                     | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  |
| 0歳                                       | 31.7  | 12.7  | 0.8   | 2.9   | 10.2  | 6.2   | 3.7   | 20.2  |
| 1歳                                       | 11.1  | 79.2  | 26.9  | 25.2  | 27.3  | 4.1   | 37.5  | 22.7  |
| 2歳                                       | 28.7  | 44.7  | 10.9  | 9.9   | 7.2   | 1.9   | 3.6   | 19.0  |
| 3歳                                       | 30.9  | 19.0  | 5.1   | 7.8   | 1.6   | 3.8   | 2.7   | 2.0   |
| 4歳                                       | 25.3  | 11.8  | 3.0   | 3.6   | 1.0   | 5.6   | 1.5   | 0.8   |
| 5歳以上                                     | 11.0  | 9.2   | 2.2   | 1.6   | 0.6   | 3.2   | 0.3   | 0.3   |
| 計                                        | 139   | 177   | 49    | 51    | 48    | 25    | 49    | 65    |
| 漁獲割合                                     | 33.8% | 57.9% | 31.1% | 42.0% | 44.1% | 28.7% | 37.5% | 57.9% |
| 年齢別漁獲係数 (F)、%SPR、F/Fmsy                  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 年齢\年                                     | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  |
| 0歳                                       | 0.32  | 0.46  | 0.02  | 0.18  | 0.72  | 0.18  | 0.19  | 1.04  |
| 1歳                                       | 0.20  | 1.41  | 0.80  | 0.99  | 1.45  | 0.54  | 0.75  | 1.43  |
| 2歳                                       | 0.68  | 1.39  | 0.57  | 0.67  | 0.57  | 0.31  | 0.62  | 1.35  |
| 3歳                                       | 0.99  | 1.38  | 0.50  | 0.94  | 0.16  | 0.83  | 0.84  | 0.91  |
| 4歳                                       | 1.24  | 1.65  | 0.92  | 0.92  | 0.33  | 2.45  | 1.24  | 1.02  |
| 5歳以上                                     | 1.24  | 1.65  | 0.92  | 0.92  | 0.33  | 2.45  | 1.24  | 1.02  |
| %SPR                                     | 28.64 | 11.44 | 28.88 | 21.03 | 12.02 | 27.30 | 28.19 | 6.85  |
| F/Fmsy                                   | 1.92  | 4.41  | 1.84  | 2.55  | 2.98  | 2.10  | 1.90  | 4.56  |
| 年齢別資源尾数 (百万尾)                            |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 年齢\年                                     | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  |
| 0歳                                       | 4,838 | 2,483 | 1,220 | 1,134 | 895   | 1,918 | 1,240 | 1,419 |
| 1歳                                       | 1,679 | 2,366 | 1,047 | 798   | 636   | 293   | 1,073 | 690   |
| 2歳                                       | 938   | 917   | 386   | 317   | 199   | 100   | 114   | 339   |
| 3歳                                       | 624   | 320   | 153   | 146   | 108   | 76    | 49    | 41    |
| 4歳                                       | 404   | 156   | 54    | 62    | 38    | 62    | 22    | 14    |
| 5歳以上                                     | 154   | 108   | 34    | 24    | 23    | 30    | 5     | 5     |
| 計                                        | 8,636 | 6,350 | 2,895 | 2,481 | 1,900 | 2,478 | 2,503 | 2,509 |
| 年齢別資源量 (千トン)、親魚量 (千トン)、再生産成功率 (RPS、尾/kg) |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 年齢\年                                     | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  |
| 0歳                                       | 143   | 42    | 41    | 21    | 24    | 46    | 26    | 38    |
| 1歳                                       | 73    | 128   | 60    | 49    | 43    | 12    | 87    | 37    |
| 2歳                                       | 71    | 73    | 31    | 25    | 20    | 9     | 9     | 31    |
| 3歳                                       | 60    | 31    | 16    | 16    | 13    | 8     | 6     | 4     |
| 4歳                                       | 43    | 18    | 6     | 7     | 4     | 8     | 2     | 2     |
| 5歳以上                                     | 19    | 14    | 4     | 3     | 3     | 4     | 1     | 1     |
| 計                                        | 411   | 305   | 157   | 121   | 109   | 87    | 131   | 112   |
| 親魚量                                      | 231   | 199   | 87    | 75    | 63    | 35    | 62    | 56    |
| RPS                                      | 21.0  | 12.4  | 14.1  | 15.0  | 14.3  | 55.4  | 20.1  | 25.4  |
| 年齢別平均体重 (g)                              |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 年齢\年                                     | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  |
| 0歳                                       | 30    | 17    | 33    | 19    | 27    | 24    | 21    | 27    |
| 1歳                                       | 44    | 54    | 57    | 61    | 68    | 41    | 81    | 53    |
| 2歳                                       | 76    | 79    | 79    | 78    | 102   | 88    | 83    | 92    |
| 3歳                                       | 96    | 97    | 102   | 107   | 124   | 109   | 118   | 99    |
| 4歳                                       | 107   | 115   | 112   | 117   | 111   | 122   | 113   | 111   |
| 5歳以上                                     | 123   | 129   | 132   | 138   | 118   | 143   | 108   | 110   |

補足表 2-1. (続き)

| 年齢別漁獲尾数 (百万尾)                            |       |       |       |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年齢\年                                     | 2008  | 2009  | 2010  | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| 0歳                                       | 459   | 121   | 209   | 760    | 515    | 330    | 2,499  | 4,823  |
| 1歳                                       | 178   | 620   | 406   | 1,769  | 612    | 813    | 591    | 2,668  |
| 2歳                                       | 36    | 29    | 206   | 76     | 570    | 544    | 470    | 380    |
| 3歳                                       | 16    | 11    | 14    | 15     | 25     | 240    | 346    | 223    |
| 4歳                                       | 2     | 6     | 10    | 6      | 4      | 8      | 76     | 40     |
| 5歳以上                                     | 1     | 2     | 8     | 8      | 1      | 5      | 5      | 13     |
| 計                                        | 692   | 788   | 852   | 2,634  | 1,727  | 1,939  | 3,988  | 8,145  |
| 年齢別漁獲量 (千トン)                             |       |       |       |        |        |        |        |        |
| 年齢\年                                     | 2008  | 2009  | 2010  | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| 0歳                                       | 11.7  | 2.6   | 6.2   | 23.2   | 13.6   | 7.4    | 60.1   | 88.7   |
| 1歳                                       | 9.8   | 41.9  | 30.9  | 97.0   | 34.2   | 44.6   | 30.0   | 110.0  |
| 2歳                                       | 2.9   | 2.7   | 23.9  | 8.3    | 50.2   | 48.9   | 44.7   | 36.4   |
| 3歳                                       | 1.9   | 1.1   | 1.6   | 1.8    | 3.0    | 26.9   | 41.0   | 28.3   |
| 4歳                                       | 0.3   | 0.7   | 1.1   | 0.6    | 0.6    | 1.0    | 9.6    | 5.2    |
| 5歳以上                                     | 0.2   | 0.2   | 0.9   | 0.9    | 0.1    | 0.8    | 0.8    | 1.8    |
| 計                                        | 27    | 49    | 65    | 132    | 102    | 130    | 186    | 271    |
| 漁獲割合                                     | 27.3% | 38.4% | 21.1% | 29.7%  | 20.6%  | 21.8%  | 18.4%  | 21.1%  |
| 年齢別漁獲係数 (F)、%SPR、F/Fmsy                  |       |       |       |        |        |        |        |        |
| 年齢\年                                     | 2008  | 2009  | 2010  | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| 0歳                                       | 0.26  | 0.12  | 0.04  | 0.18   | 0.10   | 0.06   | 0.16   | 0.31   |
| 1歳                                       | 1.04  | 0.94  | 1.03  | 0.68   | 0.27   | 0.29   | 0.17   | 0.33   |
| 2歳                                       | 0.50  | 0.60  | 1.48  | 0.71   | 0.63   | 0.52   | 0.34   | 0.19   |
| 3歳                                       | 0.40  | 0.34  | 0.85  | 0.46   | 0.70   | 0.79   | 1.03   | 0.34   |
| 4歳                                       | 0.32  | 0.30  | 0.80  | 1.60   | 0.29   | 0.62   | 0.84   | 0.37   |
| 5歳以上                                     | 0.32  | 0.30  | 0.80  | 1.60   | 0.29   | 0.62   | 0.84   | 0.37   |
| %SPR                                     | 20.53 | 27.50 | 25.17 | 27.05  | 35.85  | 35.83  | 38.00  | 36.26  |
| F/Fmsy                                   | 2.19  | 1.76  | 2.33  | 1.95   | 1.34   | 1.40   | 1.29   | 1.27   |
| 年齢別資源尾数 (百万尾)                            |       |       |       |        |        |        |        |        |
| 年齢\年                                     | 2008  | 2009  | 2010  | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| 0歳                                       | 2,415 | 1,294 | 6,810 | 5,709  | 6,500  | 7,322  | 20,208 | 22,223 |
| 1歳                                       | 337   | 1,243 | 769   | 4,394  | 3,205  | 3,935  | 4,638  | 11,500 |
| 2歳                                       | 111   | 80    | 326   | 183    | 1,497  | 1,647  | 1,973  | 2,625  |
| 3歳                                       | 59    | 45    | 30    | 50     | 60     | 537    | 658    | 938    |
| 4歳                                       | 11    | 27    | 22    | 8      | 21     | 20     | 164    | 158    |
| 5歳以上                                     | 5     | 8     | 17    | 12     | 3      | 12     | 12     | 51     |
| 計                                        | 2,938 | 2,697 | 7,973 | 10,356 | 11,286 | 13,473 | 27,652 | 37,494 |
| 年齢別資源量 (千トン)、親魚量 (千トン)、再生産成功率 (RPS、尾/kg) |       |       |       |        |        |        |        |        |
| 年齢\年                                     | 2008  | 2009  | 2010  | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| 0歳                                       | 62    | 28    | 202   | 174    | 171    | 164    | 486    | 409    |
| 1歳                                       | 19    | 84    | 58    | 241    | 179    | 216    | 236    | 474    |
| 2歳                                       | 9     | 7     | 38    | 20     | 132    | 148    | 188    | 252    |
| 3歳                                       | 7     | 5     | 3     | 6      | 7      | 60     | 78     | 119    |
| 4歳                                       | 1     | 3     | 2     | 1      | 3      | 3      | 21     | 21     |
| 5歳以上                                     | 1     | 1     | 2     | 1      | 0      | 2      | 2      | 7      |
| 計                                        | 99    | 128   | 307   | 443    | 492    | 593    | 1,010  | 1,282  |
| 親魚量                                      | 28    | 58    | 75    | 149    | 232    | 321    | 406    | 636    |
| RPS                                      | 87.4  | 22.2  | 90.9  | 38.4   | 28.1   | 22.8   | 49.8   | 34.9   |
| 年齢別平均体重 (g)                              |       |       |       |        |        |        |        |        |
| 年齢\年                                     | 2008  | 2009  | 2010  | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| 0歳                                       | 26    | 21    | 30    | 31     | 26     | 22     | 24     | 18     |
| 1歳                                       | 55    | 68    | 76    | 55     | 56     | 55     | 51     | 41     |
| 2歳                                       | 82    | 93    | 116   | 109    | 88     | 90     | 95     | 96     |
| 3歳                                       | 123   | 108   | 117   | 122    | 119    | 112    | 118    | 127    |
| 4歳                                       | 123   | 115   | 109   | 108    | 128    | 128    | 126    | 132    |
| 5歳以上                                     | 142   | 127   | 119   | 119    | 175    | 181    | 155    | 142    |

補足表 2-1. (続き)

| 年齢別漁獲尾数 (百万尾)                            |        |        |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 年齢\年                                     | 2016   | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 0歳                                       | 3,493  | 6,466  | 7,278   | 3,409   | 6,661   | 8,718   | 13,683  | 9,262   | 11,072  |
| 1歳                                       | 1,589  | 1,451  | 2,659   | 4,505   | 4,186   | 6,019   | 6,668   | 7,291   | 3,882   |
| 2歳                                       | 1,419  | 1,496  | 2,047   | 5,336   | 10,363  | 7,693   | 7,350   | 10,591  | 10,913  |
| 3歳                                       | 384    | 1,142  | 1,128   | 1,320   | 2,354   | 4,762   | 3,918   | 3,964   | 7,411   |
| 4歳                                       | 154    | 275    | 367     | 560     | 649     | 741     | 1,344   | 1,764   | 2,604   |
| 5歳以上                                     | 34     | 88     | 135     | 170     | 128     | 169     | 261     | 606     | 551     |
| 計                                        | 7,073  | 10,918 | 13,613  | 15,300  | 24,342  | 28,102  | 33,224  | 33,478  | 36,432  |
| 年齢別漁獲量 (千トン)                             |        |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 年齢\年                                     | 2016   | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 0歳                                       | 71.9   | 89.1   | 123.8   | 53.1    | 102.3   | 121.0   | 221.8   | 139.5   | 166.5   |
| 1歳                                       | 75.9   | 73.2   | 109.4   | 182.1   | 172.3   | 222.4   | 224.8   | 292.7   | 149.1   |
| 2歳                                       | 112.3  | 136.8  | 147.6   | 302.0   | 519.8   | 377.2   | 335.9   | 489.3   | 484.6   |
| 3歳                                       | 43.1   | 122.8  | 104.4   | 112.0   | 161.0   | 276.2   | 217.4   | 239.4   | 370.3   |
| 4歳                                       | 18.8   | 35.8   | 39.6    | 56.4    | 63.0    | 62.2    | 98.4    | 136.8   | 160.2   |
| 5歳以上                                     | 4.7    | 12.6   | 17.8    | 20.2    | 15.3    | 18.6    | 27.2    | 57.2    | 45.0    |
| 計                                        | 327    | 470    | 543     | 726     | 1,034   | 1,078   | 1,125   | 1,355   | 1,376   |
| 漁獲割合                                     | 19.4%  | 21.1%  | 16.3%   | 17.3%   | 21.0%   | 20.2%   | 19.1%   | 24.4%   | 34.4%   |
| 年齢別漁獲係数 (F)、%SPR、F/Fmsy                  |        |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 年齢\年                                     | 2016   | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 0歳                                       | 0.20   | 0.19   | 0.12    | 0.07    | 0.10    | 0.10    | 0.19    | 0.42    | 0.27    |
| 1歳                                       | 0.20   | 0.14   | 0.14    | 0.12    | 0.13    | 0.16    | 0.13    | 0.19    | 0.39    |
| 2歳                                       | 0.38   | 0.36   | 0.39    | 0.60    | 0.59    | 0.49    | 0.37    | 0.41    | 0.62    |
| 3歳                                       | 0.39   | 0.80   | 0.67    | 0.62    | 0.78    | 0.81    | 0.65    | 0.46    | 0.75    |
| 4歳                                       | 0.55   | 0.72   | 0.87    | 1.22    | 0.99    | 0.80    | 0.74    | 0.97    | 0.83    |
| 5歳以上                                     | 0.55   | 0.72   | 0.87    | 1.22    | 0.99    | 0.80    | 0.74    | 0.97    | 0.83    |
| %SPR                                     | 37.06  | 36.38  | 37.45   | 35.26   | 31.85   | 33.02   | 33.37   | 26.96   | 24.26   |
| F/Fmsy                                   | 1.27   | 1.35   | 1.31    | 1.50    | 1.72    | 1.61    | 1.53    | 1.88    | 2.14    |
| 年齢別資源尾数 (百万尾)                            |        |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 年齢\年                                     | 2016   | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 0歳                                       | 24,060 | 44,932 | 80,109  | 65,819  | 83,052  | 108,626 | 94,339  | 33,227  | 56,365  |
| 1歳                                       | 10,947 | 13,268 | 24,825  | 47,740  | 41,328  | 50,218  | 65,676  | 52,035  | 14,690  |
| 2歳                                       | 5,524  | 6,037  | 7,705   | 14,464  | 28,313  | 24,275  | 28,734  | 38,565  | 28,910  |
| 3歳                                       | 1,449  | 2,542  | 2,822   | 3,489   | 5,327   | 10,494  | 9,973   | 13,243  | 17,180  |
| 4歳                                       | 446    | 657    | 769     | 968     | 1,259   | 1,644   | 3,136   | 3,477   | 5,632   |
| 5歳以上                                     | 97     | 210    | 283     | 295     | 249     | 374     | 608     | 1,195   | 1,192   |
| 計                                        | 42,524 | 67,646 | 116,514 | 132,775 | 159,527 | 195,631 | 202,466 | 141,743 | 123,969 |
| 年齢別資源量 (千トン)、親魚量 (千トン)、再生産成功率 (RPS、尾/kg) |        |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 年齢\年                                     | 2016   | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 0歳                                       | 495    | 619    | 1,363   | 1,025   | 1,276   | 1,508   | 1,529   | 500     | 848     |
| 1歳                                       | 523    | 670    | 1,022   | 1,930   | 1,701   | 1,855   | 2,214   | 2,089   | 564     |
| 2歳                                       | 437    | 552    | 556     | 819     | 1,420   | 1,190   | 1,313   | 1,782   | 1,284   |
| 3歳                                       | 163    | 273    | 261     | 296     | 364     | 609     | 553     | 800     | 858     |
| 4歳                                       | 54     | 85     | 83      | 98      | 122     | 138     | 229     | 270     | 347     |
| 5歳以上                                     | 13     | 30     | 37      | 35      | 30      | 41      | 63      | 113     | 97      |
| 計                                        | 1,686  | 2,230  | 3,322   | 4,202   | 4,913   | 5,341   | 5,903   | 5,553   | 3,998   |
| 親魚量                                      | 772    | 1,075  | 1,142   | 1,633   | 2,277   | 2,349   | 2,602   | 3,382   | 2,699   |
| RPS                                      | 31.2   | 41.8   | 70.2    | 40.3    | 36.5    | 46.2    | 36.3    | 9.8     | 20.9    |
| 年齢別平均体重 (g)                              |        |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 年齢\年                                     | 2016   | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 0歳                                       | 21     | 14     | 17      | 16      | 15      | 14      | 16      | 15      | 15      |
| 1歳                                       | 48     | 50     | 41      | 40      | 41      | 37      | 34      | 40      | 38      |
| 2歳                                       | 79     | 91     | 72      | 57      | 50      | 49      | 46      | 46      | 44      |
| 3歳                                       | 112    | 108    | 93      | 85      | 68      | 58      | 55      | 60      | 50      |
| 4歳                                       | 122    | 130    | 108     | 101     | 97      | 84      | 73      | 78      | 62      |
| 5歳以上                                     | 139    | 143    | 132     | 119     | 119     | 111     | 104     | 94      | 82      |

補足表 2-2. チューニングに用いた指標値とパラメータ推定値

| 指標値  | ①              | ②              | ③              | ④        |
|------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 対象   | N <sub>0</sub> | N <sub>1</sub> | N <sub>0</sub> | SSB      |
| 2005 | 6.13           | 1.61           | 1,202.79       | 31.45    |
| 2006 | 16.98          | 1.45           | 62.95          | 7.19     |
| 2007 | 4.73           | 1.31           | 59.77*         | 32.11    |
| 2008 | 8.94           | 1.32           | 1,018.06       | 12.95    |
| 2009 | 16.52          | 1.22           | 1,414.79       | 24.06    |
| 2010 | 188.41         | 1.53           | 15,258.18      | 37.49    |
| 2011 | 46.39          | 3.03           | 7,358.56       | 51.99    |
| 2012 | 89.24          | 13.66          | 5,714.65       | 115.86   |
| 2013 | 29.77          | 16.73          | 6,600.84       | 133.91   |
| 2014 | 456.30         | 7.04           | 11,891.65      | 306.31   |
| 2015 | 699.05         | 11.24          | 34,764.07      | 146.12   |
| 2016 | 486.93         | 159.85         | 15,550.85      | 240.64   |
| 2017 | 2,443.86       | 16.40          | 17,091.56      | 451.61   |
| 2018 | 4,461.98       | 195.40         | 54,528.35      | 1,354.24 |
| 2019 | 2,605.36       | 249.63         | 13,870.31      | 1803.8   |
| 2020 | 11,390.16      | 1,069.65       | 23,473.04      | 681.31   |
| 2021 | 5,585.14       | 825.10         | 36,506.24      | 1,065.63 |
| 2022 | 3,424.65       | 454.41         | 32,893.79      | 1,417.35 |
| 2023 | 1,096.04       | 308.49         | 23,400.37      | 940.88   |
| 2024 | 1,948.41       | 23.46          | 39,514.89      | 294.85   |
| 2025 | -              | -              | -              | 399.74   |
| q    | 9.00E-05       | 3.63E-04       | 0.82           | 0.41     |
| b    | 1.56           | 1.26           | 0.96           | 1.00**   |

①北西太平洋北上期浮魚類資源調査による中層トロール 0 歳魚標準化 CPUE (尾/網/60 分)。


②北西太平洋北上期浮魚類資源調査による中層トロール 1 歳魚標準化 CPUE (尾/網/60 分)。

③秋季亜寒帯域 0 歳魚現存量 (百万尾)。

④潮岬以東海域 (海区Ⅰ・Ⅱ) 産卵量 (兆粒)。


\* 2007 年の秋季亜寒帯域 0 歳魚現存量は、調査海域が狭く推定されるマイワシ 0 歳魚主分布域を十分カバーできなかったため推定精度が低い (過小推定) と考えられ、チューニングから除外した。

\*\* b=1 に固定。




補足図 2-1. 残差プロット


濃い灰色は 80%信頼区間、薄い灰色は 95%信頼区間を示す。sigma は指標値の標準偏差、rho は自己相関係数を示す。



補足図 2-2. 予測加入量、資源尾数、または産卵量と指標値の関係



補足図 2-3. レトロスペクティブ解析の結果  
Mohn's  $\rho$  の値を左上に示す。



補足図 2-4. (a) 資源量、(b) 親魚量、(c) 加入量の推定値と 90%信頼区間  
実線が推定値、破線が 90%信頼区間を示す。

### 補足資料 3 管理基準値案と禁漁水準案等


令和 7 年 8 月に公開された「管理基準値等に関する研究機関会議資料」により、目標管理基準値 (SBtarget) には MSY 水準における親魚量 (SBmsy : 143.2 万トン)、限界管理基準値 (SBlimit) には MSY の 60% が得られる親魚量 (SB0.6msy : 53.0 万トン)、禁漁水準 (SBban) には MSY の 10% が得られる親魚量 (SB0.1msy : 5.3 万トン) を用いることが提案されている (古市ほか 2025、補足表 6-2)。

目標管理基準値案と、SBmsy を維持する漁獲圧 (Fmsy) を基準にした神戸プロットを補足図 3-1 に示す。コホート解析により得られた 2024 年の親魚量 (SB2024 : 269.9 万トン) は目標管理基準値案、および限界管理基準値案、禁漁水準案を上回る。本系群の親魚量は、1993~2014 年は限界管理基準値案を下回っていたが、2015 年に限界管理基準値案を上回り、2019 年以降は目標管理基準値案も上回って推移している。本系群における 1988 年以降 (通常加入期) の漁獲圧は、1998 年を除き、Fmsy を上回っていたと判断される。


平衡状態における平均親魚量と年齢別平均漁獲量との関係を補足図 3-2 に示す。平均親魚量が限界管理基準値以下では 0~3 歳魚が殆どを占めている。しかし、親魚量が増加するにつれて高齢魚の比率が高くなる傾向がみられる。

### 引用文献

古市 生・由上龍嗣・上村泰洋・西嶋翔太・井須小羊子・伊澤雄登・東口胤成・渡部亮介 (2025) 令和 7 年度の管理基準値等に関する研究機関会議資料. FRA-SA2025-BRP02-01.



補足図 3-1. 管理基準値案と親魚量・漁獲圧との関係 (神戸プロット)



補足図 3-2. 平衡状態における平均親魚量と年齢別平均漁獲量との関係（漁獲量曲線）

#### 補足資料 4 漁獲管理規則案に対応した将来予測

##### (1) 将来予測の設定

資源評価で推定した 2024 年の資源量から、コホート解析の前進法を用いて 2025～2049 年の将来予測計算を行った。この将来予測では加入量の不確実性を考慮した。再生産関係式を用いて各年に予測される親魚量から加入量を予測し、その予測値に、観測値と再生産関係式の残差のランダムなリサンプリングによって誤差を与えることで加入量の不確実性を考慮した。直近の加入量の傾向を反映させるため、後ろ向きに時代を区切って残差のリサンプリングを行うバックワードリサンプリングを採用した。この試行を 5,000 回繰り返し行い、それらの平均値と 90% 予測区間を求めることにより、不確実性の程度を示した。

2025 年の漁獲圧は現状の漁獲圧 (F2022-2024) を仮定した。現状の漁獲圧は、今年度評価における 2022～2024 年の F 値の単純平均とした。2025 年に予測される資源量と現状の漁獲圧から同年の漁獲量を算出した。2026 年の漁獲圧は、下記の漁獲管理規則案に従い、各年に予測される親魚量をもとに算出した。なお、将来予測の計算方法は補足資料 5 に示した。

##### (2) 漁獲管理規則案

漁獲管理規則案は、目標管理基準値案以上に親魚量を維持・回復する達成確率を勘案して、親魚量に対応した漁獲圧 (F) 等を定めたものである。「漁獲管理規則および ABC 算定のための基本指針」では、親魚量が限界管理基準値案を下回った場合には禁漁水準案まで直線的に漁獲圧を削減するとともに、親魚量が限界管理基準値以上にある場合には  $F_{msy}$  に調整係数  $\beta$  を乗じた値を漁獲圧の上限とするものを提示している。補足図 4-1 に本系群の「管理基準値等に関する研究機関会議資料」により提案された漁獲管理規則を示す。ここでは例として調整係数  $\beta$  を 0.9 とした場合を示した。なお、研究機関からの提案では「 $\beta$  は 0.9 以下とすることが望ましい」とされている (古市ほか 2025)。

##### (3) 2026 年の予測値

漁獲管理規則案に基づき試算された 2026 年の平均漁獲量は  $\beta$  を 0.9 とした場合に 60.3 万トン (90% 予測区間は 52.4 万～66.9 万トン)、 $\beta$  を 1.0 とした場合には 66.1 万トン (90% 予測区間は 57.4 万～73.4 万トン) であった (補足表 4-3)。2026 年に予測される親魚量は、いずれの繰り返し計算でも限界管理基準値案を上回り、平均 187.0 万トンと見込まれた。

##### (4) 2027 年以降の予測


2027 年以降も含めた将来予測の結果を補足図 4-2 および補足表 4-1、4-2、4-3 に示す。漁獲管理規則案に基づく管理を 10 年間継続した場合、2036 年の親魚量の予測値は  $\beta$  を 0.9 とした場合には 244.0 万トン (90% 予測区間は 179.6 万～323.4 万トン) であり、 $\beta$  を 1.0 とした場合には 230.5 万トン (90% 予測区間は 168.8 万～306.0 万トン) である (補足表 6-5)。予測値が目標管理基準値案を上回る確率は  $\beta$  が 1.0 以下で 50% を上回る。限界管理基準値案を上回る確率は  $\beta$  が 1.0 以下で 90% を上回る。現状の漁獲圧 (F2022-2024、 $\beta = 1.65$  に相当) を継続した場合の 2036 年の親魚量の予測値は 166.2 万トン (90% 予測区間は 119.2 万～222.9 万トン) であり目標管理基準値案を上回る確率は 72%、限界管理基準値案を上回

る確率は 100%である。


#### 引用文献

古市 生・由上龍嗣・上村泰洋・西嶋翔太・井須小羊子・伊澤雄登・東口胤成・渡部亮介 (2025) 令和 7 年度の管理基準値等に関する研究機関会議資料. FRA-SA2025-BRP02-01.


#### a) 縦軸を漁獲圧にした場合



#### b) 縦軸を漁獲量にした場合



補足図 4-1. 漁獲管理規則案



補足図 4-2. 漁獲管理規則案に従って漁獲を続けた場合（赤線）と現状の漁獲圧（F2022-2024）で漁獲を続けた場合の将来予測（青色）

太実線は平均値、網掛けはシミュレーション結果の 90%が含まれる予測区間、細線は 5 通りの将来予測の例示である。親魚量の図の緑破線は目標管理基準値案、黄一点鎖線は限界管理基準値案、赤点線は禁漁水準案を示す。漁獲量の図の黒破線は最大持続生産量 MSY を、漁獲割合の図の黒破線は目標管理基準値案を維持する漁獲割合の水準 (Umsy) を示す。漁獲管理規則案での調整係数  $\beta$  には 0.9 を用いた。2025 年の漁獲量は予測される資源量と現状の漁獲圧 (F2022-2024) により仮定した。

補足表 4-1. 将来の親魚量が目標・限界管理基準値案を上回る確率

## a) 目標管理基準値案を上回る確率 (%)

| $\beta$ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.0     | 100  | 100  | 100  | 99   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.9     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.8     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.7     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.6     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.5     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.4     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.3     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.2     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.1     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.0     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 現状の漁獲圧  |      |      | 92   | 90   | 90   | 90   | 88   | 84   | 77   | 72   | 73   | 72   |

## b) 限界管理基準値案を上回る確率 (%)

| $\beta$ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.0     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.9     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.8     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.7     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.6     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.5     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.4     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.3     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.2     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.1     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 0.0     |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 現状の漁獲圧  |      |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

$\beta$  を 0～1.0 で変更した場合の将来予測の結果を示す。2025 年の漁獲量は現状の漁獲圧（F2022-2024）から予測される 110.3 万トンとし、2026 年から漁獲管理規則案による漁獲とした。比較のため現状の漁獲圧（F2022-F2024、 $\beta=1.65$  に相当）で漁獲を続けた場合の結果も示した。

補足表 4-2. 将来の平均親魚量（万トン）

| $\beta$ | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  | 2036  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.0     | 204.3 | 187.0 | 210.3 | 234.9 | 248.5 | 255.5 | 254.8 | 244.6 | 237.7 | 233.4 | 232.2 | 230.5 |
| 0.9     |       |       | 214.6 | 243.5 | 260.1 | 268.9 | 269.1 | 259.0 | 251.9 | 247.3 | 245.9 | 244.0 |
| 0.8     |       |       | 219.1 | 252.6 | 272.4 | 283.4 | 284.7 | 274.9 | 267.7 | 262.8 | 261.1 | 259.1 |
| 0.7     |       |       | 223.7 | 262.1 | 285.6 | 299.1 | 301.8 | 292.5 | 285.2 | 280.0 | 278.1 | 275.9 |
| 0.6     |       |       | 228.4 | 272.0 | 299.7 | 316.1 | 320.6 | 312.0 | 304.8 | 299.3 | 297.2 | 294.8 |
| 0.5     |       |       | 233.3 | 282.4 | 314.7 | 334.7 | 341.3 | 333.6 | 326.7 | 321.1 | 318.8 | 316.3 |
| 0.4     |       |       | 238.3 | 293.4 | 330.8 | 354.8 | 364.1 | 357.9 | 351.5 | 345.9 | 343.5 | 340.8 |
| 0.3     |       |       | 243.4 | 304.9 | 348.1 | 376.9 | 389.5 | 385.2 | 379.7 | 374.3 | 371.9 | 369.1 |
| 0.2     |       |       | 248.7 | 317.0 | 366.6 | 400.9 | 417.7 | 415.9 | 411.9 | 407.1 | 405.0 | 402.2 |
| 0.1     |       |       | 254.1 | 329.7 | 386.5 | 427.4 | 449.1 | 450.9 | 449.0 | 445.3 | 443.8 | 441.4 |
| 0.0     |       |       | 259.7 | 343.0 | 407.9 | 456.4 | 484.4 | 490.7 | 491.9 | 490.2 | 489.9 | 488.2 |
| 現状の漁獲圧  |       |       | 184.5 | 187.1 | 187.8 | 188.1 | 184.9 | 175.4 | 170.2 | 167.7 | 167.4 | 166.2 |

$\beta$  を 0.0～1.0 で変更した場合の将来予測の結果を示す。2025 年の漁獲量は現状の漁獲圧（F2022-2024）から予測される 110.3 万トンとし、2026 年から漁獲管理規則案による漁獲とした。比較のため現状の漁獲圧（F2022-F2024、 $\beta=1.65$  に相当）で漁獲を続けた場合の結果も示した。

補足表 4-3. 将来の平均漁獲量（万トン）

| $\beta$ | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.0     | 110.3 | 66.1 | 70.9 | 77.5 | 81.5 | 82.5 | 81.8 | 79.8 | 78.1 | 76.8 | 75.7 | 74.9 |
| 0.9     |       | 60.3 | 65.9 | 73.0 | 77.5 | 78.9 | 78.6 | 76.9 | 75.3 | 73.9 | 72.9 | 72.1 |
| 0.8     |       | 54.4 | 60.5 | 67.9 | 72.8 | 74.7 | 74.7 | 73.3 | 71.9 | 70.6 | 69.6 | 68.8 |
| 0.7     |       | 48.3 | 54.7 | 62.3 | 67.5 | 69.9 | 70.2 | 69.1 | 67.8 | 66.6 | 65.6 | 64.9 |
| 0.6     |       | 42.0 | 48.5 | 56.0 | 61.4 | 64.1 | 64.8 | 64.1 | 63.0 | 61.8 | 60.9 | 60.3 |
| 0.5     |       | 35.5 | 41.8 | 49.0 | 54.4 | 57.4 | 58.4 | 57.9 | 57.1 | 56.1 | 55.3 | 54.7 |
| 0.4     |       | 28.9 | 34.6 | 41.2 | 46.3 | 49.4 | 50.6 | 50.5 | 49.9 | 49.1 | 48.5 | 48.0 |
| 0.3     |       | 22.0 | 26.8 | 32.5 | 37.1 | 40.0 | 41.3 | 41.5 | 41.2 | 40.6 | 40.1 | 39.7 |
| 0.2     |       | 14.9 | 18.5 | 22.8 | 26.4 | 28.8 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 30.0 | 29.7 | 29.4 |
| 0.1     |       | 7.6  | 9.6  | 12.0 | 14.1 | 15.7 | 16.5 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.5 |
| 0.0     |       | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 現状の漁獲圧  |       | 99.7 | 96.3 | 97.5 | 97.8 | 95.8 | 93.5 | 90.6 | 88.6 | 87.6 | 86.5 | 85.5 |

$\beta$  を 0.0～1.0 で変更した場合の将来予測の結果を示す。2025 年の漁獲量は現状の漁獲圧（F2022-2024）から予測される 110.3 万トンとし、2026 年から漁獲管理規則案による漁獲とした。比較のため現状の漁獲圧（F2022-F2024、 $\beta=1.65$  に相当）で漁獲を続けた場合の結果も示した。

## 補足資料 5 将来予測の方法

将来予測における各種設定には補足表 5-1 の値を用いた。資源尾数や漁獲量の予測は、資源評価高度化作業部会（2025）に基づき、統計ソフトウェア R（version 4.4.0）用計算パッケージ `frasyr`（コミット番号: @05eacac）を用いて実施した。将来予測における加入量は、令和 7 年 8 月に公開された「管理基準値等に関する研究機関会議資料」において提案された通常加入期（1988～2024 年）のホッケー・スティック型関係式（ $a=0.027$ 、 $b=1,197,721$ 、 $SD=0.753$ ）に基づいている（古市ほか 2025）。2010 年以降、通常加入期の再生産関係から予測される平均値より高い加入量が生じることが多い（図 4-9）。今後も（少なくとも短期的には）良好な加入が継続することは十分に想定されるため、この加入量の良好な傾向を取り入れた将来予測を行った。具体的には加入量の不確実性として、2025 年以降の加入量を、観測値と再生産関係式の残差のランダムなリサンプリングによって与え、この試行を 5,000 回繰り返し行った。直近の加入量の傾向を反映させるため、後ろ向きに時代を区切って残差のリサンプリングを行うバックワードリサンプリングを採用した。バックワードリサンプリングは以下のような手順で行われ、直近の加入量の傾向の影響が徐々に緩和されるような仮定となっている（補足図 5-1、5-2）。

- ・将来予測の 1～5 年目：資源評価の最新 5 年分（2020～2024 年）の残差のみから重複を許したリサンプリングを行う
- ・将来予測の 6～10 年目：最新 5 年分（2020～2024 年）の残差、または、さらに過去に遡った 5 年分（2013～2019 年）の残差のどちらかをランダムに選択し、選ばれた方の 5 年分の残差を、重複を許してリサンプリングを行う。
- ・将来予測の 11 年目～：上記の手順のように 5 年ずつリサンプリングする範囲を追加する。

将来予測における漁獲係数  $F$  は、「令和 7（2025）年度 漁獲管理規則および ABC 算定のための基本指針（水産研究・教育機構 2025）」における 1 系資源の管理規則に基づき算出される値を用いた。将来予測における選択率等の値には、上述の「管理基準値等に関する研究機関会議資料」にて提案された各種管理基準値案の推定に用いた値を引き続き用いた（古市ほか 2025）。年齢別平均体重については、近年の負の密度依存的な成長の変化を取り入れるために、年齢別資源尾数と年齢別体重に以下のように負の非線形関係を仮定した。

$$\ln(W_{a,y}) = \beta_0^a + \beta_1^a \ln(N_{a,y}) \quad (9)$$

ここで  $W_{a,y}$  および  $N_{a,y}$  は、 $y$  年の  $a$  歳の平均体重と資源尾数である。資源尾数と平均体重の関係のパラメータ  $\beta_0^a$  と  $\beta_1^a$  は、各齢で資源尾数と体重の対数を取り単回帰することで得た。将来予測において、体重が実際に起き得ない極端な値を取らないように、予測された体重が観測された体重の最大値を超える場合は、観測された体重の最大値になるよう上限を設けた。なお、資源尾数と成長の関係は、年代によって異なると思われるため（Kamiura et al. 2022）、2010 年以降のデータのみ使用して、資源尾数と体重の関係を推定した（補足図 5-3、補足表 5-2）。2025 年の漁獲圧は、直近 3 年（2022～2024 年）の平均値である現状の漁獲圧（ $F_{2022-2024}$ ）とした。

資源尾数の予測には、コホート解析の前進法（(10) 式）を用いた。

$$N_{a+1,y+1} = N_{a,y} \exp(-F_{a,y} - M) \quad \text{※} a < 4 \text{ の場合} \quad (10a)$$

$$N_{5+,y+1} = (N_{5+,y} + N_{4,y}) \exp(-F_{4,y} - M) \quad \text{※最高齢グループ} \quad (10b)$$

漁獲尾数は上記で求めた資源尾数と各漁獲シナリオから仮定される F 値をもとに (11) 式により求めた。

$$C_{a,y} = N_{a,y} \{1 - \exp(-F_{a,y})\} \exp\left(-\frac{M}{2}\right) \quad (11)$$

## 引用文献

- 古市 生・由上龍嗣・上村泰洋・西嶋翔太・井須小羊子・伊澤雄登・東口胤成・渡部亮介  
(2025) 令和 7 年度の管理基準値等に関する研究機関会議資料. FRA-SA2025-BRP02-01.
- Kamimura, Y., K. Tadokoro, S. Furuichi, and R. Yukami (2022) Stronger density-dependent growth of Japanese sardine with lower food availability: Comparison of growth and zooplankton biomass between a historical and current stock-increase period in the western North Pacific. *Fish. Res.* **255**, 106461.
- 水産研究・教育機構 (2025) 令和 7 (2025) 年度漁獲管理規則および ABC 算定のための基本指針. FRA-SA2024-ABCWG02-01, 水産研究・教育機構, 横浜, 23pp.
- 資源評価高度化作業部会 (2025) 令和 7 (2025) 年度 再生産関係の推定・管理基準値計算・将来予測シミュレーションに関する技術ノート. FRA-SA-2024-ABCWG02-04, 水産研究・教育機構, 横浜, 14pp.

補足表 5-1. 将来予測のパラメータ

| 年齢    | 選択率<br>(注 1) | Fmsy<br>(注 2) | F2022-2024<br>(注 3) | 平均体重 (g) |         | 自然<br>死亡<br>係数 | 成熟<br>割合 |
|-------|--------------|---------------|---------------------|----------|---------|----------------|----------|
|       |              |               |                     | 平均       | 四分位範囲   |                |          |
| 0 歳   | 0.35         | 0.18          | 0.30                | 20       | 18 – 22 | 0.4            | 0.0      |
| 1 歳   | 0.28         | 0.14          | 0.24                | 46       | 42 – 49 | 0.4            | 0.2      |
| 2 歳   | 0.55         | 0.28          | 0.47                | 66       | 59 – 72 | 0.4            | 1.0      |
| 3 歳   | 0.73         | 0.37          | 0.62                | 77       | 71 – 81 | 0.4            | 1.0      |
| 4 歳   | 1.00         | 0.51          | 0.85                | 89       | 85 – 92 | 0.4            | 1.0      |
| 5 歳以上 | 1.00         | 0.51          | 0.85                | 96       | 94 – 98 | 0.4            | 1.0      |


注 1：令和 7 年度の管理基準値等に関する研究機関会議資料で MSY を実現する水準の推定の際に使用した選択率(すなわち、令和 7 年度資源評価での F2022-2024 の選択率)。

注 2：令和 7 年度の管理基準値等に関する研究機関会議資料で推定された Fmsy (すなわち、令和 7 年度資源評価での F2022-2024 に Fmsy/ F2022-2024 を掛けたもの)。


注 3：今回の資源評価で推定された 2022～2024 年の年齢別の F の単純平均として算出した。この F 値は 2025 年の漁獲量の仮定に使用した。

補足表 5-2. 資源尾数と体重の関係のパラメータと仮定した最大体重


| 年齢    | $\beta_0^a$ | $\beta_1^a$ | 最大体重 (g) |
|-------|-------------|-------------|----------|
| 0 歳   | 5.34        | -0.23       | 35       |
| 1 歳   | 5.26        | -0.15       | 81       |
| 2 歳   | 5.91        | -0.19       | 116      |
| 3 歳   | 5.45        | -0.13       | 127      |
| 4 歳   | 5.09        | -0.08       | 143      |
| 5 歳以上 | 5.24        | -0.09       | 181      |



補足図 5-1. バックワードリサンプリングの概念図



補足図 5-2. 加入量の予測値に対する観測値の残差（1988～2024 年）と将来予測において用いられた残差



補足図 5-3. 資源尾数と体重の関係

## 補足資料 6 各種パラメータと評価結果の概要

補足表 6-1. 再生産関係式のパラメータ

| 再生産関係式      | 最適化法  | 自己相関 | a     | b         | S.D.  | $\rho$ |
|-------------|-------|------|-------|-----------|-------|--------|
| ホッケー・スティック型 | 最小二乗法 | 無    | 0.027 | 1,197,721 | 0.753 | -      |

a と b は各再生産関係式の推定パラメータ、S.D. は加入量の標準偏差、 $\rho$  は自己相関係数である。

補足表 6-2. 管理基準値案と MSY

| 項目         | 値                                                                                       | 説明                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SBtarget 案 | 143.2 万トン                                                                               | 目標管理基準値案。最大持続生産量 MSY を実現する親魚量(SBmsy)     |
| SBlimit 案  | 53.0 万トン                                                                                | 限界管理基準値案。MSY の 60%の漁獲量が得られる親魚量(SB0.6msy) |
| SBban 案    | 5.3 万トン                                                                                 | 禁漁水準案。MSY の 10%の漁獲量が得られる親魚量(SB0.1msy)    |
| Fmsy       | SBmsy を維持する漁獲圧<br>(0 歳, 1 歳, 2 歳, 3 歳, 4 歳, 5 歳以上)=(0.18, 0.14, 0.28, 0.37, 0.51, 0.51) |                                          |
| %SPR       | 43.6%                                                                                   | Fmsy に対応する%SPR                           |
| MSY        | 47.0 万トン                                                                                | 最大持続生産量                                  |

補足表 6-3. 最新年の親魚量と漁獲圧

| 項目                            | 値                                                                                            | 説明                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| SB2024                        | 269.9 万トン                                                                                    | 2024 年の親魚量                                       |
| F2024                         | 2024 年の漁獲圧(漁獲係数 F) (0 歳, 1 歳, 2 歳, 3 歳, 4 歳, 5 歳以上)<br>=(0.27, 0.39, 0.62, 0.75, 0.83, 0.83) |                                                  |
| U2024                         | 34.4%                                                                                        | 2024 年の漁獲割合                                      |
| %SPR (F2024)                  | 24.3%                                                                                        | 2024 年の%SPR                                      |
| %SPR (F2022-2024)             | 27.7%                                                                                        | 現状(2022～2024 年)の漁獲圧に対応する%SPR*                    |
| 管理基準値案との比較                    |                                                                                              |                                                  |
| SB2024/ SBmsy<br>(SBtarget 案) | 1.89                                                                                         | 最大持続生産量を実現する親魚量(SBmsy、目標管理基準値案)に対する 2024 年の親魚量の比 |
| F2024/ Fmsy                   | 2.14                                                                                         | SBtarget を維持する漁獲圧(Fmsy)に対する 2024 年の漁獲圧の比*        |
| 親魚量の水準                        | MSY を実現する水準を上回る(1.89 倍)                                                                      |                                                  |
| 漁獲圧の水準                        | SBmsy を維持する水準を上回る(2.14 倍)                                                                    |                                                  |
| 親魚量の動向                        | 横ばい                                                                                          |                                                  |

\* 2024 年の選択率の下で Fmsy の漁獲圧を与える F を%SPR 換算して算出し求めた比率。

補足表 6-4. 予測漁獲量と予測親魚量

| 2026 年の親魚量(予測平均値):187.0 万トン |                                  |                      |                                   |                     |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 項目                          | 2026 年の<br>漁獲量<br>予測平均値<br>(万トン) | 90%<br>予測区間<br>(万トン) | 現状の漁獲圧に<br>対する比<br>(F/F2022-2024) | 2026 年の<br>漁獲割合 (%) |
| $\beta=1.0$                 | 66.1                             | 57.4 – 73.4          | 0.61                              | 18                  |
| $\beta=0.9$                 | 60.3                             | 52.4 – 66.9          | 0.54                              | 16                  |
| $\beta=0.8$                 | 54.4                             | 47.3 – 60.3          | 0.48                              | 15                  |
| $\beta=0.7$                 | 48.3                             | 42.1 – 53.5          | 0.42                              | 13                  |
| $\beta=0.6$                 | 42.0                             | 36.6 – 46.5          | 0.36                              | 11                  |
| $\beta=0.5$                 | 35.5                             | 31.0 – 39.3          | 0.30                              | 10                  |
| $\beta=0.4$                 | 28.9                             | 25.2 – 31.9          | 0.24                              | 8                   |
| $\beta=0.3$                 | 22.0                             | 19.2 – 24.3          | 0.18                              | 6                   |
| $\beta=0.2$                 | 14.9                             | 13.0 – 16.4          | 0.12                              | 4                   |
| $\beta=0.1$                 | 7.6                              | 6.6 – 8.3            | 0.06                              | 2                   |
| $\beta=0.0$                 | 0.0                              | 0.0 – 0.0            | 0.00                              | 0                   |
| F2022-2024                  | 99.7                             | 86.0 – 111.2         | 1.00                              | 27                  |

補足表 6-5. 異なる  $\beta$  を用いた将来予測結果

| 考慮している不確実性: 加入量 |                                  |                      |                                  |              |            |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 項目              | 2036 年<br>の親魚量<br>予測平均値<br>(万トン) | 90%<br>予測区間<br>(万トン) | 2036 年に親魚量が以下の<br>管理基準値を上回る確率(%) |              |            |
|                 |                                  |                      | SBtarget<br>案                    | SBlimit<br>案 | SBban<br>案 |
| $\beta=1.0$     | 230.5                            | 168.6 – 306.0        | 100                              | 100          | 100        |
| $\beta=0.9$     | 244.0                            | 179.6 – 323.4        | 100                              | 100          | 100        |
| $\beta=0.8$     | 259.1                            | 191.4 – 342.8        | 100                              | 100          | 100        |
| $\beta=0.7$     | 275.9                            | 205.0 – 364.3        | 100                              | 100          | 100        |
| $\beta=0.6$     | 294.8                            | 220.3 – 387.9        | 100                              | 100          | 100        |
| $\beta=0.5$     | 316.3                            | 237.6 – 414.6        | 100                              | 100          | 100        |
| $\beta=0.4$     | 340.8                            | 257.3 – 445.3        | 100                              | 100          | 100        |
| $\beta=0.3$     | 369.1                            | 280.2 – 479.7        | 100                              | 100          | 100        |
| $\beta=0.2$     | 402.2                            | 307.6 – 519.9        | 100                              | 100          | 100        |
| $\beta=0.1$     | 441.4                            | 340.5 – 566.2        | 100                              | 100          | 100        |
| $\beta=0.0$     | 488.2                            | 379.6 – 622.5        | 100                              | 100          | 100        |
| F2022-2024      | 166.2                            | 119.2 – 222.9        | 72                               | 100          | 100        |

補足表 6-6. 漁獲シナリオに対応する将来予測

HCR ( $\beta = 0.9$ )

| 年齢別漁獲係数 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 年齢\年    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 0歳      | 0.30 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 1歳      | 0.24 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2歳      | 0.47 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 3歳      | 0.62 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 4歳      | 0.85 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 5歳以上    | 0.85 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 単純平均    | 0.56 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |

| 年齢別平均資源尾数 (百万尾) ※ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 年齢\年              | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
| 0歳                | 58,416  | 58,566  | 57,937  | 58,464  | 57,817  | 50,263  | 50,600  | 50,320  | 50,840  | 50,777  | 47,615  |
| 1歳                | 28,718  | 29,149  | 33,427  | 33,068  | 33,368  | 32,999  | 28,688  | 28,880  | 28,720  | 29,017  | 28,981  |
| 2歳                | 6,668   | 15,194  | 17,176  | 19,696  | 19,485  | 19,662  | 19,444  | 16,904  | 17,017  | 16,923  | 17,098  |
| 3歳                | 10,444  | 2,802   | 7,897   | 8,927   | 10,237  | 10,127  | 10,219  | 10,106  | 8,785   | 8,844   | 8,795   |
| 4歳                | 5,449   | 3,770   | 1,340   | 3,778   | 4,271   | 4,898   | 4,845   | 4,889   | 4,835   | 4,203   | 4,231   |
| 5歳以上              | 1,991   | 2,139   | 2,497   | 1,622   | 2,282   | 2,770   | 3,241   | 3,418   | 3,511   | 3,527   | 3,267   |
| 計                 | 111,686 | 111,620 | 120,274 | 125,555 | 127,460 | 120,719 | 117,037 | 114,517 | 113,708 | 113,291 | 109,987 |

| 年齢別平均資源量 (千トン) ※ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 年齢\年             | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  |
| 0歳               | 924   | 926   | 918   | 924   | 916   | 823   | 827   | 824   | 830   | 830   | 787   |
| 1歳               | 1,166 | 1,170 | 1,314 | 1,302 | 1,312 | 1,300 | 1,155 | 1,161 | 1,155 | 1,166 | 1,165 |
| 2歳               | 454   | 883   | 964   | 1,077 | 1,067 | 1,075 | 1,065 | 952   | 957   | 952   | 961   |
| 3歳               | 714   | 228   | 560   | 618   | 696   | 689   | 695   | 688   | 609   | 613   | 610   |
| 4歳               | 450   | 321   | 124   | 321   | 358   | 406   | 402   | 405   | 401   | 353   | 355   |
| 5歳以上             | 192   | 205   | 236   | 159   | 217   | 259   | 298   | 313   | 321   | 322   | 301   |
| 計                | 3,900 | 3,732 | 4,116 | 4,402 | 4,567 | 4,552 | 4,442 | 4,343 | 4,274 | 4,236 | 4,178 |
| 親魚量              | 2,043 | 1,870 | 2,146 | 2,435 | 2,601 | 2,689 | 2,691 | 2,590 | 2,519 | 2,473 | 2,459 |

| 年齢別平均漁獲尾数 (百万尾) ※ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年齢\年              | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   |
| 0歳                | 12,224 | 7,123  | 7,046  | 7,110  | 7,031  | 6,113  | 6,154  | 6,120  | 6,183  | 6,175  | 5,791  |
| 1歳                | 4,955  | 2,887  | 3,310  | 3,275  | 3,304  | 3,268  | 2,841  | 2,860  | 2,844  | 2,873  | 2,870  |
| 2歳                | 2,037  | 2,795  | 3,159  | 3,623  | 3,584  | 3,617  | 3,577  | 3,109  | 3,130  | 3,113  | 3,145  |
| 3歳                | 3,947  | 657    | 1,851  | 2,092  | 2,399  | 2,373  | 2,395  | 2,368  | 2,059  | 2,073  | 2,061  |
| 4歳                | 2,548  | 1,140  | 405    | 1,143  | 1,292  | 1,481  | 1,466  | 1,479  | 1,463  | 1,271  | 1,280  |
| 5歳以上              | 931    | 647    | 755    | 491    | 690    | 838    | 980    | 1,034  | 1,062  | 1,067  | 988    |
| 計                 | 26,642 | 15,248 | 16,527 | 17,733 | 18,301 | 17,690 | 17,412 | 16,970 | 16,741 | 16,573 | 16,135 |

| 年齢別平均漁獲量 (千トン) ※ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 年齢\年             | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  |
| 0歳               | 193   | 113   | 112   | 112   | 111   | 100   | 101   | 100   | 101   | 101   | 96    |
| 1歳               | 201   | 116   | 130   | 129   | 130   | 129   | 114   | 115   | 114   | 115   | 115   |
| 2歳               | 139   | 162   | 177   | 198   | 196   | 198   | 196   | 175   | 176   | 175   | 177   |
| 3歳               | 270   | 53    | 131   | 145   | 163   | 161   | 163   | 161   | 143   | 144   | 143   |
| 4歳               | 211   | 97    | 37    | 97    | 108   | 123   | 122   | 123   | 121   | 107   | 107   |
| 5歳以上             | 90    | 62    | 71    | 48    | 66    | 78    | 90    | 95    | 97    | 98    | 91    |
| 計                | 1,103 | 603   | 659   | 730   | 775   | 789   | 786   | 769   | 753   | 739   | 729   |
| 漁獲割合             | 28.3% | 16.2% | 16.0% | 16.6% | 17.0% | 17.3% | 17.7% | 17.7% | 17.6% | 17.5% | 17.4% |

※5,000回の繰り返し計算を行った平均値である。

補足表 6-7 現状の漁獲圧に対応する将来予測

F2022-2024

| 年齢別漁獲係数 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 年齢\年    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 0歳      | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 1歳      | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 2歳      | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| 3歳      | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 4歳      | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 5歳以上    | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 単純平均    | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |

| 年齢別平均資源尾数 (百万尾) ※ |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 年齢\年              | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   |
| 0歳                | 58,416  | 58,566  | 57,937  | 58,411  | 57,753  | 50,199  | 50,517  | 50,242 | 50,753 | 50,673 | 47,512 |
| 1歳                | 28,718  | 29,149  | 29,224  | 28,910  | 29,147  | 28,818  | 25,049  | 25,207 | 25,070 | 25,325 | 25,285 |
| 2歳                | 6,668   | 15,194  | 15,422  | 15,461  | 15,295  | 15,421  | 15,247  | 13,253 | 13,336 | 13,264 | 13,399 |
| 3歳                | 10,444  | 2,802   | 6,384   | 6,480   | 6,496   | 6,427   | 6,479   | 6,406  | 5,568  | 5,603  | 5,573  |
| 4歳                | 5,449   | 3,770   | 1,011   | 2,304   | 2,339   | 2,345   | 2,320   | 2,339  | 2,312  | 2,010  | 2,023  |
| 5歳以上              | 1,991   | 2,139   | 1,699   | 779     | 886     | 927     | 941     | 937    | 942    | 936    | 847    |
| 計                 | 111,686 | 111,620 | 111,677 | 112,345 | 111,916 | 104,137 | 100,553 | 98,384 | 97,981 | 97,811 | 94,639 |

| 年齢別平均資源量 (千トン) ※ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 年齢\年             | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  |
| 0歳               | 924   | 926   | 918   | 924   | 915   | 822   | 826   | 823   | 829   | 828   | 786   |
| 1歳               | 1,166 | 1,170 | 1,173 | 1,162 | 1,170 | 1,159 | 1,029 | 1,034 | 1,030 | 1,039 | 1,037 |
| 2歳               | 454   | 883   | 884   | 886   | 878   | 884   | 875   | 782   | 786   | 782   | 789   |
| 3歳               | 714   | 228   | 466   | 468   | 469   | 464   | 468   | 463   | 410   | 412   | 410   |
| 4歳               | 450   | 321   | 95    | 204   | 206   | 206   | 204   | 206   | 203   | 179   | 180   |
| 5歳以上             | 192   | 205   | 166   | 82    | 92    | 95    | 97    | 96    | 97    | 96    | 88    |
| 計                | 3,900 | 3,732 | 3,701 | 3,724 | 3,729 | 3,630 | 3,499 | 3,404 | 3,355 | 3,336 | 3,290 |
| 親魚量              | 2,043 | 1,870 | 1,845 | 1,871 | 1,878 | 1,881 | 1,849 | 1,754 | 1,702 | 1,677 | 1,674 |

| 年齢別平均漁獲尾数 (百万尾) ※ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年齢\年              | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   |
| 0歳                | 12,224 | 12,256 | 12,124 | 12,223 | 12,086 | 10,505 | 10,571 | 10,514 | 10,621 | 10,604 | 9,943  |
| 1歳                | 4,955  | 5,029  | 5,042  | 4,988  | 5,028  | 4,972  | 4,322  | 4,349  | 4,325  | 4,369  | 4,362  |
| 2歳                | 2,037  | 4,642  | 4,712  | 4,724  | 4,673  | 4,712  | 4,659  | 4,049  | 4,075  | 4,053  | 4,094  |
| 3歳                | 3,947  | 1,059  | 2,412  | 2,448  | 2,455  | 2,428  | 2,448  | 2,421  | 2,104  | 2,117  | 2,106  |
| 4歳                | 2,548  | 1,763  | 473    | 1,077  | 1,094  | 1,096  | 1,085  | 1,094  | 1,081  | 940    | 946    |
| 5歳以上              | 931    | 1,000  | 794    | 364    | 414    | 434    | 440    | 438    | 440    | 437    | 396    |
| 計                 | 26,642 | 25,749 | 25,557 | 25,825 | 25,750 | 24,147 | 23,524 | 22,864 | 22,646 | 22,520 | 21,846 |

| 年齢別漁獲量 (千トン) ※ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 年齢\年           | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  |
| 0歳             | 193   | 194   | 192   | 193   | 192   | 172   | 173   | 172   | 174   | 173   | 164   |
| 1歳             | 201   | 202   | 202   | 200   | 202   | 200   | 178   | 178   | 178   | 179   | 179   |
| 2歳             | 139   | 270   | 270   | 271   | 268   | 270   | 267   | 239   | 240   | 239   | 241   |
| 3歳             | 270   | 86    | 176   | 177   | 177   | 175   | 177   | 175   | 155   | 156   | 155   |
| 4歳             | 211   | 150   | 45    | 95    | 96    | 96    | 95    | 96    | 95    | 84    | 84    |
| 5歳以上           | 90    | 96    | 78    | 38    | 43    | 45    | 45    | 45    | 45    | 45    | 41    |
| 計              | 1,103 | 997   | 963   | 975   | 978   | 958   | 935   | 906   | 886   | 876   | 865   |
| 漁獲割合           | 28.3% | 26.7% | 26.0% | 26.2% | 26.2% | 26.4% | 26.7% | 26.6% | 26.4% | 26.3% | 26.3% |

※5,000 回の繰り返し計算を行った平均値である。

## 補足資料 7 調査の概要

### (1) 主要港、各地漁場における漁獲物調査、漁況調査

関係試験研究機関により、主要港における水揚げ量、および水揚げ物の体長、体重、年齢、成熟度等のデータ収集が行われている。収集データから体長－体重、体長－年齢、年齢－成熟関係等を解析するとともに、農林統計による漁獲量から年齢別漁獲量を推定している。また、各地漁場における漁獲状況調査、標本船調査、各地先海域における分布量、加入量調査が実施されている。

冬季の房総～常磐海域においては、千葉県水産総合研究センター、茨城県水産試験場により、大中型まき網の CPUE、漁場分布および漁獲物組成の調査が行われ、1 歳魚資源量の指標となる未成魚越冬群指数が求められている。未成魚越冬群指数は、1 歳魚に相当する「小羽」と「小中羽」の 2 銘柄について日別に資源量指数を求め、これを来遊期間である前年 12 月から当年 4 月までについて合計した値である（内山 1998）。ここ数年の未成魚越冬群指数については、最近の海洋環境・資源状態の変化によりマイワシ 1 歳以上の越冬時の分布が変化し、1 歳魚の資源量を反映できていない可能性がある。なお、このような状況でも機能する指標値の探索が進められており、1～5 月の宮城県定置網の未成魚（1 歳魚）の CPUE が資源変動のトレンドを捉えられていることが示されている（増田・古市 2023）。

### (2) 卵稚仔調査

産卵状況を把握するために、関係試験研究機関により、改良型ノルパックネット（口径 45 cm リング、目合 0.335 mm）の鉛直曳による採集調査が実施されている。各都府県試験研究機関は、地先沿岸に定線を設定し、月 1 回程度の頻度で周年に亘って実施している。水研は、産卵の多い 2～3 月に関東近海から薩南の黒潮周辺域において大規模な調査を実施しているほか、その他の沖合の海洋・資源調査において随時採集を実施している。得られた結果は卵稚仔調査協議会がとりまとめ、海区ごとの産卵量を推定している。海区区分は、海区 I：常磐以北、II：房総～熊野灘、III：紀伊水道外域～日向灘、IV：薩南としている。

### (3) 加入量調査・沖合分布調査

漁場外の沖合域における資源の状況を把握するため、次の調査が実施されている。

- ① 移行域幼稚魚調査：水産研究・教育機構が 1996 年以降 5～6 月の黒潮親潮移行域の北緯 35～42 度、東経 143～165 度の海域において幼稚魚用中層トロール（網口 25 m、コード目合 10 mm）による幼稚魚採集調査を実施し、加入量指数を西田ほか（2001）を改変した次の方法で算出している。

加入量指数 =  $\sum$  [表面水温 1℃ の各水温帯における有漁獲点 CPUE 中央値（尾数/網）] × [表面水温 1℃ の各水温帯における有漁獲点割合] × [表面水温 1℃ ごとの各水温帯の調査対象海域全体に対する面積割合]。

- ② 北西太平洋北上期浮魚類資源調査（サンマ資源量直接推定調査、北上期浮魚類資源調査）：水産研究・教育機構が 2001 年以降 6～7 月の移行域～親潮域において中層トロ

ール（網口 30 m、コッド目合 17 mm）による漁獲調査を実施し、分布量を推定している。

- ③ 北西太平洋秋季浮魚類資源調査：水産研究・教育機構が 2005 年以降 9～10 月の三陸～道東～千島列島東方沖海域において、計量魚探機音響資源調査、および中層トロール（網口 30 m、コッド目合 17 mm）による漁獲調査を実施し、1 歳以上の分布状況を把握するとともに、東経 145～180 度の亜寒帯域の表面水温 10～15℃ 域における 0 歳魚の現存量を推定している。
- ④ 三陸～道東海域流し網調査：北海道立総合研究機構釧路水産試験場により、春～秋季の三陸～道東海域において流し網調査が行われ、漁場外の沖合における魚群の分布状況や体長・年齢組成等が把握されている。

#### 引用文献

- 増田義男・古市 生 (2023) 宮城県沿岸域におけるマイワシの来遊と越冬. 黒潮の資源海洋研究, **24**, 71-76.
- 西田 宏・渡邊千夏子・谷津明彦 (2001) 黒潮親潮移行域における稚魚採集結果に基づくマイワシ・マサバの加入量水準予測. 黒潮の資源海洋研究, **2**, 77-82.
- 内山雅史 (1998) 越冬期の未成魚. 「マイワシの資源変動と生態変化 (水産学シリーズ 119)」 渡邊良朗・和田時夫編, 恒星社厚生閣, 東京, 103-113.

補足表 7-1. 産卵量（兆粒）

|       | 1980  | 1981 | 1982  | 1983  | 1984  | 1985  | 1986  | 1987  | 1988  | 1989  | 1990  | 1991  | 1992  |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I・II区 | 150   | 109  | 43    | 79    | 244   | 153   | 734   | 285   | 277   | 420   | 3,379 | 2,632 | 697   |
| I～IV区 | 562   | 989  | 892   | 622   | 1,158 | 2,052 | 5,614 | 1,462 | 2,727 | 2,328 | 4,304 | 3,423 | 1,754 |
|       | 1993  | 1994 | 1995  | 1996  | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  |
| I・II区 | 48    | 61   | 26    | 22    | 49    | 42    | 35    | 170   | 32    | 12    | 7     | 18    | 31    |
| I～IV区 | 1,280 | 638  | 143   | 148   | 172   | 121   | 145   | 283   | 63    | 33    | 44    | 62    | 101   |
|       | 2006  | 2007 | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
| I・II区 | 7     | 32   | 13    | 24    | 37    | 52    | 116   | 134   | 306   | 146   | 241   | 452   | 1,354 |
| I～IV区 | 38    | 148  | 84    | 118   | 75    | 120   | 192   | 245   | 426   | 228   | 347   | 531   | 1,378 |
|       | 2019  | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |       |       |       |       |       |       |
| I・II区 | 1,804 | 681  | 1,066 | 1,417 | 941   | 295   | 400   |       |       |       |       |       |       |
| I～IV区 | 1,892 | 723  | 1,088 | 1,423 | 1,023 | 325   | 697   |       |       |       |       |       |       |

卵稚仔調査協議会による前年 10 月から当年 9 月までの集計値。

2025 年は 6 月までの暫定値。

補足表 7-2. 移行域幼稚魚調査（5～6 月）による移行域加入量指数

|              | 1996  | 1997 | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  |
|--------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 移行域<br>加入量指数 | 187.4 | 45.0 | 60.1  | 6.1   | 45.7  | 0.1   | 0.8   | 0.1   | 0.6   | 5.0   |
|              | 2006  | 2007 | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|              | 0.4   | 3.2  | 1.2   | 16.8  | 391.4 | 28.8  | 123.2 | 139.1 | 158.0 | 101.5 |
|              | 2016  | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|              | 102.6 | 91.9 | 524.8 | 248.1 | 257.1 | 836.3 | 646.9 | 527.7 | 8.0   | 14.4  |

補足表 7-3. 未成魚越冬群指数（千葉水総研、茨城水試）

|              | 1976   | 1977   | 1978   | 1979   | 1980   | 1981   | 1982   | 1983   | 1984   | 1985   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 未成魚<br>越冬群指数 | 7,592  | 4,109  | 16,840 | 11,653 | 2,853  | 53,698 | 41,207 | 6,740  | 50,085 | 41,197 |
|              | 1986   | 1987   | 1988   | 1989   | 1990   | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995   |
|              | 62,928 | 42,986 | 39,659 | 1,588  | 5,944  | 224    | 30     | 30,541 | 5,802  | 5,054  |
|              | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   | 2000   | 2001   | 2002   | 2003   | 2004   | 2005   |
|              | 239    | 8,481  | 1,136  | 5,763  | 0      | 8,480  | 122    | 404    | 342    | 28     |
|              | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|              | 1,093  | 371    | 385    | 921    | 780    | 3,374  | 408    | 1,397  | 1,757  | 2,065  |
|              | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |        |
|              | 2,480  | 1,855  | 2,178  | 6,991  | 17,329 | 11,661 | 630    | 817    | 1,182  |        |

## 補足資料 8 資源量指標値標準化の手法

北西太平洋北上期浮魚類資源調査による 中層トロール 0 歳魚 CPUE および 1 歳魚 CPUE の標準化を行った。0 歳魚 CPUE は加入量（0 歳魚資源尾数）の指標値、1 歳魚 CPUE は 1 歳魚資源尾数の指標値である。

北西太平洋北上期浮魚類資源調査は 2001 年から開始されているが、耳石サンプルが利用可能で漁獲物の年齢分解が可能な 2005～2024 年の期間を使用した。標準化には、Vector-Autoregressive Spatio-Temporal (VAST) モデル (Thorson and Barnett 2017) を使用した。VAST は、空間自己相関を考慮することで、相対密度の時空間変動の柔軟な取り扱いを可能にした CPUE 標準化の手法である。

VAST では調査 CPUE（尾/網/時）を、サンプル  $i$  の遭遇確率 ( $p_1(i)$ ) と、遭遇時した場合のサンプル  $i$  の密度 ( $p_2(i)$ ) に分けて、以下の 2 つの線形予測子で表す。

$$p_1(i) = \beta_1(t_i) + \omega_1(s_i) + \varepsilon_1(s_i, t_i) \quad (12)$$

$$p_2(i) = \beta_2(t_i) + \omega_2(s_i) + \varepsilon_2(s_i, t_i) \quad (13)$$

右辺の第 1 項の  $\beta(t_i)$  は調査年  $t$  の効果を表す係数であり、第 2 項の  $\omega(s_i)$  は調査年  $t$  における空間のランダム効果、第 3 項の  $\varepsilon(s_i, t_i)$  は調査年  $t$  と場所  $s$  における時空間のランダム効果を表している。VAST では初めに、空間情報から、クラスタリングの一種である k-平均法により空間分布を近似するノットを決め、ノットにおける相対密度の時空間変化をモデル化する。先行研究ではノット数は 100 以上とすることを推奨されているので (Thorson 2019)、これに倣い、今回はノット数を 150（1 歳魚では推定が困難であったため 100）とした。空間効果の確率密度関数は多変量正規分布 (MVN) を使って、

$$\omega_1(\cdot, f) \sim MVN(0, \mathbf{R}_1), \quad \omega_2(\cdot, f) \sim MVN(0, \mathbf{R}_2) \quad (14)$$

と表す。ここで、 $\mathbf{R}_1$ ,  $\mathbf{R}_2$  は Matérn 相関関数であり、

$$\mathbf{R}_1(s_n, s_m) = \frac{1}{2^{\varphi-1}\Gamma(\varphi)} \times (\kappa_1 |\mathbf{d}(s_n, s_m)\mathbf{H}|)^{\varphi} \times K_{\nu}(\kappa_1 |\mathbf{d}(s_n, s_m)\mathbf{H}|), \quad (15)$$

$$\mathbf{R}_2(s_n, s_m) = \frac{1}{2^{\varphi-1}\Gamma(\varphi)} \times (\kappa_2 |\mathbf{d}(s_n, s_m)\mathbf{H}|)^{\varphi} \times K_{\nu}(\kappa_2 |\mathbf{d}(s_n, s_m)\mathbf{H}|) \quad (16)$$

と表される。VAST では、 $\varphi = 1$  と固定し、推定しない。 $\Gamma$  はガンマ関数、 $K_{\nu}$  は第 2 種の変形ベッセル関数、 $\kappa_1$  と  $\kappa_2$  は非相関率、 $\mathbf{d}(s_n, s_m)$  はノット間の距離、 $\mathbf{H}$  は地理的な異方性（方角によって相関の程度が異なること）を表す行列であるが、推定が困難であったため異方性を仮定しなかった。同様に、時空間効果の確率密度関数は

$$\varepsilon_1(\cdot, f, t) \sim \begin{cases} MVN(0, \mathbf{R}_1) & \text{if } t = 1 \\ MVN(\rho_{\varepsilon 1} \varepsilon_1(\cdot, f, t-1), \mathbf{R}_1) & \text{if } t > 1 \end{cases} \quad (17)$$

$$\varepsilon_2(\cdot, f, t) \sim \begin{cases} MVN(0, \mathbf{R}_2) & \text{if } t = 1 \\ MVN(\rho_{\varepsilon 2} \varepsilon_2(\cdot, f, t-1), \mathbf{R}_2) & \text{if } t > 1 \end{cases} \quad (18)$$

で与えられるが、本解析では時空間効果は独立と仮定した ( $\rho_{\varepsilon 1} = \rho_{\varepsilon 2} = 0$ )。各年の効果 ( $\beta$ ) については、漁獲のない年があり、これらの年でも正の標準化 CPUE の値を算出するため、ランダム効果として推定した。

$$\beta_1(t) \sim \begin{cases} Normal(0, \sigma_{\beta 1}^2) & \text{if } t = 1 \\ Normal(\rho_{\beta 1} \beta_1(t-1), \sigma_{\beta 1}^2) & \text{if } t > 1 \end{cases} \quad (19)$$

$$\beta_2(t) \sim \begin{cases} Normal(0, \sigma_{\beta 2}^2) & \text{if } t = 1 \\ Normal(\rho_{\beta 2} \beta_2(t-1), \sigma_{\beta 2}^2) & \text{if } t > 1 \end{cases} \quad (20)$$

年の効果においても、各年独立と仮定した ( $\rho_{\beta 1} = \rho_{\beta 2} = 0$ )。

本データを使用した解析では二項分布とガンマ分布を使用したデルタ型のモデルを使用し、予測遭遇率 ( $r_1(i)$ ) と遭遇時の予測 CPUE ( $r_2(i)$ ) を以下の式で表した (Thorson 2017)。

$$r_1(i) = \text{logit}^{-1} p_1(i) \quad (21)$$

$$r_2(i) = a_i \times \log^{-1} p_2(i) \quad (22)$$

$a_i$  はオフセット項であるが、CPUE を目的変数としてオフセット項は 1 とした。CPUE が観測される確率は以下で表され、周辺尤度が最大となるパラメータを推定した。

$$\Pr(b_i = B) = \begin{cases} 1 - r_1(i) & \text{if } B = 0 \\ r_1(i) \times g\{B|r_2(i), \sigma_m^2(c)\} & \text{if } B > 0 \end{cases} \quad (23)$$

上記モデルのパラメータは、最尤法によって推定されるが、多くのランダム効果を伴うため、高速な計算が必要であり、Template Model Builder (Kristensen et al. 2016) と呼ばれる高速最適化ソフトが使用される。

VAST の資源量指標値は各年における各位置の相対密度を  $d(x, c, t) = r_1(x, c, t) \times r_2(x, c, t)$  で計算し、各ノットの面積と密度を掛け合わせた値の総和を存在量として求められるが、今回の解析では密度は CPUE (尾/網/60 分) であるため、総和を面積の合計値で割った値を標準化 CPUE (尾/網/60 分) として算出した。


$$I(t) = \frac{\sum_{s=1}^{n_s} (a(s) \times d(s, t))}{\sum_{s=1}^{n_s} a(s)} \quad (24)$$

各ノットの面積の合計値は年によって変わらないため、この処理によって標準化指標値の相対的なトレンドは変わらない。指標値を求める際、ランダム効果の平均補正を行った (Thorson and Kristensen 2016)。VAST のモデル構造については、Thorson (2019) や GitHub (<https://github.com/James-Thorson-NOAA/VAST>) に詳しく記載されている。


VAST で推定された各年の局所密度の分布を補足図 8-1、8-2 に示す。1 歳魚の分布の変化が顕著に見られており、2016 年以降に分布の重心が東方向に移動し、分布が沖合に拡大していることが明らかになった。0 歳魚 CPUE は 2020 年のピークの後に減少し、2024 年は 2024 年と同水準であった。1 歳魚 CPUE は 2020-2021 年のピークの後に減少し、2024 年では 2023 年からさらに低下し、低い水準となった (補足図 8-3)。R パッケージの DHARMA (Hartig 2022) を使用しモデル診断を行ったところ、いずれの解析においても Q-Q プロットは理論上の予測線の上に観測値が載っており、コルモゴロフ-スミルノフ検定において有意差は検出されなかった (補足図 8-4)。

## 引用文献


- Hartig, F. (2022) DHARMA: Residual Diagnostics for Hierarchical (Multi-Level/Mixed) Regression Models. R package version 0.4.5. <https://CRAN.R-project.org/package=DHARMA>.
- Kristensen, K., A. Nielsen, C. E. Berg, H. Skaug and B. M. Bell (2016) TMB: automatic differentiation and Laplace approximation. *J. Stat. Softw.*, **70**, 1-21.
- Thorson, J. T. (2017) Three problems with the conventional delta-model for biomass sampling data, and a computationally efficient alternative. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.*, **75**, 1369-1382.
- Thorson, J. T. (2019) Guidance for decisions using the Vector Autoregressive Spatio-Temporal (VAST) package in stock, ecosystem, habitat and climate assessments. *Fish. Res.*, **210**, 143-161.
- Thorson, J. T. and LAK. Barnett (2017) Comparing estimates of abundance trends and distribution shifts using single- and multispecies models of fishes and biogenic habitat. *ICES J. Mar. Sci.*, **74**, 1311-1321.
- Thorson, J. T. and K. Kristensen (2016) Implementing a generic method for bias correction in statistical models using random effects, with spatial and population dynamics examples. *Fish. Res.*, **175**, 66-74.



補足図 8-1. 北上期調査データから推定された各年の 0 歳魚の相対密度  
×印は分布の重心を表す。




補足図 8-2. 北上期調査データから推定された各年の 1 歳魚の相対密度  
×印は分布の重心を表す。



補足図 8-3. 北上期調査の 0 歳魚 CPUE および 1 歳魚 CPUE の経年変化

赤実線は今年度評価による標準化指標値、青点はノミナル指標値を表す。平均が 1 となるように標準化した値を示しており、影は 95%信頼区間を表す。ノミナルは CPUE の単純平均を表す。



補足図 8-4. 各資源量指標値の解析における標準化残差 (0-1 の範囲に標準化した残差) の Q-Q プロット

左上にコルモゴロフ-スミルノフ検定における  $p$  値を示す。

## 補足資料 9 前回管理基準値等の提案後の経過

### (1) 評価を取り巻く状況

#### 1) 過年度の経緯

本系群では令和 2 年 3 月の研究機関会議で管理基準値と漁獲管理規則が提案・合意された。令和 2 年 7 月の資源管理手法検討部会で管理方策について議論がなされた後、令和 2 年 9 月の資源管理方針に関する検討会で管理方策が同意され、令和 3 年 1 月から MSY に基づく管理が開始された。これまでに本系群を対象として開催された資源管理、資源評価に関連する会議について補足表 9-1 に取りまとめた。

#### 2) 資源管理基本方針に関連するパラメータ

令和 2 年 9 月に開催された「資源管理方針に関する検討会」で取り纏められ「水産政策審議会」を経て資源管理基本方針が定められた。同方針の目標管理基準値、限界管理基準値、禁漁水準、調整係数  $\beta$  などは古市ほか（2024）の補足資料 3 を参照されたい。

#### 3) 前回管理基準値提案以降の大きな出来事

##### ① 通常加入期としては高い加入が継続

通常加入期の再生産関係から予測される平均値より高い加入が継続し、資源が増加した。

##### ② 急激な体重の低下

2019 年以降に 2 歳以上で急激に体重が低下した。現在の資源尾数は 1980 年代の高水準期の 3 分の 1 にも満たないのに、1980 年代の高水準期と同程度もしくはそれ以上の体重の低下が見られている。これは、餌を巡る競争の激化により強い密度依存的な負の効果が現れたためと考えられている（Kamimura et al. 2022）。

##### ③ 外国船による漁獲の増加

2014 年以降、資源が増加して回遊範囲が拡大したことにより、ロシアおよび中国漁船による漁獲が行われるようになった。特に 2020 年以降に外国船による漁獲量は増大した。中国漁船による漁獲量は 20 万トン台で推移している。一方、ロシア漁船による漁獲量は 2020～2022 年は 30 万トン前後で推移していたが、2023 年以降はさらに増加して 50 万トン台で漁獲している。

#### 4) 資源評価の変更点

目標管理基準値の設定以降、資源評価において行った変更点は以下のとおり。

##### ① 外国船による漁獲量も含めた評価の適用（令和 4 年度）

2014 年以降、資源が増加して回遊範囲が拡大したことにより、ロシアおよび中国による漁獲が増え、特に 2020 年以降に急増している。そのため、外国船による漁獲量も含めた評価を行うこととした。

##### ② 将来予測において ABC 算定年まで直近 3 年平均の体重を適用（令和 4 年度）

近年の急激な体重の低下を反映させるために、将来予測において ABC 算定年まで直近 3 年平均の体重を適用した。

##### ③ 将来予測においてバックワードリサンプリングの適用（令和 4 年度）

将来予測において、近年の加入の良好な傾向を取り入れるため、残差のバックワードリサンプリングを適用した。

④ 中国の年齢別漁獲尾数の算出において、中国から提供された体長組成を使用（令和 6 年度）

NPFC（北太平洋漁業委員会）において、中国より 2020～2022 年の漁獲物の体長組成データが提供され、使用可能になったため、中国の年齢別漁獲尾数の算出において、中国から提供された体長組成を使用することとした。

⑤ 北上期調査 0 歳魚および 1 歳魚 CPUE を資源量指標値として使用（令和 6 年度）

耳石による年齢査定手法の確立により、北上期調査において 0 歳魚と 1 歳魚の CPUE の算出が可能になったため、資源量指標値として使用することとした。耳石を用いて年齢査定を行い 0 歳魚および 1 歳魚の CPUE を算出し、Vector-Autoregressive Spatio-Temporal (VAST; Thorson and Barnett 2017) によって標準化した値を資源量指標値として使用した。

## 5) ピア ビュー

水産研究・教育機構では、資源評価に関する透明性や客観性を確保するため、その科学的妥当性について国内外の専門家に諮問するピア ビューのプロセスを令和 2（2020）年度から導入している。本系群については、令和 3 年 9 月 14～15 日に米国の専門家によるビューを、令和 3 年 10 月 5 日および 8 日に国内の専門家によるレビューを受けた。ビューの詳細はオンライン上で公開されている報告書を参照されたい。（[https://www.fra.affrc.go.jp/shigen\\_hyoka/peer\\_review/index.html](https://www.fra.affrc.go.jp/shigen_hyoka/peer_review/index.html)）

## （2）過年度資源評価の結果の比較

前回管理基準値等を用いた令和 2（2020）年度から令和 6（2024）年度までの資源評価結果を比較した（補足図 9-1、補足表 9-2）。評価年度が進むにつれ、2015 年級群の加入量が下方修正され、それにともない 2017 年の親魚量も下方修正された。これは、2015 年級群の加入量指標値は高かったが、その後漁獲としてそれほど現れなかったことが主な原因と考えられる。2020 年級群以降の加入量は、将来予測において想定されていた水準より高く水準が継続した。一方で、2020 年前後の親魚量は将来予測で想定されていたより低い水準と推定された。これは、体重の急激な低下などが原因と思われる。2022 年度資源評価以降は将来予測においてバックワードリサンプリングを適用したことによって、想定される加入量が高くなり、それにともない将来予測における親魚量の予測値も高くなった。


## （3）まとめ

本系群においては前回管理基準値提案以降、良好な加入の継続による資源の増加、外国船による漁獲の増大、急激な成長の低下が見られた。そのため、令和 7 年以降の評価で用いる管理基準値については、外国船の漁獲も含めた資源量推定による最新のデータに基づき、また近年の資源尾数と体重の負の関係も考慮して算出された値が提案されている（古市ほか 2025）。ピア ビューにおける指摘のうち、外国船による漁獲が当時では考慮されていなかった点が改善されたこと、またその生物データも利用している点や、資源量指標値の標準化を進めたこと等の進捗はあったが、本系群の資源評価で用いるデータや手法に

はさらなる改善が必要な部分もある。その中で優先的に取り組むべき課題について補足資料 10 に整理した。

#### 引用文献

- 古市 生・由上龍嗣・東口胤成・上村泰洋・西嶋翔太・渡部亮介・井須小羊子 (2024) 令和 6 (2024) 年度マイワシ太平洋系群の資源評価.FRA-SA2024-SC09-01. 水産庁・水産研究・教育機構, 東京. 49pp.
- 古市 生・由上龍嗣・上村泰洋・西嶋翔太・井須小羊子・伊澤雄登・東口胤成・渡部亮介 (2025) 令和 7 年度の管理基準値等に関する研究機関会議資料.FRA-SA2025-BRP02-01.
- Kamimura, Y., K. Tadokoro, S. Furuichi, and R. Yukami (2022) Stronger density-dependent growth of Japanese sardine with lower food availability: Comparison of growth and zooplankton biomass between a historical and current stock-increase period in the western North Pacific. *Fish. Res.* **255**, 106461.
- Thorson, J. T. and LAK. Barnett (2017) Comparing estimates of abundance trends and distribution shifts using single- and multispecies models of fishes and biogenic habitat. *ICES J. Mar. Sci.*, **74**, 1311-1321.



補足図 9-1. 評価年度別の親魚量、資源量、加入尾数の比較

実線は VPA による推定値、点線は漁獲シナリオに基づく将来予測結果の平均値、網掛けはシミュレーション結果の 90%が含まれる予測区間を示す。

補足表 9-1. 本系群資源評価を取り巻く過年度の経緯

| 年<br>月         | 資源評価をめぐる主な経緯                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年<br>3月    | 資源管理目標等に関する研究機関会議<br><a href="https://www.fra.affrc.go.jp/shigen_hyoka/SCmeeting/2019-1/index.html">https://www.fra.affrc.go.jp/shigen_hyoka/SCmeeting/2019-1/index.html</a><br>再生産関係の設定、管理基準値と漁獲管理規則の提案、将来予測の検討                                              |
| 2020年<br>7月    | 資源管理方針に関する検討会(第1回マイワシ太平洋系群)<br><a href="https://www.jfa.maff.go.jp/j/study/kanri/231027_10.html">https://www.jfa.maff.go.jp/j/study/kanri/231027_10.html</a>                                                                                                  |
| 2020年<br>8月    | 令和2(2020)年度マイワシ・マアジ資源評価会議<br><a href="https://www.fra.affrc.go.jp/shigen_hyoka/SCmeeting/2019-1/index.html">https://www.fra.affrc.go.jp/shigen_hyoka/SCmeeting/2019-1/index.html</a>                                                                          |
| 2020年<br>9月    | 資源管理方針に関する検討会(第2回マイワシ太平洋系群)<br><a href="https://www.jfa.maff.go.jp/j/study/kanri/231027_10.html">https://www.jfa.maff.go.jp/j/study/kanri/231027_10.html</a>                                                                                                  |
| 2021年<br>1月    | MSYに基づくTAC管理開始                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2021年<br>8月    | 令和3(2021)年度マイワシ・マアジ資源評価会議<br><a href="https://www.fra.affrc.go.jp/shigen_hyoka/SCmeeting/2019-1/index.html">https://www.fra.affrc.go.jp/shigen_hyoka/SCmeeting/2019-1/index.html</a>                                                                          |
| 2021年<br>9・10月 | ピアレビュー                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022年<br>8月    | 令和4(2022)年度マイワシ・マアジ資源評価会議<br><a href="https://www.fra.affrc.go.jp/shigen_hyoka/SCmeeting/2019-1/index.html">https://www.fra.affrc.go.jp/shigen_hyoka/SCmeeting/2019-1/index.html</a>                                                                          |
| 2023年<br>8月    | 令和5(2023)年度いわし類・マアジ太平洋系群資源評価会議<br><a href="https://www.fra.go.jp/shigen/fisheries_resources/meeting/stock_assesment_meeting/2023/2023-08.html">https://www.fra.go.jp/shigen/fisheries_resources/meeting/stock_assesment_meeting/2023/2023-08.html</a>         |
| 2024年<br>8月    | 令和6(2024)年度いわし類・マアジ太平洋系群資源評価会議<br><a href="https://www.fra.go.jp/shigen/fisheries_resources/meeting/stock_assesment_meeting/2024/sa2024-sc09.html">https://www.fra.go.jp/shigen/fisheries_resources/meeting/stock_assesment_meeting/2024/sa2024-sc09.html</a> |

補足表 9-2. 各年の評価年度別の親魚量、資源量、加入尾数

## a) 親魚量(万トン)

| 評価年度 / 年         | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MSY 算定時(2019 年度) | 211.4  | 316.4  | 241.7  | 184.9  | 158.2  |
| 2020 年度評価        | 158.5  | 287.6  | 287.5  | 222.2  | 177.3  |
| 2021 年度評価        | 145.6  | 172.0  | 244.5  | 243.2  | 185.4  |
| 2022 年度評価        | 174.5  | 244.6  | 220.5  | 242.1  | 242.8  |
| 2023 年度評価        | 174.6  | 249.0  | 240.4  | 240.5  | 242.4  |
| 2024 年度評価        | 163.7  | 228.9  | 244.5  | 277.2  | 279.1  |

## b) 資源量(万トン)

| 評価年度 / 年         | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MSY 算定時(2019 年度) | 415.9  | 384.6  | 310.0  | 254.7  | 227.9  |
| 2020 年度評価        | 341.5  | 408.3  | 356.3  | 291.7  | 246.8  |
| 2021 年度評価        | 308.4  | 320.7  | 374.9  | 317.5  | 257.1  |
| 2022 年度評価        | 441.6  | 486.5  | 442.8  | 439.3  | 389.3  |
| 2023 年度評価        | 454.7  | 522.4  | 496.7  | 491.4  | 440.7  |
| 2024 年度評価        | 422.4  | 516.9  | 526.6  | 492.2  | 426.4  |

## c) 加入尾数(億尾)

| 評価年度 / 年         | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MSY 算定時(2019 年度) | 186.5  | 185.3  | 187.1  | 185.6  | 186.9  |
| 2020 年度評価        | 391.5  | 185.8  | 186.0  | 185.2  | 185.5  |
| 2021 年度評価        | 341.8  | 442.3  | 198.2  | 199.2  | 198.1  |
| 2022 年度評価        | 549.1  | 696.5  | 616.4  | 441.3  | 439.9  |
| 2023 年度評価        | 621.4  | 783.7  | 688.7  | 581.9  | 466.1  |
| 2024 年度評価        | 665.4  | 978.1  | 752.2  | 605.9  | 351.0  |

漁獲シナリオに基づく将来予測結果を示す。将来予測結果は白背景で示し、それ以外の推定値などを灰色背景で示す。

## 補足資料 10 今後検討すべき課題の整理

今年度以降における本系群資源評価において取り組むべき課題を以下のように整理した（補足表 10-1）。

### (1) レジームシフト

マイワシ太平洋系群は大気～海洋生態系の構造の転換（ ジームシフト）と同期して資源が大きく変動するとされる。本資源は、再生産関係も ジームシフトと同期して変化すると想定しているが、 ジームシフトの検出・判別は困難であり、近年でレジームシフトが起きていたとすると、シフトを検出するのはさらに難しい。レジームシフトの検出・判別手法の研究を進める必要がある。また、このような ジームシフトと同期して大きく変動する資源をどのように管理すべきかについては今後も議論が必要だろう。

### (2) 年齢別漁獲尾数・年齢別体重

外国漁船による年齢別漁獲尾数および年齢別体重については、NPFC にロシアからは報告がなく、中国からは漁獲物の体長組成についての報告はあるが報告年数は十分とは言えない。さらなる報告を求めるとともに、年齢査定手法の情報交換を行う等して、外国漁船による年齢別漁獲尾数の精度向上も必要である。

我が国の漁獲物については、主要港において各年・各季節による漁獲量や体長組成、年齢組成について十分なサンプリング・計測が行われており、我が国の漁業における地域や季節による体長組成・年齢組成や体重の違いを十分把握したうえで年齢別漁獲尾数が推定されている。

現在、年齢別漁獲尾数の推定は、耳石あるいは鱗による年齢査定結果に基づいている。鱗と耳石の年齢査定結果に大きな食い違いはないことは確認してあるが（Kamimura et al. 2022、Fujinami et al. 2024）、それぞれの査定手法における誤差やバイアスについては厳密には評価できていない。年齢査定における誤差やバイアスの評価を行うとともに、年齢別漁獲尾数の観測誤差の評価も試みる必要がある。

### (3) 成熟率

親魚量の推定において重要である年齢別成熟割合について、資源および環境変動に伴う成長の変化により、親魚の繁殖特性も変化していることが想定されるが、現状では十分な情報が得られていない。本年度評価で 2016 年以降に適用している成熟率として、 ジームシフト後に一時的に資源が回復した 1994～1997 年当時と同等の状態を仮定しているが、このことは 2014～2016 年のサンプルの分析結果に基づくものである（由上ほか 2017）。一方、本系群では 2018 年以降、年齢別体重が減少する傾向が見られており（補足表 2-1、補足図 10-1）、それに伴って成熟率の低下も生じている可能性がある。成熟率が本年度評価の仮定より低かった場合、資源量および親魚量は過大に推定されている危険がある（補足図 10-2）。資源評価の精度向上のためにも、近年の成熟率に関する情報の収集・解析を進める必要がある。

## (4) 漁獲量や選択性等の不確実性

本系群では、我が国の漁獲量は漁業・養殖業生産統計年報から、ロシアおよび中国の漁獲量はNPFCを通じて、十分信頼に足る漁獲量情報を得ているが、引き続き信頼性の高い情報が得られるよう働きかけていく必要がある。


魚種選択性（狙い操業）は、他の浮魚類の来遊状況との関係で本種に対する選択性に変化が生じると考えられ、漁業から資源量指標値を得て資源計算に採用する場合には十分な注意が必要となるが、本系群では漁業由来の資源量指標値を使用しておらず、問題にならない。また、サイズ選択性についても、漁具自体に大きな変化はなく、長期的に見て漁業種ごとで見れば変化があるとは考えられないが、公海域で漁獲している中国の漁獲物は我が国のものと比べて小型に偏っている。この違いの要因として、年齢別に分布範囲が異なることや漁具構成が異なることが考えられる。海域により漁獲物サイズが異なることについては今後も注視する必要がある。ただし、現在採用している資源評価モデル（VPA）では、海域による漁獲量の比率が変わることがあっても、資源全体にかかる年齢別選択率は各年で適正に推定されていると考えられる。

## 引用文献


- Fujinami, Y., M. Takahashi, H. Kurota (2024) Evaluation the precision of age determination and variability in growth for Japanese sardine (*Sardinops melanostictus*), Tsushima Warm Current sub-population. JARQ. **58**, 65-74.
- Kamimura, Y., K. Tadokoro, S. Furuichi, and R. Yukami (2022) Stronger density-dependent growth of Japanese sardine with lower food availability: Comparison of growth and zooplankton biomass between a historical and current stock-increase period in the western North Pacific. Fish. Res. **255**, 106461.
- 由上龍嗣・渡邊千夏子・上村泰洋・古市 生・赤嶺達郎・岸田 達 (2017) 平成 28 (2016) 年度マイワシ太平洋系群の資源評価. 水産庁・水産研究・教育機構, 東京. 15-52.

補足表 10-1. 今後検討すべき課題の整理項目

| 項目                | 検討課題                                       |
|-------------------|--------------------------------------------|
| レジームシフト           | ・レジームシフトの検出・判別手法の研究<br>・レジームシフト資源の管理のありかた  |
| 年齢別漁獲尾数・<br>年齢別体重 | ・年齢別漁獲尾数の観測誤差の評価<br>・外国船による年齢別漁獲尾数の推定精度の向上 |
| 成熟率               | ・年齢別成熟割合の推定                                |
| 漁獲量や選択性等の<br>不確実性 | ・現状問題になっていないが、今後も魚種選択性やサイズ選択性について注視する      |



補足図 10-1. 漁獲物の年齢別平均体重の経年変化




補足図 10-2. 近年の成熟率がより低いと仮定した場合の親魚量、資源量、加入尾数の推定結果の比較

ここでは、近年、成熟率がより低かった場合の仮定として、マイワシ太平洋系群および対馬暖流系群において、もっとも成熟率が低かった年代の成熟率を 2018 年級以降に適用した上で VPA により資源量推定をした結果を示した（青実線）。適用した成熟率は、対馬暖流系群の 1976～1989 年の値（0-1 歳：0、2 歳：0.5、3 歳以上：1）。

## 補足資料 11 昨年度評価結果との比較

本年度評価では、昨年度（2024 年度）資源評価結果と比べて、2021 年級群および 2022 年級群の資源量が上方修正された（補足図 11-1）。それにともない、2024 年の親魚量も増加した。この原因としては、2024 年における 2 歳魚（2022 年級群）および 3 歳魚（2023 年級群）の漁獲尾数が多かったことの影響が大きいと思われる。2025 年以降の予測値については、仮定した再生産関係のパラメータや管理基準値等が異なるため直接比較できないが、両者が大きく乖離することはなかった。



補足図 11-1. 本年度（2025 年度）評価と昨年（2024 年度）度評価との比較

実線は VPA による推定値、点線は漁獲シナリオに基づく将来予測結果の平均値、網掛けはシミュレーション結果の 90%が含まれる予測区間を示す。